

金英杰微信公众号“jinyingjieedu”

获取更多 2017 综合笔试真题及答案请加群 511574534

2017 中西医执业助理

12. 舌色淡白而有裂纹，其临床意义是

- A. 阴液亏虚
- B. 热盛伤津
- C. 脾虚湿侵
- D. 寒邪凝滞
- E. 血虚不润

答案：E

【解析】舌淡白而有裂纹，多为血虚不润。

13. 舌苔黄腻的临床意义是

- A. 湿热内蕴
- B. 大肠热盛
- C. 心火亢盛
- D. 肺热壅盛
- E. 热陷心包

答案：A

【解析】舌苔黄腻而厚为痰热、湿热、暑湿等邪内蕴。

14. 夜卧不安，腹胀，嗳腐吞酸的临床意义是

- A. 心肾不交
- B. 胆郁痰扰

- C. 食滞内停
- D. 心脾两虚
- E. 痰湿困脾

答案：

【解析】卧不安，腹胀暖气酸腐者，多为食滞内停。

35. 《素问·生气通天论》：“冬伤于寒，春必温病。”此说的发病类型是属于

- A. 感邪即发
- B. 徐发
- C. 伏而后发
- D. 复发
- E. 继发

答案：C

【解析】《素问·生气通天论》的“冬伤于寒，春必温病。”描述的是感受邪气后，病邪在机体内潜伏一段时间，或在诱因的作用下，过时而发病，称为“伏而后发”。

71. 流行性出血热判断少尿的标准为 24 小时尿量少于

- A. 400 ml
- B. 300 ml
- C. 200 ml
- D. 100 ml
- E. 50 ml

答案：A

【解析】少尿期多发生于第 5~8 病日，持续时间 2~5 日。24 小时尿量少于 400ml 为少尿，少于 50ml 为无尿。可引起尿毒症、酸中毒和水电解质紊乱，重者可出现高血容量综合征和肺水肿。

72. 杀灭细菌芽孢的方法是

- A. 紫外线消毒法
- B. 酒精浸泡法
- C. 碘伏浸泡法
- D. 环氧乙烷灭菌法
- E. 含氯消毒液浸泡法

答案：D

【解析】灭菌法可以杀灭包括细菌芽孢的一切微生物。该类消毒方法有热力、电离辐射、微波等物理方法和甲醛、戊二醛、过氧乙酸、环氧乙烷等化学灭菌剂。

73. 霍乱剧烈腹泻的主要致病因素是

- A. 神经氨酸酶
- B. 血凝素
- C. 霍乱内毒素
- D. 霍乱肠毒素
- E. 菌体裂解

答案：D

【解析】霍乱肠毒素能促使肠黏膜杯状细胞分泌黏液增加，使腹泻的水样便中含有大量黏液。腹泻导致的失水使胆汁分泌减少，所以吐泻物呈“米泔水”样。

74. 判断中毒性菌痢与流行性乙型脑炎的重要依据是

- A. 高热、昏迷、惊厥
- B. 发病季节
- C. 血清抗体检测
- D. 脑脊液常规
- E. 血常规

答案：C

【解析】流行性乙型脑炎(乙脑)多发生于夏秋季，常有高热、惊厥、昏迷等表现，需与中毒型菌痢相鉴别。乙脑起病与进展相对缓慢，循环衰竭少见，意识障碍及脑膜刺激征明显，脑脊液可有蛋白及白细胞增高，粪便检查多无异常，乙脑病毒特异性抗体 IgM 阳性可资鉴别。

75. 下列关于流行性出血热发热期三痛的叙述，正确的是

- A. 全身酸痛、头痛、眼眶痛
- B. 头痛、腓肠肌痛、腰痛
- C. 腹痛、腰痛、眼眶痛
- D. 头痛、腰痛、眼眶痛
- E. 全身酸痛、腰痛、眼眶痛

答案：D

【解析】常有典型的“三痛”：头痛、腰痛、眼眶痛。

76. 下列各项，属于针刺泻法的操作是

- A. 捻转角度小
- B. 捻转频率慢
- C. 轻插重提
- D. 先浅后深
- E. 操作时间短

答案：C

【解析】泻法，针下得气后，先深后浅，轻插重提，提插幅度大，频率快，操作时间长者为泻法。

77. 手太阴经在上肢的分布是

- A. 内侧前缘
- B. 外侧前缘

- C. 内侧中线
- D. 外侧后缘
- E. 内侧后缘

答案：A

【解析】十二经脉左右对称地分布于头面、躯干和四肢，纵贯全身。与六脏相配属的六条阴经(六阴经)，分布于四肢内侧和胸腹，上肢内侧为手三阴经，手足阴经为太阴在前、厥阴在中、少阴在后。

78. 下列各项中，属同名经配穴法的是

- A. 咳嗽取尺泽、太渊(均属于手太阴肺经穴)
- B. 阳明头痛取合谷、内庭(合谷属手阳明大肠经，内庭属足阳明胃经)
- C. 膝痛取阳陵泉、阴陵泉(阳陵泉属足少阳胆经、阴陵泉属足太阴脾经)
- D. 胃痛取中脘、内庭(中脘属于任脉，内庭属足阳明胃经)
- E. 痛经取公孙、隐白(均属于足太阴脾经穴)

答案：B

【解析】A 项咳嗽取尺泽、太渊(均属于手太阴肺经穴);B 项阳明头痛取合谷、内庭(合谷属手阳明大肠经，内庭属足阳明胃经)C 项膝痛取阳陵泉、阴陵泉(阳陵泉属足少阳胆经、阴陵泉属足太阴脾经);D 项胃痛取中脘、内庭(中脘属于任脉，内庭属足阳明胃经);E 项痛经取公孙、隐白(均属于足太阴脾经穴)。

79. 治疗耳聋虚证，应选取的主穴是

- A. 合谷、神门、翳风、耳门
- B. 太白、耳门、风池、听会
- C. 百会、耳门、风池、听宫
- D. 合谷、神门、翳风、听宫
- E. 肾俞、听宫、翳风、太溪

答案：E

【解析】治疗耳聋虚证主穴选听宫、翳风、太溪、肾俞

90. 伤寒病凡一经病证未罢，又见他经病证者，称为

- A. 合病
- B. 并病
- C. 继病
- D. 徐发
- E. 复发

答案：B

【解析】伤寒病初起不从阳经传入，而病邪直入于三阴者，称为“直中”。伤寒病不经过传变，两经或三经同时出现的病证，称为“合病”。如太阳阳明合病、太阳太阴合病等。并病，伤寒病凡一经病证未罢，又见他经病证者，称为“并病”。如太阳少阴并病、太阴少阴并病等。

B 型题

- A. 心与肺
- B. 心与肾
- C. 脾与肾
- D. 肝与肾
- E. 肺与肾

95. 上述各项，体现藏泄互藏关系的两脏是

答案：D

【解析】肝肾之间的关系，主要表现在精血同源、藏泄互用以及阴阳互滋互制等方面。

96. 上述各项，体现水火既济关系的两脏是

答案：B

【解析】心与肾在生理上的联系，主要表现为“心肾相交”。心肾相交的机理，主要从水火既济、精神互用、君相安位来阐发。

- A. 主贮藏胆汁

- B. 主受纳水谷
- C. 主腐熟水谷
- D. 主受盛水谷
- E. 主传化糟粕

97. 上述各项，属于小肠生理机能的是

答案：D

【解析】小肠的生理机能：(1)主受盛化物(2)主泌别清浊(3)小肠主液。

98. 上述各项，属于大肠生理机能的是

答案：E

【解析】大肠的生理机能：(1)主传化糟粕；(2)大肠主津。

- A. 虚中夹实
- B. 实中夹虚
- C. 真实假虚
- D. 邪正相持
- E. 真虚假实

99. 外感热病临床出现高热气粗、面红目赤，兼口渴、舌燥少津等，其病机是

答案：D

100. 临床由于气血亏损，血海空虚而致的经闭，其病机是

答案：E

- A. 面色淡黄枯槁
- B. 面色淡黄虚浮
- C. 面黑而干焦
- D. 面黄而晦暗

E. 面色口唇青紫

101. 寒湿凝滞可见的面色是

答案: D

【解析】黄而晦暗如烟熏者，属“阴黄”，乃寒湿郁滞所致。

102. 脾虚湿盛可见的面色是

答案: B

【解析】面色淡黄而虚浮，称为“黄胖”。属脾气虚弱，湿邪内盛。

A. 神疲乏力，皮下紫斑

B. 气短懒言，面色紫暗

C. 面色晄白，冷汗淋漓

D. 情志抑郁，胁肋胀痛

E. 头晕目眩，少气自汗

103. 气虚血瘀证的辨证要点是

答案: B

【解析】气虚血瘀证的辨证要点临床以面色淡白无华或面色紫暗，倦怠乏力，少气懒言，局部疼痛如刺，痛处固定不移、拒按，舌淡紫，或有斑点，脉涩等为辨证依据。

104. 气不摄血证的辨证要点是

答案: A

【解析】辨证要点临床以衄血、便血、尿血、崩漏、皮下青紫色斑块等各种慢性出血，并见面色淡白无华，神疲乏力，少气懒言，心慌心悸，食少，舌淡白，脉弱等为辨证依据。

A. 肺肾气虚证

B. 肺气虚证

C. 脾肺气虚证

D. 心肺气虚证

E. 肾气不固证

105. 以久病咳喘，呼多吸少，自汗耳鸣，腰膝酸软为特征的证是

答案：A

【解析】肺气虚，呼吸功能减退，而见咳喘无力、气短、咯痰清稀等症。肺肾气虚证则兼有呼多吸少、腰酸耳鸣、尿随咳出等肾失摄纳的证候。

106. 以久病咳喘，胸闷心悸，乏力少气，自汗声低为特征的证是

答案：D

【解析】肺气虚，呼吸功能减退，而见咳喘无力、气短、咯痰清稀等症。心肺气虚证则兼有心悸怔忡、胸闷等心气不足的证候；

A. 清热

B. 燥湿

C. 透疹

D. 健脾

E. 升阳

107. 茯苓和薏苡仁共同具有的功效是

答案：D

【解析】茯苓的【功效】利水渗湿，健脾，宁心。薏苡仁的【功效】利水渗湿，健脾，除痹，清热排脓。

108. 柴胡和葛根共同具有的功效是

答案：E

【解析】柴胡的【功效】解表退热，疏肝解郁，升举阳气。葛根的【功效】解肌退热，透疹，生津止渴，升阳止泻。

第二单元

1. 确诊肺结核最主要的方法是

- A. 血常规
- B. 胸部 CT
- C. 结核菌素试验
- D. 结核分枝杆菌检查
- E. 纤维支气管镜检查

答案：D

2. 慢性阻塞性肺疾病痰热郁肺证的中医治法是

- A. 温肺散寒，化痰降逆
- B. 宣肺降气，化痰止咳
- C. 宣肺散寒，化痰止咳
- D. 清热化痰，宣肺平喘
- E. 解表散寒，止咳化痰

答案：D

3. 肺心病急性加重期死亡的首要原因是

- A. 休克
- B. 肺性脑病
- C. 心律失常
- D. 消化道出血
- E. 酸碱平衡失衡

答案：B

4. 易形成肺大泡或囊状气肿的肺炎是

- A. 链球菌肺炎
- B. 病毒性肺炎

- C. 支原体肺炎
- D. 葡萄球菌肺炎
- E. 军团菌肺炎

答案：D

5. 原发性支气管肺癌的中医基本病机是

- A. 外邪内侵，化热成痰酿毒于肺，久成癥积
- B. 正气虚弱，癆虫乘虚耗阴伤肺，久成癥积
- C. 正气虚弱，毒恋肺脏，瘀阻络脉，久成癥积
- D. 外邪内饮，痰浊瘀血互结阻肺，久成癥积，
- E. 本虚标实，痰邪宿根，伏隐于肺，久成癥积

答案：C

6. 中央型肺癌通过 X 线检查表现的直接征象是

- A. 肺不张
- B. 阻塞性肺炎
- C. 局限性肺气肿
- D. 一侧肺门肿块
- E. 继发性肺囊肿

答案：D

7. 治疗脑血栓形成痰热腑实，风痰上扰证，应首选的方剂是

- A. 天麻钩藤饮
- B. 真方白丸子
- C. 星蒺承气汤
- D. 补阳还五汤

E. 镇肝熄风汤

答案：C

8. 癫痫持续状态伴肝功能不全，首选的治疗措施是

A. 地西洋静脉注射

B. 丙戊酸钠口服

C. 苯妥英钠口服

D. 异戊巴比妥口服

E. 10%水合氯醛 30ML 灌肠

答案：E

9. 左心衰竭最早出现的症状是

A. 夜间阵发性呼吸困难

B. 咳嗽、咳痰

C. 咳血

D. 乏力、疲倦

E. 劳力性呼吸困难

答案：E

10. 治疗心力衰竭痰饮阻肺证，应首选的方剂是

A. 四逆汤合五苓散

B. 参附汤合真武汤

C. 真武汤合三子养亲汤

D. 生脉散合五苓散

E. 真武汤合葶苈大枣泻肺汤

答案：C

11. 治疗窦性心动过速，应首选的方剂是

- A. 维拉帕米
- B. 地尔硫卓
- C. β 受体阻滞剂
- D. 胺碘酮
- E. 三磷酸腺苷

答案：C

12. 下列各项，不属于慢性心律失常病因病机的是

- A. 心阳不足
- B. 肝郁化火
- C. 心肾阳虚
- D. 气阴两虚
- E. 痰浊阻肺

答案：B

13. 心源性猝死最常见的病因是

- A. 冠心病及其并发症
- B. 扩张性心肌病
- C. 先天性心血管病
- D. 电解质失衡
- E. Q—T 间期延长

答案：A

14. 血管紧张素转换酶抑制剂的不良反应是

- A. 低钾血症

- B. 心率增快、面部潮红、头痛、下肢水肿
- C. 心动过缓、乏力，四肢发冷
- D. 体位性低血压
- E. 刺激性干咳和血管性水肿

答案：E

15. 下列各项中，不符合典型心绞痛特点的是

- A. 部位主要在胸骨中或上段之后
- B. 疼痛常为压迫、发闷或紧缩感
- C. 常有体力劳动或情绪激动诱发
- D. 持续时间一般超过 15 分钟
- E. 休息或舌下含服硝酸甘油可以缓解

答案：D

16. 促进已吸收的毒物排出的治疗措施是

- A. 立即脱离中毒环境
- B. 洗胃
- C. 导泻及灌肠
- D. 使用特效解毒药
- E. 血液透析

答案：E

17. 治疗慢性胃炎脾胃蕴热证，应首选的方剂是

- A. 四君子汤
- B. 柴胡疏肝散
- C. 益胃汤

D. 失笑散

E. 三仁汤

答案：E

18. 肝硬化门脉高压症的临床表现是

A. 腹水、黄疸、脾肿大

B. 腹水、黄疸、侧枝循环建立

C. 腹水、脾肿大、肝功能衰竭

D. 腹水、脾肿大、侧枝循环建立

E. 黄疸、脾肿大、侧枝循环建立

答案：D

19. 溃疡性结肠炎的腹痛特点是

A. 疼痛-便意-便后缓解

B. 转移性右下腹痛

C. 隔下钻顶样腹痛

D. 夜间隐痛，阵发性加剧

E. 腹痛-餐后缓解

答案：A

20. 下列各项，属于骨髓造血功能衰竭引起的贫血是：D(再生障碍性贫血)

A. 缺铁性贫血

B. 骨髓增生异常综合征

C. 铁粒幼细胞性贫血

D. 再生障碍性贫血

E. 地中海性贫血

21. 下列各项，不属成人特发性血小板减少性紫癜临床特点的是：C(脾脏显著增大)

- A. 全身皮肤出现瘀点
- B. 女性可表现为月经量过多
- C. 脾脏显著增大
- D. 牙龈出血
- E. 血小板功能正常

22. 治疗急性白血病热毒炽盛证，应首选的方剂是：B(黄连解毒汤合清营汤)

- A. 加味清胃散合泻心汤
- B. 黄连解毒汤合清营汤
- C. 六味地黄汤合茜根散
- D. 龙胆泻肝汤和犀角地黄汤
- E. 白虎汤合知柏地黄丸

23. 具有“腹中结块柔软，时聚时散，共窜胀痛”特点的病证是：E(聚证)

- A. 血瘀
- B. 气胀
- C. 痞满
- D. 积证
- E. 聚证

24. 治疗肾病综合征，应首选的药物是：A(尼泼松)

- A. 尼泼松
- B. 环磷酰胺
- C. 氮芥
- D. 环孢素

E. 麦考酚吗乙酯

25. 治疗尿路感染脾肾亏虚，湿热屡犯证，应首选的方剂是：C(无比山药丸)

A. 八正散

B. 丹栀逍遥散

C. 无比山药丸

D. 知柏地黄丸

E. 越脾加术汤

26. 治疗慢性肾衰竭湿浊证，首选的方剂是

A. 小半夏加茯苓汤

B. 黄连温胆汤

C. 五皮饮合五苓散

D. 桃红四物汤

E. 天麻钩藤饮

27. 急性肾衰竭少尿期出现的电解质紊乱主要表现是

A. 高钠血症

B. 高氯血症

C. 高钾血症

D. 高钙血症

E. 高镁血症

28. 胃和十二指肠同时发生的溃疡是

A. 幽门管溃疡

B. 球后溃疡

C. 复合性溃疡

D. 巨大溃疡

E. 老年人消化性溃疡

29. 治疗糖尿病并发症雀目，首选的方剂是

A. 玉女煎

B. 麦味地黄汤

C. 六味地黄丸

D. 金匱肾气丸

E. 杞菊地黄丸

30. 类风湿关节炎活动期的主要临床症状体征是

A. 晨僵

B. 对称性关节痛

C. 关节肿胀

D. 关节功能障碍

E. 关节畸形

31. 疼痛轻微，皮色不变，压之酸痛的原因是

A. 风

B. 气

C. 湿

D. 痰

E. 寒

32. 适用于医院环境内物品表面的消毒剂

A. 乙醇

B. 碘伏

C. 过氧乙酸

D. 环氧乙烷

E. 碘酊

33. 下列各项。不属于蛛网膜下腔麻醉的并发症的是

A. 头痛

B. 腰背痛

C. 尿潴留

D. 呼吸抑制

E. 下肢瘫痪

34. 下列各项，属正常人血清钠浓度的是

A. 100mmol/L

B. 110mmol/L

C. 120mmol/L

D. 130mmol/L

E. 140mmol/L

35. 术后减张缝线的拆除时间是

A. 4~5 日

B. 6~7 日

C. 7~9 日

D. 10~12 日

E. 14 日

36. 经痛的中医治法是

A. 合营祛瘀，清热利湿

B. 清肝解郁，消肿化毒

C. 散风清热，化痰消肿

D. 利湿祛痰，解热解毒

E. 活血化瘀，清热解毒

37. 后尿道损伤伴尿潴留应首选的紧急措施是

A. 立即导尿

B. 经会阴手术

C. 耻骨上膀胱造瘘

D. 尿道扩张术

E. 结肠造瘘

38. 肺癌纵膈受累侵犯下颈交感神经链的体征是

A. 患侧声带麻痹

B. 患侧横膈运动迟缓

C. 上腔静脉综合征

D. 心包堵塞体征

E. Homers 综合征

39. 治疗直肠癌湿热瘀毒证，应首选的方剂是

A. 四妙散

B. 木香分气丸

C. 吴茱萸汤

D. 导痰汤

E. 参苓白术散

40. 茵陈蒿汤合大柴胡汤治疗急性胆囊炎的中医证型是

- A. 肝胆瘟热证
- B. 肝胆湿热证
- C. 肝胆脓毒证
- D. 血瘀痰凝证
- E. 肝胃不和证

41. 治疗甲状腺功能亢进后手足抽搐，应首选的药物是

- A. 葡萄糖
- B. 肾上腺素
- C. 氯化钾
- D. 碘剂
- E. 葡萄糖酸钙

42. 治疗门静脉高压症气随血脱证，应首选的方剂是

- A. 实脾饮
- B. 独参汤
- C. 麦门冬汤
- D. 人参养荣汤
- E. 膈下逐瘀汤

43. 治疗便血不伴疼痛及痔块脱出的内痔，其中医治法是

- A. 清热凉血祛风
- B. 清热渗湿祛风
- C. 清热利湿祛风
- D. 补气升提止血
- E. 通腑泄热化瘀

44. 四妙勇安汤治疗血闭塞行脉管炎的中医证型是

- A. 寒湿证
- B. 血瘀证
- C. 热毒证
- D. 肾虚证
- E. 气虚证

45. 治疗银屑病风热血燥证，应首选的方剂是

- A. 凉血地黄丸
- B. 地黄饮子
- C. 萆薢渗湿汤
- D. 桃红四物汤
- E. 清营汤

46. 下列关于孕激素生理作用的叙述，正确的是

- A. 降低子宫平滑肌兴奋性，升高基础体温
- B. 促进子宫内膜腺体及间质增生、恢复
- C. 促子宫经口松弛，黏液分泌增加，变稀薄
- D. 促进卵泡发育
- E. 促进水钠潴留

47. 下列关于排卵性月经失调子宫内膜病理改变的叙述，错误的是

- A. 子宫内膜于经前呈分泌反应
- B. 分泌期的子宫内膜腺体呈现分泌反应不良
- C. 子宫内膜可见复杂性增生
- D. 月经第 5~6 天，可以见到分泌反应的子宫内膜

E. 月经第 5~6 天, 可以见到混合型的子宫内膜

48. 下列关于产程的叙述, 错误的是

- A. 第一产程也称为宫颈扩张期
- B. 第一产程指规律宫缩到宫口开全
- C. 第三产程约需时间为 1 个小时
- D. 总产程从规律宫缩开始到胎儿胎盘娩出
- E. 第二产程指宫口开全到胎儿娩出

49. 妊娠剧吐的临床常见证型是

- A. 肾气亏损证
- B. 脾胃虚弱证
- C. 气阴两虚证
- D. 痰火上扰证
- E. 肝气郁结证

50. 习惯性流产宫颈口松弛者, 修补术最佳时间为

- A. 妊娠 8-12 周
- B. 妊娠 14-18 周
- C. 妊娠 24-28 周
- D. 妊娠 32-36 周
- E. 分娩期

51. 下列关于妊娠期高血压疾病基本病理变化的叙述, 正确的是

- A. 妊娠 20 周后血压升高
- B. 子宫胎盘灌注不足
- C. 胎儿宫内生长受限

D. 全身小动脉痉挛

E. 可见蛋白尿

52. 产后出血的最常见原因是

A. 子宫收缩乏力

B. 胎盘植入

C. 软产道裂伤

D. 凝血功能障碍

E. 前置胎盘

53. 产褥感染最常见的中医证型是

A. 气虚血瘀证

B. 气血虚弱证

C. 感染邪毒证

D. 肝郁气滞证

E. 湿热下注证

54. 盆腔炎性疾病，湿热瘀结证的治疗方法是

A. 清热解毒，化瘀止痛

B. 清热利湿，化瘀止痛

C. 滋阴降火，化瘀止痛

D. 清热利湿，杀虫止痒

E. 清热利湿，燥湿止带

55. 下列各项，属于“治崩三法”的是

A. 塞流，澄源，求因

B. 塞流，固湿，调冲

C. 止血，固冲，复旧

D. 塞流，澄源，复旧

E. 塞流，止血，澄源

56. 黄氏建中汤治疗痛经所适用的中医证型是

A. 气滞血瘀证

B. 寒湿凝滞证

C. 湿热瘀主症

D. 气血虚弱证

E. 肝肾亏损证

57. 治疗产后身痛血虚证，应首选的方剂是

A. 独活寄生汤

B. 八珍汤

C. 黄芪桂枝五物汤

D. 生化汤

E. 人参养荣汤

58. 下列关于宫颈癌的叙述，错误的是

A. 高危型 PHV 持续感染不是子宫颈癌的主要危险因素

B. 宫颈癌 II 期指肿瘤已超出宫颈，但未达宫壁，或未达引导下 1/3

C. 原位癌或微嗜喘浸润癌可无明显病灶

D. 早期宫颈癌多为接触性出血或血水样阴道分泌物

E. 宫颈刮片细胞学检查是宫颈癌筛查的主要方法

59. 膈下逐瘀汤治疗子宫内膜异位症适宜的中医证型是

A. 寒温血瘀证

- B. 气滞血瘀证
- C. 痰瘀互结证
- D. 气虚血瘀证
- E. 肾虚血瘀证

60. 治疗不孕症，启宫丸适用的中医证型是

- A. 肾虚证
- B. 湿热证
- C. 肝郁证
- D. 痰湿证
- E. 血瘀证

61. 幼儿期年龄范围是

- A. 出生后脐带结扎至出生后满 28 日
- B. 出生后 28 日至 1 周岁
- C. 1~3 周岁
- D. 3~7 周岁
- E. 7 周岁至青春期来临

62. 小儿前囟闭合的正常时间是

- A. 5~6 个月
- B. 7~8 个月
- C. 9~11 个月
- D. 12~18 个月
- E. 20~24 个月

63. 下列特点可概括为“纯阳之体”的是

- A. 脏腑娇嫩，形气未充
- B. 生机蓬勃，发育迅速
- C. 发病容易，传变迅速
- D. 脏气清灵，易趋康复
- E. 易寒易热，易虚易实

64. 小儿辅助食品正确的添加原则是

- A. 由少到多
- B. 由粗到细
- C. 由多种到一种
- D. 由稠到稀
- E. 天气寒冷时尽快增加辅食

65. 诊断儿科疾病，四诊中最为重要的是

- A. 望
- B. 闻
- C. 问
- D. 切
- E. 触

66. 引起咽-结合膜热的病毒是

- A. 腺病毒
- B. 单纯疱疹病毒
- C. 柯萨奇病毒
- D. 巨细胞病毒
- E. 冠状病毒

67. 治疗病毒性心肌炎风热犯心证，应首选的方剂是

- A. 玉屏风散
- B. 荆防败毒丸
- C. 葛根芩连汤
- D. 银翘散
- E. 生脉散

68. 治疗鹅口疮心脾积热证，应首选的方剂是

- A. 清胃散
- B. 泻黄散
- C. 泻心汤
- D. 清热泻脾散
- E. 导赤散

69. 小儿泄泻脾虚泻症的治法是

- A. 健脾和胃，消食化滞
- B. 清热化湿，健脾止泻
- C. 疏风散寒，化湿和中
- D. 清肠解热，化湿止泻
- E. 健脾益气，助运止泻

70. 治疗急性肾小球肾炎应用青霉素的目的是

- A. 预防肾炎复发
- B. 防止交叉感染
- C. 清除残余病灶
- D. 治疗并发症

E. 治疗肾炎

71. 下列关于小儿营养性贫血治疗的叙述, 正确的是

- A. 口服铁剂按元素铁每日 0.2-0.6mg/kg
- B. 口服铁剂的同事口服维生素 B 有助于铁剂吸收
- C. 血红蛋白达正常水平后继续服用铁剂 6-8 周
- D. 口服铁剂最好于进餐时服药
- E. 牛奶可与铁同服, 不影响铁的吸收

72. 治疗小儿寒性哮喘, 应首选的方剂是

- A. 小青龙汤合三子养生汤
- B. 金佛草散合定喘汤
- C. 射干麻黄汤合都气丸
- D. 华盖散合麻杏石甘汤
- E. 三拗汤合二陈汤

73. 下列各项, 不属于过敏性紫癜临床表现的是

- A. 皮肤出血点
- B. 便血
- C. 呕吐
- D. 血尿, 蛋白尿
- E. 关节畸形

74. 下列临床表现, 符合麻疹发病特点的是

- A. 遍身猩红色皮疹
- B. 热退疹出
- C. 向心性分布

D. 最后出现于前胸及后背

E. 热甚疹出

75. 蛔虫成虫可引起的最常见的症状是

A. 脐周腹痛

B. 恶心呕吐

C. 寐中磨牙

D. 烦躁易怒

E. 喜食泥土

76. 患者，女，76岁。慢性肺源性心脏病史5年。近日受凉后咳喘加重，神志恍惚，谵语，抽搐，烦躁不安，咯痰不爽，舌质紫淡，脉细滑数。治疗首选的方剂是D(涤痰汤合至宝丹)

77. 患者，男，51岁。高血压病史20年。平素头晕目眩，头重如蒙，肢体麻木，胸脘痞闷。现症状突然出现短暂性神经功能缺失。彩色经颅多勒(TCD)课件血管狭窄，动脉粥样硬化斑块，应首先考虑的诊断为B(TIA)

78. 患者，女，35岁。尿频、尿急、尿痛3天，伴腰痛，高热，寒战，恶心呕吐，既往有尿路感染反复发作史，查体：39.8℃，肋腰点有压痛，有肾区叩击痛。血常规示WBC 11.8×10^9 。尿常规示白细胞++++/HP，红细胞+++/HP。临床诊断最可能是E(慢性肾盂肾炎急性发作)

79. 患者，女，32岁。甲状腺功能亢进症病史2年，症见颈前肿胀，烦躁易怒，胸闷，两肋胀满，善太息，失眠，月经失调，腹胀便溏，舌质淡红，苔白腻，脉弦。治疗应首选的方剂是E(逍遥散合二陈汤)

80. 患者，男，64岁。患有糖尿病3年，血脂，血糖控制不理想。今晨出现昏厥1次，短暂失忆，视物黑朦，右侧肢体无力，麻木，休息30分钟后症状消失，应首先考虑的诊断为：E(短暂性脑缺血发作)

81. 患者，女，62岁，高血压病史15年。近半年出现活动心悸，伴尿少肢肿。现症：心悸，喘息不能平卧，形寒肢冷，尿少便溏，舌淡胖，苔白滑，脉细数。查体：心界向两侧扩大，心率100次/分，两下肢闻及细湿啰音，肝颈静脉反流征阳性，踝部凹陷性水肿。其病症结合诊断是：C(慢性心力衰竭，阳虚饮停证)

82. 患者，女，65岁。Ⅱ度Ⅰ型房室传导阻滞病史3年。现症见心悸气短，动则加剧，汗出倦怠，面色苍白，形寒肢冷，舌淡苔白，脉沉细而数。其中医治法是：D(温补心阳，安神定悸)

83. 患者，男，75岁。高血压病30年，血压控制不住，一直未重视。近来自觉乏力，腰酸，双目模糊，食欲减退，时有恶心，来院就诊。查血压160/95mmgh，尿常规提示蛋白质(+)，红细胞(+)，血清肌酐425umol/L。目前患者禁用的药物是

- A. 呋塞米
- B. 贝那普利
- C. 硝苯地平
- D. 双嘧达莫
- E. 美托洛尔

84. 患者，男，65岁。急性心肌梗死1周，未进行介入治疗。现症胸闷心痛，动则加重，神疲乏力，气短懒言，心悸自汗，舌胖色暗，苔薄白，脉细无力。心电图示：V3-5异常Q波，伴T波双向。其病证结合诊断是

- A. 急性前壁心肌梗死，气虚血瘀证
- B. 急性前壁心肌梗死，痰瘀互结证
- C. 急性高侧壁心肌梗死，气虚血瘀证
- D. 急性下壁心肌梗死，心脾两虚证
- E. 急性前壁心肌梗死，气阴两虚证

85. 患者，女，50岁。虚烦不眠，触事易惊，终日提提，伴气短自汗，倦怠无力，舌淡，脉弦细。治疗应首选的方剂是

- A. 六味地黄丸合交泰丸
- B. 安神定志丸和合酸枣仁汤
- C. 归脾汤合二陈汤
- D. 龙胆泻肝汤
- E. 黄连温胆汤

86. 患者，男，65岁。胃癌胃大部切除术后半年，现症见神疲乏力，面色无华，少气懒言，动则气促，自汗，消瘦，舌态薄白，舌质淡白，边有齿痕，脉沉细无力。其中医证型是

- A. 痰湿内阻证
- B. 脾胃虚寒证
- C. 脾胃虚弱证
- D. 肝胃不和证
- E. 气血两虚证

87. 患者，男，35岁。慢性粒细胞白血病5年。近1月来地热，盗汗，头晕，面色潮红，口干口苦，心悸，消瘦，面色无华，皮肤瘀斑。舌红，脉细数。应首选的中西医治疗方案是

- A. 苯丁酸氮芥，四君子汤
- B. 羟基脲，青嵩鳖甲汤
- C. 阿糖胞苷，归脾汤
- D. 白消安，八珍汤
- E. 环磷酰胺，沙参麦冬汤

88. 患者，女，76岁。咳嗽，痰少，伴气急，胸肋刺痛，呼吸，转侧则疼痛加重，寒热往来，口苦咽干，苔薄白，脉弦数。其中医诊断是

- A. 痰饮，饮留胃肠证
- B. 悬饮，饮停胸胁证
- C. 悬饮，邪犯胸肺证
- D. 支饮，寒饮伏肺证
- E. 伏饮，心脾两虚证

89. 患者，男，43岁。慢性肾小球肾炎病史3年。现症面色无华，少气乏力，手足心热，腰酸背痛，舌红，少苔，脉细。查体：血压150/90mmgh。尿蛋白1.5g/24小时。首选的中西医治疗方案是

- A. 氨氯地平，济生肾气丸

- B. 氯沙坦，参芪地黄丸
- C. 阿糖胞苷，归脾汤
- D. 环磷酰胺，八珍汤
- E. 苯丁酸氮芥，沙参麦冬汤

90. 患者，女，22岁。寒战，高热，腹痛，尿频、尿急、灼热刺痛，舌红苔黄腻，脉滑数。查体：体温39℃，双肾区叩诊击痛。实验室检查：查白细胞 $19.5 \times 10^9 / L$ 。中性粒细胞90%，尿白细胞20个/高倍视野，应首先考虑的病症结合诊断是

- A. 急性肾盂肾炎，膀胱湿热证
- B. 急性肾盂肾炎，肝胆郁热证
- C. 急性膀胱炎，膀胱湿热证
- D. 急性膀胱炎，肝胆郁热证
- E. 尿路综合征，膀胱湿热证

91. 患者，女，49岁。尿频尿急3天。小便湿浊，排尿刺痛，下腹部疼痛，无发热和腰痛，尿常规：尿蛋白(一)，白细胞20~30HP。红细胞10~15HP，为改善患者症状，同时增加抗生素的疗效，可以服用的药物是

- A. 维生素C
- B. 维生素B6
- C. 叶酸
- D. 碳酸氢钠
- E. 抗焦虑药

92. 患者，男，46岁。2型糖尿病多年。口服多种降糖药、血糖控制差，现症尿频量多，浊如脂膏，腰酸腿软，口干乏力。头晕耳鸣，皮肤干燥，舌红少苔，脉细数，实验室检查：空腹血糖10.9mmol/L，糖化血红蛋白90%，应选用的中西医结合治疗方案是

- A. 胰岛素，玉女煎
- B. 胰岛素，六味地黄丸

- C. α -糖苷酶抑制剂，消渴方
- D. 磺脲类，知柏地黄丸
- E. 双胍类，石斛明目丸

93. 患者因颜面及下肢反复浮肿 4 年，加重 2 个月入院。现 侧浮身肿，按之凹陷不起，面色灰滞。畏寒肢冷。腰腿酸软。神清抗呆，舌 淡 有 ，苔白，脉沉 。治疗首选的方剂是

- A. 知柏地黄丸
- B. 济生肾气丸合真武汤
- C. 金鹰肾气丸合猪苓汤
- D. 程氏
- E. 汤合五皮饮

94. 患者在输液的过程中，突发心率加快，咳嗽甚至呼吸困难。肺部大量湿罗音。咳大量血性泡沫样痰。皮肤发绀。X 线摄片显示肺水肿影像。应首选考虑的诊断为

- A. 非溶血性发热反应
- B. 细菌污染反应
- C. 循环超负荷
- D. 过敏反应
- E. 溶血反应

95. 痈患者，局部疮湿平塌，极苔酸浸，疮色 滞，不易化脓腐脱，溃出脓液稀少，疼痛剧烈，伴有高热，脂燥 干，结呆，大便秘燥，小便短赤，舌红，苔黄，脉细数。治疗应首选的方剂是

- A. 仙方活命饮
- B. 竹叶黄芪汤
- C. 十全大补汤
- D. 知柏地黄丸

E. 防风痛圣散

96. 脑震荡患者受伤 10 天后仍感头痛，肢倦乏力，精神不振，舌淡，苔薄白，脉细。其中医治法是

- A. 益气补肾，养血健脑
- B. 益气补血，活血化瘀
- C. 疏肝活血，安神健脑
- D. 清热解毒，活血养血
- E. 开窍通闭，活血化瘀

97. 患者面部突发肿物，直径约 1cm，质软，边界清楚，表面与皮肤粘连，肿物中央皮肤表面有一小孔。应首先考虑的诊断是

- A. 脂肪瘤
- B. 纤维瘤
- C. 神经纤维瘤
- D. 皮脂腺囊肿
- E. 血管瘤

98. 患者突发腹痛，并逐渐转移至右下，进行性加剧，右下腹压痛，反跳痛阳性，腹皮挛急，可扪及包块，壮热，恶心纳差，便秘，舌红，苔黄腻，脉滑数。治疗可与大黄牡丹汤合用的方剂

- A. 红藤煎剂
- B. 透脓散
- C. 白虎汤
- D. 犀角地黄汤
- E. 托里消毒散

99. 甲状腺癌患者，肿块坚硬如石，推之不移，局部僵硬，形体消瘦，皮肤枯槁，声音嘶哑，腰酸无力，舌苔红，少苔，脉沉细数。治疗应首选的方剂是

- A. 海藻玉壶汤合逍遥散

- B. 桃红四物汤合海藻玉壶汤
- C. 通窍活血汤合养阴清肺汤
- D. 柴胡疏肝散合海藻玉壶汤
- E. 龙胆泻肝合藻药散

100. 患者餐后突发性上腹痛，刀割样，恶心呕吐，全腹压缩，反跳痛阳性，腹肌紧张，未确诊进一步影应作的检查是

- A 尿淀粉酶
- B. 立位腹部平片
- C. 腹部彩超
- D. 肝、肾功能
- E. 血脂肪酶

101. 患者，女，28岁。周期性无痛性便血2年，呈滴血新鲜，量较多，痔核较大，便时痔核脱出肛外，便后能自行还纳，应首先考虑的诊断是

- A. I 期
- B. II 期内痔
- C. III 期内痔
- D. IV 期内痔
- E. 血栓外痔

102. 患者，男，30岁。5天前有不洁性生活史，昨天发现尿道口红肿发痒，轻度刺痛，排尿不适，今晨排尿时尿道外口刺痛灼热，排尿后减轻，尿道口有黄色粘稠的脓性分泌物。应首先考虑的诊断是

- A 梅毒
- B. 淋病
- C. 尖锐湿疣
- D. 慢性前列腺炎

E. 前列腺增生症

103. 患者，女，49岁，已婚。子宫颈脱出于阴道口1月，劳累或向下屏气后加重，下腹下坠，神倦乏力，少气懒言，面色无华，舌淡红，苔薄白，脉缓弱。治疗应首选的方剂是

- A. 龙胆泻肝丸
- B. 五味消毒饮
- C. 补中益气汤
- D. 大补元煎
- E. 知柏地黄丸

104. 患者，女，30岁。诊断为盆腔炎5天，出现神昏谵语，口渴欲饮，烦躁不宁1天，体温39℃，舌红绛，苔黄燥，脉弦细数。治疗应首选的方剂是

- A. 青蒿鳖甲汤
- B. 大黄牡丹皮汤
- C. 清营汤
- D. 五味消毒饮
- E. 白虎汤

105. 患者，女，34岁。孕29周，面目及下肢浮肿，按之凹陷，肤色浅，皮薄而光亮，倦怠无力，气短懒言，下肢逆冷，腰膝酸软，小便短赤，舌淡胖边有齿痕，苔白滑，脉沉滑无力

- A. 阴虚肝阳证
- B. 气虚血瘀证
- C. 气滞湿阻证
- D. 脾肾两虚证
- E. 脾虚肝旺证

106. 患者产后血性恶露4周末止，时多时少，色暗紫，夹血块，小腹疼痛拒按，舌紫黯，边尖有瘀斑、瘀点，脉沉涩。其中中医证型是

- A. 血瘀证
- B. 气滞证
- C. 气虚证
- D. 血虚证
- E. 血寒证

107. 患者，女，30岁，已婚。停经9周左右开始出现阴道不规则出血10余天，有时可见水泡状组织排出，下腹隐痛，呕吐剧烈，食入即吐，汤水难咽。查人绒毛促性腺激素值明显高于正常妊娠月份值。应首先考虑的诊断是

- A. 先兆流产
- B. 异位妊娠
- C. 葡萄胎
- D. 难免流产
- E. 不全流产

108. 患者，女，30岁，已婚。月经稀发，肥胖，婚后未孕，带下量多，形体肥胖，多毛，四肢倦怠，胸闷泛恶，现月经停闭8月，检查血HCG(-)，超声提示：子宫附件无明显异常，内膜厚7mm，舌体胖大，色淡，苔白腻，脉滑。其中中医证型是

- A. 寒湿凝滞证
- B. 脾肾阳虚证
- C. 痰湿阻滞证
- D. 气滞血瘀证
- E. 肝郁脾虚证

109. 患者产后1月余，尿频伴夜尿多1周，腰膝酸软，头晕耳鸣，无尿痛，面色晦暗，舌淡，苔白滑，脉沉细无力。其中中医证型是

- A. 脾虚证
- B. 血瘀证

- C. 气虚证
- D. 气滞证
- E. 肾虚证

110. 患者，女，38岁，外阴奇痒难忍，灼热疼痛1周，自外用达克宁栓无明显好转。带下量多，色黄气秽，胸闷烦躁，口苦口干，小便黄，大便干，舌红，苔黄腻，脉弦数。妇科检查见局部皮肤黏膜粗糙肥厚，其中医治法是

- A. 滋阴清热，养血通络
- B. 健脾除湿，升阳止带
- C. 清利湿热，通络止痒
- D. 疏肝理气，活血解毒
- E. 疏肝解郁，养血通络

111. 患者，女，28岁。近1年经前乳房、乳头胀痛，胸闷肋胀，精神抑郁，头晕目眩，烦躁易怒，舌紫黯，脉弦，其中医证型是

- A. 脾肾阳虚证
- B. 肝肾阴虚证
- C. 肝郁气滞证
- D. 瘀血阻滞证
- E. 心脾气虚证

112. 患者，2岁。发热烦躁，咳嗽喘促，呼吸困难，气急鼻煽，喉间痰鸣，面赤口渴，吐痰，舌质红，舌苔黄厚腻，指纹紫滞。其证是

- A. 风寒闭肺证
- B. 风热闭肺证
- C. 肝郁气滞证
- D. 瘀血阻滞证
- E. 心脾气虚证

113. 患者，10个月。腹泻3天，现精神萎靡，皮肤干燥，眼窝凹陷，哭时泪少。四肢稍凉。判断其脱水程度是

- A. 无脱水
- B. 轻度脱水
- C. 中度脱水
- D. 重度脱水
- E. 重度脱水伴休克

114. 病毒性脑炎患儿，出现高热，头痛，恶心呕吐，神志不清，喉中痰鸣，颈项强直，烦躁不安，肢体抽抽，舌红，苔黄腻，脉数。治疗应首选的方剂是

- A. 龙胆泻肝汤
- B. 镇肝熄风汤
- C. 犀角地黄汤
- D. 清瘟败毒散
- E. 羚角钩藤汤

115. 患儿，7岁。多动难静，急躁易怒，冲动任性，深思涣散，动作涣散，动作笨拙，注意力不集中，无心烦躁，记忆力差，腰酸乏力，大便闭结，舌红，苔薄，脉弦细。治疗应首选的方剂是

- A. 知柏地黄丸
- B. 杞菊地黄丸
- C. 六味地黄丸
- D. 金贵肾气丸
- E. 河车八味丸

116. 患儿，6岁。突发高热，恶心呕吐，血压90/60mmHg，神志昏迷，反复惊厥，四肢温，肛门拭子查到脓血便。舌质红那个，苔黄，脉数。治疗应首选的方剂是

- A. 参附龙牡救逆汤

- B. 独参汤
- C. 黄连解毒汤
- D. 清瘟败毒饮
- E. 甘露消毒丸

117. 患儿，8个月。未及时添加辅食和维生素D制剂。近1月来，多汗夜惊，烦躁不安，前囟开大，乳牙未萌，发稀枕秃。治疗选用维生素D的剂量是

- A. 每日 1000IU
- B. 每日 1500IU
- C. 每日 2000IU
- D. 每日 200IU
- E. 每日 3000IU

118. 患儿，5岁，轻微发热2天，双侧耳根部漫肿疼痛，边缘不清，触之痛甚，咀嚼不便，咽红，舌质红，苔薄黄，脉浮数。诊为流行性腮腺炎。其中医证型是

- A. 邪侵肺卫证
- B. 温毒在表证
- C. 毒邪内闭证
- D. 热毒炽盛证
- E. 邪犯肺脾证

答案 B

119. 患儿，7岁。发热一周，伴咽痛、躯干部皮疹。查体：T38.6℃，咽充血，扁桃体 II 度肿大，两侧颈部可触及肿大的淋巴结，肝脾肿大，躯干部见红色斑丘疹，压之褪色。舌质红，苔黄，脉数。血常规示白细胞 $12 \times 10^9/L$ ，异型淋巴细胞 16%。其诊断是

- A. 川崎病
- B. 麻疹

C. 传染性单核细胞增多症

D. 猩红热

E. 风热热

答案 C

120. 患儿，2岁。咳嗽2天，咳声不爽，痰黄黏稠，口渴咽痛，鼻流浊涕，伴发热、恶心、头痛、微出汗，舌红苔薄黄，脉浮数。其中医证型是

A. 风寒咳嗽

B. 风热咳嗽

C. 痰热咳嗽

D. 痰湿咳嗽

E. 阴虚燥咳

答案 B

121. 支气管哮喘患者，症见倦怠无力，食少便溏，面色萎黄无华，痰多而黏，咳吐不爽，胸脘满闷，恶心纳呆，舌质淡苔白腻，脉细弱。治疗应首选的方剂是：

C(六君子汤)

122. 支气管哮喘患者，症见喘促气短，语气低微，面色晄白，自汗畏风，咳痰清稀色白，鼻流清涕，舌淡苔白，脉细弱。治疗应首选的方剂是：D(玉屏风散)

123. 上述各项，属于符合心肌梗死中医病机的是：B(寒凝、气滞、血瘀、痰阻)

124. 上述各项，属于符合原发性高血压中医病机的是：D(肝阳上亢、痰浊内蕴)

125. 治疗白细胞减少症脾肾亏虚证，应首选的方剂是：B(黄芪建中汤合右归丸)

126. 治疗缺铁性贫血脾肾阳虚证，应首选的方剂是：D(八珍汤和无比山药丸)

127. 患者腹痛肠鸣，泻下粪便臭如败卵，脘腹胀满，其中医治法是：E(消食导滞，和中止泻)

128. 患者泄泻清稀，脘闷食少，腹痛肠鸣，恶寒头痛，其中医治法是：E(芳香化湿，解表散寒)

129. 治疗糖尿病体形肥胖并伴有血脂异常者，应首选的药物是：A(磺脲类)

130. 治疗糖尿病仅餐后血糖增高者，应首选的药物是：B(α -葡萄糖苷酶抑制剂)

131. 治疗甲状腺功能亢进症肝火旺盛证，应首选的方剂是：D(龙胆泻肝汤)

132. 治疗甲状腺功能亢进症阴虚火旺证，应首选的方剂是：E(天王补心丹)

消痛散

失笑散

桃红四物汤

二仙汤

瓜蒌牛蒡汤

133. 治疗乳房纤维瘤肝气郁结证，应首选的方剂是：A

134. 治疗乳腺增生病冲任失调证，应首选的方剂是：D

尿频、尿急、尿痛

进行性排尿困难

尿滞留

D. 无痛性血尿

E. 突发腰腹痛伴血尿

135. 属于前列腺增生症的症状 B

136. 属于泌尿系统解释的症状是 E

A. 硬下疳

B. 脊髓痨

C. 杨梅疮

D. 神经梅毒

E. 心血管梅毒

137. 一期梅毒的主要表现是 A

138. 二期梅毒的主要表现是 C

A. 妊娠 20 周前阴道出血或腹痛

B. 妊娠 28 周阴道反复无痛性出血

C. 子宫软，大小与停经月份不相符

D. 孕晚期反复无痛性阴道出血

E. 孕晚期或分娩期腹痛伴阴道出血

139. 胎盘早剥 I 度表现出的症状是

答案 E

20 周后或分娩期阴道出血，伴腹痛。子宫软，大小与停经月份相符。

140. 前置胎盘孕晚期表现出的症状是

答案 D

A. 知柏地黄丸

B. 归肾丸

C. 六味地黄丸

D. 杞菊地黄丸

E. 人参养营汤

141. 治疗经前综合征肝肾阴虚证，应首选的方剂是

答案 A

142. 治疗绝经综合征肝肾阴虚证，应首选的方剂是

答案 D

- A. 补中益气汤
- B. 胎元饮
- C. 寿胎丸
- D. 泰山磐石散
- E. 通乳丹

143. 治疗胎漏、胎动不安气血虚弱症，应首选的方剂是

答案 B

144. 治疗产后缺乳气血虚弱症，应首选的方剂是

答案 E

- A. 补肾壮骨，填阴温阳
- B. 补肺益肾，活血祛瘀
- C. 健脾益气，补肺固表
- D. 理气益肺，止咳化痰
- E. 扶正固表，调和营卫

145. 反复呼吸道感染营卫失和，邪毒留恋证的治法是

答案 E

146. 反复呼吸道感染肾虚骨弱，精血失充证的治法是

答案 A

- A. 不换金正气散
- B. 保和丸
- C. 异功散
- D. 养胃增液汤
- E. 平胃散

147. 患儿不思进食，食少饮多，皮肤湿润，大便偏干，小便短黄，手足心热，舌红少津，苔少，脉细数。治疗应首选的方剂是

答案 D

148. 患儿不思进食，食而不化，大便偏稀夹不消化食物，面色少华，形体偏瘦，舌质淡，苔薄白，脉细无力，治疗应首选的方剂为

答案 C

A. 淡

B. 滞

C. 红

D. 紫

E. 沉

149. 小儿出现咳嗽，鼻塞流涕，咽腔不适，舌淡红苔白，辨寒热时，其指纹为

答案 C

150. 小儿大便稀薄，日 3-5 次，色黄褐(?)，气味臭秽，辨虚时，其指纹为

答案 B