

2020 年护士执业资格考试 13 日考题汇总 (网友回忆版)

患儿, 10 个月, 易激惹, 夜间哭闹、多汗、睡眠不安。查体: 方颅、肋骨串珠, 手镯征(+), 诊断为佝偻病, 以下护理措施不妥的是

- A. 指导母乳喂养
- B. 操作轻未以防断针
- C. 多抱患儿到户外晒太阳
- D. 添加含维生素 D 的食物
- E. 积极进行站立行走锻炼

颅内动脉瘤最常见的部位是

- A. 大脑中动脉
- B. 大脑后动脉
- C. 项内-后交通动脉
- D. 大脑前动脉
- E. 基底动脉

符案: C

患者, 男。春节期间出国游玩, 回国后确诊 COVID-19。关于该患者的隔离处理措施正确的是

- A. 患者有权拒绝隔离
- B. 自我居家隔离
- C. 在医际传染病期进行如制隔离
- D. 无需隔离
- E. 在医皖发热门诊进行隔的

C

静脉输液中发现药液不滴查无回血, 轻轻挤压输液管有阻力感, 此时应 ()

- A. 调整针头位置
- B. 局能热敷按摩
- C. 升高输液取高度
- D. 适当变换股体位置
- E. 更换针头重新穿刺

答案: E

“后天之本”指的是

- A. 用
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

答案: C

漏斗骨盆胎头内旋导致

- A. 持选性视的位
- B. 持读性枕后位
- C. 持法性臂先露

D. 持续性肩先露

E. 子宫破裂

答案：B

年龄达六十岁之后每增加一岁心排量是

A. 增加 1%

B. 增加 2%

C. 下降 1%

D. 下降 2%

E. 无明显变化

答案：C

属于乙类传染病，但按甲类管理的疾病是

A. 伤寒

B. 霍乱

C. 高致病性禽流感

D. 鼠疫

E. 非典型肺炎

情案：E

留置导尿管病人的护理措施错误的是

A. 每周更换尿袋一次

B. 每天更换尿袋一次

C. 每周更换尿管一次

D. 观察尿量及性状

E. 每天行会阴护理两次

答案：A

青霉素过敏性休克在抢救时首先采取的措施是

A. 立即通知医生抢救

B. 静脉注射 0.1% 盐酸肾上腺素 1ml

C. 立即停药，平卧，皮下注射 0.1% 盐酸肾上腺素

D. 立即吸氧，胸外心脏按压

E. 氢化考的松静脉输液

答案：A

不符合铺床节力原则的是

A. 备齐用物，按序放置

B. 身体靠床沿

C. 上身前倾，两膝直立

D. 下肢稍分开，保持稳定

E. 使用肘部力量，动作轻柔

答案：C

1: 静脉输液中发现药液不滴查无回血，轻轻挤压输液管有阻力感，此时应

A. 调整针头位置

B. 局部热敷按摩

- C.升高输液瓶高度
- D.适当变换肢体位置
- E.更换针头重新穿刺

答案及解析

进针后、注射药液前，务必检查有无回血。静脉注射必须见有回血后方可注入药物。

2: 男。春节期间出国游玩，回国后确诊 COVID-19,关于该患者的隔离处理措施，正确的是

- A.患者有权拒绝隔离
- B.自我居家隔离
- C.在医院传染病房进行强制隔离口
- D.无需隔离
- E.在医院发热门诊进行隔离

答案及解析

必须强制隔离。

3: 颅内动脉瘤最常见的部位是

- A.大脑中动脉
- B.大脑后动脉
- C.颈内-后交通动脉
- D.大脑前动脉
- E.基底动脉

答案及解析

有关动脉瘤常见部位各家统计资料观点不一，但国内综合统计以颈内动脉颅内段动脉瘤最为常见

4: 患儿，10 个月，易激惹，夜间哭闹、多汗、睡眠不安。查体:方颅、肋骨串珠，手镯征(+)，诊断为佝偻病，以下护理措施不妥的是

- A.指导母乳喂养.
- B.操作轻柔以防断针
- C.多抱患儿到户外晒太阳
- D.添加含维生素 D 的食物

金英杰教育

www. jinyingjie. com

E.积极进行站立行走锻炼

答案及解析

根据题干分析,该患JL为维生素D缺乏性佝偻病。其护理为:①指导家长每日带患儿进行一定时间的户外活动,直接接受阳光照射。生后2~3周后即可带婴儿户外活动,冬季也要保证每日1~2小时户外活动时间。②提倡母乳喂养,按时添加辅食,给予富含维生素D、钙、磷和蛋白质的食物。遵医嘱给予维生素D制剂,注意维生素D过量的中毒表现,如遇过量立即停用维生素D。③预防骨骼畸形和骨折,衣着柔软、宽松,床铺松软,避免早坐、站、行;避免久坐、久站,以防发生骨骼畸形(E错,为本题正确答案)。④对已有骨骼畸形可采取主动和被动运动的方法矫正。

5: 患者50岁。诊断为风湿性心瓣膜病入院。目前该患者主诉活动无耐力的最主要的相关因素是

- A.冠状动脉灌注不足致心肌收缩无力
- B.心排血量减少致组织缺血
- C.胃肠道缺血致营养不良
- D.循环淤血致机体水肿
- E.肺淤血致呼吸困难

答案及解析

护理问题中,活动无耐力的最主要的相关因素是与心排出量减少有关。(护理问题:1.活动无耐力与心排出量减少有关。2.有感染的危险与肺淤血、风湿活动有关。3.特定知识缺乏与对疾病缺乏正确认识有关。4.潜在并发症:心衰、栓塞、心律失常。)

6: 接种卡介苗的正确方法是

- A.前臂掌侧下段ID
- B.三角肌下缘ID
- C.三角肌下缘H
- D.上臂三角肌H
- E.臀大肌IM

答案及解析

预防接种:常选择上臂三角肌下缘

7: 关于尿液颜色的描述,正确的是

金英杰教育

答案及解析

乳糜尿呈乳白色，由于尿液中有淋巴液，主要见于丝虫病。溶血反应的尿液呈酱油色。胆红素尿呈深黄色或黄褐色，振荡后泡沫亦成黄色，主要见于阻塞性黄疸及肝细胞性黄疸。血尿呈红色或棕色，含红细胞量多时呈洗肉水色，主要见于急性肾小球肾炎，泌尿系统结石、肿瘤、结核及感染等，脓尿尿液呈白色浑浊。

8: 患者，男，72岁。来自偏远山区，因次日要行胃部切除术，护士告诉患者：“您明天要手术，从现在开始，不要喝水，不要吃饭。”患者答应。第2天术前护士询问患者时，患者回答说：“我按你说的没有喝水，也没有吃饭，就喝了两袋牛奶。”“影响护患沟通的因素为

答案及解析

答案:理解差异。

解析:护士在与患者的沟通过程中，由于护患双方在年龄、职业、教育程度、生活环境等方面的不同，产生了解理解差异，从而影响了护患沟通。

9: 患者,女,81岁,退休干部。冠心病住院治疗,住院前3天与护士们关系融洽。第4天,年轻护士张某在为其进行静脉输液时,静脉穿刺3次失败,更换李护士后方成功。患者非常不满,其女儿向护士长进行抱怨。从此,患者拒绝张护士为其护理。针对此患者的特点,最佳的护患关系模式为

- A.指导型
- B.被动型
- C.共同参与型
- D.指导-合作型
- E.主动-被动型

答案及解析

护患关系的基本模式主要分为三种:(1) 主动-被动型:此模式的特点是“护士为患者做治疗”。在此模式中,护士常以“保护者”的形象出现,处于专业知识的优势地位和治疗护理的主动地位,而患者则处于服从护士处置和安排的被动地位。适用于不能表达主观意愿、不能与护士进行沟通交流的患者,如神志不清、休克、痴呆以及某些精神病患者。(2) 指导-合作型:此模式的特点是“护士告诉患者应该做什么和怎么做”。在此模式中,护士常以“指导者”的形象出现,根据患者病情决定护理方案和措施,对患者进行健康教育和指导。适用于急性患者和外科手术后恢复期的患者。(3) 共同参与型:此模式的特点是“护士积极协助患者进行自我护理”。护士常以“同盟者”的形象出现,为患者提供合理的建议和方案,患者主动配合

治疗护理，积极参与护理活动。适用于具有一定文化知识的慢性病患者。题目中患者是退休干部，属于有一定文化知识的慢性病患者。应该选择共同参与型的护患模式。(C对, ABDE错)

10: 患者，女，81岁，退休干部。冠心病住院治疗，住院前3天与护士们关系融洽。第4天，年轻护士张某在为其进行静脉输液时，静脉穿刺3次失败，更换李护士后方成功。患者非常不满，其女儿向护士长进行抱怨。从此，患者拒绝张护士为其护理。护患关系冲突的主要责任人是

- A.患者
- B.张护士
- C.李护士
- D.护士长
- E.患者女儿

答案及解析

扎实的扎针技术是促进护患关系和谐的基础，本题是由于张护士穿刺失败，导致的护患矛盾，主要责任人是张护士。(B对, ACDE错)

11: 患者女，28岁因“婚后2年，未避孕未孕”诊断为“不孕症”而入院，入院后，在进行妇科检查时，发现患者伴有尖锐湿疣，护士便将此信息告知了科室护士，并告知了同病房的其他患者，该护士的行为属于

- A.侵犯患者的人格权
- B.侵犯患者的隐私权
- C.侵犯患者的同意权
- D.侵犯患者的生命健康权
- E.侵犯患者的知情权

答案及解析

护士透露患者有尖锐湿疣，属于侵犯了隐私权。

12: 不符合铺床节力原则的是

- A.备齐用物，按序放置
- B.身体靠床沿
- C.上身前倾，两膝直立

金英杰教育

www.jinyingjie.com

D.下肢稍分开，保持稳定

E.使用肘部力量，动作轻柔

答案及解析

遵循节力原则: a.操作前,要备齐物品,按顺序放置,计划周到,以减少无效动作,避免多次走动; b.铺床前,能升降的床应将床升至便于铺床的高度,以防腰部过度弯曲; c.铺床时,身体尽量靠近床边,上身保持直立,两膝稍弯曲以降低重心,两脚根据活动情况左右或前后分开,以扩大支撑面,有利于操作及维持身体的稳定性; d.操作中,使用肘部力量,动作要平稳连续。

视频题:灌肠的,肝性脑病,错误的步骤,其中一步是用了肥皂水,明显的错误

确认是新冠,让去怎么隔离

有机磷的机制,瞳孔变化的大小,毒甸减的症状

易换高血压的是, a bcde 性格,五中种选一个

压疮的炎性浸润期

小儿腹泻,轮状病毒

高血压的分级

期前收缩

最容易发生骨折的第几肋

热水坐浴的禁忌症

1: 对于先兆早产的孕妇,首要的治疗是答案:抑制宫缩

答案及解析

先兆早产的首要治疗为抑制宫缩,同时还要积极控制感染、治疗合并症和并发症。对于宫缩进行性增强、有宫内感染、继续妊娠弊大于利、已达孕 34 周等孕妇,应终止妊娠。对于 35 周前的先兆早产患者应当给予糖皮质激素促胎肺成熟,降低新生儿死亡率、呼吸窘迫综合征的发病率。

2: 患者,男性,21 岁,大面积皮肤烧伤合并呼吸道烧伤,怀疑有铜绿假单胞菌感染。为该患者实施口腔护理时应选用的溶液是

A.0.1%醋酸溶液

B.复方硼酸溶液

C.0.2%呋喃西林溶液

金英杰教育

www.jinyingjie.com

D.2%~3%硼酸溶液

E.生理盐水

答案及解析

1%醋酸溶液:用于铜绿假单胞菌感染时。口腔 pH 偏碱性时适用。J。

3: 患者, 女性 63 岁, 心力衰竭, 卧床 2 个月。近日骶尾部皮肤破溃, 家庭病床护士观察后认为是压疮的炎性浸润期。该护士认为患者的饮食护理应采用

A.高维生素、高蛋白、低盐

B.高维生素、高脂肪、低蛋白

C.高热量、低蛋白、↓低盐

D.高维生素、高蛋白、低脂肪

E.高维生素、高蛋白、高糖类

答案及解析

解析:该患者有心力衰竭、压疮, 应给与高热量、高蛋白、高维生素、低盐饮食, A 对。

4: 患者, 女性 63 岁, 心力衰竭, 卧床 2 个月近日骶尾部皮肤破溃, 家庭病床护士观察后认为是压疮的炎性浸润期。该护士解释她的判断是因为患者压疮的表现符合炎性浸润期的典型表现, 包括

A.低尾部皮肤呈紫色, 有皮下硬结, 并出现水泡

B.表皮有感染发生, 形成溃疡

C.局部坏死组织侵入真皮下层, 颜色变黑

D.患者主诉骶尾部疼痛麻木感

E.表皮水泡破溃, 并有黄色液体渗出

答案及解析

解析:炎性浸润期:局部红肿向外浸润、扩大、变硬;皮肤颜色转为紫红色, 压之不褪色;表皮水泡形成, 病人有疼痛感, A 对。

下午

肾对应怒喜思悲恐当中的哪个

有个护士在给死者进行护理的时候, 偷偷剪了一束头发做实验标本, 侵犯了啥?

甘露醇多久滴完

氧中毒用 20%甘露醇的作用是解毒还是降颅内压

金英杰教育

www.jinyingjie.com

风湿性心瓣膜病，是乙型溶血性链球菌
烫伤的图片题
颅底骨折临床表现

嗜睡，共济失调，复视是什么药物的不良反应

- 1 卡马西平
- 2 苯妥英钠
- 3 苯巴比妥
- 4 拉莫三嗪
- 5 丙酸戊盐

新生儿寒冷损伤综合征治疗和护理最关键的是

- A. 坚持母乳喂养
- B. 供给足够的液体
- C. 逐步复温
- D. 合理用药
- E. 蓝光疗法

答案：C

患者男性，34岁。因十二指肠溃疡行毕Ⅱ式手术。术后8天进食，进食后出现上腹部饱胀感，后出现呕吐，呕吐物为食物和胆汁。护士根据患者的情况，考虑其出现了

- A. 幽门梗阻
- B. 吻合口梗阻
- C. 输入段梗阻
- D. 输出段梗阻
- E. 十二指肠溃疡复发


答案：D

胃大部切除术后并发输出段梗阻，多因粘连、大网膜水肿，或炎性肿块压迫等所致。表现为上腹饱胀，呕吐物含食物和胆汁。

患者男性，48岁。上腹部疼痛不适伴进行性加重的黄疸，诊断为胰腺癌。患者术前需补充的维生素是

- A. 维生素A
- B. 维生素B
- C. 维生素C
- D. 维生素D
- E. 维生素K

答案：E



乳腺癌最易发生于乳腺的

- A.1
- B.2
- C.3
- D.4
- E.5

答案：A

肝硬化腹水病人，每日进水量限制在

- A.1500ml
- B.1000ml
- C.800ml
- D.500ml
- E.300ml

答案：B

肝硬化腹水病人限制钠、水的摄入：限制盐在 1~2g/d，进水量限制在 1000ml/d 左右。

有机磷中毒病人其瞳孔表现为

- A.双侧瞳孔缩小
- B.双侧瞳孔扩大
- C.双侧瞳孔大小不等，忽大忽小
- D.双侧瞳孔同向俯斜
- E.单侧瞳孔扩大、固定

答案：A

小儿肺炎链球菌感染的化脓性脑膜炎，首选

- A.氯霉素
- B.红霉素
- C.青霉素
- D.克林霉素
- E.庆大霉素

答案：C

金英杰教育

www.jinyingjie.com

患儿女，早产儿，胎龄 32 周，出生后 6 天，近 3 日患儿哭声减弱，活动减少，拒乳、反应低下。体温 34℃，双面颊、肩部、臀部、下腹部、大腿及小腿外侧皮肤发硬，硬肿范围大于 60%。按之如橡皮样，属重度新生儿寒冷损伤综合征。恢复正常体温需要时间是

- A.1~2 小时
- B.2~4 小时
- C.4~8 小时
- D.8~10 小时
- E.12~24 小时

答案：E

肝硬化伴大量腹水取半卧位的原因是

- A.有利于腹水消退
- B.增加回心血量
- C.减轻心脏负荷
- D.减轻呼吸困难
- E.降低腹内压力

答案：D

脊柱骨折急救搬运的基本原则是

- A.始终保持脊柱中立位
- B.始终卧硬板转运
- C.不可背驮运送
- D.不可抱持运送
- E.不可坐位检查和运送

答案：A

支气管哮喘的典型表现为发作性伴有哮鸣音的

- A.呼气性呼吸困难
- B.吸气性呼吸困难
- C.混合性呼吸困难
- D.一过性呼吸困难
- E.进行性呼吸困难

答案：A

患儿面色蜡黄，手有震颤，红细胞 $3 \times 10^{12}/L$ ，血红蛋白 80g/L，血片中红细胞形态大小不等，以大红细胞为多，首先考虑

- A.营养性缺铁性贫血
- B.营养性巨幼红细胞性贫血
- C.营养性混合性贫血
- D.生理性贫血
- E.溶血性贫血

答案：B

治疗支气管哮喘时，快速静注氨茶碱的主要不良反应有

- A.口干和皮疹
- B.心律失常和低血压
- C.腹绞痛和腹泻

- D.耳鸣和高血压
 - E.红斑和视力模糊
- 答案：B

目前控制支气管哮喘发作的首选药物是

- A.沙丁胺醇
 - B.氨茶碱
 - C.倍氯米松
 - D.色苷酸钠
 - E.糖皮质激素
- 答案：A