

2021 中 西 医 执 业 医 师 考 试

模拟密押卷

2021 年

中 西 医 执 业 医 师

资 格 考 试

专 用

第一单元

一、A1 型选择题（1~94 题）

答题说明：每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1、证候的概念是

- A. 疾病发展某一阶段的病理概括
- B. 是对疾病症状与体征的鉴别概括
- C. 是对疾病症状与体征的分析概括
- D. 对疾病表现症状的综合概括
- E. 对阴阳气血失调临床表现的概括

2、“寒极生热，热极生寒”说明了阴阳之间的哪种关系

- A. 相互转化
- B. 相互交感
- C. 对立制约
- D. 互根互用
- E. 消长平衡

3、“壮水之主，以制阳光”的治法，最适于治疗的是

- A. 阴盛则寒之证
- B. 阴虚则热之证
- C. 阴盛伤阳之证
- D. 阴损及阳之证
- E. 阳损及阴之证

4、火的特性是

- A. 曲直

B. 稼穡

C. 从革

D. 炎上

E. 润下

5、具有“藏而不泻”特点的是

- A. 五脏
- B. 六腑
- C. 奇恒之腑
- D. 五官
- E. 五体

6、下列各项在血液运行中起关键作用的是

- A. 心血充盈
- B. 脉道通利
- C. 心气充沛
- D. 心神安宁
- E. 心阳亢盛

7、与精神意识思维活动关系最密切的是

- A. 心主血脉功能
- B. 肝主疏泄的功能
- C. 肺主治节的功能
- D. 脾主运化的功能
- E. 肾主藏精的功能

8、具有“喜燥恶湿”特性的脏腑是

- A. 肝
- B. 脾
- C. 胃
- D. 肾

E. 肺

9、属肝之志的是

A. 忧

B. 怒

C. 恐

D. 喜

E. 思

10、“水火既济”的“水火”所指的脏是

A. 心脾

B. 肝肺

C. 脾肾

D. 心肾

E. 肝肾

11、与气虚关系最密切的脏腑是

A. 心、肺

B. 肺、脾

C. 肺、肾

D. 脾、胃

E. 肝、肺

12、目的视觉功能主要取决于

A. 肾中精气的充盈

B. 肝血的充足

C. 脾气的健运

D. 肾阳的蒸化

E. 肾阴的滋养

13、大肠的主要生理功能是

A. 受盛

B. 传化糟粕

C. 化物

D. 泌别清浊

E. 通行元气

14、以下脏器中即属六腑之一，又属于奇恒之府的是

A. 脑

B. 胆

C. 心包

D. 三焦

E. 膀胱

15、在气的生成过程中，生气之源有赖于

A. 肺的呼吸功能

B. 脾胃运化功能

C. 肾的闭藏功能

D. 肺肾协调功能

E. 心的主血功能

16、充养脑髓、滑利骨节的主要是

A. 精

B. 气

C. 血

D. 津

E. 液

17、按十二经脉的流注次序，肝经向下流注的经脉是

A. 膀胱经

B. 胆经

C. 三焦经

D. 心经

E. 肺经

18、具有司眼睑开合，“分主一身左右之阴阳”功能的是

A. 冲脉

B. 督脉

C. 阴、阳跷脉

D. 阴、阳维脉

E. 任脉

19、具有亢奋、偏热、多动等特征的体质为

A. 阳虚质

B. 偏阴质

C. 偏阳质

D. 肝郁质

E. 阴阳平和质

20、致病后可出现各种秽浊症状或可阻遏气机的邪气是

A. 风邪

B. 寒邪

C. 火、热邪

D. 湿邪

E. 燥邪

21、患者因受精神刺激而气逆喘息，面红目赤，呕血，昏厥卒倒。其病机是

A. 怒则气上

B. 悲则气消

C. 喜则气缓

D. 思则气结

E. 恐则气下

22、“冬伤于寒，春必病温”，其发病类型是

A. 感邪即发

B. 徐发

C. 继发

D. 合病

E. 伏而后发

23、患者胃肠热盛，大便秘结，腹满硬痛而拒按，潮热，神昏谵语，但又兼见面色苍白，四肢厥冷，精神萎顿。其病机是

A. 虚中夹实

B. 真实假虚

C. 由实转虚

D. 真虚假实

E. 实中夹虚

24、疾病的标与本的概念下列哪项是不确切的

A. 邪气与正气

B. 外感与内伤

C. 症状与病机

D. 原发病与继发病

E. 先病与后病

25、以热治热的治法适用于

A. 瘀血所致崩漏者

B. 阴寒内盛，格阳于外而见热象者

C. 里热盛极，阳盛格阴而见寒象者

D. 因脾虚而致痞满且大便不畅者

E. 因实热壅积而致大便不通者

26、失神与少神的共同表现是

A. 言语失伦

B. 表情淡漠

C. 倦怠乏力

D. 面色晦暗少华

E. 以上都不是

27、心、脾二经有热可致

A. 强硬舌

B. 颤动舌

C. 痿软舌

D. 吐弄舌

E. 歪斜舌

28、患者，男，59岁。久病，因精气内伤，肺肾阴虚，虚火灼肺，以致津枯肺损，声音难出，称为

A. 子暗

B. 金破不鸣

C. 金实不鸣

D. 少气

E. 短气

29、可提示疾病发展转折点的是

A. 自汗

B. 盗汗

C. 绝汗

D. 冷汗

E. 战汗

30、脉象的产生，与什么有关

A. 心脏的搏动

B. 心气的盛衰

C. 脉管的通利

D. 气血的盈亏及各脏腑的协调作用

E. 以上皆是

31、腹胀满，无压痛，叩之作空声，可见于

A. 水臌

B. 气胀

C. 痰饮

D. 积聚

E. 内痈

32、八纲中的“寒热”是指

A. 辨病位的纲领

B. 辨病性的纲领

C. 辨虚实的纲领

D. 辨病因的纲领

E. 辨标本的纲领

33、暑淫证候的表现是

A. 头昏沉，嗜睡，胸脘痞闷

B. 口渴饮水，口唇鼻咽干燥

C. 发热恶热，汗出，气短神疲

D. 突发皮肤瘙痒、丘疹

E. 肠鸣腹泻，脘腹拘急冷痛

34、以下哪项临床症状血虚证与血瘀证均可见

A. 心悸

B. 脉涩

C. 手麻

D. 腹痛

E. 闭经

35、产后大出血，继则冷汗淋漓，面色苍白，甚则晕厥。其病机是

A. 气血两虚

B. 气血失和

C. 气不摄血

D. 气随血脱

E. 气滞血瘀

36、下列阳明腑实证的临床表现应除外哪项

A. 脉沉迟而实

B. 日晡潮热

C. 腹胀拒按

D. 大便秘结

E. 身热不扬

37、在温病辨证中，斑疹隐现属于

A. 卫分证候

B. 气分证候

C. 中焦证候

D. 营分证候

E. 血分证候

38、少阳病本证的临床表现是

A、口苦，咽干，目眩，寒热往来，胸胁苦满，默默不欲饮食

B、呕吐不止，剑突下急迫感，烦躁

C、胸烦满，烦惊谵语，小便不利，一身尽重，难以转侧

D、腹满而吐，食不下，大便泄泻，口不渴，时腹自痛，四肢欠温

E、恶寒，发热，头痛，便溏，脉浮

39、气陷证的临床表现是

A、畏寒肢冷

B、动则汗出

C、少气懒言

D、脘腹坠胀

E、舌淡苔白

40、下列各项，不属于阳水临床表现的是

A、头面部先肿

B、兼脾、肾阳虚

C、起病急，病程短

D、皮肤光亮而薄

E、多夹风邪为患

41、下列各项，是正常舌象表现的是

A、舌质红

B、舌体瘦薄

C、舌体淡嫩少苔

D、舌苔薄白

E、舌体短缩

42、邪盛病进时，常见的脉象是

A. 实

B. 大

C. 紧

D. 滑

E. 长

43、病人表现为得神提示的是

A、痰迷心窍，精神失常

B、精气充足，体健神旺

- C、精气大伤，机能衰减
D、精气不足，机能减退
E、精气衰竭，阴不敛阳，虚阳外越
- 44、小儿鼻柱，眉间及口唇四周青紫的临床意义是
- A、肝脾不调
B、瘀血内阻
C、小儿惊风
D、疼痛剧烈
E、寒凝气滞
- 45、治疗瘰疬、癭瘤等证的药物具有的药味是
- A、苦
B、甘
C、咸
D、涩
E、淡
- 46、按照药性升降浮沉理论，具有升浮药性的药物是
- A、重镇安神药
B、平肝息风药
C、开窍药
D、清热药
E、泻下药
- 47、中药的副作用指的是
- A、配伍不当出现的反应
B、药不对证出现的不良反应
C、达不到常规用量不能控制病情
D、超过常规用量时出现的不适反应

E、在常规剂量时出现的与疗效无关的不适反应

48、全蝎配蜈蚣属于药物七情中的

- A. 相须
B. 相使
C. 相反
D. 相畏
E. 相恶

49、下列各组药物中，不属于配伍禁忌的是

- A. 川贝母与川乌
B. 藜芦与赤芍
C. 肉桂与赤石脂
D. 水银与砒霜
E. 硫黄与厚朴

答案： E

50、羚羊角入汤剂宜

- A. 久煎
B. 先煎
C. 布包煎
D. 另行溶化
E. 另煎

51、下列药物中能燥湿止带的是

- A. 防风
B. 白芷
C. 羌活
D. 苍耳子
E. 藁本

52、善于疏散半表半里之邪而有和解退热之功的药物是

- A、菊花
- B、柴胡
- C、升麻
- D、桑叶
- E、蝉蜕

53、肺热壅盛、喘促气急治疗宜与平喘药配伍的是

- A. 栀子
- B. 芦根
- C. 石膏
- D. 夏枯草
- E. 淡竹叶

54、白花蛇蛇草的功效是

- A. 祛风，解表，止痛
- B. 祛风，通络，利尿
- C. 祛风，活络，定惊
- D. 祛风湿，强筋骨
- E. 祛风湿，治骨鲛

55、治疗热淋涩痛，应选用

- A. 大黄
- B. 芦荟
- C. 番泻叶
- D. 甘遂
- E. 大戟

56、风湿痹痛兼有表证者，当选用

- A. 秦艽
- B. 独活

C. 威灵仙

D. 桑枝

E. 桑寄生

57、既能祛风湿，又能消骨鲛的药物是

- A. 威灵仙
- B. 防己
- C. 狗脊
- D. 独活
- E. 木瓜

58、用治湿阻气滞之脘腹胀闷，腹痛及咳喘多痰宜选

- A. 佩兰
- B. 砂仁
- C. 厚朴
- D. 藿香
- E. 白豆蔻

59、利水渗湿作用较强，治疗水湿停滞所致小便不利、水肿、泄泻、带下，宜首选

- A. 石韦
- B. 滑石
- C. 萹蓄
- D. 木通
- E. 猪苓

60、小茴香善于治疗的是

- A. 亡阳厥逆
- B. 厥阴头痛
- C. 寒饮咳喘

D. 虚阳上浮

E. 寒疝腹痛

61、上入肺、中走脾、下达肾与膀胱
的药是

A. 木香

B. 陈皮

C. 香附

D. 乌药

E. 青皮

62、具有行气调中止痛功效的药物是

A. 柿蒂

B. 木香

C. 香附

D. 乌药

E. 薤白

63、具有消食化积，行气散瘀功效的
是

A. 山楂

B. 莱菔子

C. 鸡内金

D. 麦芽

E. 谷芽

64、既能杀虫，又能润肺止咳的药物
是

A. 贯众

B. 槟榔

C. 花椒

D. 雷丸

E. 榧子

65、具有散瘀消痈功效的药物是

A. 大蓟

B. 地榆

C. 槐花

D. 白茅根

E. 侧柏叶

66、治疗血瘀气滞，经行腹痛，兼风
湿肩臂疼痛者，应选用

A. 桃仁

B. 丹参

C. 红花

D. 姜黄

E. 益母草

67、具有温肺化痰功效的药物是

A. 白芥子

B. 紫苏子

C. 葶苈子

D. 杏仁

E. 旋覆花

68、肝胃不和、恶心呕吐宜用

A. 石决明

B. 代赭石

C. 生龙骨

D. 白芍

E. 灵磁石

69、具有开窍宁神，化湿和胃功效的
药物是

A. 石菖蒲

B. 苏合香

- C. 麝香
- D. 冰片
- E. 牛黄

70、上能敛肺气，下能滋肾阴的药物是

- A. 诃子
- B. 五味子
- C. 乌梅
- D. 五倍子
- E. 覆盆子

71、“以补为固”补而兼疏的方剂是

- A. 牡蛎散
- B. 固冲汤
- C. 健脾丸
- D. 玉屏风散
- E. 真人养脏汤

72、小青龙汤中的君药是

- A. 麻黄、桂枝
- B. 桂枝、白芍
- C. 干姜、细辛
- D. 桂枝、干姜
- E. 干姜、半夏

73、小青龙汤的组成药物中含有

- A. 黄连
- B. 杏仁
- C. 细辛
- D. 熟地黄
- E. 石膏

74、大黄附子汤主治的是

- A. 食积便秘
- B. 血虚便秘
- C. 气虚便秘
- D. 脾约便秘
- E. 冷积便秘

75、小柴胡汤方中外透内清的药对是

- A. 柴胡、半夏
- B. 黄芩、半夏
- C. 柴胡、黄芩
- D. 柴胡、炙甘草
- E. 人参、黄芩

76、小柴胡汤中和解少阳的药物配伍是

- A. 柴胡、黄芩
- B. 柴胡、生姜
- C. 人参、大枣
- D. 生姜、大枣
- E. 半夏、生姜

77、逍遥散中配伍薄荷的用意是

- A. 疏肝解郁
- B. 散肝透邪
- C. 疏郁透邪
- D. 疏肝散热
- E. 清利头目

78、青蒿鳖甲汤中有先入后出之妙的药对是

- A. 知母、青蒿
- B. 青蒿、鳖甲
- C. 知母、丹皮

D. 生地、知母

E. 青蒿、生地

79、左金丸中黄连与吴茱萸的用量比

例为

A、1:1

B、2:1

C、6:1

D、3:1

E、4:1

80、清暑益气汤的功用是

A、清暑除烦，益气和胃

B、清暑益气，养阴生津

C、清暑利湿，益气和胃

D、清暑益气，和胃止呕

E、益气养阴，清透暑热

81、大建中汤的功用是

A. 温中补虚，理气健脾

B. 温中补虚，和里缓急

C. 温中补虚，降逆止痛

D. 温中补虚，降逆止呕

E. 温中祛寒，补气健脾

82、大柴胡汤的组成药物中和解少阳

的是

A. 枳实、芍药

B. 桔梗、芍药

C. 黄芩、半夏

D. 黄芩、桔梗

E. 黄芩、柴胡

83、炙甘草汤中用量最大的药物是

A. 炙甘草

B. 人参

C. 桂枝

D. 生地黄

E. 阿胶

84、属于固涩剂适应范围的病证是

A、血热崩漏

B、肺虚久咳

C、火动遗精

D、伤食泄泻

E、热病多汗

85、酸枣仁汤中养肝血，安心神的药

物是

A. 知母

B. 川芎

C. 茯苓

D. 甘草

E. 酸枣仁

86、旋覆代赭汤主治的病因病机是

A. 痰热内阻，胃失和降

B. 食积内停，胃失和降

C. 胃虚痰阻，气逆不降

D. 胃虚有热，气逆不降

E. 胃中虚冷，气逆不降

87、越鞠丸中以行气为主的药物是

A. 木香

B. 沉香

C. 香附

D. 枳壳

E. 厚朴

88、半夏厚朴汤组成的药物中不含有

- A、半夏
- B、厚朴
- C、白术
- D、茯苓
- E、生姜

89、下列哪项是补阳还五汤主治证候的临床表现

- A. 小便不利
- B. 小便频多
- C. 大便秘结
- D. 大便溏薄
- E. 二便不利

90、外感风邪头痛、头风，治宜选用

- A. 消风散
- B. 二陈汤
- C. 川芎茶调散
- D. 天麻钩藤饮
- E. 半夏白术天麻汤

91、叶天士《温热论》认为，温病在表，初用辛凉轻剂，夹湿则加入哪组药物

- A、荆芥、防风
- B、芦根、滑石
- C、薄荷、牛蒡
- D、银花、连翘
- E、薄荷、豆豉

92、以下哪项不属于太阳中风脉证提纲

- A、恶风
- B、发热
- C、汗出
- D、鼻鸣干呕
- E、头痛

93、除下列哪一项外，均是《素问·上古天真论》指出的养生的重要原则

- A、法于阴阳
- B、和于术数
- C、起居有常
- D、延年益寿
- E、食饮有节

94、关于防己黄芪汤证的主症，以下哪项不是

- A、脉浮
- B、身重
- C、汗出
- D、恶风
- E、身体疼烦

二、A2型选择题（95~122题）

答题说明：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

95、患者，男，40岁。素有高血压病史，现症见眩晕耳鸣，面红头胀，腰

膝酸软，失眠多梦，时有遗精或性欲亢进，舌红，脉沉弦细。其病机是

- A. 阴虚内热
- B. 阴损及阳
- C. 阴虚阳亢
- D. 阳损及阴
- E. 阴虚火旺

96、患者，男，45岁。心烦不寐，眩晕耳鸣，健忘，腰酸梦遗，舌红少津，脉细数。其病变所在脏腑是

- A. 心、脾
- B. 肺、肾
- C. 肺、肝
- D. 心、肾
- E. 肝、胃

97、患者，女，37岁，恶寒发热，头身疼痛，无汗。鼻塞流涕，脉浮紧。其舌苔应是

- A. 白厚
- B. 薄白
- C. 黄腻
- D. 花剥
- E. 白腻

98、患者，男，56岁，头痛且空，每兼眩晕，腰痛酸软，神疲乏力，遗精带下，耳鸣失眠，舌红少苔，脉细无力，此属何种头痛

- A. 肝阳头痛
- B. 肾虚头痛

C. 气血亏虚头痛

D. 瘀血头痛

E. 痰浊头痛

99、患儿，男，4岁。因发热，腹泻来诊。脉浮，大小不齐，应考虑为

- A. 痰食
- B. 风痰
- C. 寒湿
- D. 积滞
- E. 风热

100、患者男性，46岁。高血压病史

10年。现面红头胀，眩晕耳鸣，腰膝痠软，失眠多梦，时有遗精或性欲亢进，舌红，脉沉细弦。其病机是

- A. 阴虚阳亢
- B. 阴虚内热
- C. 阴虚火旺
- D. 阴损及阳
- E. 阳损及阴

101、患者，男，45岁。面色浮红如妆，但非满面通红，口渴但不欲饮，小便清长，舌淡，苔白，脉浮大，按之无力。其病证多为

- A. 阴虚火旺
- B. 肝胆湿热
- C. 实热内炽
- D. 真热假寒
- E. 真寒假热

102、患者，女，32岁，头胀且痛，胸闷，口不渴，身重而痛，发热体倦，小便清长。舌苔白滑，脉濡缓。其证候是

- A. 伤暑
- B. 冒湿
- C. 伤湿
- D. 中暑
- E. 以上均非

103、患者男性，60岁。素眩晕病史，因恼怒而突发头痛而胀，继则昏厥仆倒，呕血，不省人事，肢体强痉，舌红苔黄，脉弦。此证候属

- A. 气结
- B. 气逆
- C. 气郁
- D. 气脱
- E. 气陷

104、患者，47岁，曾发高热，热退而见口鼻、皮肤干燥，形瘦，目陷，唇舌干燥，舌紫绛边有瘀斑、瘀点。其病机是

- A. 津液不足
- B. 津亏血瘀
- C. 津枯血燥
- D. 津停气阻
- E. 气阴两亏

105、患者，男，19岁。因考试过劳紧张，近一周来心情烦躁，入夜难眠，

咽干欲饮，舌红苔黄而干，脉数，其证候是

- A. 心阴虚证
- B. 气血两虚证
- C. 肝火上炎证
- D. 心血虚证
- E. 心火亢盛证

106、患者，男，56岁。大便时溏时泻，迁延反复，稍进油腻食物，则大便次数明显增加，食少。食后脘闷不舒，面色萎黄，神疲倦怠，舌质淡，苔白，脉细弱。其证候是

- A. 脾阳虚弱
- B. 中气下陷
- C. 脾胃虚弱
- D. 肝气乘脾
- E. 肾阳虚衰

107、患者，女，51岁，心烦不得眠，口燥咽干，舌尖红，脉细数。此病证是

- A. 少阴热化证
- B. 少阴寒化证
- C. 厥阴病证
- D. 少阳病证
- E. 太阴病证

108、患者，女，32岁。咳嗽痰少，口干咽燥，声音嘶哑，形体消瘦，午后潮热，腰膝酸软，舌红少苔，脉细数。其证型是

- A. 肺肾阴虚证
- B. 肺肾气虚证
- C. 肾阴虚证
- D. 燥邪犯肺证
- E. 肺阴虚证

109、患者，女，18岁，外感风寒，恶寒发热，无汗，腹痛，吐泻，舌苔白腻。治疗宜选用

- A. 麻黄
- B. 桂枝
- C. 香薷
- D. 防风
- E. 白芷

110、患者，女，30岁，小便短数，灼热刺痛，尿色黄赤，舌苔黄腻，脉数。治疗应选用

- A. 大蓟
- B. 地榆
- C. 槐花
- D. 白茅根
- E. 侧柏叶

111、患者，女，38岁。头痛连及项背，遇风则痛甚，恶风寒喜裹头戴帽，口不渴，苔薄白，脉浮。用药应首选的是

- A. 发散风寒药
- B. 发散风热药
- C. 活血化瘀药
- D. 理气药

E. 祛风湿药

112、患者，男，42岁。全头胀痛，急躁易怒，口苦胁痛，面红目赤，便秘溲赤，舌边尖红，苔黄，脉弦数。用药应首选的是

- A. 全蝎、蜈蚣
- B. 磁石、牡蛎
- C. 龙胆、栀子
- D. 天麻、石决明
- E. 川芎、川牛膝

113、患儿，男，12岁。患流行性出血热，经治疗基本恢复，但仍低热未退，夜热早凉，热退无汗，形体消瘦，舌红少苔，脉细数。用药应首选的药物是

- A. 地骨皮
- B. 赤芍
- C. 牡丹皮
- D. 黄柏
- E. 生地黄

114、患者，女，42岁，身热多汗，心胸烦闷，气逆欲呕，口干喜饮，舌红少苔，脉虚数。治疗应首选

- A. 导赤散
- B. 凉膈散
- C. 生脉散
- D. 竹叶石膏汤
- E. 清暑益气汤

115、患者恶寒蜷卧，四肢厥冷，吐泻腹痛，口不渴，神衰欲寐，脉沉微。治疗应首选

- A. 理中丸
- B. 肾气丸
- C. 四逆散
- D. 当归四逆汤
- E. 回阳救急汤

116、患者，女，58岁。绝经数年，忽又来潮，量多、色淡，肌热面赤，烦渴欲饮，脉洪大而虚。治疗应选用

- A. 归脾汤
- B. 四物汤
- C. 当归补血汤
- D. 温经汤
- E. 黄土汤

117、某男，67岁，喘促日久，现咳嗽痰多，气急胸闷，苔腻，脉滑，治疗应选用

- A. 越婢加半夏汤
- B. 苏子降气汤
- C. 涤痰汤
- D. 平喘固本汤
- E. 真武汤合五苓散

118、患者，女，36岁。漏下不止，血色暗淡，四肢不温，面色萎黄，舌淡苔白，脉沉细。治疗应首选

- A. 归脾汤
- B. 四物汤

- C. 黄土汤
- D. 胶艾汤
- E. 小蓟饮子

119、患者，女，37岁，眩晕头痛，胸膈痞闷，恶心呕吐，舌苔白腻，脉弦滑者，治宜选用

- A. 温胆汤
- B. 镇肝息风汤
- C. 羚角钩藤汤
- D. 天麻钩藤饮
- E. 半夏白术天麻汤

120、患者，女，28岁，咳嗽痰黄，胸闷痞满，小便短赤，舌质红，苔黄腻，脉滑数者，治宜选用

- A. 温胆汤
- B. 清气化痰丸
- C. 茯苓丸
- D. 半夏白术天麻汤
- E. 小陷胸汤

121、患者，男，32岁，脘腹胀痛，恶食呕逆，大便泄泻，舌苔厚腻，脉滑者，治宜选用

- A. 健脾丸
- B. 保和丸
- C. 四逆散
- D. 痛泻要方
- E. 葛根黄芩黄连汤

122、患者，男，69岁，面色萎黄，头晕眼花，四肢倦怠，气短少言，心悸

不安，食欲减退，舌淡苔白，脉细弱。

治疗应首选

- A. 四物汤
- B. 归脾汤
- C. 当归补血汤
- D. 四君子汤
- E. 八珍汤

三、B1 型选择题（123~150 题）

答题说明： 以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个与问题最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某一个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

- A、环境因素
- B、气候因素
- C、正气不足
- D、地域因素
- E、邪气侵害

123、疾病发生的重要条件是

124、疾病发生的内在根据是

- A、劳力过度
- B、劳神过度
- C、房劳过度
- D、过度饥饿
- E、饮食超量

125、可损伤心脾的因素是

126、可损伤肾精的因素是

A、正治

B、从治

C、标本兼治

D、反治

E、治标

127、对大出血患者应采用的治疗原则是

128、高热患者应采用的治疗原则是

A、大汗淋漓，四肢厥冷，面色苍白，神情淡漠，呼吸微弱，脉微欲绝

B、形体消瘦，五心烦热，颧红盗汗，口燥咽干，皮肤干燥，脉象细数

C、身热大汗，汗热质黏，面色潮红，躁扰不安，渴喜冷饮，脉细数疾

D、高热肢厥，神识昏沉，胸腹灼热，口渴喜饮，面色紫暗，脉沉有力

E、经常畏冷，四肢不温，渴喜热饮，常自汗出，尿清便溏，脉迟无力

129、真热假寒证的临床表现是

130、亡阳证的临床表现是

A、身热不扬

B、日晡潮热

C、五心烦热

D、身热汗出

E、往来寒热

131、少阳病证发热的临床表现是

132、阳明病实证发热的临床表现是

A、弦滑数

B、洪数脉

C、浮滑脉

D、滑数脉

E、沉涩脉

133、寒凝血瘀证的脉象是

134、肝火夹痰证的脉象是

A、大黄配枳实

B、枳实配芒硝

C、大黄配附子

D、附子配枳实

E、大黄配芒硝

135、用于实热积滞，大便秘结的药对是

136、用于寒实积滞，便秘腹痛的药对是

A、豨莶草

B、防己

C、威灵仙

D、桑寄生

E、蕲蛇

137、具有祛风湿、强筋骨功效的药物是

138、具有祛风湿、利水功效的药物是

A、香附

B、木香

C、陈皮

D、乌药

E、枳实

139、治疗湿热泻痢、里急后重，与黄连配伍的药物是

140、治疗寒痰阻闭、胸阳不振之胸痹疼痛，与薤白配伍的药物是

A、定喘汤

B、止嗽散

C、小青龙汤

D、苓桂术甘汤

E、苓甘五味姜辛汤

141、以温肺化饮为主要功用的方剂是

142、既散寒解表又温肺化饮的方剂是

A、散寒解表，化湿和中

B、解表散寒，理气和中

C、祛暑解表，化湿和中

D、祛湿化浊，理气宽中

E、清暑益气，养阴生津

143、香薷散的功用是

144、清暑益气汤的功用是

A、肝、脾

B、肝、胃

C、脾、胃

D、肝、肾

E、脾、肾

145、吴茱萸汤主证病机涉及的主要脏腑是

146、理中丸主证病机涉及的主要脏腑是

A、宣白承气汤

B、牛黄承气汤

C、增液承气汤

D、导赤承气汤

E、新加黄龙汤

147、“阳明温病，下之不通”，若因兼火腑不通，而见“左尺牢坚，小便赤痛，时烦渴甚”者，宜选用

148、“阳明温病，下之不通”，若因兼邪闭心包，而见“神昏舌短，内窍不通，饮不解渴”者，宜选用

A、下利清谷，里寒外热，汗出而厥者

B、呕而脉弱，小便复利，身有微热，见厥者

C、下利腹胀满，身体疼痛者

D、手足厥寒，脉细欲绝者

E、下利后脉绝，手足厥冷，脉不还者

149、当归四逆汤主治

150、通脉四逆汤主治

E. 瘀血阻络

2、代谢性酸中毒可出现

A. 潮式呼吸

B. 库斯莫尔呼吸

C. 间停呼吸

D. 夜间阵发性呼吸困难

E. 吸气性呼吸困难

3、肝区病变出现腹痛的特点是

A. 突发中上腹剧烈刀割样持续性疼痛

B. 持续性、广泛性剧烈腹痛伴腹肌紧张

C. 右上腹进行性锐痛

D. 剑突下钻顶样疼痛

E. 右上腹阵发性绞痛

4、抽搐不伴有意识障碍最可能的原因是

A. 急性脑血管病

B. 脑外伤

C. 癫痫

D. 癔病

E. 小儿高热惊厥

5、下列除哪项外，均可见胸痛

A. 带状疱疹

B. 肺癌

C. 气胸

D. 心包炎

E. 哮喘

6、病史中，不属主要症状特点的内容是

第二单元

一、A1型选择题（1~83题）

答题说明：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1、上消化道出血患者的粪便性状是

A. 经络痹阻

B. 结石阻滞

C. 肝肾阴虚

D. 湿寒阻滞

- A. 部位
- B. 程度
- C. 诊治经过
- D. 性质
- E. 持续时间

7、下列各项中，叩诊不会出现浊音的是

- A. 肺不张
- B. 肺空洞
- C. 胸腔积液
- D. 胸膜肥厚粘连
- E. 未液化的肺脓肿

8、可出现强迫蹲位的疾病是

- A. 急性腹膜炎
- B. 先天性发绀型心脏病
- C. 心绞痛
- D. 破伤风
- E. 急性肺水肿

9、下列关于甲状腺检查说法错误的是

- A. 甲状腺肿大 II 度，能看到肿大，又能触及，但不超过胸锁乳突肌
- B. 甲状腺肿大常可听到低调的连续性血管杂音
- C. 甲亢时肿大的甲状腺质地多较柔软
- D. 甲状腺癌时，包块有结节感、不规则、质硬
- E. 甲状腺癌触诊时可摸到颈总动脉搏动

10、肠套叠可见腹痛，并伴有

- A. 急性发热
- B. 黄疸
- C. 呕吐
- D. 腹泻
- E. 血便

11、主动脉瓣狭窄，可出现的是

- A. 心尖部舒张期震颤
- B. 胸骨左缘第 2 肋间收缩期震颤
- C. 胸骨左缘第 3、4 肋间收缩期震颤
- D. 胸骨右缘第 2 肋间收缩期震颤
- E. 胸骨左缘第 2 肋间连续性震颤

12、轻度有机磷杀虫药中毒瞳孔变化情况是

- A. 瞳孔缩小
- B. 瞳孔扩大
- C. 两侧瞳孔大小不等
- D. 瞳孔形状不规则
- E. 乳白色

13、下列除哪项外，常可出现血沉明显增快

- A. 风湿病的病情趋于静止时
- B. 亚急性细菌性(感染性)心内膜炎
- C. 重度贫血
- D. 心肌梗死
- E. 多发性骨髓瘤

14、下列疾病，立位 X 线透视可见膈下游离气体影的是

- A. 急性胃穿孔
- B. 肠梗阻

- C. 肠套叠
- D. 肝破裂
- E. 结肠肿瘤

15、下列除哪项外，均是采录既往史所要求的内容

- A. 过去健康情况
- B. 预防接种情况
- C. 传染病史
- D. 过敏史
- E. 是否到过传染病的流行地区

16、下列可引起呕吐物多且有粪臭味的疾病是

- A. 胃潴留
- B. 肠梗阻
- C. 慢性胆囊炎
- D. 幽门梗阻
- E. 有机磷中毒

17、呕吐与头部位置改变有密切关系的疾病是

- A. 脑炎
- B. 耳源性眩晕
- C. 妊娠反应
- D. 尿毒症
- E. 糖尿病酮症酸中毒

18、慢性肾衰竭闻诊可见

- A. 蒜臭
- B. 粪臭
- C. 尿臭
- D. 肝臭

E. 烂苹果

19、血清总胆红素、结合胆红素、非结合胆红素均中度增加。可见于

- A. 蚕豆病
- B. 胆石症
- C. 珠蛋白生成障碍性贫血
- D. 急性黄疸性肝炎
- E. 胰头癌

20、下列除哪项外，均可引起血清钾增高

- A. 急慢性肾功能衰竭
- B. 静脉滴注大量钾盐
- C. 严重溶血
- D. 代谢性酸中毒
- E. 代谢性碱中毒

21、表示药物安全性的是

- A. 药物的效能
- B. 治疗指数
- C. 半数有效量
- D. 最小有效剂量
- E. 极量

22、毛果芸香碱的主要适应证是

- A. 青光眼
- B. 角膜炎
- C. 结膜炎

D. 视神经水肿

E. 晶状体混浊

23、有机磷杀虫药中毒的主要机制

A. 促使乙酰胆碱水解

B. 抑制心血管运动中枢

C. 兴奋交感神经系统

D. 抑制胆碱酯酶活性

E. 抑制呼吸中枢

24、山莨菪碱适于治疗的疾病是

A. 青光眼

B. 晕动病

C. 感染中毒性休克

D. 麻醉前给药

E. 震颤麻痹

25、主要兴奋 β 受体的拟肾上腺素药是

A. 去甲肾上腺素

B. 肾上腺素

C. 间羟胺

D. 异丙肾上腺素

E. 多巴胺

26、安定具有下述哪种作用

A. 降血压

B. 中枢性肌松

C. 镇痛

D. 镇吐

E. 利尿

27、苯巴比妥用于消除下列哪种之外的各型癫痫

A. 强直阵挛发作

B. 肌阵挛性发作

C. 失神小发作

D. 强直发作

E. 失张力发作

28、用于人工冬眠的药物是

A. 吗啡

B. 丙咪嗪

C. 氯丙嗪

D. 苯海索

E. 左旋多巴

29、卡比多巴与左旋多巴合用的机制是

A. 增强左旋多巴的疗效，减轻其外周副作用

B. 卡比多巴直接激动多巴胺受体，增强左旋多巴疗效

C. 抑制多巴胺的再摄取，增强左旋多巴的疗效

D. 卡比多巴阻断胆碱受体，增强左旋多巴疗效

E. 减慢左旋多巴由肾脏排泄，增强左旋多巴的疗效

30、成瘾性最小的镇痛药是

A. 吗啡

B. 芬太尼

C. 哌替啶

D. 喷他佐辛

E. 美沙酮

31、阿司匹林的作用是

- A、抗炎、免疫抑制
- B、镇痛、镇静
- C、镇痛、抗炎
- D、解热、镇静
- E、抗炎、抗休克

32、下列根据高血压病情特点及并发症选药，错误的是

- A、伴有心绞痛者宜用硝苯地平
- B、伴有心力衰竭者宜用利尿药
- C、伴有肾功能不全者宜用卡托普利
- D、伴有消化性溃疡者宜用可乐定
- E、伴有支气管哮喘者宜用 β 受体阻滞药

33、利尿药物中，可用于治疗尿崩症的是

- A. 呋塞米
- B. 依他尼酸
- C. 螺内酯
- D. 氨苯蝶啶
- E. 氢氯噻嗪

34、适用于高心输出量型高血压的药物是

- A. 肼苯哒嗪
- B. 硝苯地平
- C. 硫氮酮
- D. 普萘洛尔
- E. 氢氯噻嗪

35、治疗急性心肌梗死引起的室性心律失常的最佳药物是

- A. 奎尼丁
- B. 苯妥英钠
- C. 利多卡因
- D. 维拉帕米
- E. 普萘洛尔

36、普萘洛尔长期服用后突然停药，可能出现

- A. 眩晕
- B. 心绞痛
- C. 精神抑郁
- D. 心率过慢
- E. 充血性心衰

37、心绞痛发作时首选药物为

- A. 美托洛尔
- B. 硝酸甘油
- C. 维拉帕米
- D. 曲美他嗪
- E. 硝苯地平

38、在体内和体外均有强大的抗凝血作用的是

- A. 肝素
- B. 阿司匹林
- C. 华法林
- D. 双香豆素
- E. 新双香豆素

39、抑制质子泵的抗消化性溃疡药是

- A. 奥美拉唑

B. 西咪替丁

C. 碳酸镁

D. 硫糖铝

E. 氢氧化铝

40、氨茶碱的平喘机制是

A. 抑制细胞内钙释放

B. 激活磷酸二酯酶

C. 抑制磷脂酶 A2

D. 激活腺苷酸环化酶

E. 抑制鸟苷酸环化酶

41、病原体侵入人体后能否引起疾病，主要取决于

A. 机体的保护性免疫

B. 机体的天然屏障作用

C. 病原体的毒力与数量

D. 病原体的侵入途径与特异性定位

E. 病原体的致病力与机体的免疫功能

42、属 DNA 病毒的是

A. 甲型肝炎病毒

B. 乙型肝炎病毒

C. 丙型肝炎病毒

D. 丁型肝炎病毒

E. 戊型肝炎病毒

43、普通型流脑临床特征性体征是皮肤

A. 瘀点或瘀斑

B. 水疱

C. 黑痂

D. 斑丘疹

E. 脓肿

44、下列各项，不属医院感染的是

A、无明显潜伏期的感染，在入院 48 小时后发生的感染

B、本次感染直接与上次住院有关

C、有明确潜伏期的感染，自入院时算起没有超过其平均潜伏期的感染

D、新生儿经产道时获得的感染

E、肿瘤患者住院化疗期间出现带状疱疹

45、有关流脑和乙脑鉴别最有意义的是

A、外周血白细胞明显升高

B、脑膜刺激征明显

C、高热、头痛、呕吐、昏迷

D、皮肤瘀点瘀斑

E、发病季节

46、传染病的基本特征为

A、有传染性、免疫性和病原体

B、有传染性、流行性、地方性和季节性

C、有传染性、病原体、免疫性和流行性

D、有传染性、传播途径和传染源

E、有传染性、免疫性和流行性

47、关于布鲁菌病感染途径的描述，错误的是

A、经呼吸道吸入传播

B、经消化道食人传播

C、经体表皮黏膜接触传播

D、人与人之间相互传播

E、蚊虫叮咬传播

48、下列有关消毒方法的叙述，错误的是

A、微波消毒属灭菌法

B、异丙醇属中效消毒法

C、通风换气属低效消毒法

D、灭菌法可杀灭一切微生物

E、病原体及消毒方法相同，在不同的物品上消毒效果相同

49、下列有关中毒型菌痢脑型与乙脑鉴别的叙述，最有意义的是

A、起病急骤

B、呼吸衰竭

C、早期出现休克

D、高热、昏迷、抽搐

E、粪便常规检查有无白细胞

50、潜伏期是指

A、自病原体侵入机体至典型症状出现

B、自病原体侵入机体至排出体外

C、自病原体侵入机体至临床症状开始出现

D、自接触传染源至患者开始出现症状

E、自接触传染源至典型症状出现

51、流脑败血症期特征性的表现是

A、高热

B、休克

C、病理征阳性

D、皮肤黏膜瘀斑

E、脑膜刺激征

52、下列各项，不属标准预防技术的是

A、洗手

B、戴手套

C、穿隔离衣

D、戴防护眼罩

E、病房的空气处理系统

53、十二经脉中，相表里的阴经和阳经的交接部位

A. 胸腹部

B. 胸部

C. 腹部

D. 指（趾）内侧端

E. 四肢内侧

54、外邪由皮毛传入脏腑的途径，依次是

A. 络脉——孙脉——经脉

B. 孙脉——经脉——络脉

C. 经脉——孙脉——络脉

D. 络脉——经脉——孙脉

E. 孙脉——络脉——经脉

55、在八脉交会穴中，通任脉的是

A. 足临泣

B. 公孙

C. 后溪

D. 照海

E. 列缺

56、在特定穴中，原穴主要用于治疗

- A. 五脏病证
- B. 六腑病证
- C. 五脏六腑病证
- D. 急性病证
- E. 表里经脉病证

57、耻骨联合上缘至股骨内上髁上缘的骨度分寸是

- A. 18 寸
- B. 19 寸
- C. 20 寸
- D. 21 寸
- E. 22 寸

58、下列腧穴中，归经错误的是

- A. 合谷——大肠经
- B. 太溪——肝经
- C. 列缺——肺经
- D. 阳陵泉——胆经
- E. 阴陵泉——脾经

59、下列哪个腧穴是足阳明胃经的原穴

- A. 冲阳
- B. 内庭
- C. 厉兑
- D. 解溪
- E. 足三里

60、太阴脾经的穴位是

- A. 气冲
- B. 大横

C. 期门

- D. 梁门
- E. 章门

61、手少阴心经的络穴是

- A. 少海
- B. 神门

C. 阴郛

D. 通里

E. 灵道

62、当第 9 胸椎棘突下，旁开 1.5 寸的穴位是

- A. 膈俞
- B. 脾俞

C. 胆俞

D. 胃俞

E. 肝俞

63、下列经脉中，在大腿部没有经穴分布的是

A. 足阳明胃经

B. 足少阳胆经

C. 足太阴脾经

D. 足厥阴肝经

E. 足少阴肾经

64、既是络穴，又是八脉交会穴的腧穴是

A. 太渊

B. 合谷

C. 后溪

D. 内关

E. 阳池

65、“起于目外眦，……下行耳后”的经脉是

A. 足阳明胃经

B. 足少阳胆经

C. 足太阳膀胱经

D. 手少阳三焦经

E. 手太阳小肠经

66、叶天士《温热论》中提到，温邪上受，首先犯

A、清窍

B、脑

C、肺

D、上焦

E、咽喉

67、湿热证，数日后，脘中微闷，知饥不食，为

A、湿邪蒙绕三焦

B、阴津受伤，余邪留滞经络

C、余邪内留，胆气不舒

D、中气亏损，升降悖逆

E、胃气不舒，肺气不布，元气大亏

68、太阳中风证发热的特点是

A、蒸蒸发热

B、翕翕发热

C、时发热

D、或已发热，或未发热

E、往来寒热

69、《素问·阴阳应象大论》指出药食

气味中“气厚”之品的性能是

A、发散解表

B、淡渗通利

C、泻下

D、助阳增热

E、泄泻

70、据《灵枢·本神》，所以任物者谓之

A、意

B、心

C、志

D、思

E、虑

71、“见肝之病，知肝传脾，当先实脾”，这是以下哪个层次的医生的认识

A、圣人

B、上工

C、中工

D、下工

E、庸工

72、正确处理医务人员关系的意义是

A、实现正确诊断、有效治疗

B、有利于提高医疗服务水平

C、取他人之长，补己之短

D、使医务人员之间相互尊重

E、互相监督，避免疏漏

73、1976年美国学者提出的医患关系基本模式是

A. 主动-被动型，互相-合作型，平等参与型

B. 主动-合作型，相互-指导型，共同参与型

C. 主动-配合型，指导-合作型，共同参与型

D. 主动-被动型，指导-合作型，共同参与型

E. 主动-被动型，共同参与型，父权主义型

74、生命质量的衡量标准不包括

A. 个体生命健康程度

B. 个体生命德才素质

C. 个体生命优化条件

D. 个体生命治愈希望

E. 个体生命预期寿命

75、属于医学伦理学基本原则的

A. 有利、公正

B. 权利、义务

C. 廉洁奉公

D. 医乃仁术

E. 等价交换

76、反映医患关系本质的是

A. 医患关系是一种民事法律关系

B. 医患关系是具有道德意义较强的社会关系

C. 医患关系是一种商家与消费者的关系

D. 医患关系只包括技术性方面的关系

E. 医患关系是患者与治疗者在诊疗和保健中所建立的联系

77、下列各项中，不属于传染病诊治工作的道德要求的是

A. 重视消毒隔离

B. 勇于献身的高尚道德情操

C. 严格疫情报告制度

D. 强化社会预防保健意识

E. 正确对待患者的拒绝

78、我国卫生法律是由哪一级机构制定和颁布的

A. 卫生部

B. 国务院

C. 最高人民法院

D. 全国人大及其常委会

E. 地方人民政府

79、国家实行医师资格考试制度，目的是检查评价申请医师资格者是否具备

A. 医学专业学历

B. 取得医学专业技术职务的条件

C. 从事医学专业教学、科研的资格

D. 开办医疗机构的条件

E. 从事医学实践必须的基本专业知识与能力

80、药品成分的含量与国家药品标准或者省、自治区、直辖市药品标准规定不符合的是

A. 劣药

- B. 假药
- C. 保健药品
- D. 非处方用药
- E. 特殊药品

81、《中华人民共和国传染病防治法》中“医源性感染”的含义是指

- A、在从事医学实验中，因病原体传播引起的感染
- B、在从事实验室工作中，因接触病原体所致的感染
- C、在从事医学服务中，因病原体传播引起的感染
- D、感染病原体、无临床症状、能排出病原体
- E、人与脊椎动物接触病原体而感染

82、《突发公共事件应急条例》是由哪里制定的

- A. 全国人大常委会
- B. 国务院
- C. 全国政协
- D. 市级人民政府
- E. 卫生部

83、对发生医疗事故的赔偿等民事责任争议问题处理时，可以考虑的方式是

- A. 医疗事故损害后果与患者原有疾病状况之间的关系
- B. 患者的经济状况
- C. 患者亲友在纠纷处理过程中的态度

- D. 无过错输血感染造成的不良后果
- E. 医患双方协商解决

二、A2型选择题（84~107题）

答题说明：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

84、患者，中年男性。持续或间断咳血痰或少量咯血，最大可能是

- A. 肺炎
- B. 肺脓肿
- C. 肺气肿
- D. 肺癌
- E. 肺梗死

85、患者，男，30岁，食欲和记忆力减退，检查：眼睑苍白，红细胞、白细胞和血小板均减少。应首先考虑的是

- A. 再生障碍性贫血
- B. 缺铁性贫血
- C. 溶血性贫血
- D. 失血性贫血
- E. 巨幼红细胞性贫血

86、患者，女，25岁。大咯血急诊入院，既往有反复咳嗽、大量脓痰及咯血病史。胸片示左下肺肺纹理增多、增粗、排列紊乱。诊断最可能的是

- A. 肺结核

- B. 肺炎
- C. 肺癌
- D. 支气管扩张
- E. 肺脓肿

87、患儿，男，10岁。皮肤黄染伴右上腹绞痛2天。实验室检查：尿胆红素(+)，尿胆原(-)。应首先考虑的是

- A. 蚕豆病
- B. 胃炎
- C. 胆道蛔虫症
- D. 急性病毒性肝炎
- E. 遗传性球形红细胞增多症

88、患者，65岁。皮肤、巩膜黄染呈进行性加重，大便持续变白，病后消瘦明显。应首先考虑的是

- A. 急性病毒性肝炎
- B. 肝硬化
- C. 肝癌
- D. 胰头癌
- E. 胆总管结石

89、患者，男，58岁。腰痛，腰部活动受限。检查：脊柱叩击痛，坐骨神经刺激征(+)。应首先考虑的是

- A. 腰肌劳损
- B. 脑膜炎
- C. 蛛网膜下腔出血
- D. 腰椎间盘突出
- E. 肾下垂

90、患者，女，40岁。仰卧时腹部呈蛙状，侧卧时下侧腹部明显膨出。应首先虑的是

- A. 胃肠胀气
- B. 腹腔积液
- C. 巨大卵巢囊肿
- D. 肥胖
- E. 子宫肌瘤

91、患者，女，68岁。因心力衰竭入院，拟用地高辛口服治疗，每日0.25mg。已知地高辛半衰期为36小时，达稳定的血药浓度约需

- A. 2~3天
- B. 6~7天
- C. 9~10天
- D. 12~14天
- E. 16~18天

92、患者，男，40岁。癫痫病史多年，今因癫痫持续状态被送入医院。应采取的治疗措施是

- A. 口服苯巴比妥
- B. 口服苯妥英钠
- C. 口服丙戊酸钠
- D. 静脉注射安定、地西洋
- E. 肌肉注射氯丙嗪

93、患者，男，62岁。患高血压病8年，突发气促，端坐呼吸，咳吐粉红色泡沫痰。检查：双肺广泛水泡音，血压160/90mmHg。治疗应首选

A. 氨茶碱

B. 螺内酯(安体舒通)

C. 地高辛

D. 吗啡

E. 多巴酚丁胺

94、某女，55岁，由于劳累、过度兴奋而突发心绞痛，请问服用下列哪种药效果好

A. 口服硫酸奎尼丁

B. 舌下含服硝酸甘油

C. 注射盐酸利多卡因

D. 口服盐酸普鲁卡因胺

E. 注射苯妥英钠

95、患者，女，60岁。因全身关节疼痛，长期服用某药，昨日出现自发性骨折。导致该不良反应的药物是

A. 强的松

B. 阿司匹林

C. 消炎痛

D. 保泰松

E. 布洛芬

96、患者，男，35岁。大面积烧伤合并严重铜绿假单胞菌感染，生化检查血肌酐及尿素氮值异常。应选用的抗感染药物是

A. 复方新诺明

B. 头孢氨苄

C. 丁胺卡那霉素

D. 庆大霉素

E. 头孢三嗪

97、患者，女，26岁，诊断为艾滋病。该病 I 期的临床表现应该是

A. 发热、全身不适、头痛、厌食、恶心、肌痛、关节痛和淋巴结肿大，持续 1~3 周后缓解

B. 临床上没有任何症状，但血清中能检出 HIV 以及 HIV 核心蛋白和包膜蛋白的抗体，具有传染性

C. 除腹股沟淋巴结以外，全身其他部位两处或两处以上淋巴结肿大，一般持续 3 个月以上

D. 出现头痛、癫痫、进行性痴呆、下肢瘫痪

E. 卡波西肉瘤、慢性淋巴性间质性肺炎等

98、男性 40 岁，不规则发热半年余，反复抗菌无效，明显消瘦，侨居国外多年，临床考虑是否同艾滋病有关，下列哪项检查既便捷又具特异性

A、痰培养

B、胸部 CT

C、血清抗-HIV

D、HIV 分离

E、CD4/CD8 比值，CD4 计数

99、患者，男，40岁，慢性乙肝病史，化验乙肝五项指标，HBsAg (+)，抗HBc (+)，HBeAg (+)，ALT120U/L，其意义

- A、病毒有复制，肝脏有损伤
- B、病毒无复制，无传染性
- C、有传染性
- D、肝脏有损伤，无传染性
- E、病毒有复制，有传染性，肝脏有损害

100、患者有肝硬化史，因劳累病情复发，黄疸进行性加深，乏力，腹胀，出现腹腔积液，下肢浮肿，化验 ALT 200U / L，血清白蛋白 28g / L，总胆红素 300 μ mol / L，凝血酶原时间 24 秒。应诊断为

- A、肝硬化代偿期
- B、急性重型肝炎
- C、亚急性重型肝炎
- D、慢性重型肝炎
- E、胆汁性肝硬化

101、患者男性，38 岁，船民，昨晚进食海蟹一只，晨起腹泻稀水便，10 小时内排便 20 余次，量多。水样，无臭味，中午呕吐 3~4 次，初起水样，后为米泔水样，发病后无排尿，就诊时呈重度脱水征，意识淡漠，BP 80/50mmHg，下列检查对明确诊断无帮助的是

- A、血清凝集试验
- B、大便悬滴镜检
- C、大便碱性蛋白胨增菌培养
- D、血培养

E、大便涂片革兰染色镜检

102-107 针灸

102、患者，男，32 岁，牙痛剧烈，伴口臭，口渴，便秘，舌苔黄，脉洪。

治疗应首选

- A. 风池
- B. 外关
- C. 足三里
- D. 风门
- E. 内庭

103、患者，男，48 岁。大便出血，色鲜红，血量不等，有赘物垂于肛外。

治疗应首选

- A. 承山
- B. 大肠俞
- C. 小肠俞
- D. 膈俞
- E. 血海

104、患者高血压史 2 年。平素心烦惊悸，健忘失眠。治疗应首选

- A. 合谷
- B. 间使
- C. 神门
- D. 内关
- E. 灵道

105、女性，46 岁。咳嗽月余，表现为气逆而咳，引胁作痛，面赤咽干，心烦易怒，苔黄少津，脉弦数。针灸取穴为

- A. 肺俞、尺泽、列缺、太冲
- B. 肺俞、太渊、三阴交、行间
- C. 肺俞、太渊、三阴交、膏肓
- D. 肺俞、太渊、三阴交、阴陵泉
- E. 肺俞、尺泽、列缺、大椎

106、患者阵发性胃脘部绞痛，揉按则舒，上腹部平软。治疗应首选

- A. 原穴
- B. 络穴
- C. 下合穴
- D. 八会穴
- E. 背俞穴

107、患者，女，35岁。经前腹痛剧烈，以冷痛为主，得热痛减，月经量少色黯，肢冷畏寒，舌暗苔白，脉沉紧。治疗宜选取的主穴是

- A. 肝俞、肾俞、太溪、气海
- B. 关元、三阴交、隐白、肝俞
- C. 中极、次髎、地机、三阴交
- D. 关元、足三里、三阴交、肾俞
- E. 带脉、中极、白环俞、三阴交

108、患者左侧牙痛剧烈，龈肿，伴口臭，口渴，便秘，脉洪。治疗除取主穴外，还应加

- A. 风池、外关
- B. 内庭、合谷
- C. 中渚、养老
- D. 太溪、行间
- E. 太冲、曲池

109、患者因夜吹风扇，晨起出现右颈项痛，转动受限，并向同侧肩部放射。针灸治疗除主穴外，宜选取

- A. 血海、膈俞、肩髃
- B. 合谷、曲池、大椎
- C. 风池、内关、肩井
- D. 风池、合谷、肩髃
- E. 大椎、束骨、天宗

110、某女，45岁。突然头晕乏力，泛泛欲吐，昏倒不省人事，牙关紧闭，脉沉弦。治疗宜选用的是

- A. 手厥阴经穴
- B. 手少阴经穴
- C. 足厥阴经穴
- D. 督脉穴
- E. 任脉穴

三、B1型选择题（111~150题）

答题说明：以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案，请从中选择一个与问题最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某一个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

- A. 咯铁锈色痰
- B. 咯粉红色泡沫痰
- C. 唇色、睑结膜苍白
- D. 咳嗽，午后潮热，盗汗
- E. 弛张热，皮肤、巩膜黄染

111、患败血症时，可出现

112、患肺结核时，可出现

- A. 靴形心
- B. 梨形心
- C. 烧瓶状心
- D. 脉搏短绌
- E. 心浊音界明显缩小

113、二尖瓣狭窄可见到

114、心包积液时可见到

- A. 血红蛋白尿
- B. 酱油色尿
- C. 乳糜尿
- D. 淡黄色尿
- E. 浓茶色尿

115、丝虫病可见：

116、疟疾可见：

- A. 异常

Q 波

- B. T 波倒置，ST 段压低
- C. P 波高尖
- D. 多发室性期收缩
- E. QT 间期延长

117、有助于心肌梗死的心电图诊断是

118、有助于心绞痛的心电图诊断是

- A. 磺胺嘧啶
- B. 甲硝唑
- C. 甲氧苄啶
- D. 左氧氟沙星
- E. 呋喃唑酮

119、治疗各种厌氧菌感染的重要药物是

120、可以代替大环内酯类用于支原体肺炎的药物是

- A. I 型糖尿病
- B. 心、肝、肾等疾病的辅助治疗
- C. II 型糖尿病
- D. 胰岛素抵抗
- E. 低血糖

121、二甲双胍的临床适应证是

122、降血糖药最常见的不良反应是

- A. 阿托品
- B. 山莨菪碱
- C. 东莨菪碱
- D. 毛果芸香碱
- E. 溴丙胺太林

123、兴奋中枢的抗胆碱药是

124、抑制中枢的抗胆碱药是

- A. 氢氯噻嗪
- B. 普萘洛尔
- C. 胍屈嗪
- D. 哌唑嗪
- E. 卡托普利

125、可引起高血钾、血管神经性水肿的降压药物是

126、可引起红斑狼疮样综合征的降压药物是

- A. 变异幅度小，出现频率低
- B. 变异幅度小，出现频率高

- C、变异幅度大，出现频率低
- D、变异幅度大，出现频率高
- E、发生于乙型

127、抗原漂移指的是

128、抗原转换指的是

- A、斑丘疹
- B、丘疹
- C、出血疹
- D、疱疹
- E、荨麻疹

129、流行性出血热的皮疹属

130、伤寒的皮疹属

- A、闪罐法
- B、留罐法
- C、走罐法
- D、刺血拔罐法
- E、留针拔罐法

131、治疗丹毒、扭伤常选用

132、治疗局部皮肤麻木或功能减退常选用

- A、太溪
- B、行间
- C、足三里、脾俞
- D、肾俞、太溪
- E、命门、关元

133、经早虚热证，宜加用

134、经迟寒凝证，宜加用

- A、风门、列缺
- B、印堂、内庭

C、曲池、大椎

D、太溪、太冲

E、中脘、丰隆

135、治疗风寒头痛宜取

136、治疗风热头痛宜取

- A、太溪、中封
- B、商丘、解溪
- C、丘墟透照海
- D、颊车、合谷、太冲
- E、廉泉、通里、哑门

137、治疗中风足内翻者，宜加用

138、治疗中风语言蹇涩者，宜加用

- A、玉女煎
- B、梨皮、蔗浆
- C、金汁
- D、化斑汤
- E、知母、阿胶、龟板

139、叶天士《温热论》中指出，若斑出热不解，因为胃津亡，轻者治疗可

140、叶天士《温热论》中指出，若斑出热不解，因为胃津亡，重者治疗可

- 选用
- A、心下痞，按之濡，关上脉浮
- B、心下痞，恶寒汗出
- C、心下痞，呕而发热，肠鸣下利
- D、心下痞硬，干噎食臭，腹中雷鸣下利
- E、心下痞硬而满，干呕心烦不得安，

下利频作，谷不化，腹中雷鸣

141、甘草泻心汤主治

142、半夏泻心汤主治

A、互相尊重

B、互相爱护

C、互相支持

D、互相监督

E、互相学习

143、医务人员之间虽然在职务上有上级和下级之别，在专业分工上有差异，但为患者服务的目标是一致的，体现的道德原则是

144、分工明确、相互依赖是现代医疗活动的鲜明特点，体现的道德原则是

A、经济标准

B、疗效标准

C、社会标准

D、行为标准

E、科学标准

145、评价医务人员医疗行为善恶标准的出发点和根本标准是

146、评价医疗行为是否有利于人类生存和改善，是否有利于人类健康符合

A、地方卫生法规

B、基本法律

C、卫生法律

D、卫生规章

E、卫生行政法规

147、省级人民代表大会制定颁布的是

148、国务院卫生行政部门颁布的是

A、鼠疫、霍乱

B、流行性乙型脑炎、风疹

C、流行性感、麻风病

D、传染性非典型性肺炎、肺炭疽

E、传染性非典型性肺炎、流行性感冒

149、丙类传染病是

150、甲类传染病是

第三单元

一、A₁型选择题（1～30题）

答题说明：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。

1. 急性上呼吸道感染不包括下列哪种疾病

A. 普通感冒

B. 急性咽结膜炎

C. 急性病毒性咽炎

D. 急性支气管炎

E. 急性咽-扁桃体炎

2. 葡萄球菌肺炎的临床表现为

A. 寒战，高热，胸痛，咳嗽，咯铁锈色痰

B. 早期可出现肺实变体征

C. 低热，盗汗，病程长

D. 高热，咳嗽，脓性痰

E. 咯粉红色泡沫痰

3. 肺动脉高压形成的最重要的因素是

A. 缺氧

B. 高碳酸血症

C. 血容量增多

D. 呼吸性酸中毒

E. 血液粘稠度增加

4. 左心衰竭出现的最早的症状是

- A. 呼吸困难
- B. 心律增快
- C. 嗜睡
- D. 紫绀
- E. 少尿

5. 高血压危重症快速降压宜选用

- A. 静滴硝普钠
- B. 卡托普利
- C. 普萘洛尔
- D. 静注地西洋
- E. 静注呋塞米

6. 风湿性心脏瓣膜病中，最容易并发脑栓塞的是

- A. 二尖瓣关闭不全
- B. 主动脉瓣狭窄
- C. 主动脉瓣关闭不全
- D. 三尖瓣狭窄
- E. 二尖瓣狭窄伴心房颤动

7. 急性心肌梗死最常见的心律失常是

- A. 房性期前收缩或心房纤颤
- B. 室性期前收缩或室性心动过速
- C. 房室传导阻滞
- D. 预激综合征
- E. 右束支传导阻滞

8. 中医学认为引起高血压病的病机关键是

- A. 肝肾阴阳失调
- B. 肝脾疏泄失调
- C. 肺肾吐纳失调
- D. 心肾交济失调
- E. 心肺相辅失调

9. 胃溃疡最主要的症状是

- A. 嗝气，反酸
- B. 恶心，呕吐
- C. 呕吐，黑便
- D. 上腹疼痛
- E. 食欲减退

10. 腹痛寒邪内阻证治疗首选方剂

- A. 良附丸合正气天香散
- B. 大承气汤
- C. 枳实导滞丸
- D. 小建中汤
- E. 柴胡疏肝散

11. 下列各项中，不符合淤胆型肝炎临床表现的是

- A. 黄疸深
- B. 自觉症状重
- C. 皮肤瘙痒
- D. 大便颜色变浅
- E. 血清胆固醇升高

12. 泌尿慢性肾功能不全的饮食治疗，说法不正确的是

- A. 限制蛋白饮食
- B. 低热量饮食
- C. 低盐饮食
- D. 心衰患者还应控制水量
- E. 低磷饮食

13. 尿路感染的主要病机是

- A. 湿热蕴结下焦，膀胱气化不利
- B. 湿热蕴结中焦，膀胱气化失司
- C. 湿热蕴结肝胆，肝胆疏泄失常
- D. 肾气亏虚，肾失蒸化开合
- E. 肾阴亏虚，湿热蕴结

14. 急性肾损伤病人由少尿期进入多尿期，尿量超过

- A. 300mL
- B. 400mL
- C. 500mL
- D. 250mL
- E. 350mL

15. 有助于再障与急性白血病鉴别的是

- A. 感染发热
- B. 皮肤黏膜出血
- C. 贫血苍白
- D. 胸骨压痛

E. 网织红细胞减少

16. 慢性粒细胞白血病阴虚内热证，治疗宜选

- A. 清营汤
- B. 犀角地黄汤
- C. 八珍汤
- D. 青蒿鳖甲汤
- E. 膈下逐瘀汤

17. 下列哪一项不属于过敏性紫癜的好发部位

- A. 下肢
- B. 臀部
- C. 上肢
- D. 躯干
- E. 面部

18. 皮肤、黏膜正常止血过程决定于以下哪项因素

- A. 血小板质和量及血管壁的正常
- B. 皮肤、黏膜的完整性及凝血因素的正常
- C. 血小板的质和量、血管壁及凝血因素正常
- D. 血小板质和量正常，凝血因素正常
- E. 凝血因素正常，骨髓正常，血小板质和量正常

19. 治疗甲亢危象应首选

- A. 普萘洛尔
- B. 氢化可的松
- C. 控制感染
- D. 碘化钠
- E. 抗甲状腺药物增量

20. 平胃散合桃红四物汤适用于治疗糖尿病的证型是

- A. 痰瘀互结
- B. 气阴两虚
- C. 阴虚燥热
- D. 阴阳两虚
- E. 脉络瘀阻

21. 成年型甲减主要的临床表现是

- A. 大脑发育不良
- B. 骨髓发育不良
- C. 身材矮小
- D. 消瘦
- E. 代谢、脏器功能受损

22. 反映甲状腺功能最有价值的指标是

- A. 血清甲状腺激素的测定
- B. 血清 TSH 测定
- C. 甲状腺摄 ^{131}I 率测定
- D. T_3 抑制试验
- E. 促甲状腺激素释放激素 (TRH) 兴奋试验

23. 甲亢的水肿特点是

- A. 胫前黏液性水肿
- B. 胫后黏液性水肿
- C. 下垂性水肿
- D. 向心性水肿
- E. 离心性水肿

24. 鉴别 1 型和 2 型糖尿病的主要指标是

- A. 血浆胰岛素测定
- B. 葡萄糖耐量试验
- C. 糖化血红蛋白
- D. 尿糖
- E. 空腹血糖

25. 类风湿关节炎的基本病理改变是

- A. 皮炎
- B. 滑膜炎
- C. 心包炎
- D. 血管炎
- E. 心肌炎

26. 下列各项中，不属于系统性红斑狼疮诊断依据的是

- A. 颧部红斑
- B. 非侵蚀性关节炎
- C. 蛋白尿或细胞管型
- D. 溶血性贫血或白细胞减少

E. 血沉加快

27. 下列是继发性高尿酸血症或痛风鉴别要点的是

- A. 儿童、青少年、女性和老年人更少见
- B. 高尿酸血症程度较轻
- C. 40%患者 24 小时的尿酸排出量减少
- D. 痛风性关节炎症状往往较轻或不典型
- E. 无明确的相关用药史

28. 高渗性失水早期的主要表现是

- A. 口渴
- B. 心悸
- C. 晕厥
- D. 恶心
- E. 烦躁

29. 有关血脂异常的中医病因病机，说法错误的是

- A. 病位在心、脾、肾、肝
- B. 病性多为本虚标实
- C. 本虚为脏腑亏虚
- D. 标实为痰浊瘀血，阻滞经脉
- E. 病因与素体肥胖，加之饮食不节有关

30. 导致血脂异常发病的关键因素是

- A. HDL-C 升高
- B. HDL-C 降低
- C. TG 升高
- D. LDL-C 升高
- E. LDL-C 降低

二、A₂ 型选择题 (31 ~ 106 题)

答题说明：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。

31. 患者，男，29 岁，因寒战、高热、咳嗽 4 天入院。查体：血压 110/70mmHg，口唇发绀，呼吸幅度减小、叩诊轻度浊音、听诊呼吸音减低和胸膜摩擦音。

X 线示：肺段大片、均匀炎症浸润阴影，血象：白细胞 $19 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞 0.76。可诊断为

- A. 支原体肺炎
- B. 病毒性肺炎
- C. 衣原体肺炎
- D. 真菌性肺炎
- E. 肺炎链球菌肺炎

32. 患者，男，65 岁。反复咳嗽，咳痰 20 年，加重 1 周而入院。现症见咳嗽气促，痰多色黄质稠，咳吐不爽，身热，口干欲饮，舌质红，苔黄腻，脉滑数。治疗应首选

- A. 定喘汤
- B. 麻杏石甘汤
- C. 桑白皮汤
- D. 加减泻白散
- E. 温胆汤

33. 患者，男，49 岁。患支气管哮喘 20 年，急性发作 1 周，昨夜气急突然加重。体检：发绀，大汗，两肺叩诊过清音，两肺闻及哮鸣音，左肺呼吸音减弱，心率 120 次/分，律齐。用氨茶碱、激素后哮鸣音改善，但气急无好转。病情加重的原因最可能是

- A. 严重支气管痉挛
- B. 并发左心衰
- C. 并发气胸
- D. 继发肺部感染
- E. 并发呼吸衰竭

34. 患者，男，50 岁。咳痰带血二月余，近一个月食少，体重减轻。有吸烟嗜好，按肺炎治疗无效。X 线检查见右肺近肺门处有一团块状阴影，痰脱落细胞检查找到癌细胞。本例患者的首选治疗方案是

- A. 放射治疗
- B. 手术切除
- C. 化学药物治疗
- D. 抗生素治疗
- E. 免疫治疗

35. 患者，女，58岁。患急性心肌梗死后第2天出现少尿，血压75/50mmHg，烦躁不安，面色苍白，表情淡漠，皮肤湿冷，大汗淋漓，脉细弱无力。应首先考虑的是

- A. 左心衰竭
- B. 低血糖反应
- C. 心源性休克
- D. 急性肾衰竭
- E. 心肌梗死后综合征

36. 患者，女，28岁。以心悸，气短，下肢水肿入院。检查：颈静脉怒张，心尖部舒张期杂音，肝肋缘下3cm轻度压痛。肝颈静脉回流征(+)。其肝脏病变可能是

- A. 慢性迁延性肝炎
- B. 肝炎后肝硬化
- C. 慢性肝淤血
- D. 肝脂肪变性
- E. 肝细胞肝癌

37. 一患者因2小时胸痛来诊，心电图示V₁~V₃导联QRS波呈QrS型，ST段呈弓背向上抬高伴倒置T波，诊断心肌梗死的部位是

- A. 下壁
- B. 间壁
- C. 前间壁
- D. 前壁
- E. 侧壁

38. 患者，女，30岁。心悸气促2个月，咯粉红色泡沫痰。查体：面颊暗红，口唇紫绀，双肺底闻及湿啰音，心尖区可闻及舒张期隆隆样杂音，下肢浮肿。诊断是

- A. 肺源性心脏病
- B. 冠心病
- C. 二尖瓣狭窄，心功能不全
- D. 高血压心脏病
- E. 心包积液

39. 患者，女，40岁。3年前发现患有风湿性心脏病，近半年来，体力活动明显受限，轻度活动即出现心悸，气短。其心功能为

- A. I级
- B. II级
- C. III级
- D. IV级
- E. 0级

40. 患者，男，20岁。现症见神萎迟钝，肢厥汗淋，形寒畏冷，心悸胸闷，呼吸急促，尿少或无尿。舌淡，苔白，脉微欲绝。查体：血压70/50mmHg，面色苍白，四肢湿冷。治疗应首选

- A. 人参养荣汤
- B. 四味回阳汤
- C. 保元汤
- D. 清营汤
- E. 生脉饮

41. 患者，女，32岁。饱餐后出现上腹部剧痛伴恶心呕吐，呕后腹痛反而加重，服解痉剂无效。检查：体温39℃，心率120次/分，腹部紧张。有压痛、反跳痛，血清淀粉酶350U，血钙1.63mmol/L。应首先考虑的是

- A. 急性心肌梗死
- B. 溃疡病穿孔
- C. 急性胰腺炎
- D. 急性阑尾炎
- E. 急性肠梗阻

42. 患者，男，48岁。上腹部无规律胀痛3年余，常因饮食不当而发作，偶有反酸，嗝气，心血管检查无异常。应首先考虑的是

- A. 慢性胆囊炎
- B. 心绞痛
- C. 胃溃疡
- D. 胃癌
- E. 慢性胃炎

43. 患者，男，40岁。乙肝病史6年，近半月肝区持续性疼痛，胃纳差，黄疸，消瘦。查体：肝肋下4cm，质硬，表面不平，压痛。应首先考虑的是

- A. 慢性肝炎
- B. 肝脓肿
- C. 肝硬化
- D. 继发性肝癌
- E. 原发性肝癌

44. 慢性胃炎患者，胃脘隐痛，嘈杂，口干咽燥，五心烦热，大便干结，舌红少津，脉细。治疗应首选的方剂是

- A. 沙参麦冬汤
- B. 生脉饮
- C. 滋水清肝饮
- D. 益胃汤
- E. 玉女煎

45. 患者，男，49岁。腹泻3~5次/日，便稀，时带黏液及血，2年来时重时轻。左下腹有压痛。曾用利福平治疗无效。今日结肠镜检查示：黏膜充血水肿、易脆，伴糜烂和溃疡。应首先考虑的诊断为

- A. 阿米巴肠炎
- B. 溃疡性结肠炎
- C. 结肠癌
- D. 细菌性痢疾
- E. 肠结核

46. 患者，男，50岁。肝硬化腹水，症见：腹膨大，按之坚满，脘闷腹胀纳呆，大便溏泄，小便不利，舌苔白腻，脉弦缓。其治法是

- A. 疏肝理气，利湿散满
- B. 运脾利湿，化气行水
- C. 活血化瘀，利水消肿
- D. 调脾行气，清热利湿
- E. 温补肾阳，通阳利水

47. 患者，女，38岁。高热寒战，腰痛，恶心、呕吐，尿频、尿急、尿痛等膀

胱刺激症状。尿沉渣镜检白细胞 >5 个/HP。其诊断应首先考虑的是

- A. 尿道炎
- B. 急性肾小球肾炎
- C. 慢性肾小球肾炎
- D. 急性肾盂肾炎
- E. 慢性肾盂肾炎

48. 患者小便淋漓不已，时作时止，每于劳累后发作，尿热，时有尿痛，面色无华，神疲乏力，少气懒言，腰膝酸软，食欲不振，口干不欲饮水，舌质淡，苔薄白，脉沉细。治疗应首选的方剂是

- A. 八正散
- B. 丹栀逍遥散
- C. 无比山药丸
- D. 知柏地黄丸
- E. 补中益气汤

49. 张某，男性，36岁。体检时发现蛋白尿阳性，24小时定量为1.3g，下肢轻度浮肿，血压150/96mmHg，血肌酐 $124\mu\text{mol/L}$ 。其诊断是

- A. 慢性肾小球肾炎
- B. 急性肾小球肾炎
- C. 肾病综合征
- D. 慢性肾功能衰竭
- E. 慢性肾盂肾炎

50. 患者，女，24岁。患再生障碍性贫血，症见：面色及唇甲苍白，食欲下降，精神萎靡，腰膝酸软，形寒肢冷，月经色淡，舌胖有齿痕苔白，脉沉细。其证型是

- A. 气血两虚
- B. 肾虚血瘀
- C. 脾气虚弱
- D. 肾阳亏虚
- E. 脾胃虚寒

51. 患者因胸骨疼痛、发热就诊，血液检查见到幼稚细胞增多，骨髓检查见有核细胞增生活跃，原始细胞占40%。

应首先考虑的诊断是

- A. 再生障碍性贫血
- B. 白血病
- C. 骨髓增生异常综合征
- D. 传染性单核细胞增多症
- E. 传染性淋巴细胞增多症

52. 患者因乏力就诊，骨穿示增生减低，考虑为再障。现症见面色苍白，倦怠乏力，头晕心悸，手足心热，腰膝酸软，畏寒肢冷，齿鼻衄血，舌质淡，苔白，脉细无力。其中医治法是

- A. 滋阴助阳，益气补血
- B. 补肾助阳，益气养血
- C. 滋阴补肾，益气养血
- D. 清热凉血，解毒养阴
- E. 补肾活血

53. 患者高热 2 周，伴乏力气短。血象检查：网织红细胞绝对值 $12 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞 $0.4 \times 10^9/L$ ，血小板 $18 \times 10^9/L$ ；骨髓象示：骨髓增生广泛重度减低。应考虑的诊断是

- A. 骨髓增生异常综合征
- B. 非重型再障
- C. 白血病
- D. 恶性贫血
- E. 重型再障

54. 康某，女性，28 岁，患功能性子宫出血多年，就诊时面色萎黄，口唇色淡，爪甲无泽，神疲乏力，食少便溏，恶心呕吐，舌质淡，苔薄腻，脉细弱。血常规检查：血红蛋白 $102g/L$ ，血清铁浓度为 $8.1 \mu mol/L$ ，骨髓铁染色显示：骨髓小粒可染铁消失，铁粒幼红细胞为 12%。应首先考虑的病证结合诊断是

- A. 缺铁性贫血+心脾两虚证
- B. 再生障碍性贫血+脾胃虚弱证
- C. 缺铁性贫血+脾胃虚弱证
- D. 肾性贫血+脾肾阳虚证
- E. 再生障碍性贫血+脾肾阳虚证

55. 某女，45 岁，出现甲状腺弥漫性对称性肿大，伴锥体叶肿大，质地坚实，甲状腺功能正常，实验室检查显示：血清 TPOAb 及 TgAb 明显增高。其可能的诊断为

- A. 桥本甲状腺炎
- B. 萎缩性甲状腺炎
- C. 腺癌
- D. 急性甲状腺
- E. 原发性甲状腺功能减退症

56. 某女，42 岁，曾诊断为慢性淋巴细胞性甲状腺炎，近期出现甲状腺迅速肿大伴疼痛、压迫症状，应首选的治疗措施是

- A. 手术治疗
- B. 甲硫咪唑
- C. 糖皮质激素
- D. 左甲状腺素
- E. 泼尼松

57. 某男，35 岁，易疲劳，怕冷，少汗，动作缓慢，食欲减退而体重增加，记忆力减退，实验室检查显示：FT₄ 降低，TSH 正常。其可能的诊断为

- A. 甲状腺功能亢进症
- B. 原发性甲状腺功能减退症
- C. 继发性甲状腺功能减退症
- D. 亚急性甲状腺炎
- E. 甲状腺瘤

58. 王某，颈前肿胀 5 个月，伴眼突，烦躁易怒，手指颤抖，多汗，面红目赤，头晕目眩，口苦咽干，大便秘结，舌红苔黄，脉弦数。治疗应首选的方剂是

- A. 龙胆泻肝汤
- B. 逍遥散
- C. 天王补心丹
- D. 柴胡疏肝散
- E. 镇肝息风汤

59. 刘某，因发热、淋巴结肿大就诊，骨穿诊断为急性白血病，给以化疗药

物治疗。现低热，自汗，盗汗，气短，乏力，面色不华，头晕，腰膝酸软，手足心热，皮肤瘀点、瘀斑，鼻衄、齿衄，舌淡有齿痕，脉沉细。其中医治法是

- A. 益气养阴，清热解毒
- B. 清热化痰，活血散结
- C. 清热解毒，利湿化浊
- D. 清热解毒，凉血止血
- E. 益气养阴，利湿化浊

60. 患者女，39岁。现患者自觉颈前肿胀并伴有疼痛，发热多汗、急躁、心悸半月。左侧甲状腺轻度肿大。心率100次/分，律齐。疑为亚急性甲状腺炎，应首先考虑的诊断是

- A. Graves病
- B. 桥本病
- C. 单纯性甲状腺肿
- D. 甲状腺腺瘤
- E. 亚急性甲状腺炎

61. 王某，男，18岁，多饮、多食、多尿5年，曾有酮症酸中毒史，现在空腹血糖12.0mmol/L。应首选的治疗措施是饮食疗法加

- A. 运动疗法
- B. 磺脲类降糖药
- C. 胰岛素
- D. 二甲双胍
- E. 噻唑烷二酮

62. 癫痫患者，发则突然跌仆，目睛上视，口吐白沫，手足抽搐，喉间痰鸣，舌苔白腻，脉弦滑。治疗应首选的方剂是

- A. 醒脾汤
- B. 黄连温胆汤
- C. 龙胆泻肝汤
- D. 左归丸
- E. 定痫丸

63. 女性患者，72岁。1天前上午发现口角右偏，左手不能持物，左下肢不

能行走，说话吐字不清。下午检查发现左侧鼻唇沟浅，伸舌稍向左偏，左侧上下肢肌力4级。今晨醒来说话正常，鼻唇沟对称，伸舌居中，四肢运动灵活有力。其诊断是

- A. 右侧大脑中动脉血栓形成
- B. 椎-基底动脉血栓形成
- C. 短暂性脑缺血发作
- D. 脑出血
- E. 蛛网膜下腔出血

64. 患者突然发生神昏，半身不遂，口噤不开，四肢不温，痰涎壅盛，舌质暗淡，苔白腻，脉沉滑。西医诊断为脑出血。治疗应首选的方剂是

- A. 天麻钩藤饮
- B. 安宫牛黄丸合羚羊角汤
- C. 涤痰汤送服苏合香丸
- D. 镇肝息风汤
- E. 真方白丸子

65. 患者，男，50岁。高血压病史15年，未坚持服药。2小时前因情绪激动突然意识不清，双侧瞳孔不等大。应首先考虑的是

- A. 酒精中毒
- B. 药物中毒
- C. 高血压性脑出血
- D. 脑血栓
- E. 心功能不全

66. 眩晕，耳鸣，突然发生口舌歪斜，舌强语蹇，手指或半身麻木，烦躁失眠，舌红，脉弦滑。治疗应首选方剂

- A. 龙胆泻肝汤
- B. 地黄饮子
- C. 镇肝熄风汤
- D. 大秦芩汤
- E. 苏合香丸

67. 患者，男，68岁。高血压病史20年，近日突然意识丧失，深度昏迷，出现“三偏征”，伴有高热与呕血。应首先考虑的是

- A. 内囊-基底节出血(外侧型)
- B. 内囊-基底节出血(内侧型)
- C. 桥脑出血
- D. 小脑出血
- E. 蛛网膜下腔出血

68. 患者, 男, 68 岁。3 年来无诱因逐渐出现行动缓慢, 行走时前倾屈曲体态, 伴头晕目眩, 耳鸣, 腰膝酸软, 五心烦热, 大便秘结。查体: 面具脸, 双手震颤, 双侧肢体肌张力增高。无智力和感觉障碍, 无锥体束损害征。舌红苔少, 脉弦细。最可能的诊断是

- A. 帕金森病
- B. 血管性痴呆
- C. 阿尔兹海默病
- D. 肝豆状核变性
- E. 脑梗死

69. 患者, 男, 73 岁。3 年来无诱因逐渐出现近事遗忘, 不爱出门, 烦躁易怒, 理解力下降, 伴眩晕头痛, 面红目赤, 心烦不寐, 多疑善虑, 心悸不安, 咽干口渴, 口臭生疮, 尿赤便干。查体: 坐立不安, 无锥体束征和感觉障碍, 视力、视野正常。舌质红, 苔黄, 脉弦数。首先考虑的诊断是

- A. 抑郁症
- B. 脑血栓形成
- C. Alzheimer 病
- D. 帕金森病
- E. 皮克病

70. 某男, 被人发现时躺在公园一角落, 呈半昏迷状态, 遂急送医院。查体: 体温 37°C, 血压 130/70mmHg, 神志不清, 两侧瞳孔针尖大小, 口角流涎, 口唇紫绀, 呼吸急促, 两肺满布水泡音, 心率 60 次/分, 肌肉有震颤。迅速洗胃, 洗出液有大蒜味。其诊断是

- A. 有机磷杀虫药中毒
- B. 酒精中毒
- C. 一氧化碳中毒
- D. 中暑

E. 安定中毒

71. 患者, 30 岁, 煤气中毒, 经过积极抢救后苏醒, 2 天后又出现神志不清, 右侧肢体偏瘫, 体温、血压正常, 两肺呼吸音粗。应首选的治疗措施是

- A. 高压氧舱
- B. 地塞米松输注
- C. 甘露醇输注
- D. 维生素 C 输注
- E. 脑营养物质

72. 患者, 女, 25 岁。患者 10 小时前因失恋服用 1 瓶苯巴比妥, 出现昏迷, 呼吸抑制。血压 70/50mmHg。首先考虑的诊断是

- A. 呼吸衰竭
- B. 有机磷杀虫药中毒
- C. 急性一氧化碳中毒
- D. 低血容量休克
- E. 急性镇静催眠药中毒

73. 张某, 12 岁, 因发热就诊, 肌注青霉素后出现肢冷, 汗出, 血压下降。治疗应首选的药物是

- A. 间羟胺
- B. 氢化可的松
- C. 去甲肾上腺素
- D. 多巴胺
- E. 肾上腺素

74. 患者, 男, 56 岁。重度烧伤渗出期, 现昏迷。查体: 面色苍白, 四肢湿冷, 皮肤黏膜发绀, 呼吸浅快, 40 次/分, 心率 125 次/分, 血压 70/50mmHg, 体温 40°C。舌淡, 脉微欲绝。最可能的诊断是

- A. 休克
- B. 急性肺损伤
- C. 急性心力衰竭
- D. 急性肾功能衰竭
- E. 心源性猝死

75. 每逢生气后，即咳逆阵作，痰滞咽喉咳之不出，胸胁胀痛，咳时面赤，口苦咽干，舌红苔薄黄，脉弦数。治疗应首选

- A. 二陈汤合柴胡疏肝散
- B. 黄芩泻白散合黛蛤散
- C. 桑白皮汤合柴胡疏肝散
- D. 清金化痰汤合桔梗汤
- E. 龙胆泻肝汤合黛蛤散

76. 患者暴饮过食之后，突然昏厥，气息窒塞。脘腹胀满，舌苔厚腻，脉滑实。经探吐治疗后，应首选

- A. 藿香正气散
- B. 着朴夏苓汤
- C. 枳实导滞丸
- D. 神术散合保和丸
- E. 越鞠丸

77. 患者，女，42岁，眩晕昏蒙，头重如裹，胸闷恶心，纳呆多寐，舌苔白腻，脉濡滑。其病机是

- A. 风湿
- B. 气虚
- C. 血虚
- D. 痰浊
- E. 肾虚

78. 患者女性，65岁，腹痛拘急，遇寒痛甚，得温痛减，口淡不渴，形寒肢冷，小便清长，大便清稀，舌质淡，苔白腻，脉沉紧。应首选的治疗方法

- A. 消食导滞，理气止痛
- B. 温中补虚，缓急止痛
- C. 散寒温里，理气止痛
- D. 疏肝解郁，理气止痛
- E. 活血化瘀，和络止痛

79. 男性患者，49岁，大便不干，排出困难，小便清长，面色㿔白，四肢不温，腹中冷痛，腰膝酸冷，舌淡苔白，脉沉迟。其中医治法为

- A. 益气通便

- B. 温阳通便
- C. 补火助阳
- D. 回阳救逆
- E. 润肠通便

80. 可以改善 COPD 患者生存率的治疗措施是

- A. 及时应用抗菌药物
- B. 支气管扩张药
- C. 长期家庭氧疗
- D. 康复治疗
- E. 肺减容手术

81. 患者鼓胀，腹大胀满，形似蛙腹，朝宽暮急，面色苍黄，院闷纳呆，神倦怯寒，肢冷浮肿，小便短少不利，舌体胖、质紫，苔淡白，脉沉细无力。其中医治法为

- A. 清热利湿，攻下逐水
- B. 温补脾肾，化气利水
- C. 活血化瘀，行气利水
- D. 温中健脾，行气利水
- E. 疏肝理气，运脾利湿

82. 属慢性肺心病肺动脉高压 X 线检查表现的是

- A. 双肺纹理增多
- B. 右心室肥厚
- C. 右下肺动脉干扩张
- D. 双肺透亮度增高
- E. 右心房肥大

83. 顾某，男，35岁。两天来腹中结块，时聚时散，攻窜胀痛，脘胁胀闷不适，苔薄，脉弦。其诊断是

- A. 聚证，肝气郁结证
- B. 聚证，食滞痰阻证
- C. 积证，气滞血阻证
- D. 积证，肝气郁结证
- E. 积证，正虚瘀结证

84. 适用于夜间发作性哮喘的药物是

- A. 茶碱控释片
- B. 氨茶碱

- C. 喘定
- D. 受体激动剂
- E. 沙丁胺醇

85. 童某, 女, 48 岁。两胁下积块 5 年, 积块坚硬, 隐痛, 饮食大减, 肌肉瘦削, 神倦乏力, 面色黧黑, 舌质淡紫, 脉细数。治疗此病证首选的方剂是

- A. 木香顺气散
- B. 膈下逐瘀汤合六君子汤
- C. 柴胡疏肝散合失笑散
- D. 逍遥散合鳖甲煎丸
- E. 八珍汤合化积丸

86. 急性肺水肿患者应采取坐位且双下肢下垂, 其目的是

- A. 降低心脏压力负荷
- B. 增加回心血量
- C. 增加肺通气量
- D. 减少静脉回流
- E. 减慢心率, 降低氧耗

87. 对化疗最敏感的肺癌组织学类型是

- A. 鳞状上皮癌
- B. 类癌
- C. 腺癌
- D. 小细胞肺癌
- E. 大细胞肺癌

88. 某患者, 身目俱黄, 色泽鲜明, 发热口渴, 腹部胀满, 口干, 口苦, 恶心呕吐, 胁胀痛而拒按, 小便赤黄、短少, 大便秘结, 舌红, 苔黄腻, 脉弦滑。治疗此证应首选的方剂是

- A. 甘露消毒丹
- B. 茵陈蒿汤
- C. 茵陈四苓散
- D. 茵陈术附汤
- E. 黄芪建中汤

89. 慢性左心衰竭患者的体征中, 最不具有诊断价值的是

- A. 心音低钝

- B. 肺动脉瓣区第二心音亢进
- C. 心率减慢
- D. 心脏扩大
- E. 舒张期奔马律

90. 黎某, 男性, 25 岁。因颜面浮肿就诊。现眼睑头面浮肿, 全身皮肤光亮, 尿少色赤, 身发疮痍, 恶风发热, 舌质红, 苔薄黄, 脉浮数。其中医治法是

- A. 散风清热, 宣肺行水
- B. 宣肺解毒, 利湿消肿
- C. 健脾化湿, 通阳利水
- D. 温运脾阳, 以利水湿
- E. 活血祛瘀, 化气行水

三、A₃ 型选择题 (107~130 题)

答题说明: 以下提供若干个案例, 每个案例下设若干道试题。请根据题干所提供的信息, 在每一道考题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案。

(107~110 题共用题干)

患者, 女, 28 岁。左下腹痛, 脓血样便伴里急后重 2 年。现腹痛隐隐、日腹泻 4~5 次伴腹胀、食欲不振、午后发热, 盗汗, 五心烦热, 头晕眼花。查体: 左下腹轻压痛, 左侧掌指关节红肿。舌红少苔, 脉细数。血常规检查: 红细胞 $85 \times 10^9/L$, 血红蛋白 105g/L, 红细胞沉降率加速。大便细菌培养阴性, 阿米巴滋养体阴性。纤维结肠镜: 肠黏膜血管纹理模糊、紊乱, 黏膜充血、水肿, 有脓性分泌物附着。

107. 首先考虑的诊断是

- A. 溃疡性结肠炎
- B. 阿米巴肠炎
- C. 慢性细菌性痢疾
- D. 肠易激综合征
- E. 血吸虫病

108. 中医治法是

- A. 疏肝, 健脾, 止泻
- B. 健脾, 温肾, 止泻

- C. 滋阴养血，清热化湿
D. 清热利湿，活血化痰
E. 健脾渗湿，温阳止泻
109. 治疗此证应首选的方剂是

- A. 四神丸加味
B. 驻车丸
C. 参苓白术散加味
D. 白头翁汤加味
E. 膈下逐瘀汤加味

110. 若热重，大便硬结难出者，宜

- A. 用四物汤
B. 用四神丸
C. 酌加知母、熟大黄
D. 用补中益气汤
E. 加白头翁、黄连、马齿苋

(111~115 题共用题干)

答案: DEDBA

解析: 患者，男，58岁。高血压病史6年。近5个月来夜尿增多，伴有乏力、气促、腰酸、纳呆腹胀、食欲减退。

查体: 轻度贫血貌，血压170/110mmHg。舌淡红，苔白，有齿痕。脉沉细。肾功能检查: GFR50mL/min, Cr

60mL/min, Scr256 μmol/L, 结合临床

表现，诊断: 慢性肾衰竭。

慢性肾衰竭的患者可根据需要应用利尿剂(呋塞米、布美他尼等)。噻嗪类利尿剂及潴钾利尿剂对CRF患者

(Scr>220μmol/L)不宜应用，因此时疗效甚差。对严重肺水肿急性左心衰竭者，常需及时给予血液透析或持续性血液滤过，以免延误治疗时机。

患者夜尿增多，伴有乏力、气促、腰酸、纳呆腹胀、食欲减退。轻度贫血貌，血压170/110mmHg。舌淡红，苔白，有齿痕。脉沉细。结合临床表现，诊断:

慢性肾衰竭。中医诊断为脾肾气虚证; 治法为: 补气健脾益肾; 方剂: 六君子汤。

脾肾气虚证; 中医治法: 补气健脾益肾; 方剂: 六君子汤。

脾肾气虚证，若脾虚湿困，恶心呕吐，胸闷纳呆者，可加苍术、藿香、佩兰、

薏苡仁健脾化湿。

(116~118 题共用题干)

答案: BEB

解析: 中消(胃热炽盛证)，证候: 多食易饥，口渴多尿，形体消瘦，大便秘结，苔黄，脉滑实有力。治法: 清胃泻火，养阴增液。方药: 玉女煎加味。

(119~122 题共用题干)

答案: EBED

解析: 患者一个月前出现头晕乏力，失眠多梦，耳鸣眼花，胸闷心悸，动则尤甚。查体: 面色萎黄，唇甲色淡，肋下癥积。舌体胖大，舌质淡红，舌苔薄白，脉虚无力。血象检查: 血红蛋白75g/L，中性粒细胞 $0.9 \times 10^9/L$ ，血小板 $60 \times 10^9/L$ 。骨髓象示: 骨髓增生活跃，骨小梁旁区和间区出现3-5个呈簇状分布的原粒和早幼粒细胞。造血祖细胞体外集落培养“流产”，结合临床表现，诊断: 骨髓增生异常综合征。

促造血治疗可使用雄激素，如司坦唑醇、十一酸睾酮等; 造血生长因子，如粒细胞集落刺激因子(G-CSF)、促红细胞生成素(EPO)等，能改善部分患者的造血功能。

气血两虚证的主症为面色萎黄，唇甲色淡，头晕目眩，失眠多梦，耳鸣眼花，气短懒言，疲乏无力，胸闷心悸，动则尤甚，肋下癥积，舌体胖大，舌质淡红，舌苔薄白，脉虚无力。治以益气补血，方用八珍汤加味。

气血两虚证，治以益气补血，方用八珍汤加味。

(123~125 题共用题干)

答案: BDE

解析: 尿血下焦湿热证的主症为小便黄赤灼热，尿血鲜红，心烦口渴，面赤，夜寐不安，舌质红，苔黄腻，脉数。

下焦湿热证，治以清热利湿，凉血止血。

下焦湿热证，方用小蓟饮子加减。

(126~130 题共用题干)

答案: BBECE

解析: 患者,男,67岁。昨夜上厕所中突发剧烈头痛伴呕吐而入院。查体:昏睡,双眼向左凝视,右侧肢体偏瘫,右侧巴宾斯基征(+)。血压220/110mmHg,结合患者临床表现,诊断:蛛网膜下腔出血。

脑脊液检查均匀一致血性,是诊断SAH的重要依据。

蛛网膜下腔出血需要安静休息:绝对卧床4~6周,镇静、镇痛,避免用力和情绪刺激。

蛛网膜下腔出血患者现目合口开,鼻鼾息微,手撒肢冷,汗多不止,二便自遗,脉微欲绝,结合临床表现,中医证型:元气败脱,心神涣散; 中医治法:益气回阳,救阴固脱; 方剂:

大剂参附汤合生脉散。

蛛网膜下腔出血证型:元气败脱,心神涣散; 中医治法应益气回阳,救阴固脱; 方剂:参附汤合生脉散。

四、B₁型选择题(131~150题)

答题说明: 以下提供若干组考题,每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案,请从中选择一个与问题最密切的答案。某一个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(131~132 题共用备选答案)

答案: DB

解析: 支气管哮喘典型表现为发作性伴有哮鸣音的呼气性呼吸困难或发作性胸闷和咳嗽,其发作常与吸入外源性变应原有关,大多数有季节性。慢性支气管炎喘息型多见于中老年人,有慢性咳嗽史,喘息常年存在,主要症状为咳嗽、咳痰,或伴有喘息,如

合并哮喘可闻及广泛哮鸣音并伴呼气期延长。

(133~134 题共用备选答案)

答案: BE

解析: 胸闷隐痛,时作时止。见于胸痹气阴两虚证。胸痛彻背,感寒痛甚。见于胸痹之阴寒凝滞证。

(135~136 题共用备选答案)

答案: AC

解析: 胆囊炎表现为反复发作右上腹隐痛,进食油脂食物常加重。B超可见胆囊炎性改变,静脉胆道造影时胆囊显影淡薄或不显影,多合并胆囊结石。消化性溃疡一般表现为发作性上腹疼痛,有周期性和节律性,好发于秋冬和冬春之交。钡餐造影可发现龛影或间接征象。胃镜检查可见黏膜溃疡。

(137~138 题共用备选答案)

答案: AB

解析: 降压药物选择 ①有钠水潴留容量依赖性高血压患者可选用噻嗪类利尿药,如氢氯噻嗪口服。②对肾素依赖性高血压应首选血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI),如贝那普利。或用血管紧张素II受体拮抗剂(ARB),如氯沙坦或缬沙坦。③心率较快的中、青年患者或合并心绞痛患者,可选用β受体阻滞剂,如阿替洛尔或美托洛尔。④老年患者,以及合并糖尿病、冠心病患者,选用钙离子拮抗剂,如氨氯地平或硝苯地平控释片。⑤若高血压难以控制可以选用不同类型降压药联合应用。

(139~140 题共用备选答案)

答案: CB

解析: 特发性血小板减少的临床表现。临床上分为急性型和慢性型两种。(1)急性型常见于儿童。起病急骤,少数病例表现为暴发性起病。可有轻度发热、畏寒,突发广泛性皮肤黏膜紫癜,

甚至大片瘀斑。皮肤瘀点多为全身性，以下肢多见，分布均匀。黏膜出血多见于鼻腔、牙龈，口腔可有血疱。(2)慢性型 常见于年轻女性，起病隐匿，症状较轻。出血常反复发作，每次出血可持续数天到数月。皮肤紫癜、瘀斑、瘀点以下肢远端或止血带以下部位多见。可有鼻腔、牙龈，口腔黏膜出血，女性月经过多有时是唯一症状。粒细胞缺乏症粒细胞极度缺乏，机体抵抗力明显下降，感染成为主要合并症。牙龈、口腔粘膜、软腭、咽峡部发生坏死性溃疡，常覆盖灰黄或淡绿色假膜。皮肤、鼻腔、阴道、子宫、直肠、肛门均可出现炎症。局部感染常引起相应部位淋巴结肿大。肺部的严重感染引起咳嗽、呼吸困难、紫绀。发生败血症时可伴肝损害，出现肝大、黄疸。

(141~142 题共用备选答案)

答案: BC

解析: 悬饮之邪犯胸肺证: 证见寒热往来，身热起伏，汗少，或发热不恶寒，有汗而热不解，咳嗽，痰少，气急，胸胁刺痛，呼吸、转侧疼痛加重，心下痞硬，干呕，口苦，咽干，舌苔薄白或黄，脉弦数。悬饮之络气不和证: 证见胸胁疼痛，如灼如刺，胸闷不舒，呼吸不畅，或有闷咳，甚则迁延，经久不已，阴雨更甚，可见病侧胸廓变形，舌苔薄，质暗，脉弦。

(143~144 题共用备选答案)

答案: AB

解析: 阿托品主要作用于外周 M 胆碱能受体，缓解 M 样症状，根据中毒轻重、用药后 M 样症状缓解程度，决定剂量、用药途径和间隔时间，尽早使患者达到并维持“阿托品化”。胆碱酯酶复活药能对抗外周 N₂ 受体，控制肌纤维颤动等 N 样症状。

(145~146 题共用备选答案)

答案: CD

解析: 帕金森病的病位筋脉，与肝肾脾密切相关。脑为元神之府，灵机出于此，故痴呆病位在脑，与心肝脾肾功能失调有关。

(147~148 题共用备选答案)

答案: BB

解析: 突发事件的报告情形和报告时限要求突发事件监测机构、医疗卫生机构和有关单位发现有下列情形之一的，应当在 2 小时内向所在地县级人民政府卫生行政主管部门报告; 接到报告的卫生行政主管部门应当在 2 小时内向本级人民政府报告，并同时向上级人民政府卫生行政主管部门和国务院卫生行政主管部门报告: (1) 发生或者可能发生传染病暴发、流行的;

(2) 发生或者发现不明原因的群体性疾病的; (3) 发生传染病菌种、毒种丢失的; (4) 发生或者可能发生重大食物和职业中毒事件的。

(149~150 题共用备选答案)

答案: CA

解析: 甲状腺功能减退症，脾肾气虚证，治法: 益气健脾补肾。方药: 四君子汤合大补元煎加减。甲状腺功能减退症，心肾阳虚证，治法: 温补心肾，利水消肿。方药: 真武汤合苓桂术甘汤加减。

第四单元

一、A₁ 型选择题 (1 ~ 54 题)

答题说明: 每一道考试题下面有 A. B. C. D. E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。

1. 中医泛指一切皮里膜外浅表部位的病理性肿块为

A. 结核

- B. 瘤
- C. 瘰
- D. 疽
- E. 岩

2. 灭菌是指

- A. 杀灭细菌
- B. 杀灭病原微生物
- C. 杀灭有害微生物
- D. 杀灭一切活的微生物
- E. 杀灭芽胞类微生物

3. 下列哪项不属于麻醉前用药的目的

- A. 解除病人精神紧张
- B. 使麻醉过程平稳
- C. 增强麻醉效果
- D. 促进肌肉松弛
- E. 减轻病人疼痛感

4. 关于等渗性缺水，正确的是

- A. 水和钠按其在血液中的正常比例丢失
- B. 外科临床中较少见
- C. 也称慢性缺水
- D. 血清钠浓度明显降低
- E. 血清钠浓度明显增高

5. 下列哪项不属于输血适应证

- A. 凝血机制异常和出血性疾病
- B. 重症感染
- C. 黄疸
- D. 器官移植
- E. 低蛋白血症

6. 休克的西医治疗不包括

- A. 补充血容量
- B. 积极处理原发病
- C. 纠正酸碱平衡失调
- D. 应用血管活性药物
- E. 减轻体重

7. 手术前准备不包括

- A. 预防感染
- B. 全身营养

- C. 心理准备
- D. 肠道准备
- E. 明确诊断

8. 多器官功能障碍综合征的治疗措施不包括

- A. 控制感染
- B. 维持氧的供需平衡
- C. 保护肝肾功能
- D. 免疫学治疗
- E. 化痰止咳

9. 下列属于神经破坏性药物的是

- A. 阿米替林
- B. 哌替啶
- C. 芬必得
- D. 阿司匹林
- E. 地西泮

10. 目前仍在探索的腹腔镜手术不包括

- A. 胃切除术
- B. Whipple 手术
- C. 门静脉转流术
- D. 门静脉断流术
- E. 解剖性肝切除术

11. 因脾虚感染疔病的中医治法是

- A. 清热利湿解毒
- B. 托毒生肌
- C. 补益气血
- D. 祛风清热
- E. 健脾和胃，清化湿热

12. 下列哪项不属于脑挫裂伤的诊断要点

- A. 脑脊液呈血性改变
- B. 伤后昏迷在半小时以内
- C. CT 检查显示脑挫伤区有点片状高密度或高低混杂密度影像
- D. 头部外伤史
- E. 出现局灶症状与体征

13. 下列哪项不是肿瘤的转移途径

- A. 血道转移
- B. 远位转移
- C. 接种转移
- D. 淋巴道转移
- E. 直接蔓延

14. 恶性程度最高的甲状腺癌是

- A. 鳞状上皮癌
- B. 滤泡状腺癌
- C. 髓样癌
- D. 未分化癌
- E. 乳头状腺癌

15. 肺癌的病理分类错误的是

- A. 腺癌
- B. 鳞癌
- C. 髓样癌
- D. 细支气管肺泡细胞癌
- E. 未分化癌

16. 单发的乳腺肿块，且无疼痛，腋窝淋巴结不大，无周期性改变，可诊断为

- A. 乳腺导管扩张症
- B. 乳腺癌
- C. 乳腺纤维腺瘤
- D. 积乳囊肿
- E. 急性乳腺炎

17. 下列哪项不属于急性穿孔的诊断要点

- A. 有溃疡病史，且近期有溃疡病活动症状
- B. 突然发生的持续性上腹部剧烈疼痛，迅速发展到全腹
- C. 检查时有明显的腹膜刺激征，并多有肝浊音界缩小或消失
- D. X线检查发现膈下有游离气体
- E. 墨菲氏征阳性

18. 我国原发性肝癌最常见的病因是

- A. 长期饮酒
- B. 肝炎
- C. 肝硬化

- D. 肝血管瘤
- E. 肝吸虫

19. 下列关于女性骨盆的叙述，错误的是

- A. 骨盆入口呈横椭圆形
- B. 入口横径长于前后径
- C. 耻骨弓较宽
- D. 坐骨棘间径小于 10cm
- E. 骶骨切迹呈圆形

20. 子宫内膜从增殖期变成分泌期，其最直接的原因是

- A. 促性腺激素释放激素的作用
- B. 促性腺激素的作用
- C. 雌激素的作用
- D. 孕激素的作用
- E. HCG 的作用

21. 女子婚后同居 1 年，未避孕而从未受孕，应诊断为

- A. 断绪
- B. 断产
- C. 五不女
- D. 全不产
- E. 暗产

22. 下列各项，属产褥感染的是

- A. 产褥期所发生的感染
- B. 分娩后生殖道的感染
- C. 分娩及产褥期生殖道感染
- D. 分娩后体温升高，达到或超过 38℃
- E. 产后所发生的一切感染

23. 羊水进入母体循环最常见的途径是

- A. 子宫颈管黏膜的静脉
- B. 子宫体部内膜的静脉
- C. 不正常开放的子宫血管
- D. 胎盘附着处的血窦
- E. 剖宫产子宫切口处开放的血管

24. 妇科疾病的发生，主要涉及的脏腑是

- A. 肾、肝、脾
- B. 脾、肺、肾
- C. 心、肺、肾
- D. 心、肝、肾
- E. 肺、脾、心

25. 下列各项，属确诊宫颈癌最可靠的方法是

- A. 宫颈刮片细胞学检查
- B. 阴道镜检查
- C. 宫颈锥切术
- D. 宫颈活组织检查
- E. 碘试验检查

26. 下列关于女性生殖系统炎症的叙述，错误的是

- A. 滴虫阴道炎患者其性配偶也应检查
- B. 生殖器炎症常为需氧菌及厌氧菌混合感染
- C. 衣原体支原体所致生殖器炎症属性传播疾病
- D. 滴虫阴道炎治疗一疗程后复查阴性即为治愈
- E. 外阴阴道念珠菌病久治不愈，应查血糖

27. 下列各项，不属妊娠剧吐临床表现的是

- A. 择食、食欲不振
- B. 恶心呕吐频繁
- C. 呕吐物中有胆汁或咖啡渣样物
- D. 脉搏增快
- E. 体温升高

28. 下列关于胎动次数的叙述，属胎儿窘迫的是

- A. 胎动 < 10 次/12 小时
- B. 胎动 < 15 次/12 小时
- C. 胎动 < 20 次/12 小时
- D. 胎动 < 25 次/12 小时
- E. 胎动 < 30 次/12 小时

29. 下列各项，不属热伤冲任所致病证的是

- A. 月经先期
- B. 月经过多
- C. 月经过少
- D. 崩漏
- E. 经行吐衄

30. 正常的胎位是

- A. 枕前位
- B. 枕后位
- C. 枕横位
- D. 前不均倾位
- E. 臀位

31. 可疑黄体功能不全，应选择诊刮的时间是

- A. 经前期或月经来潮 6 小时内
- B. 月经来潮后 12 小时
- C. 月经来潮后 24 小时
- D. 行经第 2 天
- E. 行经第 5 天

32. 下列关于新产后和哺乳期的生理特点的叙述，错误的是

- A. 有恶露的排出，1 月左右干净
- B. 体温在产后 24 小时内略升高
- C. 产褥早期，产妇血液处于高凝状态
- D. 12 小时可开始哺乳
- E. 生理性闭经

33. 正常分娩时最主要的产力是

- A. 子宫收缩力
- B. 肛提肌收缩力
- C. 腹肌收缩力
- D. 膈肌收缩力
- E. 骨骼肌收缩力

34. 下列各项，不属妇科外治法的是

- A. 外阴熏洗
- B. 阴道纳药
- C. 肛门导入
- D. 体育气功
- E. 贴敷法

35. 下列各项，不属子宫内膜异位症好

发部位的是

- A. 卵巢
- B. 子宫颈
- C. 子宫骶骨韧带
- D. 子宫后壁
- E. 子宫直肠窝

36. 下列各项, 不属引起子宫脱垂原因的是

- A. 第二产程延长
- B. 产后过早过重劳动
- C. 慢性咳嗽
- D. 便秘
- E. 剖宫产

37. 小儿开始更换恒牙的年龄是

- A. 2~3 岁
- B. 4~5 岁
- C. 6~7 岁
- D. 8~9 岁
- E. 10 岁以后

38. 卫气营血辨证与三焦辨证常用于治疗的疾病是

- A. 心理性疾病
- B. 急性传染病
- C. 营养性疾病
- D. 结缔组织病
- E. 肠寄生虫病

39. 符合幼儿期特点的是

- A. 体格发育最快
- B. 识别危险的能力强
- C. 语言思维和交往能力增强
- D. 不易发生营养缺乏和消化紊乱
- E. 自身免疫力增强, 传染病发生率低

40. 2 岁小儿的头围大约是

- A. 42cm
- B. 46cm
- C. 48cm
- D. 50cm
- E. 54cm

41. 下列属于早产儿生理性黄疸特点的是

- A. 生后 5~6 天出现, 30~35 天完全消退
- B. 生后 1~2 天出现, 3~7 天完全消退
- C. 生后 3~4 天出现, 15~20 天完全消退
- D. 生后 3~4 天出现, 21~28 天完全消退
- E. 生后 2~3 天出现, 10~14 天完全消退

42. 下列各项, 不属肺炎合并心力衰竭诊断要点的是

- A. 心率突然超过 180 次/分
- B. 呼吸突然加快, 超过 60 次/分
- C. 突然极度烦躁不安, 发绀
- D. 心音低钝, 颈静脉怒张
- E. 左肋缘下可扪及脾脏

43. 肺炎喘嗽痰热闭肺证的治则是

- A. 清热涤痰、开肺定喘
- B. 辛凉开肺、清热化痰
- C. 清心开肺、化痰止咳
- D. 清热解毒、泻肺开闭
- E. 宣肺化痰、止咳平喘

44. 小儿肺炎喘嗽的中医病机是

- A. 肺气失宣
- B. 肺失肃降
- C. 肺气闭郁
- D. 邪客肺卫
- E. 外邪触动伏痰

45. 9 岁患儿, 男, 哮喘病史三年余, 现症见咳嗽痰多, 食少脘痞, 面色欠华, 大便不实, 肌肉痿弱, 倦怠乏力, 舌淡苔白, 脉缓无力。治疗首选方剂是

- A. 补中益气汤
- B. 六君子汤
- C. 健脾丸
- D. 理中汤
- E. 参苓白术散

46. 下列各项，不属病毒性心肌炎诊断指标的是

- A. 心脏同位素扫描发现心室扩大
- B. 有心脏扩大、心包炎表现之一
- C. 多汗、心悸、胸闷
- D. 奔马律或心包摩擦音
- E. 急慢性心功能不全或心脑血管综合征

47. 治疗充血性心力衰竭心阳虚弱证的首选方剂是

- A. 真武汤合苓桂术甘汤
- B. 桂枝甘草龙骨牡蛎汤
- C. 五皮饮
- D. 五苓散
- E. 参苓白术散

48. 鹅口疮的病原体是

- A. 白色念珠菌
- B. 柯萨奇病毒
- C. 葡萄球菌
- D. 链球菌
- E. 流感杆菌

49. 急性肾小球肾炎的病位是

- A. 心肝肾
- B. 肺脾肾
- C. 心肺肾
- D. 脾肾膀胱
- E. 心脾肝

50. 中医认为病毒性脑炎的病情演变总不离热、痰、风的相互转化，其始动因素是

- A. 风
- B. 痰
- C. 热
- D. 瘀
- E. 寒

51. 癫痫持续状态的首选药物是

- A. 水合氯醛
- B. 甘露醇
- C. 苯巴比妥钠

- D. 苯妥英钠
- E. 地西洋

52. 抽动障碍阴虚风动证治疗应的首选方剂是

- A. 当归龙荟丸
- B. 青蒿鳖甲汤
- C. 生脉饮
- D. 大定风珠
- E. 温胆汤

53. 注意力缺陷多动障碍的治疗原则是

- A. 调和阴阳
- B. 补益心脾
- C. 滋肾平肝
- D. 补益心脾
- E. 清心化痰

54. 小儿缺铁性贫血的治疗原则是

- A. 健脾益气，滋生化源
- B. 健运脾胃，益气养血
- C. 补血养心，益气生血
- D. 滋养肝肾，益精生血
- E. 培补脾肾，化生气血

二、A₂型选择题（55 ~ 114 题）

答题说明：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。

55. 患者，女性，28 岁，手术后出现表情淡漠，嗜睡，烦躁，腹胀，心跳加快，心电图早期 T 波低平、双相倒置，继之 S-T 段下降、Q-T 间期延长和 U 波

- 出现，属
- A. 轻度缺水
 - B. 中度缺水
 - C. 重度缺水
 - D. 低钾血症
 - E. 高钾血症

56. 患者，男，45岁。烧伤后见精神恍惚，语声低微，口唇紫绀，四肢厥冷，舌暗紫，有瘀点，脉细数。除相关西医治疗外，首选的中医治疗方药是

- A. 清营汤加减
- B. 人参养营汤加减
- C. 四味回阳饮加减
- D. 保元汤合固阳汤加减
- E. 独参汤合四逆汤加减

57. 患者，男性，35岁，出现局部隆起，红肿热痛明显，压之剧痛，有波动感，应首先考虑的诊断是

- A. 丹毒
- B. 蜂窝织炎
- C. 脓肿
- D. 疔
- E. 痈

58. 患者，男，60岁，鼻唇沟毛囊处出现红肿热痛小结节，逐渐肿大隆起3天，近两天中央部坏死，出现脓栓，红肿热痛加重。处理不当容易引起

- A. 面部蜂窝织炎
- B. 化脓性海绵状静脉窦炎
- C. 脑脓肿
- D. 化脓性脑膜炎
- E. 败血症

59. 患者，男，55岁，因砖头砸伤右侧头顶部，后出现昏迷，CT检查示：右侧脑顶叶内高密度影。应首先考虑的诊断是

- A. 脑内血肿
- B. 硬膜外血肿
- C. 硬膜下血肿
- D. 蛛网膜下腔出血
- E. 脑干出血

60. 患者，男，汽油烧伤前臂，表皮剥脱，散在水疱，疱皮下创面微湿，红白相间，痛觉迟钝。烧伤深度为

- A. I°
- B. 浅II°

- C. 深II°
- D. III°
- E. IV°

61. 患者，男，50岁。夜间右足背蛇咬伤8小时，蛇种类不清，局部疼痛不剧烈，逐渐出现头昏、胸闷、恶心、四肢乏力、眼睑下垂、语言不利等。最可能所咬的蛇毒种类为

- A. 火毒
- B. 风毒
- C. 风火毒
- D. 热毒
- E. 湿毒

62. 患者，男，5岁，右臂沿神经干走向出现多个肿块，质软，同时皮肤出现大小不等的咖啡色斑块。应首先考虑的诊断是

- A. 皮脂腺囊肿
- B. 神经纤维瘤病
- C. 皮样囊肿
- D. 脂肪瘤
- E. 淋巴管瘤

63. 患者，女，23岁，发现颈前区单一肿块3个月，随吞咽上下活动，边界清楚，应首先考虑的诊断是

- A. 甲状腺瘤
- B. 结节性甲状腺肿
- C. 甲状腺肿
- D. 甲状腺癌
- E. 甲亢

64. 患者，女，42岁，颈部弥漫性肿大，伴四肢困乏，气短，纳呆体瘦；舌苔薄，脉弱无力。治疗应首选的方剂是

- A. 仙方活命饮
- B. 海藻玉壶汤
- C. 四海舒郁丸
- D. 柴胡疏肝散
- E. 龙胆泻肝汤

65. 1. 患者，男，70岁。吸烟史40年，

咳痰带血 1 个月，伴消瘦，无明显发热，应首先考虑的诊断为

- A. 肺癌
- B. 肺炎
- C. 支气管扩张症
- D. 肺结核
- E. 肺纤维瘤

66. 患者，女性，26 岁，产后 1 个月双乳出现红肿热痛，可触及包块，应首先考虑的诊断为

- A. 积乳囊肿
- B. 乳腺癌
- C. 乳腺纤维腺瘤
- D. 乳腺增生症
- E. 急性乳腺炎

67. 患者，女，30 岁，双乳内多发肿块，为确定肿块为实性或囊性，最好的检查方法是

- A. 钼靶 X 线摄片
- B. CT
- C. B 超
- D. 近红外线透照检查
- E. 热图像检查

68. 患者，男，35 岁，消化性溃疡反复发作 10 年，突然剧烈腹痛 3 小时，全腹压痛、反跳痛、肌紧张，X 线检查可见膈下游离气体，应首先考虑的诊断为

- A. 胃、十二指肠溃疡急性穿孔
- B. 急性腹膜炎
- C. 急性胰腺炎
- D. 急性肠梗阻
- E. 急性胆囊炎

69. 患者，男，56 岁，患肝病反复发作 20 余年，近日出现乏力、嗜睡、厌食、脾肿大、脾功能亢进、腹水，应首先考虑的诊断为

- A. 急性肝炎
- B. 肝硬化
- C. 黑热病

- D. 门脉高压症
- E. 肝性脑病

70. 转移性右下腹痛 6 小时，持续性、进行性加剧，右下腹局限性压痛、拒按，伴纳差，发热（38.5℃），苔白腻，脉弦紧。其中医治法是

- A. 行气活血，通腑泄热
- B. 通腑泄热，利湿解毒
- C. 通腑排毒，养阴清热
- D. 通里攻下，清热化瘀
- E. 温中散寒，通里攻下

71. 右上腹痛牵涉右肩背，突发畏寒高热，巩膜皮肤黄染，应首先考虑的诊断为

- A. 急性胆囊炎
- B. 急性胰腺炎
- C. 黄疸型肝炎
- D. 壶腹部周围肿瘤
- E. 急性化脓性梗阻性胆管炎

72. 患者，男性，60 岁，腹股沟部出现可复性肿物 1 个月，可降入阴囊，应首先考虑的诊断为

- A. 腹股沟直疝
- B. 腹股沟斜疝
- C. 股疝
- D. 难复性疝
- E. 嵌顿疝

73. 患者，男，5 岁，便血，排便时可见单个、鲜红色樱桃样肿物脱出，便后可自行回纳。应首先考虑的是

- A. 肛管直肠周围脓肿
- B. 肛瘘
- C. 内痔
- D. 直肠息肉
- E. 血栓性外痔

74. 患者，男，20 岁，阴囊结块，肿硬而冷，牵引睾丸疼痛，喜暖畏寒；苔白腻，脉弦紧。治疗应首选的方剂是

- A. 天台乌药散

- B. 右归丸
- C. 补中益气汤
- D. 香连化滞丸
- E. 附子理中汤

75. 产妇临产 8 小时，肛诊检查头先露，宫口已开全，先露+4，此时产力的组成是

- A. 子宫收缩力
- B. 子宫收缩力+腹肌收缩力
- C. 子宫收缩力+膈肌收缩力
- D. 子宫收缩力+腹肌收缩力+膈肌收缩力
- E. 子宫收缩力+腹肌收缩力+膈肌收缩力+肛提肌收缩力

76. 初产妇，24 岁。从分娩后第 3 天体温在 38.5℃ 左右，子宫收缩好，无压痛，会阴伤口无肿胀及压痛，恶露淡红色，无臭味，双乳肿胀且硬。首先应考虑的诊断是

- A. 会阴伤口感染
- B. 乳腺炎
- C. 产褥感染
- D. 上呼吸道感染
- E. 泌乳热

77. 患者，女，26 岁，已婚。孕 48 天，阴道不规则出血 5 天，突感一侧下腹撕裂样剧痛，拒按。首先应考虑的诊断是

- A. 胎动不安
- B. 胞阻
- C. 异位妊娠破裂
- D. 堕胎
- E. 小产

78. 患者，女，30 岁。妊娠 47 天，恶心呕吐，多为食物，呕不能食，或食入即吐，脘腹胀满，不思饮食，头晕乏力，倦怠思睡，舌淡，苔白，脉缓滑无力。治疗应首选的方剂是

- A. 加味温胆汤
- B. 香砂六君子汤

- C. 小半夏加茯苓汤
- D. 干姜人参半夏丸
- E. 苏叶黄连汤

79. 患者，女，24 岁，G₁P₁ 现孕 36 周，“先兆子痫”入院。入院后 2 天，经治疗血压持续在 165/120mmHg，感视物模糊，现自数胎动减少，做 NST 为无反应型，再做 B 型超声生物物理评分为 4 分。应首选的治疗措施是

- A. 立即终止妊娠
- B. 继续治疗妊娠高血压病至妊娠 37 周
- C. 次日复查 NST
- D. 吸氧观察
- E. 做 OCT

80. 患者，女，33 岁。孕 2 个月，家务劳动后感心悸，气短，胸闷。心率 119 次/分，呼吸 22 次/分，心尖区有三级收缩期杂音，肺底部有湿啰音，下肢水肿（+）。应首选的治疗措施是

- A. 饮食中限制食盐的摄入
- B. 加强整个孕期监护
- C. 心衰控制后行人工流产
- D. 立即入院终止妊娠
- E. 心衰控制后，继续妊娠

81. 初孕妇，29 岁。足月妊娠，上午 8 时始阵发宫缩，10 时胎膜破裂，下午 16 时肛门检查：宫口已开全，胎头先露，胎位 LOA，胎头颅骨最低点在坐骨棘水平以下 3cm，胎心率 100 次/分，羊水呈草绿色，黏稠。首先应考虑的诊断是

- A. 滞产
- B. 宫缩乏力
- C. 胎儿窘迫
- D. 胎膜早破
- E. 可疑头盆不称

82. 患者，女，25 岁。产后恶露过期不止，量较多，色红质稠，大便干燥，舌红，脉滑数。其中医证型是

- A. 血瘀型
- B. 气虚型
- C. 阴虚型
- D. 血热型
- E. 湿热型

83. 患者，女，34岁。自然分娩，产后第3天午后体温37.8℃，大小便正常。检查：子宫底脐下3指，无压痛，乳房胀硬。首先应考虑的诊断是

- A. 产褥热
- B. 流行性感
- C. 伤口感染
- D. 泌尿系感染
- E. 乳汁淤积

84. 患者，女，48岁。外阴瘙痒逐渐加重3年，抓破后伴有局部疼痛。查见大阴唇、阴唇间沟等处皮肤有抓痕，黏膜变白，皮肤变薄、干燥、失去弹性。首先应考虑的诊断是

- A. 外阴增生型营养不良
- B. 外阴硬化性苔藓
- C. 外阴白癜风
- D. 外阴银屑病
- E. 外阴湿疹

85. 患者，女，31岁。月经周期不规则，周期、经期延长，量偏多，婚后4年不孕，双合诊检查子宫后倾后屈，基础体温呈单相。首先应考虑的诊断是

- A. 子宫位置异常
- B. 黄体萎缩不全
- C. 无排卵性异常子宫出血
- D. 黄体发育不全
- E. 子宫内膜修复延长

86. 患者，女，20岁。近半年来出现月经提前，甚则半月一行，经量时多时少，色紫红，夹有瘀块，伴胸闷肋胀，烦躁易怒，口苦咽干，舌红，苔薄，脉弦数。其中医证型是

- A. 阳盛血热型
- B. 气虚型

- C. 虚热型
- D. 血瘀型
- E. 肝郁血热型

87. 患者，女，34岁，已婚。近3年月经量少，渐至停闭，五心烦热，两颧潮红，骨蒸劳热，舌红，少苔，脉细数。治疗应首选的方剂是

- A. 保阴煎
- B. 加减一阴煎
- C. 两地汤
- D. 人参养营汤
- E. 左归丸

88. 患者，女，50岁。因阴道不规则流血诊断为宫颈癌IIa期，其病变应累及的范围是

- A. 宫颈、阴道上1/3处，无明显宫旁浸润
- B. 宫颈、阴道上1/3处及宫旁浸润
- C. 宫颈、阴道上2/3范围内，无明显宫旁浸润
- D. 宫颈、宫旁浸润，但未达盆壁
- E. 宫颈、阴道下1/3浸润但无宫旁浸润

89. 患者，女，48岁。月经周期正常，月经量多5年，子宫如孕2个半月大小，表面不平，宫体左侧可扪及直径约为5cm大小包块，质硬，与子宫体分不开，无压痛。首先应考虑的诊断是

- A. 多发性子宫肌瘤
- B. 卵巢实质性肿瘤
- C. 子宫腺肌瘤
- D. 盆腔炎性包块
- E. 子宫内膜异位囊肿

90. 患者，女，24岁，已婚。停经35日，阴道流血1日，血HCG>100kU/L。首先应考虑的诊断是

- A. 早期妊娠
- B. 多胎妊娠
- C. 先兆流产

- D. 异位妊娠
- E. 葡萄胎

91. 患者，女，29岁。诊断为绒癌。应首选的治疗措施是

- A. 化疗术治疗
- B. 放疗
- C. 手术治疗
- D. 先化疗后手术
- E. 先手术后化疗

92. 患者，女，31岁。近2年经期或经后腹痛，喜温喜按，月经色淡、质稀，神疲乏力，舌淡暗，苔薄白，脉细无力，诊断为子宫内膜异位症。治疗应首选的方剂是

- A. 少腹逐瘀汤
- B. 膈下逐瘀汤
- C. 血府逐瘀汤
- D. 桃红四物汤
- E. 理冲汤

93. 患者，女，29岁。近4年经行后腹痛，痛引腰骶，月经量少，色淡暗、质稀，头晕耳鸣，舌有瘀点，苔薄白，脉沉细涩，腹腔镜检查为子宫内膜异位症。治疗应首选的方剂是

- A. 五子衍宗丸合失笑散
- B. 归肾丸合桃红四物汤
- C. 右归丸合失笑散
- D. 六味地黄丸合桃红四物汤
- E. 肾气丸合桃红四物汤

94. 患者，女，62岁。外阴脱出肿物1年。妇科检查：部分宫体脱出阴道。

首先应考虑的诊断和治疗是

- A. 子宫Ⅱ度脱垂轻——手术
- B. 子宫Ⅱ度脱垂重——手术
- C. 子宫Ⅲ度脱垂——手术
- D. 子宫Ⅰ度脱垂轻——子宫托
- E. 子宫Ⅰ度脱垂重——子宫托

95. 患儿，6个月。每闻声响则啼哭不安。其病位是

- A. 肝
- B. 脾
- C. 心
- D. 肺
- E. 肾

96. 患儿，出生7天。面目皮肤发黄，色泽晦暗精神差，吮乳少，四肢欠温，腹胀便溏，舌淡苔白腻，指纹色淡。其诊断是

- A. 新生儿黄疸，瘀积发黄证
- B. 新生儿黄疸，湿热熏蒸证
- C. 新生儿，生理性黄疸
- D. 新生儿寒冷损伤综合征
- E. 新生儿黄疸，寒湿阻滞证

97. 大便色白，肝大明显，结合胆红素增高为主，见于

- A. 生理性黄疸
- B. 母乳性黄疸
- C. 病理性黄疸
- D. 新生儿败血症
- E. 胆道闭锁

98. 患儿，4岁。发热咽痛，咽部充血，软腭上有2~4mm大小的疱疹，疱疹周围有红晕。心肺听诊正常。其可能的诊断是

- A. 咽结合膜
- B. 疱疹性咽峡炎
- C. 急性化脓性扁桃体炎
- D. 支气管炎
- E. 支气管肺炎

99. 患儿，2岁。患肺炎喘嗽反复不愈2周余，低热起伏，咳嗽无力，多汗、四肢欠温，面色白，纳呆便溏，舌质偏淡，舌苔白滑，指纹淡红而滞，在风关，治疗应首选的方剂是

- A. 桂枝汤
- B. 人参五味子汤
- C. 四君子汤
- D. 补中益气汤
- E. 泻白散

100. 患儿, 18 个月。腹泻时轻时重, 已经 3 个月, 大便清稀无臭, 夹不消化食物, 有时便后脱肛, 形寒肢冷, 面色㿔白, 精神萎靡, 睡时露睛, 舌淡苔白, 指纹色淡。治疗应首选的方剂是

- A. 附子理中汤合四神丸
- B. 保和丸合二陈汤
- C. 金匱肾气丸合人参乌梅汤
- D. 参苓白术散合理中丸
- E. 异功散合平胃散

101. 患儿, 6 个月。母乳喂养, 腹泻已两个半月, 大便每日 6~7 次, 便中含有奶瓣, 曾服用妈咪爱无效。查体: 神志清, 体重 6.3kg, 化验: 大便偶见脂肪滴。应首先考虑的诊断是

- A. 生理性腹泻
- B. 大肠杆菌性肠炎
- C. 霉菌性肠炎
- D. 病毒性
- E. 过敏性肠炎

102. 患儿, 3 岁。反复浮肿 2 月余。尿蛋白(+++), 镜检(-), 尿蛋白定量 >10mg/

(kg·d), 血清白蛋白 25g/L, 胆固醇 10.4mmol/L (40mg/dL), 血压正常。尿素氮正常。首先考虑的诊断是

- A. 急性肾炎
- B. 肾病综合征
- C. 尿路感染
- D. 肾盂肾炎
- E. 急进性肾炎

103. 患儿, 2 岁。起病急骤, 皮肤出现瘀斑瘀点, 色红鲜明, 伴有齿衄鼻衄, 偶见尿血, 面红目赤, 心烦口渴, 便秘尿少, 舌红, 苔黄, 脉数。其首选方剂是

- A. 参苓白术散
- B. 桃仁汤
- C. 犀角地黄汤

- D. 大补阴丸合茜根散
- E. 归脾汤

104. 患儿, 2 岁。发热 7 天, 壮热, 体温 40℃, 昼轻夜重, 唇干赤裂, 烦躁不宁, 肌肤斑疹鲜红, 手足肿胀潮红, 杨梅舌, 指纹紫。诊断为皮肤黏膜淋巴结综合征, 其病机是

- A. 邪在肺胃
- B. 卫气同病
- C. 气营两燔
- D. 邪在太阳
- E. 邪在少阴

105. 患儿, 2 个月。足月顺产, 母乳喂养, 诊断佝偻病激期, 为治疗服用维生素 D, 每日补充的合理剂量是

- A. 200IU
- B. 400IU
- C. 2000IU
- D. 4000IU
- E. 1000IU

106. 患儿, 3 岁。低热恶寒, 鼻塞流涕, 全身皮肤成批出疹, 为红色斑疹和斑丘疹, 继有疱疹, 疱浆清亮, 头面、躯干多见, 舌红, 苔薄白, 脉浮数。其诊断是

- A. 猩红热, 邪侵肺胃证
- B. 麻疹, 见形期
- C. 水痘, 邪郁肺卫证
- D. 风疹, 邪郁肺卫证
- E. 幼儿急疹, 肺卫蕴热证

107. 患儿, 2 岁。生后至今不会站立与行走, 头项歪斜。其病变脏腑主要是

- A. 心肝
- B. 心肾
- C. 肺脾
- D. 心肺
- E. 脾肾

108. 新生儿, 15 天。生后母乳喂养。每次哺乳后易溢乳, 应采取的措施是

- A. 哺乳后轻拍其背
- B. 两次喂哺时间相隔 3 小时
- C. 每次哺乳时间 1 小时
- D. 减少每次哺乳量
- E. 定时喂哺，每日 6~8 次

109. 患儿，1 岁。轻咳流涕，伴有喷嚏，心肺正常，指纹淡紫于风关。其病情判断是

- A 邪浅病轻
- B 病情较重
- C 邪入气营
- D 病情凶险
- E 病邪入里

110. 患儿，5 岁。舌苔花剥，状如地图，经久不愈。其病机是

- A. 脾之气阳不足
- B. 肺之气阴亏虚
- C. 乳食积滞不化
- D. 胃之气阴不足
- E. 脾之运化失健

111. 患儿，8 岁。上课注意力不集中，多动难静，急躁易怒，任性冲动，五心烦热，记忆力欠佳。舌质红，脉细弦。治疗应首选的方剂是

- A. 归脾汤
- B. 甘麦大枣汤
- C. 黄连温胆汤
- D. 杞菊地黄丸
- E. 参苓白术散

112. 6 个月男婴，呕吐腹泻 3 天，无尿 12 小时，体温 37.8℃，嗜睡与烦躁交替，双眼凹陷，口唇樱红干燥，皮肤弹性差，四肢冷，脉细弱，呼吸 60 次/分，心率 160 次/分，心音低钝，腹胀，肠鸣音减少，血象：HGB150g/L，WBC $13 \times 10^9/L$ ，NO.40，LO.60。初步诊断婴儿腹泻伴

- A. 重度脱水、代谢性酸中毒
- B. 中度低渗性脱水、代谢性酸中毒
- C. 重度脱水、低钾血症、代谢性酸中

毒

- D. 败血症、脓毒性休克、代谢性酸中毒
- E. 重度高渗性脱水、代谢性酸中毒

113. 患儿，18 个月。腹泻时轻时重，已经 3 个月，大便清稀无臭，夹不消化食物，有时便后脱肛，形寒肢冷，面色晄白，精神萎靡，睡时露睛，舌淡苔白，指纹色淡。治疗应首选的方剂是

- A. 附子理中汤合四神丸
- B. 保和丸合二陈汤
- C. 金匮肾气丸合人参乌梅汤
- D. 参苓白术散合理中丸
- E. 异功散合平胃散

114. 患儿，3 岁。反复浮肿 2 月余。尿蛋白(+++)，镜检(-)，尿蛋白定量 $>10\text{mg}/(\text{kg} \cdot \text{d})$ ，血清白蛋白 25g/L，胆固醇 10.4mmol/L (40mg/dL)，血压正常。尿素氮正常。首先考虑的诊断是

- A. 急性肾炎
- B. 单纯性肾病综合征
- C. 尿路感染
- D. 肾盂肾炎
- E. 急进性肾炎

三、A₃ 型选择题 (115 ~ 132 题)

答题说明：以下提供若干个案例，每个案例下设 3 道考题。请根据题干所提供的信息，在每一道考题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案。

(115~118 题共用题干)

患者，男，28 岁。2 天前被木刺刺伤手指，未进行消毒处理。现症见：指端剧烈跳痛，触之痛甚，畏寒、发热、头痛，体温 38.7℃，食欲不振，疼痛造成夜眠不安，舌红，苔黄，脉数。

115. 其诊断是

- A. 手部淋巴结炎

- B. 脓性指头炎
- C. 化脓性腱鞘炎
- D. 化脓性滑囊炎
- E. 脓毒症

116. 其证型是

- A. 风毒在表证
- B. 火毒结聚证
- C. 热盛肉腐证
- D. 风毒入里证
- E. 阴虚邪留证

117. 其治疗是

- A. 驱风镇痉
- B. 祛风镇痉，清热解毒
- C. 益胃养阴，疏风通络
- D. 补养气血，托毒透邪
- E. 清热解毒，透脓止痛

118. 治疗应首选

- A. 玉真散合五虎追风散加减
- B. 五味消毒饮加减
- C. 清营汤加减
- D. 托里消毒散加减
- E. 附子理中汤加减

(119~122 题共用题干)

患者，男，62岁。症见脘腹胀满，胁痛肢楚，神疲乏力，纳呆便溏，四肢肿胀，既往乙肝病史13年，CT可见肝区肿块，舌淡胖，苔白腻，脉弦滑。

119. 其诊断是

- A. 肝硬化
- B. 肝炎
- C. 肝癌
- D. 胃癌
- E. 胃溃疡

120. 其证型是

- A. 气滞血瘀证
- B. 肝胆湿热证
- C. 肝肾阴虚证
- D. 脾虚湿困证
- E. 阴阳两虚证

121. 其治疗是

- A. 疏肝理气，活血化瘀
- B. 益气健脾，化湿祛痰
- C. 清利湿热，活血化痰

D. 养阴散结，凉血解毒

E. 滋阴助阳

122. 治疗应首选

- A. 小柴胡汤
- B. 茵陈蒿汤合鳖甲煎丸加减
- C. 青蒿鳖甲汤合一贯煎加减
- D. 四君子汤合逍遥散加减
- E. 八珍汤

(123~126 题共用题干)

患者，女，32岁。已婚5年，未避孕，未怀孕。患者平素月经量少，35~40天一行，带下量多，头晕头重，时有胸闷泛恶，四肢倦怠，体胖，体毛多，舌体胖大、色淡，苔白腻，脉滑。

123. 其诊断是

- A. 异常子宫出血
- B. 闭经
- C. 多囊卵巢综合征
- D. 子宫内膜异位症
- E. 子宫腺肌病

124. 其证型是

- A. 肾阴虚证
- B. 肾阳虚证
- C. 肝经湿热证
- D. 痰湿阻滞证
- E. 气滞血瘀证

125. 其治法是

- A. 燥湿除痰，活血调经
- B. 滋阴补肾，调补冲任
- C. 温肾助阳，调补冲任
- D. 清肝解郁，除湿调经
- E. 行气活血，祛瘀通经

126. 治疗应首选

- A. 左归丸
- B. 右归丸
- C. 龙胆泻肝汤
- D. 膈下逐瘀汤
- E. 苍附导痰丸合佛手散

(127~129 题共用题干)

患儿，男，4岁。大便秘结，脘腹胀痛，不思饮食，手足心热，小便黄，恶心呕吐，舌质红，苔黄厚，脉沉有力。

127. 其诊断是
A. 乳食积滞便秘
B. 燥热内结便秘
C. 气机郁滞便秘
D. 气虚不运便秘
E. 血虚肠燥便秘

128. 其治法是

- A. 消积导滞，清热和中
B. 清腑泄热，润肠通便
C. 疏肝理气，导滞通便
D. 健脾益气，润肠通便
E. 滋阴养血，润肠通便

129. 治疗应首选

- A. 麻子仁丸加减
B. 六磨汤加减
C. 黄芪汤加减
D. 润肠丸加减
E. 保和丸加减

(130~132 题共用题干)

患儿，3岁，体重13kg。近1个月来食欲不振，面色少华，倦怠乏力，大便偏稀，夹有不消化食物，舌质淡，苔薄白。

130. 首先考虑的诊断是

- A. 厌食
B. 积滞
C. 疳气
D. 营养性缺铁性贫血

E. 小儿腹泻

131. 证型为

- A. 乳食内积
B. 脾胃气虚
C. 脾失健运
D. 脾胃阴虚
E. 脾虚夹积

132. 治疗首选

- A. 养胃增液汤
B. 不换金正气散
C. 异功散
D. 保和丸

E. 健脾丸

四、B₁型选择题(133~150题)

答题说明：以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案，请从中选择一个与问题最密切的答案。某一个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(133~134题共用备选答案)

- A. 浓缩红细胞
B. 冷沉淀
C. 白蛋白液
D. 免疫球蛋白
E. 血小板

133. 用于治疗儿童慢性贫血的是

134. 用于抗生素不能控制感染的是

(135~136题共用备选答案)

- A. 10%
B. 20%
C. 30%~50%
D. 20%~40%
E. 20%~50%

135. 轻度休克估计失血量占全身血容量的

136. 中度休克估计失血量占全身血容量的

(137~138题共用备选答案)

- A. 桃仁四物汤合犀角地黄汤加减
B. 启膈散合逍遥散加减
C. 五汁安中饮加味
D. 二陈汤合旋覆代赭汤加减
E. 大补元煎加减

137. 食管癌痰气交阻证治疗首选

138. 食管癌痰湿内蕴证治疗首选

(139~140题共用备选答案)

- A. 卵巢固有韧带
B. 主韧带
C. 骶韧带
D. 骨盆漏斗韧带

E. 圆韧带

139. 从输卵管伞端下方向外延伸达骨盆壁的韧带是

140. 起于子宫双角前面，止于大阴唇前端的韧带是

(141~142 题共用备选答案)

- A. 衔接
- B. 下降
- C. 俯屈
- D. 内旋转
- E. 仰伸

141. 胎头双顶径进入骨盆入口平面，胎头颅骨最低点接近或达到坐骨棘水平称为

142. 胎头沿骨盆轴前进的动作称为

(143~144 题共用备选答案)

- A. 肾气丸
- B. 举元煎
- C. 真武汤
- D. 六味地黄丸
- E. 内补丸

143. 滋补肾阴的代表方是

144. 补中益气的代表方是

(145~146 题共用备选答案)

- A. 42cm
- B. 46cm
- C. 48cm
- D. 50cm
- E. 54cm

145. 2 岁小儿的头围大约是

146. 5 岁小儿的头围大约是

(147~148 题共用备选答案)

5 岁时小儿的头围大约是 50cm。第一年的前 3 个月和后 9 个月： 都约增长 6cm。

- A. 出生后 2 周
- B. 出生后 2~3 天
- C. 出生后 6~7 天
- D. 出生后 24 小时内
- E. 出生后 4~5 天

147. 生理性胎黄，黄疸出现的时间是

148. 病理性胎黄，黄疸出现的时间是

(149~150 题共用备选答案)

- A. 驱蛔杀虫
- B. 散结下虫
- C. 安蛔定痛
- D. 调理脾胃
- E. 通腑排蛔

149. 治疗蛔厥证的主要方法是

150. 治疗肠蛔虫病的主要方法是