

2021 中医执业医师考试

模拟密押卷

2021 年
中医执业医师资格
考试专用
(答案)

(第一单元)

1. 足太阴脾经与手少阴心经的交接位置是A.

胸中

B. 肺中 C.

心中 D.

目内眦

E. 足大趾

答案: C

解析: 足手阴经在胸部交接: 足太阴脾经与手少阴心经交接于心中; 足少阴肾经与手厥阴心包经交接于胸中; 足厥阴肝经与手太阴肺经交接于肺中。

2. 五脏藏五神, 肾藏

A. 魄

B. 志

C. 魂

D. 神

E. 意

2. 答案: B

解析: 五脏藏五神, 心藏神, 肺藏魄, 肝藏魂, 脾藏意, 肾藏志。

3. 以下病机中是以阴阳失调来阐释实热或实寒的是

A. 阴阳偏盛

B. 阴阳格拒

C. 阴阳偏衰

D. 阴阳互损

E. 阴阳离决

3. 答案: A

解析: 实热证, 是指邪热亢盛、内外俱实的病证, 在阴阳失调上, 可看作阳偏盛。实寒是以寒邪盛为主, 正气不虚的病证, 可看作阴偏盛。阴阳偏盛, 是指人体阴阳双方中的某一方的病理性亢盛状态, 属邪气盛则实的实证。

4. 阴中求阳的治法适用于

A. 阳盛

B. 阴阳两虚

C. 阴虚

D. 阳虚

E. 阴盛

答案: D

解析: 对于阴阳偏衰的虚热及虚寒证的治疗, 补阳时适当佐以补阴药谓之阴中求阳, 补阴时适当佐以补阳药谓之阳中求阴。阴中求阳, 适用于阳虚, 补阳为主, 兼以补阴。

5. 木为火之

A. 所不胜

B. 相克 C.

母

D. 子

E. 所胜

答案: C

解析: 木生火, 故木为火之母。 6.

具有“五脏六腑之海”之称的是A.

督脉

B. 任脉

C. 冲脉

D. 带脉

E. 维脉

答案: C

解析: 冲脉能调节十二经脉气血, 故又称其为“十二经脉之海”或“五脏六腑之海”。

7. 以下属于奇经八脉生理功能的是

A. 加强了十二经脉中互为表里的两经之间的联系

B. 主束骨而利机关

C. 调节十二经脉的气血

D. 分主一身左右之阴阳

E. 加强了足三阴、足三阳经脉与心脏的联系

答案: C

解析: 奇经八脉具有蓄溢和调节十二经脉气血。当十二经脉气血满溢时, 就会流入奇经八脉, 蓄以备用; 当十二经脉气血不足时,

奇经中所蓄的气血则溢出给予补充，以保持十二经脉气血的相对恒定状态，有利于维持机体生理功能的需要。

8. 以下病机哪项是以阴阳失调来阐释真寒假热或真热假寒的

- A. 阴阳互损
- B. 阴阳离决
- C. 阴阳偏盛
- D. 阴阳偏衰
- E. 阴阳格拒

答案：E

解析：阴阳格拒指在阴阳偏盛至极的基础上，阴阳双方相互排斥而出现寒热真假病变的一类病机。

9. 足手阴经的交接部位是

- A. 肩胛部
- B. 头面部
- C. 胸部
- D. 背部
- E. 四肢部

答案：C

解析：足手阴经在胸部交接，如足太阴脾经与手少阴心经交接于心中；足少阴肾经与手厥阴心包经交接于胸中；足厥阴肝经与手太阴肺经交接于肺中。

10. 冲脉的基本功能是

- A. 调节阳经气血
- B. 调节阴经气血
- C. 调节十二经气血
- D. 维系全身经脉
- E. 主司下肢运动

答案：C

解析：冲脉调节十二经气血：冲脉上行于头，下至于足，后行于背，前布于胸腹，贯穿全身，通受十二经之气血，为总领诸经气血之要冲。

11. 肾在志为

- A. 怒
- B. 喜
- C. 思
- D. 悲

E. 恐

答案：E

解析：肝、心、脾、肺、肾对应的五志分别为怒、喜、思、悲、恐。

12. “将军之官，谋虑出焉”指的脏腑是

- A. 心
- B. 肺
- C. 脾
- D. 肝
- E. 肾

答案：D

解析：《素问·灵兰秘典论》说：“肝者，将军之官，谋虑出焉。胆者，中正之官，决断出焉。”

13. 外感六淫中易伤阳气的是

- A. 风邪
- B. 寒邪
- C. 暑邪
- D. 火邪
- E. 燥邪

答案：B

解析：寒为阴邪，易伤阳气；寒即阴气盛的表现，故称其为阴邪。感受寒邪，最易损伤人体阳气。

14. 五行指导脏腑用药，赤色、苦味入

- A. 心
- B. 脾
- C. 肺
- D. 肝
- E. 肾

答案：A

解析：青色、酸味入肝，赤色、苦味入心，黄色、甘味入脾，白色、辛味入肺，黑色、咸味入肾。

15. 元气生成的主要物质来源是

- A. 肾中精气
- B. 水谷精气
- C. 清气
- D. 脏腑精气
- E. 经气

答案：A

解析：元气由肾精化生，根于命门。

16. 脾主升清的确切含义是

- A. 脾以升为健
- B. 脾气散精，上归于肺
- C. 脾的阳气主升
- D. 输布津液防止水湿内生
- E. 与胃的降浊相对而言

答案：B

解析：脾主升清，是指脾气的升动转输作用，将胃肠道吸收的水谷精微和水液上输于心、肺等脏，通过心、肺的作用化生气血，以营养濡润全身。D 是指津液的输布，虽与升清有关，但主要是指肺的宣发和输布作用，E 是脾主升清与胃主降浊的相对关系。

17. “阴阳离决，精气乃绝”，反映了A.

- A. 阴阳转化
- B. 阴阳互藏
- C. 阴阳消长
- D. 阴阳互根
- E. 阴阳对立

答案：D

解析：阴阳互根，是指一切事物或现象中相互对立着的阴阳两个方面，具有相互依存，互为根本的关系。即阴和阳任何一方都不能脱离另一方而单独存在，每一方都以相对的另一方的存在作为自己存在的前提和条件。如果由于某些原因，阴和阳之间的互根关系遭到破坏，就会导致“独阴不生，独阳不生”，甚则“阴阳离决，精气乃绝”而死亡。

18. 起病隐缓，病程较长，反复发作，或缠绵难愈为湿邪哪方面致病特点

- A. 湿为阴邪，易伤阳气
- B. 湿为阴邪，湿性重浊
- C. 湿性黏滞，易阻气机
- D. 湿性趋下，易袭阴位
- E. 湿邪为患，其性重浊

答案：C

解析：湿性黏滞，易阻气机：湿邪致病，其黏腻停滞的特性主要表现在三个方面：一是症状的黏滞性。湿邪为患，易呈现分泌物和排泄物黏滞不爽的特征等。二是病程的缠绵性。因湿性黏滞，易阻气机，气不行则湿不化，胶着难解，故起病隐缓，病程较长，反

复发作，或缠绵难愈。三是易阻气机。因湿为重浊之邪，故伤人最易留滞于脏腑经络，阻遏气机，使脏腑气机升降失常，经络阻滞不畅。

19. 具有藏泄互用关系的两脏是

- A. 肝与脾
- B. 肝与肾
- C. 肺与肝
- D. 肝与心
- E. 脾与肾

答案：B

解析：藏泄互用：肝主疏泄，肾主封藏，二者之间存在着相互为用、相互制约的关系。肝气疏泄可促使肾气封藏有度，肾气闭藏可防肝气疏泄太过。疏泄与封藏，相反而相成，从而调节女子的月经来潮、排卵和男子的排精。

20. “至虚有盛候”的证候性质为

- A. 实中夹虚
- B. 虚中夹实
- C. 真虚假实
- D. 真实假虚
- E. 虚实夹杂

答案：C

解析：真虚假实：是指病机的本质为“虚”，但表现出“实”的假象。大多是因正气虚弱，脏腑经络之气不足，推动无力所致，故真虚假实证又称为“至虚有盛候”。如脾气虚弱，运化无力之食少脘腹胀满；气血亏损，血海空虚之女子经闭等。

21. 瘀血的疼痛特点叙述正确的是

- A. 多为胀痛
- B. 痛处游走不定
- C. 病在气分
- D. 夜间痛甚
- E. 遇温痛减

答案：D

解析：瘀血疼痛特点：多为刺痛，痛处固定不移，拒按，夜间痛甚。

22. 与生俱来的感知觉和运动能力概括为A.

神

- B. 魂
- C. 魄
- D. 意
- E. 志

答案: C

解析:《素问·宣明五气》所说:“心藏神,肺藏魄,肝藏魂,脾藏意,肾藏志。”魄是与生俱来的感知觉和运动能力;魂是人的意识活动;意、志是人类特有的理智、理性等精神活动。心神统率魂、魄、意、志诸神,是精神活动的主宰,故张介宾说:“心为五脏六腑之大主,而总统魂魄,兼赅意志。”

23. 与血液的运行密切相关的脏腑

- A. 心、肺、肾、脾
- B. 心、肺、肝、脾
- C. 心、肾、肝、脾
- D. 心、肺、肝、肾
- E. 肾、肺、肝、脾

答案: B

解析:心、肝、脾、肺等脏生理功能的相互协调与密切配合,共同保证了血液的正常运行。心阳的推动和温煦、肺气的宣发与肃降、肝气的疏泄是推动和促进血液运行的重要因素;心阴的宁静与凉润、脾气的统摄、肝气的藏血是控制和固摄血液运行的重要因素。

24. 与气机升降调节关系密切的两脏是A.

- 心与肺
- B. 心与肾
- C. 肺与脾
- D. 脾与肝
- E. 肺与肝

答案: E

解析:肝气从左升发,肺气由右肃降。肝气以升发为宜,肺气以肃降为顺。此为肝肺气机升降的特点所在。肝升肺降,升降协调,对全身气机的调畅,气血的调和,起着重要的调节作用。

25. 阴气不足,可见于五脏六腑,其最主要的是

- A. 心阴虚
- B. 脾阴虚

- C. 肾阴虚
- D. 胃阴虚
- E. 肝阴虚

答案: C

解析:阴气不足可见于五脏六腑,如肺阴、脾阴、胃阴、心阴、肝阴和肾阴皆可发生阴虚的病变,但一般以肾阴亏虚为主。肾阴为人身诸阴之本,所以肾阴不足在阴偏衰的病机中占有极其重要的地位。

26. 栝蒌薤白白酒汤证的病机是

- A. 胸阳不振,水饮上乘
- B. 痰涎壅盛,胸中痹阻
- C. 寒饮内停,逆而上冲
- D. 中阳不足,寒凝气滞
- E. 饮邪上乘,胸中气滞

26. 答案: A

解析:“胸痹之病……栝蒌薤白白酒汤主之。”本条论述了胸痹的证候、治法。由于心胸阳气不振,水饮邪气上乘,闭阻气道。

血脉,则见胸背痛、喘息咳唾、短气。

27. “温邪上受”中“上受”是指

- A. 温邪上犯头目
- B. 温邪从口鼻侵入
- C. 温邪直入心包
- D. 温邪郁肺卫
- E. 温邪蒙蔽上焦

27. 答案: B

解析:上受:口鼻居于人体上部,温邪从口鼻而入侵犯人体,故称“上受”。

28. 不属于温病卫分证的是

- A. 风热
- B. 风寒
- C. 湿热
- D. 暑热
- E. 燥热

28. 答案: B

解析:卫分证还有风热、湿热、暑热、燥热等感邪性质之分。

29. 治疗湿温初起,三大禁忌包括

- A. 禁润

- B. 禁清
- C. 禁吐
- D. 禁消
- E. 禁补

29. 答案: A

解析: 治疗湿温初起, 首先要与伤寒表证、阳明腑实证和阴虚证相鉴别, 有三大禁忌。一为禁汗: 不可见头痛发热, 身体疼痛就误以为是伤寒而使用汗法; 二为禁下: 不可见中满不饥就误以为是腑实停滞而使用下法; 三为禁润: 不可见午后身热就以为是阴虚而使用滋阴之法。

30. 太阳病, 关节疼痛而烦, 脉沉而细, 此名

- A. 湿痹
- B. 风寒痹
- C. 热痹 D.
- 风痹 E.
- 寒痹 答

案: A

解析: 原文: 太阳病, 关节疼痛而烦, 脉沉而细(一作缓者), 此名湿痹。

31. 溢饮的病机是

- A. 饮停胸膈
- B. 饮停胸胁
- C. 饮停胃肠
- D. 饮停四肢肌表
- E. 饮停膀胱

答案: D

解析: 痰饮是水饮停留于胃肠间, 悬饮是水饮停于两胁下, 溢饮是水饮停于四肢肌表, 支饮是水饮停于胸膈之间。

32. 渗湿于热下在辛凉剂中加

- A. 麻黄、桂枝
- B. 薄荷、牛蒡 C.
- 芦根、滑石 D.
- 黄芩、黄柏 E.
- 金银花、连翘 答

案: C

解析: 渗湿于热下: 指治疗温邪在表夹湿的方法, 在辛凉剂中加芦根、滑石等淡渗利湿之药, 使湿邪从下而泄。

33. 温病治疗中救阴的目的在于

- A. 滋养阴血
- B. 温补阳气
- C. 顾护津液
- D. 宣通气机
- E. 化气利湿

答案: C

解析: 温病治疗中救阴的目的不在于滋养阴血, 而在于顾护津液, 防止过汗伤津; 而通阳的目的不在于以温药温补阳气, 而在于宣通气机, 化气利湿通小便, 强调淡渗利湿法在祛湿中的重要性。

34. 阳明温病, 无汗, 实证未剧, 不可下。小便不利者, 甘苦合化, 选方为

- A. 白虎汤
- B. 竹叶石膏汤
- C. 冬地三黄汤
- D. 黄连解毒汤
- E. 犀角地黄汤

答案: C

解析: 阳明温病, 无汗, 实证未剧, 不可下。小便不利者, 甘苦合化, 冬地三黄汤主之。35. 黄疸发病常责于

- A. 卫分
- B. 气分
- C. 营分
- D. 血分
- E. 以上均非

答案: D

解析: 黄疸发病常责于血分, 因此黄疸病证注重活血化瘀法, 正如原文“脾色必黄, 瘀热以行”意为湿热郁闭于脾, 影响血分并行于周身故发黄可见之。

36. 《灵枢·决气》中提到的六气为A.

- 精、气、津、液、血、脉
- B. 气、津、液、血、脉、骨
- C. 精、津、液、血、脉、骨
- D. 津、液、血、脉、骨、肉
- E. 精、气、津、肉、血、脉

答案: A

解析: “余闻人有精、气、津、液、血、脉, 余意以为一气耳, 今乃辨为六名, 余不知其所以然。”

37. “水谷气血之海”指的是

- A. 脾

- B. 胃
- C. 大肠
- D. 小肠
- E. 三焦

答案: B

解析: 容纳于胃中的饮食物, 经过胃气的磨化和腐熟作用后, 精微物质被吸收, 并由脾气传输而营养全身, 未被消化的食糜则下传于小肠作进一步消化。经过胃的腐熟, 水谷才能游溢出人体所需要的精微物质, 人的气血才能充盛, 脏腑组织才能得到水谷精微的充养而发挥各自的生理机能, 故又称胃为“水谷气血之海”。

38. 下列说法错误的是

- A. 津质地清稀
- B. 液质地稠厚
- C. 津起滋润作用
- D. 液起濡养作用

E. 津主要分布于骨节、脏腑

答案: E

解析: 津液是津和液的总称。质地较清稀, 流动性较大, 布散于体表皮肤、肌肉和孔窍, 并能渗入血脉之内, 起滋润作用的, 称为津; 质地较浓稠, 流动性较小, 灌注于骨节、脏腑、脑、髓等, 起濡养作用的, 称为液。

39. 下列不会导致实证短气的是

- A. 痰饮
- B. 胃肠积滞
- C. 火盛
- D. 气滞
- E. 瘀阻

答案: C

解析: 实证短气, 常兼有呼吸声粗, 或胸部室闷, 或胸腹胀满等, 多因痰饮、胃肠积滞或气滞或瘀阻所致。

40. 外感风寒或风热之邪, 或痰湿壅肺, 肺失宣肃, 导致的音哑或失音, 这种现象称为

- A. 少气
- B. 短气
- C. 子暗

D. 金实不鸣

E. 金破不鸣

答案: D

解析: 新病音哑或失音者, 多属实证, 多因外感风寒或风热袭肺, 或痰湿壅肺, 肺失清肃, 邪闭清窍所致, 即所谓“金实不鸣”。42. 患者恶寒发热, 头身疼痛, 喷嚏, 鼻塞, 流涕, 咽喉痒痛, 微有咳嗽, 气喘, 舌淡红, 苔薄, 脉浮。属

- A. 表证
- B. 里证
- C. 寒证
- D. 热证
- E. 阴证

答案: A

解析: 表证常见临床表现有新起恶风寒, 或恶寒发热, 头身疼痛, 喷嚏, 鼻塞, 流涕, 咽喉痒痛, 微有咳嗽、气喘, 舌淡红, 苔薄, 脉浮。

43. 体弱气虚者其坐姿为

- A. 坐而喜俯
- B. 坐而喜仰
- C. 坐卧不安
- D. 但卧不得坐
- E. 但坐不得卧

答案: A

解析: 坐而喜俯, 少气懒言, 多属体弱气虚。44. 相兼脉主病中沉涩脉主

- A. 痰热
- B. 血瘀
- C. 痰火
- D. 湿热
- E. 阴虚火旺

答案: B

解析: 沉涩脉主血瘀, 尤常见于阳虚而寒凝血瘀者。

45. 寒湿困脾证与湿热蕴脾证均有的表现是

- A. 身热不扬
- B. 脘腹痞闷
- C. 面黄不泽

D. 口渴喜饮

E. 白带量多

答案: B

解析: 寒湿困脾证与湿热蕴脾证均因湿邪困脾,脾胃纳运失职所致,可见脘腹痞闷,纳呆呕恶,便溏,肢体困重,面目发黄,苔腻,脉濡等。

区别在于兼热、兼寒之不同。湿热蕴脾证病性属湿热,故有舌质红苔黄腻,身热不扬,阳黄,脉濡数等湿热内蕴表现;寒湿困脾证病性属寒湿,故见舌淡苔腻白滑,腹痛喜暖,口淡不渴,带下量多清稀,阴黄,脉濡缓等寒湿内停表现。故此题最佳的选项是B。

46. 临床表现主要为胃脘嘈杂,饥不欲食,干呕呃逆,口燥咽干,舌红少苔,脉细数的证候为

A. 胃阴虚 B.

胃阳虚 C.

食滞胃脘D.

肝胃不和

E. 肝脾不调

答案: A

解析: 胃阴虚证临床表现: 胃脘嘈杂,饥不欲食,或痞胀不舒,隐隐灼痛,干呕,呃逆,口燥咽干,大便干结,小便短少,舌红少苔乏津,脉细数。

47. 面色淡黄,枯槁无华称为

A. 萎黄

B. 黄胖

C. 阴黄

D. 阳黄

E. 黄疸

答案: A

解析: 面色淡黄,枯槁无华,称“萎黄”。常见于脾胃气虚,气血不足者。

48. 形瘦多食者,多属于

A. 中气虚弱

B. 中焦有火

C. 阴虚不足

D. 阳气不足

E. 痰湿内盛

答案: B

解析: 形瘦食多,属中焦有火;形瘦食少,属中气虚弱。

49. 下列不属于气虚证临床表现的是

A. 气短声低

B. 精神疲惫

C. 少气懒言

D. 体倦乏力

E. 脘腹坠胀感

答案: E

解析: 气虚证的临床表现: 气短声低,少气懒言,精神疲惫,体倦乏力,脉虚,舌质淡嫩,或有头晕目眩,自汗,动则诸症加重。

选项 E 是气陷证的临床表现。

50. 脾胃虚弱患者与正常人均可见的脉象表现是

A. 沉脉

B. 实脉

C. 缓脉

D. 长脉

E. 滑脉

答案: C

解析: 缓脉多见于湿病。脾胃虚弱,亦可见于正常人。

51. 暑邪伤人出现气短乏力的症状主要是由于

A. 暑为阳邪,其性炎上

B. 暑性升散,伤津耗气

C. 暑多夹湿,阻遏气机

D. 暑性升发,易扰心神

E. 暑性干涩,易伤津液

51. 答案: B

解析: 暑性升散,易扰心神,易伤津耗气;暑为阳邪,易升发上犯,故易上扰心神。头目,出现心胸烦闷不宁、头昏、目眩、面赤等。暑邪伤人,可致腠理开泄而多汗。且汗出过多,不仅伤津,而且气随津脱则易耗气,故

临床除常见口渴喜饮、尿赤短少等津伤之症外，往往可见气短、乏力，耗伤太过，清窍失养而突然昏倒、不省人事等。

52. 以身热夜甚、心烦不寐、舌绛、脉细数为辨证要点的是

- A. 卫分证
- B. 气分证
- C. 营分证
- D. 血分证
- E. 以上均非

答案：C

解析：营分证的辨证要点：以身热夜甚、心烦、舌绛、脉细数等为辨证要点。

53. 下列因痰湿内阻所致的头晕特点为A.

- 头晕而胀，烦躁易怒
- B. 头晕胀痛，头重脚轻
- C. 头晕且重，如物裹缠
- D. 头晕耳鸣，腰酸遗精
- E. 头晕面白，神疲乏力

答案：C

解析：头晕且重，如物裹缠，痰多苔腻者，多因痰湿内阻所致。

54. 口渴咽干，鼻干唇燥，秋季多发者属于A.

- 燥邪伤津
- B. 痰饮内停
- C. 瘀血内停
- D. 里热炽盛
- E. 外感温热病初期

答案：A

解析：口渴咽干，鼻干唇燥，发于秋季者，多因燥邪伤津。

55. 寒痰的咳痰特点是

- A. 咳吐脓血腥臭痰 B.
- 痰中带血，色鲜红
- C. 痰少而黏，难于咯出 D.
- 痰白而清稀，有灰黑点
- E. 痰白滑而量多，易咯出者

答案：D

解析：痰白而清稀，或有灰黑点者，属寒痰。因寒伤阳气，气不化津，湿聚为痰之故。56. 既能泻下冷积，逐水退肿，又能祛痰利

咽，治疗喉痹的药物是

- A. 大黄
- B. 芒硝 C.
- 牛蒡子D.
- 巴豆
- E. 芫花

答案：D

解析：巴豆功效：峻下冷积，逐水退肿，祛痰利咽，外用蚀疮。主治病证：寒积便秘；腹水鼓胀；喉痹痰阻；痈肿脓成未溃，疥癣恶疮。

57. 大蓟治疗血热出血证，多用于治疗

- A. 尿血、血淋
- B. 吐血、咯血
- C. 面部出血 D.
- 胃肠出血
- E. 便血

答案：B

解析：大蓟与小蓟二药均能凉血止血，散瘀解毒消痈，可用治血热出血证以及热毒痈肿，常相须为用。但大蓟解毒散瘀消痈、凉血止血作用较强，多用于治疗吐血、咯血及崩漏；小蓟凉血止血、解毒散瘀消痈作用弱于大蓟，但兼能利尿，故治疗尿血、血淋为优。

58. 功效燥湿消痰，下气除满，治疗梅核气的药物是

- A. 苍术 B.
- 枳实 C.
- 厚朴 D.
- 陈皮
- E. 木香

答案：C

解析：厚朴功效：燥湿消痰，下气除满。应用：（1）湿阻中焦，脘腹胀满。本品苦燥辛散，能燥湿，又下气除胀满，为消除胀满的要药。（2）食积气滞，腹胀便秘。（3）痰饮喘咳。（4）梅核气。

59. 郁李仁的功效是 A.

润肠通便，润肺止咳B.

疏散风热，清肺利咽C.

润肠通便，下气利水D.

润肠通便，祛痰利咽

E. 润肠通便，消肿散结

答案：C

解析：郁李仁功效：润肠通便，下气利水。60.

下列各项，不属栀子主治病证的是

A. 血淋涩痛

B. 骨蒸潮热

C. 火毒疮疡

D. 湿热黄疸

E. 血热吐衄

答案：B

解析：栀子主治热病心烦，湿热黄疸，热淋涩痛，血热吐衄，目赤肿痛，火毒疮疡等。

故骨蒸潮热不属于栀子的主治病证，故选 B。

61. 辛夷入汤剂宜

A. 冲服

B. 后下

C. 包煎

D. 先煎

E. 烩化

答案：C

解析：包煎：辛夷、旋覆花等药材有毛，对咽喉有刺激性，入药时宜用纱布包裹入煎。62.

下列药物中既能止咳平喘，又能润肠通便的为

A. 薏苡仁

B. 火麻仁

C. 苦杏仁

D. 郁李仁

E. 酸枣仁

答案：C

解析：苦杏仁功效：降气止咳平喘，润肠通便。63.

下列具有散寒止痛，降逆止呕，助阳止泻功效的药物是

A. 肉桂 B.

干姜 C.

吴茱萸D.

高良姜

E. 附子

答案：C

解析：吴茱萸功效：散寒止痛，降逆止呕，助阳止泻。

64. 下列药物中具有润肺清心，养阴生津功效的是

A. 石斛

B. 生地

C. 麦冬

D. 黄精

E. 天冬

答案：C

解析：麦冬功效：养阴生津，润肺清心。

65. 具有补血活血，调经止痛，润肠通便功效的药物是

A. 当归 B.

白芍 C.

三七 D.

何首乌

E. 阿胶

答案：A

解析：当归功效：补血活血，调经止痛，润肠通便。

66. 下列具有解表退热功效的是

A. 薄荷

B. 柴胡 C.

刺蒺藜D.

菟丝子

E. 钩藤

答案：B

解析：柴胡功效：解表退热，疏肝解郁，升举阳气。

67. 下列药物中，不具有行气，止痛功效的药物是

A. 郁金

- B. 白前
- C. 三棱
- D. 姜黄
- E. 川芎

答案: B

解析: 白前功效: 降气, 祛痰, 止咳。

68. 具有养阴生津功效的药物是

- A. 牡丹皮
- B. 赤芍 C.
- 紫草 D.
- 金银花

E. 生地黄

答案: E

解析: 生地黄功效: 清热凉血, 养阴生津。69.

补气养血药中加入适量肉桂, 其主要目的为

- A. 补而不滞
- B. 发汗解表
- C. 引火归原
- D. 鼓舞气血生长
- E. 散寒止痛

答案: D

解析: 肉桂应用: (1) 肾阳虚证。为治命门火衰之要药。(2) 院腹冷痛, 寒疝腹痛。善去痼冷沉寒。(3) 腰痛, 胸痹, 阴疽, 闭经, 痛经。(4) 虚阳上浮。能使因下元虚衰所致上浮的虚阳回归故里。故曰引火归原。此外, 久病体虚气血不足者。在补益气血方中加入少量本品, 可鼓舞气血生长。

70. 蒲黄的功效是

- A. 凉血, 止血, 利尿
- B. 活血, 祛瘀, 止痛
- C. 止血, 化瘀, 通淋
- D. 止血, 化瘀, 利尿
- E. 止血, 消肿, 生肌

答案: C

解析: 蒲黄的功效: 止血, 化瘀, 通淋。

71. 治疗热淋涩痛, 宜选用

- A. 知母 B.
- 芦根 C.
- 天花粉D.
- 夏枯草

E. 石膏

答案: B

解析: 芦根功效: 清热泻火, 生津止渴, 除烦, 止呕, 利尿。主治病证: 热病烦渴; 胃热呕秽; 肺热咳嗽, 肺痛吐脓; 热淋涩痛。

72. 治疗胃热呕哕, 宜选用

- A. 知母 B.
- 芦根 C.
- 天花粉D.
- 夏枯草

E. 石膏

答案: B

解析: 芦根功效: 清热泻火, 生津止渴, 除烦, 止呕, 利尿。主治病证: 热病烦渴; 胃热呕秽; 肺热咳嗽, 肺痛吐脓; 热淋涩痛。

73. 茯苓的功效是

- A. 利水渗湿
- B. 利水渗湿, 泄热
- C. 利水渗湿, 清热排脓
- D. 利水渗湿, 健脾除痹
- E. 利水渗湿, 健脾宁心

答案: E

解析: 茯苓功效: 利水渗湿, 健脾, 宁心。

根据题干要求, 此题的正确的选项是 E。74.

具有开窍、辟秽、止痛功效的药物是

- A. 麝香 B.
- 冰片 C.
- 龙骨 D.
- 苏合香
- E. 石菖蒲

答案: D

解析: 苏合香功效: 开窍, 辟秽, 止痛。

75. 下列不属于羚羊角主治病证的是

- A. 惊痫抽搐
- B. 头晕目眩

C. 目赤头痛

D. 热毒发斑

E. 风湿痹痛

答案：E

解析：羚羊角应用：（1）肝风内动，惊痫抽搐。善能清泄肝热，平肝息风，镇惊解痉。故为治惊痫抽搐之要药，尤宜于热极生风所致者。

（2）肝阳上亢，头晕目眩。（3）肝火上炎，目赤头痛。善清泻肝火而明目。（4）温热病壮热神昏，热毒发斑。

76. 功效具有凉血止血. 清肝泻火的药物是

A. 小蓟

B. 大蓟

C. 地榆

D. 槐花

E. 侧柏叶

答案：D

解析：槐花功效：凉血止血，清肝泻火。

77. 艾叶除了具有温经止血. 散寒调经之功效外，还兼有

A. 止痢

B. 截疟

C. 止痒

D. 补虚

E. 利尿

答案：C

解析：艾叶功效：温经止血，散寒调经；外用祛湿止痒。

78. 下列何药为治疗湿热泻痢的要药

A. 黄芩 B.

黄连 C.

黄柏 D.

龙胆草

E. 淡竹叶

答案：B

解析：黄连应用：（1）湿热痞满，呕吐吞酸。尤长于清中焦湿热。（2）湿热泻痢。善去脾胃大肠湿热，为治泻痢要药。（3）

高热神昏，心烦不寐，血热吐衄。尤善清泻心经实火，用治心火亢盛所致神昏，烦躁之证。

（4）痈肿疔疮，目赤牙痛。尤善疗疔毒。

（5）消渴。善清胃火而可用治胃火炽盛，消谷善饥之消渴证。（6）外治湿疹，湿疮，耳道流脓。

79. 治疗亡阳证，寒饮咳喘，应选用的药物是

A. 附子 B.

干姜 C.

肉桂 D.

吴茱萸

E. 小茴香

答案：B

解析：干姜温中散寒，回阳通脉，温肺化饮，可用于亡阳证和寒饮喘咳。

80. 桑寄生的功效不包括的是

A. 利水

B. 安胎 C.

强筋骨D.

祛风湿

E. 补肝肾

答案：A

解析：桑寄生功效：祛风湿，补肝肾，强筋骨，安胎元。故根据题干要求，最佳的选项是A。

81. 功效为收敛固涩. 益气生津. 补肾宁心的药物是 A.

乌梅 B.

诃子 C.

肉豆蔻D.

五味子

E. 赤石脂

答案：D

解析：五味子功效：收敛固涩，益气生津，补肾宁心。

82. 山楂的功效是

A. 消食健胃，行气散瘀

- B. 消食除胀，降气化痰
- C. 消食健胃，回乳消胀
- D. 消食健胃，疏肝解郁
- E. 消食健胃，涩精止遗

答案：A

解析：山楂功效：消食健胃，行气散瘀，化浊降脂。

83. 下列何药是消除脘腹胀满之要药

- A. 藿香
- B. 苍术
- C. 厚朴
- D. 砂仁
- E. 佩兰

答案：C

解析：厚朴功效：燥湿消痰，下气除满。应用：（1）湿阻中焦，脘腹胀满。为消除胀满之要药。（2）食积气滞，腹胀便秘。（3）痰饮喘咳。（4）梅核气。

84. 车前子的功效不包括的是

- A. 明目
- B. 祛痰
- C. 利尿通淋
- D. 渗湿止泻
- E. 收湿敛疮

答案：E

解析：车前子功效：清热利尿通淋，渗湿止泻，明目，祛痰。故正确的选项是 E。

85. 天冬与麦冬相比，功效偏于治疗

- A. 肺阴虚
- B. 胃阴虚
- C. 心阴虚
- D. 肾阴虚
- E. 肠燥便秘

答案：D

解析：天冬甘苦性寒，归肺肾经，清火润燥之功强于麦冬，且可滋肾阴，长于滋肾阴而降虚火，作用部位偏下，治疗肾阴虚。麦冬甘，微苦寒，归心肺胃经，滋阴润燥清热力弱于天冬，而滋腻性较小为其所长。且能养胃生津，清心除烦，又治胃阴不足之舌干口

渴，阴虚火旺之心烦不眠及心神不安等证。凡心肺胃三经阴伤有火之证，皆可用之，作用部位偏上。

81. 患者，男，28岁，现发热恶热，烦躁，口渴喜饮，汗多，面赤，舌红，苔灰黑，脉数有力。其证属

- A. 风淫证
- B. 火淫证
- C. 暑淫证
- D. 湿淫证
- E. 燥淫证

答案：B

解析：火淫证临床表现发热恶热，烦躁，口渴喜饮，汗多，大便秘结，小便短黄，面色赤，舌红或绛，苔黄干燥或灰黑，脉数有力（洪数、滑数、弦数等）。甚者或见神昏、谵语、惊厥、抽搐、吐血、衄血、痈肿疮疡等。

82. 患者，女，35岁，现症见面色晦滞，神疲乏力，气短懒言，食少纳呆，肢体麻木，舌淡紫或有瘀点瘀斑，脉细涩。其证属

- A. 气虚证
- B. 气虚血瘀证
- C. 气血两虚证
- D. 气不摄血证
- E. 气滞血瘀证

答案：B

解析：气虚血瘀证临床表现：面色淡白，神疲乏力，气短懒言，食少纳呆；面色晦滞，局部青紫、肿胀、刺痛不移而拒按，或肢体瘫痪、麻木，或可触及肿块，舌淡紫或有瘀点瘀斑，脉细涩。

83. 患者，男，69岁，近日脘腹痞胀，泛吐清水，伴有胸闷，心悸，息促不得卧，舌苔白滑，脉滑。其证属

- A. 痰证
- B. 水停证
- C. 饮证
- D. 气虚证
- E. 气逆证

答案：C

解析：饮证临床表现：脘腹痞胀，泛吐清水，

腕腹部水声辘辘；肋间饱满，咳唾引痛；胸闷，心悸，息促不得卧；身体肢节疼重；咳吐清稀痰涎，或喉间哮喘有声；头目眩晕，舌苔白滑，脉弦或滑等。

84. 患者，男，38岁，现身热，无恶寒，汗出，烦渴，胸闷痛，舌红苔黄，脉数。其证属

- A. 邪热壅肺证
- B. 热扰胸膈证
- C. 风热犯肺证
- D. 燥热犯肺证
- E. 热灼营阴证

答案：A

解析：邪热壅肺证临床表现：身热，汗出，烦渴，咳喘，或胸闷胸痛，舌红苔黄，脉数。辨证要点：本证以身热而不恶寒，咳喘，舌红苔黄，脉数为辨证要点。

85. 患者男，69岁，近日食欲不振，食少腹胀，便溏，并久咳不止，气短而喘，咯痰清稀，声低懒言，神疲乏力，舌淡，苔白滑，脉弱。其证属

- A. 心肺气虚证
- B. 脾肺气虚证
- C. 肺肾气虚证
- D. 脾肾阳虚证
- E. 脾气虚证

答案：B

解析：脾肺气虚证临床表现：食欲不振，食少，腹胀，便溏，久咳不止，气短而喘，咯痰清稀，面部虚浮，下肢微肿，声低懒言，神疲乏力，面白无华，舌淡，苔白滑，脉弱。

- A. 佐金平木法
- B. 抑木扶土法
- C. 滋水涵木法
- D. 培土生金法
- E. 泻南补北法

91. 肝火犯肺证的治法是

91. 答案：A

解析：佐金平木法是滋肺阴清肝火以治疗肝火犯肺病证的治法。

92. 肝脾不和的治法是

92. 答案：B

解析：佐金平木法是滋肺阴清肝火以治疗肝火犯肺病证的治法。抑木扶土法是疏肝健脾或平肝和胃以治疗肝脾不和（或）肝气犯胃病证的治法。滋水涵木法是滋肾阴以养肝阴的治法。培土生金法是健脾生气以补益肺气的治法。泻南补北法是泻心火补肾水以治疗心肾不交病证的治法。

- A. 因时制宜
- B. 因地制宜
- C. 治病求本
- D. 祛除邪气
- E. 因人制宜

93. 属于夏季用药慎用温热的理论依据的是

93. 答案：A

解析：因时制宜是根据时令气候特点，考虑用药的治则。如《素问·六元正纪大论》所说：“用寒远寒，用凉远凉，用温远温，用热远热，食宜同法。”

94. 属于阴盛之体慎用寒凉的理论依据是

94. 答案：E

解析：因人制宜是根据病人的年龄、性别、体质等不同特点，考虑用药的治则。

- A. 任脉
- B. 督脉
- C. 带脉
- D. 冲脉
- E. 阴维脉

95. 被称为十二经脉之海的是

95. 答案：D

解析：冲脉上行于头，下至于足，后行于背，前布于胸腹，贯穿全身，通受十二经之气血，为总领诸经气血之要冲。当脏腑经络气血有余时，冲脉能加以涵蓄和贮存，而在脏腑经络气血不足时，则冲脉给予补充灌注，以维持人体各组织器官正常生理活动的需要。由于冲脉能调节十二经脉气血，故又称其为“十二经脉之海”或“五脏六腑之海”。96. 与女子妊娠密切相关的经脉

96. 答案：A

解析：任主胞胎，故任脉与妊娠关系密切。

- A. 虚寒
- B. 真寒假热
- C. 实热
- D. 实寒
- E. 虚热

97. 阴偏衰所形成的病理变化是

97. 答案: E

解析: 阴偏衰, 即是阴虚, 是指机体阴气不足, 阴不制阳, 导致阳气相对偏盛, 功能虚性亢奋的病理状态。其病机特点多表现为阴气不足, 阳气相对偏盛的虚热证。

98. 阴偏胜所形成的病理变化是

98. 答案: D

解析: 阴偏胜, 即是阴盛, 是指机体在疾病过程中所出现的一种阴气病理性偏盛, 功能抑制, 热量耗伤过多, 病理性代谢产物积聚的病理状态。其病机特点多表现为阴盛而阳未虚的实寒证。

- A. 阴维脉、阳维脉
- B. 督脉
- C. 任脉
- D. 带脉
- E. 阴跷脉、阳跷脉

99. 具有维络腰腹, 提系胞胎, 固护胎儿作用的经脉是

99. 答案: D

解析: 带脉基本机能: ①约束纵行诸经: 十二正经与奇经中的其余七脉均为上下纵行, 唯有带脉环腰一周, 有总束诸脉的作用。②固护胞胎: 《傅青主女科》载: “带脉者, 所以约束胞胎之系也, 带脉无力, 则难以提系, 必然胞胎不固。”说明带脉还有维络腰腹, 提系胞胎, 固护胎儿的作用。③主司带下: 因带脉有病, 常见妇人带下, 故有“带脉主司带下”之说。

100. 维系联络全身阴经和阳经的经脉是

100. 答案: A

解析: 维脉的基本机能: 阴维有维系联络全身阴经的作用; 阳维有维系联络全身阳经的作用。

A. 怒

- B. 喜
- C. 思
- D. 悲
- E. 恐

101. 脾在志为

101. 答案: C

解析: 脾在志为思: 思即思虑, 属人体的情志活动。思虽为脾志, 但与心神有关, 故有“思出于心, 而脾应之”之说。思虑过度, 或所思不遂, 最易妨碍脾气运化, 致使脾胃之气结滞, 脾气不能升清, 胃气不能降浊, 因而出现不思饮食、脘腹胀闷、头目眩晕等症。

102. 肺在志为

102. 答案: D

解析: 肺在志为忧(悲): 悲忧皆为人体正常的情绪变化或情感反映, 由肺精、肺气所化生。过度悲哀或过度忧伤, 又可损伤肺精、肺气, 或导致肺气的宣降运动失调。

- A. 思则气结
- B. 恐则气下
- C. 怒则气上
- D. 悲则气消
- E. 喜则气缓

103. 患者因过度悲忧, 导致肺气耗伤或宣降失常。其病机是

103. 答案: D

解析:

104. 患者因过度思虑, 导致心脾气机郁滞, 运化失职。其病机是

104. 答案: A

解析: 怒则气上: 指大怒致使肝气上逆, 甚则血随气逆的病机变化。临床主要表现为: 头胀痛, 面红目赤, 急躁易怒; 血随气逆则呕血, 甚则昏厥卒倒; 若肝气横逆犯脾, 可兼见腹痛、腹泻等症。喜则气缓: 指过度喜乐, 致使心气涣散或心神惮散的病机变化。轻者可见心悸失眠、少气无力、精神不集中等; 重者神志失常、狂乱, 或见心气暴脱而

大汗淋漓、气息微弱、脉微欲绝等。悲则气消：指过度悲忧，导致肺气耗伤或宣降失常的病机变化。临床常见意志消沉、精神不振、气短胸闷、乏力懒言等症。惊恐伤肾，恐则气下，肾气不固，胆气不壮，神气不宁，故见胆怯易惊，恐惧不安，心悸失眠，常被恶梦惊醒，甚至出现二便失禁、滑精、阳痿等症。思则气结：指过度思虑，导致心脾气机郁滞，运化失职的病机变化。临床可见心悸、失眠、多梦、精神萎靡及倦怠乏力、食少、腹胀、便溏等症状。

- A. 前额
- B. 眉间
- C. 鼻D.
- 颊侧E.
- 耳门

105. 与明堂对应的是

105. 答案：C

解析：《灵枢·五色》划分法先将面部划分为不同的部位并给予命名，如前额-庭、颜，眉间-阙，鼻-明堂，颊侧-藩，耳门-蔽。106. 与庭、颜对应的是

106. 答案：A

解析：《灵枢·五色》划分法先将面部划分为不同的部位并给予命名，如前额-庭、颜，眉间-阙，鼻-明堂，颊侧-藩，耳门-蔽。

- A. 筋
- B. 骨
- C. 气
- D. 肉
- E. 脉

107. 根据《素问·宣明五气》所说，“久行”可伤的是

107. 答案：A

解析：《素问·宣明五气》说：“久立伤骨，久行伤筋，久卧伤气，久坐伤肉。”

108. 根据《素问·宣明五气》所说，“久坐”可伤的是

108. 答案：D

解析：《素问·宣明五气》说：“久立伤骨，久行伤筋，久卧伤气，久坐伤肉。”

- A. 当归芍药散
- B. 温经汤
- C. 甘麦大枣汤
- D. 半夏厚朴汤
- E. 白术散

109. 妇人怀妊，腹中疝痛，宜选用

109. 答案：A

解析：妇人怀妊，腹中疝痛，当归芍药散主之。

110. 妇人咽中如有炙脔，宜选用

110. 答案：D

解析：妇人咽中如有炙脔，半夏厚朴汤主之。

（111~112 题共用备选答案）

- A. 当归芍药散
- B. 温经汤
- C. 胶艾汤
- D. 附子汤
- E. 白术散

111. 妊娠腹痛由于阳虚寒甚者，选用

112. 妊娠腹痛由于冲任虚寒者，选用

111. D

解析：附子汤主妊娠腹痛由于阳虚寒甚者。

112. C

解析：胶艾汤妊娠腹痛由于冲任虚寒者。

（113~114 题共用备选答案）

- A. 肝风内动
- B. 热入心包
- C. 阴虚火旺
- D. 心脾热盛
- E. 中风先兆

113. 歪斜舌多见于

114. 颤动舌多见于

113. E

解析：歪斜舌的临床意义：主中风，或中风先兆。多因肝风内动，夹痰或夹瘀，痰瘀阻滞一侧经络，舌肌弛缓，收缩无力，而健侧舌肌如常而致。

114. A

解析：颤动舌主肝风内动。因气血两虚，阴液亏虚，舌失于濡养而无力平稳伸展舌体；

或因热极津亏而动风、肝阳化风等导致舌抖颤难安。

(115~116 题共用备选答案)

- A. 中阳偏旺
- B. 胃家实
- C. 中焦气机壅滞
- D. 脾胃健运
- E. 中脘胀满

115. “中气实则病在阳明，中气虚则病在太阴”，其中“中气实”的最佳解释是

116. “若湿热之证，不夹内伤，中气实者，其病必微”，其中“中气实”的最佳解释是

115. A

解析：“中气实则病在阳明，中气虚则病在太阴”，其中“中气实”为中阳偏旺之意。

116. D

解析：“若湿热之证，不夹内伤，中气实者，其病必微”，其中“中气实”为脾胃健运之意。

(117~118 题共用备选答案)

- A. 舌尖
- B. 舌中
- C. 舌根
- D. 舌两侧
- E. 舌底

117. 肾在舌上分属部位是

118. 肝在舌上分属部位是

117. C

解析：舌面的脏腑分部：（1）舌质多候五脏病变，侧重血分。（2）舌苔多候六腑病变，侧重气分。（3）舌尖多反映上焦心肺的病变。（4）舌中部多反映中焦脾胃的病变。（5）舌根部多反映下焦肾的病变。（6）舌两侧多反映肝胆的病变。

118. D

解析：舌面的脏腑分部：（1）舌质多候五脏病变，侧重血分。（2）舌苔多候六腑病变，侧重气分。（3）舌尖多反映上焦心肺的病变。（4）舌中部多反映中焦脾胃的病变。（5）舌根部多反映下焦肾的病变。（6）舌两侧多反映肝胆的病变。

(119~120 题共用备选答案)

- A. 口腔不洁
- B. 食积胃肠

- C. 胃热
- D. 牙疳
- E. 内有溃腐脓疡

119. 口气臭秽者多见于

120. 口臭难闻，牙龈腐烂者多见于

119. C

解析：口气酸臭，并伴食欲不振，脘腹胀满者，多属食积胃肠。口气臭秽者，多属胃热。口气腐臭，或兼咳吐脓血者，多是内有溃腐脓疡。口气臭秽难闻，牙龈腐烂者，为牙疳。120. D

解析：口气酸臭，并伴食欲不振，脘腹胀满者，多属食积胃肠。口气臭秽者，多属胃热。口气腐臭，或兼咳吐脓血者，多是内有溃腐脓疡。口气臭秽难闻，牙龈腐烂者，为牙疳。

(121~122 题共用备选答案)

- A. 肾阳不足，水停泛滥
- B. 肾阳衰微，水湿凝结
- C. 脾虚失运，水湿内停
- D. 肺失通调，停水外溢
- E. 水湿滞留，营卫郁滞

121. 石水的病机为

122. 正水的病机为

121. 答案：B

解析：石水，是皮水进一步加重所致，其病机为肾阳衰微，水湿不能蒸化，凝聚下焦，则小腹结满，小便不利，腰膝酸冷；不能上逆于肺，则不喘。

122. 答案：A

解析：正水，关乎于肾，肾阳虚不能蒸化水湿，故水湿停滞，泛溢肌肤则浮肿；水湿上逆犯肺则喘；肾阳虚弱，失于温养，则可表现力腰膝酸冷，脉迟。

- A. 正胜邪退
- B. 邪去正虚
- C. 邪胜正衰
- D. 正虚邪恋
- E. 邪正相持

123. 邪气退却而正气大伤的病理状态为

123. 答案: B

解析: 邪去正虚: 指在疾病过程中, 正气抗御邪气, 邪气退却而正气大伤的病理状态。124. 正气不能完全祛邪外出, 邪气可以稽留于一定的部位为

124. 答案: E

解析: 邪正相持: 指在疾病过程中, 机体正气不甚虚弱, 而邪气亦不亢盛, 则邪正双方势均力敌, 相持不下, 病势处于迁延状态的一种病理变化。此时, 由于正气不能完全祛邪外出, 邪气可以稽留于一定的部位, 病邪既不能消散, 亦不能深入, 又称为“邪留”或“邪结”。

- A. 地域因素
- B. 邪气侵害
- C. 邪盛正衰
- D. 气候因素
- E. 正气不足

125. 疾病发生的重要条件是

125. 答案: B

解析: 疾病发生的重要条件是邪气侵害。

126. 疾病发生的基础是

126. 答案: E

解析: 疾病发生的基础是正气不足。

- A. 急则治其标
- B. 缓则治其本
- C. 标本同治
- D. 先扶正后祛邪
- E. 先祛邪后扶正

127. 虚人感冒应选用的方法是

127. 答案: D

解析: 先扶正后祛邪, 即先补后攻。适应于正虚为主, 机体正气不能耐受攻伐者。虚人感冒要先扶正固本, 再祛外邪。

128. 二便不利应选用的方法是

128. 答案: A

解析: 若腹水严重、腹部胀满、呼吸急促、二便不利时, 则为标急, 此时当先治标病之腹水, 待腹水减退, 病情稳定后, 再治其肝病。

- A. 热甚
- B. 热在表
- C. 热在里
- D. 湿热内蕴
- E. 实热证

129. 身热初按热甚, 久按热反轻者为

129. 答案: B

解析: 身热初按热甚, 久按热反轻者: 为热在表。

130. 久按其热反甚者

130. 答案: C

解析: 久按其热反甚者: 为热在里。

- A. 既能治疗血虚证, 又能治疗遗精盗汗证
- B. 既能治疗血虚证, 又能治疗肋肋脘腹疼痛
- C. 既能治疗血虚证, 又能治疗痈疽疮疡
- D. 既能治疗血虚证, 又能治疗虚劳喘咳
- E. 既能治疗血虚证, 又能治疗出血证

131. 阿胶的主治病证是

131. 答案: E

解析: 阿胶功效: 补血滋阴, 润肺, 止血。主治: (1) 血虚萎黄, 眩晕, 心悸, 肌痿无力。为补血要药。(2) 劳嗽咯血, 吐血尿血, 便血崩漏, 妊娠胎漏。为止血要药。(3) 肺燥咳嗽。(4) 热病伤阴, 心烦失眠, 阴虚风动, 手足瘈疝等。

132. 白芍的主治病证是

132. 答案: B

解析: 白芍功效: 养血调经, 敛阴止汗, 柔肝止痛, 平抑肝阳。主治: (1) 血虚萎黄, 月经不调, 崩漏下血。(2) 肝脾不和, 胸肋脘腹疼痛, 四肢挛急疼痛。(3) 肝阳上亢, 头痛眩晕。(4) 自汗, 盗汗。

A. 蕲蛇 B.
木瓜 C.
威灵仙D.
秦艽 E.
桑寄生

133. 具有祛风，通络，止痉功效的药物是

133. 答案：A

解析：蕲蛇功效：祛风，通络，止痉。134.

具有舒筋活络，和胃化湿功效的药物是

134. 答案：B

解析：木瓜功效：舒筋活络，和胃化湿。

A. 地榆 B.
侧柏叶C.
仙鹤草D.
棕榈炭E.
血余炭

135. 既能收敛止血，又能截疟的药物是

135. 答案：C

解析：仙鹤草：收敛止血，止痢，截疟，解毒，补虚。

136. 既能收敛止血，又能利尿的药物是

136. 答案：E

解析：血余炭：收敛止血，化瘀，利尿。

A. 开窍醒神，清热止痛
B. 开窍醒神，活血通经，消肿止痛
C. 开窍醒神，辟秽止痛
D. 化痰开窍，凉肝息风，清热解毒
E. 开窍醒神，清心化痰

137. 麝香的功效是

137. 答案：B

解析：麝香功效：开窍醒神，活血通经，消肿止痛，催生下胎。

138. 牛黄的功效是

138. 答案：D

解析：牛黄功效：凉肝息风，清心豁痰，开窍醒神，清热解毒。

A. 滑石 B.
茵陈 C.
萆薢 D.
地肤子E.
泽泻

139. 具有利湿去浊，祛风除痹功效的药物是

139. 答案：C

解析：萆薢功效：利湿去浊，祛风除痹。

140. 具有清利湿热，利胆退黄功效的药物是

140. 答案：B

解析：茵陈功效：清利湿热，利胆退黄。

A. 干姜 B.
附子 C.
肉桂 D.
丁香 E.
吴茱萸

141. 治疗腹痛、泄泻，为温暖中焦之主药的是

141. 答案：A

解析：干姜主治腹痛、呕吐、泄泻。本品辛热，长于温中散寒，健运脾胃，为温暖中焦之主药。凡脾胃虚寒，无论是实证或虚寒证均可用之。治脾胃虚寒，则多配人参、白术等，如理中丸。

142. 治疗阳痿、宫冷，虚阳上浮的药物是

142. 答案：C

解析：肉桂主治：肾阳虚证。本品辛甘大热，能补火助阳，益阳消阴，作用温和持久，为治命门火衰之要药。本品大热入肝肾，能使因下元虚衰所致上浮之虚阳回归故里，故曰引火归原。

A. 贵重药物
B. 胶类药物
C. 气味芳香的药物

D. 矿物、介壳类药物

E. 粉末状及带有绒毛的药物

143. 入汤剂宜后下的药物是

144. 入汤剂宜烱化的药物是

143. 答案: C

解析: 后下: 主要指某些气味芳香的药物, 久煎其有效成分易于挥发而降低药效, 须在其他药物煎沸 5~10 分钟后放入。

144. 答案: B

解析: 溶化: 又称烱化, 主要是指某些胶类药物及黏性大而易溶的药物, 为避免入煎粘锅或粘附其他药物影响煎煮, 可单用水或黄酒将此类药加热溶化即烱化后, 用煎好的药液冲服, 也可将此类药放入其他药物煎好的药液中加热烱化后服用。

A. 薄荷 B.

荆芥 C.

桑叶 D.

菊花 E.

牛蒡子

145. 患者恶风发热, 咳嗽痰少, 伴目赤涩痛, 首选药物是

146. 患者恶风发热, 咳嗽痰多, 伴咽喉肿痛, 首选药物是

145. 答案: C

解析: 桑叶苦寒清泄肺热, 甘寒凉润肺燥, 故可用于肺热或燥热伤肺, 咳嗽痰少, 色黄而黏稠, 或干咳少痰, 咽痒等症。也常用治风热上攻. 肝火上炎所致的目赤. 涩痛. 多泪。

146. 答案: E

解析: 牛蒡子辛散苦泄, 寒能清热, 升散之中具有清降之性, 功能疏散风热, 发散之力虽不及薄荷等药, 但长于宣肺祛痰, 清利咽喉, 故风热感冒而见咽喉红肿疼痛, 或咳嗽痰多不利者, 十分常用。

A. 鱼腥草

B. 牡丹皮

C. 败酱草

D. 山慈菇

E. 大血藤

147. 具有清热解毒, 祛风止痛功效的药物是

148. 具有清热解毒, 祛瘀止痛功效的药物是

147. 答案: E

解析: 大血藤功效: 清热解毒, 活血, 祛风, 止痛。

148. 答案: C

解析: 败酱草功效: 清热解毒, 消痈排脓, 祛瘀止痛。

A. 龙骨

B. 诃子 C.

乌梅 D.

五味子 E.

五倍子

149. 具有敛肺降火, 涩肠止泻, 敛汗止血, 收湿敛疮功效的药物是

149. 答案: E

解析: 五倍子功效: 敛肺降火, 涩肠止泻, 敛汗止血, 收湿敛疮。

150. 具有收敛固涩, 益气生津, 补肾宁心功效的药物是

150. 答案: D

解析: 五味子功效: 收敛固涩, 益气生津, 补肾宁心。

第二单元

1. 属于桑菊饮功用的是

- A. 消食导滞
- B. 行气化滞
- C. 宣肺止咳
- D. 燥湿和胃
- E. 消痞除瘕

答案：C

解析：桑菊饮功用：疏风清热，宣肺止咳。2. 酸枣仁汤中益心脾而宁心神的药物是

- A. 茯苓
- B. 远志
- C. 茯神
- D. 石菖蒲
- E. 琥珀

答案：A

解析：酸枣仁汤中重用酸枣仁为君，以其甘酸质润，入心、肝之经，养血补肝，宁心安神。茯苓甘淡性平，益心脾而宁心神；知母苦寒质润，滋阴润燥，清热除烦，共为臣药。与君药相伍，养阴血，清虚热，安神除烦。佐以辛散之川芎，调肝血而疏肝气，与大量之酸枣仁相伍，辛散与酸收并用，补血与行血结合，具有养血调肝之妙。甘草和中缓急，调和诸药为使。

3. 不含川芎的方剂是

- A. 温经汤
- B. 四物汤
- C. 越鞠丸
- D. 生化汤
- E. 归脾汤

答案：E

解析：归脾汤的组成为：白术、当归、茯苓、炒黄芪、远志、龙眼肉、炒酸枣仁、人参、木香、炙甘草、生姜、大枣。方歌：归脾汤用术参芪，归草茯苓远志随；酸枣木香龙眼肉，煎加姜枣益心脾。怔忡健忘俱可却，便血崩漏总能医。

4. 半身不遂，口眼歪斜，语言蹇涩，口角流涎，脉缓无力者。选方为

- A. 桃核承气汤
- B. 小活络丹

C. 温经汤

D. 血府逐瘀汤

E. 补阳还五汤

答案：E

解析：补阳还五汤主治：中风之气虚血瘀证。半身不遂，口眼歪斜，语言蹇涩，口角流涎，小便频数或遗尿失禁，舌暗淡，苔白，脉缓无力。

5. 恶寒发热，无汗，头痛项强，肢体酸楚疼痛，口苦微渴，舌苔白或微黄，脉浮。治宜选用

- A. 越鞠丸
- B. 麻杏石甘汤
- C. 天麻钩藤饮
- D. 九味羌活汤
- E. 大青龙汤

答案：D

解析：九味羌活汤主治：外感风寒湿邪，内有蕴热证。恶寒发热，无汗，头痛项强，肢体酸楚疼痛，口苦微渴，舌苔白或微黄，脉浮。

4. 下列不属于至宝丹功用的是

- A. 开窍
- B. 息风
- C. 化浊
- D. 解毒
- E. 清热

答案：B

解析：至宝丹功用：清热开窍，化浊解毒。主治痰热内闭心包证。神昏谵语，身热烦躁，痰盛气粗，舌红苔黄垢腻，脉滑数。亦治中风、中暑、惊厥属于痰热内闭者。

7. 属于天台乌药散组成药物的是

- A. 陈皮
- B. 草豆蔻
- C. 肉桂
- D. 厚朴
- E. 川楝子

答案：E

解析：天台乌药散组成为天台乌药、木香、小茴香、青皮、高良姜、槟榔、川楝子、巴豆、酒。方歌：天台乌药木茴香，巴豆制楝青槟姜，行气疏肝止疼痛，寒疝腹痛是良方。8. 玉屏风散的功用为

- A. 涩肠止遗
- B. 清热养血
- C. 固冲摄血
- D. 补肾纳气
- E. 益气固表止汗

答案：E

解析：玉屏风散功为益气固表止汗，主治表虚自汗。

9. 朱砂安神丸中泻火除烦的药物是A. 黄连

- B. 石膏C.
- 竹叶D.
- 知母E.
- 栀子答

案：A

解析：朱砂安神丸中朱砂甘寒质重，专入心经，寒能清热，重可镇怯，既重镇安神，又清心经火，治标之中兼能治本，用为君药。黄连苦寒，入心经，清心泻火，以除烦热为臣药，两药相伍，重镇以安神，清心以除烦，共收泻火安神之功。

10. 天王补心丹与朱砂安神丸组成中均含有的药物有

- A. 炙甘草
- B. 玄参 C.
- 黄柏 D.
- 生地黄E.
- 酸枣仁答

案：D

解析：天王补心丹：酸枣仁、柏子仁、当归、天冬、麦冬、生地黄、人参、丹参、玄参、茯苓、五味子、远志、桔梗、朱砂、竹叶。朱砂安神丸：朱砂、黄连、生地黄、当归、炙甘草。两方共有的药物是朱砂、生地、当归。注意天王补心丹中不含炙甘草。

11. 酸枣仁汤中养肝血，安心神的药物是A. 茯苓

- B. 甘草
- C. 知母 D.
- 川芎 E.
- 酸枣仁答

案：E

解析：酸枣仁汤中重用甘酸质润之酸枣仁为君，入心、肝之经，养血补肝，宁心安神。

12. 保和丸的组成药物中含有

- A. 半夏、生姜
- B. 神曲、金银花
- C. 陈皮、甘草 D.
- 山楂、神曲 E.

茯苓、白术 答

案：D

解析：保和丸组成：山楂、神曲、半夏、茯苓、陈皮、连翘、莱菔子。方歌：保和山楂莱菔曲，夏陈茯苓连翘取，炊饼为丸白汤下，消食和胃食积去。

13. 下列属于槐花散功用的是

- A. 行气解郁
- B. 解表散邪
- C. 清热解毒
- D. 祛湿排脓
- E. 疏风行气

答案：E

解析：槐花散功用：清肠止血，疏风行气。

14. 治疗头微痛，恶寒无汗，咳嗽痰稀，鼻塞咽干，舌苔白，脉弦，应首选

- A. 麻黄汤 B.
- 止嗽散 C.
- 小青龙汤D.
- 桑杏汤 E.
- 杏苏散 答

案：E

解析：杏苏散主治：外感凉燥证。恶寒无汗，头微痛，咳嗽痰稀，鼻塞咽干，苔白脉弦。15. 止嗽散的组成药物中含有

- A. 防风
- B. 木香 C.
- 杏仁 D.
- 陈皮 E.
- 款冬花答

案：D

解析：止嗽散组成：桔梗、荆芥、紫菀、百部、白前、甘草、陈皮。方歌：止嗽散用百部菀，白前桔草荆陈研，宣肺疏风止咳痰，姜汤调服不必煎。

16. 川楝子在一贯煎中的作用是

- A. 疏肝理气
- B. 君药
- C. 臣药

D. 杀虫 E.

反佐药答

案: A

解析: 川楝子在一贯煎中的配伍意义: 肝体阴而用阳, 喜条达而恶抑郁, 故佐以少量川楝子, 疏肝泄热, 理气止痛, 复其条达之性。该药性苦寒, 但与大量甘寒滋阴养血药配伍, 则无苦燥伤阴之弊。

17. 下列主治气虚、外感风寒湿表证的方剂是

A. 黄芪建中汤

B. 败毒散

C. 防风通圣散

D. 补中益气汤

E. 葛根芩连汤

答案: B

解析: 败毒散主治气虚外感风寒湿证。憎寒 壮热, 头项强痛, 肢体酸痛, 无汗, 鼻塞声重, 咳嗽有痰, 胸膈痞满, 舌淡苔白, 脉浮而按之无力。

18. 身热汗多, 口渴心烦, 小便短赤, 体倦少气, 精神不振, 脉虚数, 治宜用

A. 银翘散 B.

大青龙汤

C. 九味羌活汤

D. 清暑益气汤

E. 麻杏石甘汤

答案: D

解析: 清暑益气汤主治: 暑热气津两伤证。身热汗多, 口渴心烦, 小便短赤, 体倦少气, 精神不振, 脉虚数。

19. 理中丸的功用是 A.

健脾益气, 渗湿止泻B.

温中健脾, 和里缓急C.

温中祛寒, 补气健脾D.

温中补虚, 降逆止呕E.

健脾益气, 养胃和中答

案: C

解析: 理中丸功用: 温中祛寒, 补气健脾。20.

天王补心丹的主治辨证要点是

A. 精神恍惚, 悲伤欲哭, 舌红苔少, 脉细B.

心悸失眠, 体倦食少, 舌淡, 脉细弱 C.

失眠, 惊悸, 舌红苔黄, 脉弦数

D. 失眠, 心悸, 手足心热, 舌红少苔, 脉细

数

E. 虚烦失眠, 咽干口燥, 舌红, 脉弦细

答案: D

解析: 天王补心丹主治: 阴虚血少, 神志不安证。心悸怔忡, 虚烦失眠, 神疲健忘, 或梦遗, 手足心热, 口舌生疮, 大便干结, 舌红少苔, 脉细数。

21. 下列抗菌药物中是治疗肺炎球菌肺炎首选的是

A. 青霉素 B.

红霉素 C.

四环素 D.

庆大霉素

E. 三代头孢菌素

答案: A

解析: 肺炎球菌肺炎是由肺炎链球菌感染引起。一经确诊应立即开始抗生素治疗, 不必等待细菌培养结果。对肺炎球菌肺炎, 青霉素G为首选; 对青霉素过敏者, 可选用红霉素, 林可霉素和一代头孢菌素。

22. 关于急性白血病的叙述, 不正确的是A.

出血的机制是凝血因子缺乏

B. 呈正细胞正色素性贫血

C. 是造血干细胞的恶性克隆性疾病

D. 半数以上患者以发热起病

E. 感染是最常见的死亡原因之一

答案: A

解析: 急性白血病出血与血小板减少有关。

23. 糖化血红蛋白A1 可反映平均血糖水平的时间是

A. 6~8 周

B. 8~12 周

C. 1~2 周

D. 2~4 周

E. 4~6 周

答案: B

解析: 糖化血红蛋白 A1 (GHbA1) 测定 GHbA1 可反映取血前 8~12 周的平均血糖状况, 是监测糖尿病病情的重要指标。

24. 关于肺心病的说法, 错误的是

A. COPD 病史最常见

B. 肺动脉瓣区 S₂亢进

C. 剑突下可触及心脏搏动

D. 下肢水肿

E. 心力衰竭以左心衰为主

答案：E

解析：肺源性心脏病患者，出现心力衰竭时，以右心衰竭为主。

25. 癫痫单纯部分性发作一般不超过

- A. 数十分钟
- B. 1 小时
- C. 不超过 1 分钟
- D. 数分钟
- E. 十数分钟

答案：C

解析：癫痫单纯部分性发作一般不超过 1 分钟，表现为简单的运动、感觉、自主神经或精神症状，发作时意识始终存在，发作后能复述发作的细节。

26. 肺癌常见的淋巴结转移部位是

- A. 颌下淋巴结
- B. 颞下淋巴结 C.
- 颈前淋巴结 D.
- 锁骨上淋巴结E.
- 腋窝淋巴结 答

案：D

解析：锁骨上淋巴结是肺癌常见的转移部位。

27. 慢性肾炎治疗措施中不做常规应用的是A.

避免有损肾功能的因素

- B. 应用血小板解聚药
- C. 糖皮质激素及细胞毒药物
- D. 积极控制血压
- E. 优质低蛋白饮食及低磷饮食

答案：C

解析：慢性肾小球肾炎的治疗：糖皮质激素和细胞毒药物不做常规应用，患者肾功能正常或仅轻度受损，肾脏体积正常，病理类型较轻（如轻度系膜增生性肾炎、早期膜性肾病等），尿蛋白较多者，如无禁忌证可试用。28.

与原发性肝癌发病最密切相关的是

- A. 戊型肝炎
- B. 自身免疫性肝炎
- C. 肝血管瘤
- D. 乙型肝炎
- E. 多囊肝

答案：D

解析：乙型病毒性肝炎病毒和丙型病毒性肝

炎病毒与原发性肝癌有着明显的相关性。

29. 可继发再生障碍性贫血的疾病是

- A. 慢性肾炎 B.
- 肾病综合征C.
- 急性胰腺炎D.
- 病毒性肝炎E.
- 糖尿病

答案：D

解析：再障可以发生于病毒性肝炎之后，且病情较重。

30. 救治急性一氧化碳中毒最有效的措施是

- A. 输注新鲜全血
- B. 输注浓缩红细胞悬液
- C. 应用呼吸兴奋剂
- D. 进行机械通气
- E. 高压氧治疗

答案：E

解析：救治急性一氧化碳中毒最有效的措施是高压氧治疗。

31. 有机磷杀虫药中毒时患者呼气的特异气味是

- A. 大蒜臭味
- B. 汗臭味 C.
- 烂苹果味D.
- 氨味
- E. 肝臭味

答案：A

解析：有机磷杀虫药中毒时呼出气、呕吐物有刺激性蒜臭味。

32. 洋地黄中毒引发的室早，首选的治疗措施是

- A. 立即停用洋地黄 B.
- 静脉注射利多卡因C.
- 休息
- D. 吸氧
- E. 停用排钾利尿剂

答案：A

解析：发生洋地黄中毒时应立即停药，并进行对症处理。

33. X 线钡餐检查诊断消化性溃疡的直接征象是

- A. 充盈缺损
- B. 胃壁蠕动减少呈皮革状
- C. 黏膜呈锯齿状增粗

- D. 有激惹及变形
E. 龛影

答案：E

解析：X线钡餐检查有直接和间接两种征象。直接征象为龛影，对溃疡的诊断有确诊意义。

34. 属于低血容量性休克的情况为

- A. 细胞性休克
B. 神经精神性休克
C. 失血性休克
D. 感染性休克
E. 过敏性休克

答案：C

解析：低血容量性休克一共有三类：失血性休克、失液性休克、创伤性休克。

35. 萎缩性胃炎，胃黏膜的病理改变是A.

- 糜烂，出血
B. 渗出
C. 苍白，颗粒状
D. 肥厚，粗糙 E.

充血，水肿 答

案：C

解析：胃镜检查：萎缩性胃炎黏膜苍白或灰白色，呈颗粒状，黏膜血管显露，皱襞细小。36. 癫痫单纯部分性发作一般不超过

- A. 数十分钟
B. 1 小时
C. 不超过 1 分钟
D. 数分钟
E. 十数分钟

答案：C

解析：癫痫单纯部分性发作一般不超过 1 分钟，表现为简单的运动、感觉、自主神经或精神症状，发作时意识始终存在，发作后能复述发作的细节。

37. 与原发肝癌发病最密切相关的是A.

- 戊型肝炎
B. 自身免疫性肝炎
C. 肝血管瘤
D. 乙型肝炎
E. 多囊肝

答案：D

解析：乙型病毒性肝炎病毒和丙型病毒性肝炎病毒与原发肝癌有着明显的相关性。

38. 骨髓增生异常综合征血象检查最明显的改变是

- A. 白细胞计数明显增多
B. 白细胞持续降低
C. 持续性全血细胞减少
D. 骨髓巨核细胞减少 E.
持续性全血细胞增多答

案：C

解析：骨髓增生异常综合征血象和骨髓象检查：持续性全血细胞减少，一系减少少见，多为红细胞减少， $Hb < 100g/L$ ，中性粒细胞 $< 1.8 \times 10^9/L$ ，血小板 $< 100 \times 10^9/L$ 。

39. 富含嘌呤的食物是

- A. 牛奶
B. 鸡蛋
C. 动物内脏
D. 黄瓜
E. 米饭

答案：C

解析：高尿酸血症及痛风患者应该低嘌呤饮食甚至暂时禁食富含嘌呤食物，嘌呤含量高的食物如虾、蟹、贝类、沙丁鱼、动物内脏、肉类、啤酒等。

40. 肠套叠可见腹痛，并伴有的症状是

- A. 急性发热
B. 黄疸C.
呃逆 D.
腹泻 E.
血便 答

案：E

解析：腹痛伴血便，急性者见于急性细菌性痢疾、肠套叠、绞窄性肠梗阻、急性出血性坏死性结肠炎、过敏性紫癜等；慢性者可见于慢性菌痢、肠结核、结肠癌等；柏油样便提示上消化道出血；鲜血便提示下消化道出血。

41. 患者 X 线下见两肺上部有多发的厚壁空洞，周围有较广泛的纤维条索影。应首先考虑的疾病为

- A. 肺大泡
B. 肺脓肿
C. 浸润型肺结核空洞形成
D. 慢性纤维空洞型肺结核
E. 周围型肺癌空洞形成

答案：D

解析：慢性纤维空洞型肺结核 X 线主要表现为两肺上部多发厚壁的慢性纤维病变及空洞，周围有广泛的纤维条索影及散在的新老病灶，常伴有明显的胸膜肥厚，病变的肺因纤维化而萎缩，出现肺不张征象，上叶萎缩使肺门影向上移位，下肺野血管纹理牵引向上及下肺叶的代偿性肺气肿，使膈肌下降、平坦，肺纹理被拉长呈垂柳状。

42. 下列哪项是甲状腺功能减退病人可见的面容

- A. 黏液性水肿面容
- B. 苦笑面容
- C. 无欲貌
- D. 满月脸
- E. 肢端肥大症面容

答案：A

解析：黏液性水肿面容表现为面色苍白，睑厚面宽，颜面浮肿，目光呆滞，反应迟钝，眉毛。头发稀疏，舌色淡、肿大。见于甲状腺功能减退症。

43. 风湿热引起发热的主要原因是

- A. 坏死物质吸收
- B. 内分泌与代谢障碍
- C. 产热过多
- D. 散热过少
- E. 抗原-抗体反应

答案：E

解析：抗原-抗体反应如风湿热、血清病、药物热、系统性红斑狼疮、皮炎、类风湿关节炎等。

44. 可引起阻塞性黄疸的疾病是

- A. 蚕豆病
- B. 病毒性肝炎
- C. 胰头癌
- D. 系统性红斑狼疮
- E. 毒蕈中毒

答案：C

解析：阻塞性黄疸：以 CB 增高为主，见于胆石症、胰头癌、肝癌等。

45. 胆囊触痛征（墨菲征）阳性，见于A.

- 胰头癌
- B. 肝癌
- C. 急性胆囊炎

D. 肝硬化

E. 胆囊癌

答案：C

解析：墨菲征的检查方法：医生将左手掌平放在被检者的右肋，拇指放在胆囊点，用中等压力按压腹壁，然后嘱被检者缓慢深呼吸，如果深吸气时被检者因疼痛而突然屏气，则称胆囊触痛征，墨菲征阳性，见于急性胆囊炎。

46. 红细胞直径 $>15\mu\text{m}$ 见于

- A. 溶血性贫血
- B. 失血性贫血
- C. 缺铁性贫血
- D. 巨幼细胞贫血
- E. 再生障碍性贫血

答案：D

解析：红细胞直径 $>15\mu\text{m}$ 。见于巨幼细胞贫血。

47. 导致内出血低热的原因可能是

- A. 代谢障碍
- B. 植物神经功能紊乱
- C. 无菌性坏死物质吸收
- D. 继发感染
- E. 失血导致体温调节中枢功能障碍

答案：C

解析：导致内出血低热的原因是无菌性坏死物质吸收。

48. 多发生脊柱前凸的部位是

- A. 腰椎
- B. 骶椎
- C. 颈段
- D. 颈胸段
- E. 胸段

答案：A

解析：脊柱前凸多发生于腰段，见于大量腹水、腹腔巨大肿瘤、髋关节结核及髋关节后脱位等。

49. 下列疾病，不出现杵状指（趾）的是A.

- 支气管扩张
- B. 肺癌
- C. 发绀型先天性心脏病
- D. 佝偻病
- E. 亚急性感染性心内膜炎

答案：D

解析：杵状指（趾）常见于支气管扩张、支气管肺癌、慢性肺脓肿、脓胸以及发绀型先天性心脏病、亚急性感染性心内膜炎等。50. 下列各项，不会出现血小板减少的疾病是

- A. 急性放射病
- B. 急性大失血
- C. 脾功能亢进
- D. 急性白血病
- E. 再生障碍性贫血

答案：B

解析：血小板减少①生成障碍：见于再生障碍性贫血、急性白血病、急性放射病、骨髓纤维化晚期等。②破坏或消耗增多：见于原发性血小板减少性紫癜、脾功能亢进、系统性红斑狼疮、淋巴瘤、DIC、血栓性血小板减少性紫癜等。③分布异常：见于脾肿大，如肝硬化。

51. 下列最不符合Ⅲ度房室传导阻滞的是

- A. QRS 波群形态正常
- B. QRS 波群宽大畸形
- C. P 与 QRS 无固定关系
- D. 心房率快于心室率
- E. 心房率慢于心室率

答案：E

解析：三度房室传导阻滞（完全性房室传导阻滞）①P 波和 QRS 波群无固定关系，P-P 与 R-R 间距各有其固定的规律性。②心房率 > 心室率。③QRS 波群形态正常或宽大畸形。

52. 无尿是尿量小于

- A. 7ml/h
- B. 100ml/24h
- C. 400ml/h
- D. 100ml/h
- E. 17ml/24h

答案：B

解析：尿量 < 400ml/24h 或 < 17ml/h 为少尿；尿量 < 100ml/24h 为无尿。

53. 稽留热 24 小时内温差为

- A. 1℃ 以上
- B. 2℃ 以上
- C. 3℃ 以上
- D. 1℃ 以下
- E. 2℃ 以下

答案：D

解析：稽留热：体温持续于 39℃~40℃ 以上，24 小时波动范围不超过 1℃，达数日或数周。见于肺炎链球菌性肺炎、伤寒、斑疹伤寒高热期。

54. 声音嘶哑的咳嗽多由于

- A. 纵膈肿瘤
- B. 支气管癌
- C. 声带炎
- D. 支气管哮喘
- E. 支气管炎

答案：C

解析：声音嘶哑的咳嗽多见于声带炎、喉炎、喉癌，以及喉返神经受压迫；犬吠样咳嗽多见于喉头炎症水肿或气管受压；无声（或无力）咳嗽可见于极度衰弱或声带麻痹的患者；带有鸡鸣样吼声常见于百日咳；金属调的咳嗽可由于纵膈肿瘤或支气管癌等直接压迫气管所致。

55. 小量咯血是 24 小时咯血量不超过

- A. 100ml
- B. 300ml
- C. 400ml
- D. 500ml
- E. 1000ml

答案：A

解析：大量咯血是每日超过 500ml。中等量咯血是每日 100~500ml。小量咯血是每日在 100ml 以内。

56. 医学伦理学的研究对象是

- A. 医学道德难题
- B. 医学道德关系
- C. 医学基本理论
- D. 医学基本规范
- E. 医学基本原则

答案：B

解析：医学伦理学的研究对象是医学活动中的道德现象和道德关系。

57. 被尊称为“坐堂大夫”的医家是

- A. 华佗
- B. 张仲景
- C. 孙思邈
- D. 葛洪
- E. 薛生白

答案：B

解析：张仲景任长沙太守时，仍不忘为百姓诊治疾病。被尊称为“坐堂大夫”。

58. 下列除哪项外均是医德品质的内容A.

公正

B. 严谨C.

奉献D.

乐观E.

仁爱答

案：D

解析：医德品质的内容：（1）仁爱；（2）严谨；（3）诚挚；（4）公正；（5）奉献。

59. 患者权利包括

A. 平等享有医疗的权利

B. 获得自己所患疾病真实情况

C. 拒绝治疗的权利

D. 监督医疗过程的权利

E. 以上都是

答案：E

解析：患者权利包括：平等享有医疗的权利，获得自己所患疾病真实情况，共同参与诊断和医疗方案的制订和实施等知情同意的权利，监督医疗过程的权利，对个人隐私保密的权利，拒绝治疗，拒绝参加临床试验的权利。

60. 不属于医患之间非技术关系的是

A. 经济关系

B. 法律关系

C. 道德关系

D. 同事关系

E. 价值关系

答案：D

解析：医患间非技术方面的关系是指医患交往过程中在社会、法律、道德、心理、经济等方面建立起来的人际关系。如医患间的道德关系、经济关系、价值关系、法律关系等。61. 医患关系模式正确的是

A. 主动-合作型，相互-指导型，共同参与型 B.

主动-配合型，指导-合作型，共同参与型 C. 主动-

被动型，指导-合作型，共同参与型D. 主动-

被动型，共同参与型，父权主义型E. 主动-

被动型，互相-合作型，平等参与型答案：C

解析：医患关系的基本模式为主动-被动型，

指导-合作型，共同参与型。

A2

62. 患者手足厥寒，腰腿疼痛，口不渴，舌淡苔白，脉沉细。治宜首选的是

A. 桂枝汤倍桂枝

B. 桂枝汤去芍药

C. 桂枝汤倍芍药

D. 桂枝汤倍芍药，加饴糖

E. 桂枝汤去生姜，倍大枣，加当归、通草、细辛

答案：E

解析：当归四逆汤主治：血虚寒厥证。手足厥寒，或腰、股、腿、足、肩臂疼痛，口不渴，舌淡苔白，脉沉细或细而欲绝。本方以桂枝汤去生姜，倍大枣，加当归、通草、细辛组成。

63. 患者牙痛牵引头疼，面颊发热，口气热臭，舌红苔黄，脉滑数。治宜首选的方剂是A. 黄连解毒汤

B. 左金丸

C. 导赤散

D. 白虎汤

E. 清胃散

答案：E

解析：清胃散主治：胃火牙痛。牙痛牵引头疼，面颊发热，其齿喜冷恶热，或牙宣出血，或牙龈红肿溃烂，或唇舌腮颊肿痛，口气热臭，口干舌燥，舌红苔黄，脉滑数。

64. 患者气喘咳嗽，皮肤蒸热，日晡尤甚，舌红苔黄，脉细数。治宜首选的方剂是

A. 龙胆泻肝汤

B. 左金丸

C. 泻白散

D. 导赤散

E. 苇茎汤

答案：C

解析：泻白散主治：肺热喘咳证。气喘咳嗽，皮肤蒸热，日晡尤甚，舌红苔黄，脉细数。65. 患者女，70岁。COPD病史多年，每年冬季发作，查体呈桶状胸，双肺叩诊呈过清音，心浊音界缩小，呼吸音减弱，肺功能检查显

示 $79\% > FEV_1 \geq 50\%$ ，COPD 严重程度分级是

- A. 1 级
- B. 2 级
- C. 3 级
- D. 4 级
- E. 5 级

答案：B

解析：根据 COPD 严重程度分级患者应为 II 级。1 级（轻度）： $FEV_1 \geq 80\%$ 预计值，有或无慢性咳嗽、咳痰症状。2 级（中度）： $79\% > FEV_1 \geq 50\%$ 预计值，有或无慢性咳嗽、咳痰症状。3 级（重度）： $49\% > FEV_1 \geq 30\%$ 预计值；有或无慢性咳嗽、咳痰症状。4 级（极重度）： $FEV_1 < 30\%$ 预计值或 $FEV_1 < 50\%$ ，伴呼吸衰竭。

66. 男性，65 岁，高血压病史 14 年，今晨起床突然发现右侧肢体瘫痪，感觉障碍伴有失语，经检查诊断为动脉血栓性脑梗死，其最可能的梗死部位是

- A. 左侧大脑中动脉
- B. 右侧大脑中动脉
- C. 左侧大脑前动脉
- D. 右侧大脑前动脉
- E. 椎-基底动脉

答案：A

解析：患者“肢体瘫痪、感觉障碍伴有失语”提示病变部位在大脑中动脉，且为右侧肢体瘫痪，而大脑中动脉病变为对侧偏瘫，因此选左侧大脑中动脉。常见脑动脉闭塞的表现：（1）大脑中动脉：出现典型的“三偏征”，即病变对侧偏瘫、偏身感觉障碍和同向偏盲，优势半球病变伴失语。（2）大脑前动脉：病变对侧中枢性面、舌瘫；下肢重于上肢的偏瘫；对侧足、小腿运动和感觉障碍；排尿障碍；可有强握、吸吮反射、精神障碍。（3）椎-基底动脉：可突发眩晕、呕吐、共济失调。并迅速出现昏迷、面瘫、四肢瘫痪、去脑强直、眼球固定、瞳孔缩小、高热。可因呼吸、循环衰竭而死亡。

67. 中年男性，既往有肺结核病史，近 1 个月咳嗽、咳痰、痰中带血，伴发热、消瘦就诊，为排除肺癌最有鉴别意义的是

- A. 原发病史
- B. 全身中毒症状

- C. 咳嗽、咳痰、咯血症状
- D. 血沉增快
- E. 痰液检查

答案：E

解析：痰脱落细胞是简单而有效的早期诊断方法，并能进行组织学检查。非小细胞肺癌的阳性率较小细胞肺癌者高，可达 70%~80%。

68. 女性，54 岁，腹部 B 超检查发现肝占位性病变，查肝功能正常。最有助于诊断或排除原发性肝癌的是

- A. γ -GT
- B. AFP
- C. AST
- D. ALT
- E. LPH

答案：B

解析：甲胎蛋白（AFP）是当前诊断肝细胞癌最特异的标志物。检测血清中 AFP，有助于原发性肝癌的早期诊断。

69. 女性，32 岁，因双侧腰背酸痛，尿频，尿急，尿痛 7 天就诊，体温 39°C ，双肾叩击痛（+）。尿检：蛋白（+），脓细胞（+++），红细胞（+），最可能的诊断是

- A. 急性肾炎
- B. 急性膀胱炎
- C. 肾结核
- D. 急性肾盂肾炎
- E. 慢性肾盂肾炎

答案：D

解析：急性肾盂肾炎常发生于育龄妇女，临床表现有：①泌尿系统症状：膀胱刺激征、腰痛和（或）下腹部痛、肋脊角及输尿管点压痛、肾区压痛和叩击痛；腰痛程度不一，多为钝痛、酸痛；②全身感染症状：寒战、发热、头痛、恶心呕吐、食欲不振等，体温多在 $38^{\circ}\text{C} \sim 39^{\circ}\text{C}$ ，常伴有血白细胞计数升高和血沉增快。血常规急性肾盂肾炎时，血白细胞及中性粒细胞可升高。尿常规出现白细胞管型多提示为肾盂肾炎。

70. 男性，37 岁，确诊为急粒细胞白血病，近 2 周出现发热，坐位站立时黑矇、头晕、极度乏力，急查血常规血红蛋白 47g/L ，纠正贫血快速有效的方法是

- A. 补充铁剂
- B. 输注全血
- C. 口服铁剂
- D. 应用促红细胞生成素
- E. 输用浓缩红细胞

答案：E

解析：急性白血病严重贫血输用浓缩红细胞。

71. 女性，29岁，孕5月，确诊为甲亢，最适当的治疗是

- A. 甲状腺次全切除
- B. 最小有效剂量硫脲类药物
- C. 放射性碘治疗
- D. 普萘洛尔
- E. 甲巯咪唑

答案：B

解析：患者为孕妇，所以治疗甲亢用药宜从最小有效剂量开始。甲状腺功能亢进的治疗：

抗甲状腺药物（ATD）有硫脲类（如丙硫氧嘧啶）和咪唑类（如甲巯咪唑和卡比马唑）两类药物。适应证：①病情轻、中度患者；②甲状腺轻、中度肿大；③年龄 <20 岁；④孕妇、高龄或由于其他严重疾病不适宜手术者；

⑤手术前和 ^{131}I 治疗前的准备；⑥手术后复发且不适宜 ^{131}I 治疗者。分为初治、减量和维持期3个阶段，疗程通常在1.5~2.5年或以上。治疗期每4周复查一次血清甲状腺激素水平，维持期每2个月复查一次血清甲状腺激素。不良反应有粒细胞减少、药疹和中毒性肝病。

72. 男性，38岁。甲亢复发。查体：轻度突眼，甲状腺弥漫性肿大，心率120次/分。

实验室检查：FT₃，FT₄，TSH₄，AST中度升高，血WBC $3.8\times 10^9/\text{L}$ 。适宜的治疗措施是

- A. 抗甲状腺药物治疗
- B. 复方碘溶液
- C. 甲状腺手术治疗
- D. 抗甲状腺药物+糖皮质激素
- E. 放射性 ^{131}I 治疗

答案：E

解析：患者为甲亢复发，所以用放射性 ^{131}I 治疗。放射性 ^{131}I 治疗：甲状腺能高度摄取和浓集碘， ^{131}I 衰减时释出大量 β 射线（在组织内的射程约2mm）可破坏甲状腺滤泡上

皮而减少TH分泌，并可抑制甲状腺内淋巴细胞的抗体生成。此法安全简便，费用低廉，临床治愈率高，复发率低。适应证：①成人GD伴甲状腺肿大II度以上；②ATD治疗失败或过敏；③甲亢手术后复发；④甲状腺毒症心脏病或甲亢伴其他病因的心脏病；⑤甲亢合并白细胞和（或）血小板减少或全血细胞减少；⑥甲亢合并肝、肾等脏器损害。⑦拒绝手术治疗或有手术禁忌证者。⑧浸润性突眼者。禁忌证：妊娠和哺乳期妇女。主要并发症为甲状腺功能减退，发生甲减后均需用甲状腺素替代治疗。

73. 女性，58岁。甲状腺I度肿大，反应迟钝，厌食，腹泻。实验室检查：FT₃↑，TT₄正常，TSH↓，甲状腺摄 ^{131}I 率正常。诊断是

- A. 亚急性甲状腺炎
- B. 亚临床型甲亢
- C. T₃型甲亢
- D. 甲状腺危象
- E. 淡漠型甲亢

答案：C

解析：甲亢的诊断①高代谢症状和体征；②甲状腺肿大；③血清TT₃、FT₃、TT₄、FT₄增高，TSH减低。具备以上3项诊断即可成立。根据题干可知患者仅FT₃增高为T₃型甲亢。

74. 患者因怕热、多汗、心悸、甲状腺肿大等诊断为甲亢，心电图检查为心律失常，最可能出现的心律失常是

- A. 室性早搏
- B. 交界性早搏
- C. 阵发性室上性心动过速
- D. 房颤
- E. 房室传导阻滞

答案：D

解析：在甲亢中心律失常主要是以心房颤动、房性早搏等房性心律失常为多见。

75. 男性，55岁，消化性溃疡病史15年，近2个月疼痛复发，经8周内科药物治疗无效，粪便隐血试验持续阳性，最可能的诊断是

- A. 胃溃疡活动
- B. 十二指肠溃疡活动
- C. 胃溃疡癌变
- D. 慢性胃炎
- E. 慢性胃炎

答案：A

解析：患者为胃溃疡活动，所以用放射性 ^{131}I 治疗。放射性 ^{131}I 治疗：甲状腺能高度摄取和浓集碘， ^{131}I 衰减时释出大量 β 射线（在组织内的射程约2mm）可破坏甲状腺滤泡上

皮而减少TH分泌，并可抑制甲状腺内淋巴细胞的抗体生成。此法安全简便，费用低廉，临床治愈率高，复发率低。适应证：①成人GD伴甲状腺肿大II度以上；②ATD治疗失败或过敏；③甲亢手术后复发；④甲状腺毒症心脏病或甲亢伴其他病因的心脏病；⑤甲亢合并白细胞和（或）血小板减少或全血细胞减少；⑥甲亢合并肝、肾等脏器损害。⑦拒绝手术治疗或有手术禁忌证者。⑧浸润性突眼者。禁忌证：妊娠和哺乳期妇女。主要并发症为甲状腺功能减退，发生甲减后均需用甲状腺素替代治疗。

73. 女性，58岁。甲状腺I度肿大，反应迟钝，厌食，腹泻。实验室检查：FT₃↑，TT₄正常，TSH↓，甲状腺摄 ^{131}I 率正常。诊断是

- A. 亚急性甲状腺炎
- B. 亚临床型甲亢
- C. T₃型甲亢
- D. 甲状腺危象
- E. 淡漠型甲亢

答案：C

解析：甲亢的诊断①高代谢症状和体征；②甲状腺肿大；③血清TT₃、FT₃、TT₄、FT₄增高，TSH减低。具备以上3项诊断即可成立。根据题干可知患者仅FT₃增高为T₃型甲亢。

74. 患者因怕热、多汗、心悸、甲状腺肿大等诊断为甲亢，心电图检查为心律失常，最可能出现的心律失常是

- A. 室性早搏
- B. 交界性早搏
- C. 阵发性室上性心动过速
- D. 房颤
- E. 房室传导阻滞

答案：C

解析：若胃溃疡患者年龄在 45 岁以上、疼痛的节律性消失、食欲减退、体重明显减轻、粪便隐血试验持续阳性、内科治疗效果较差者，应疑诊癌变的可能。

76. 女性，30 岁，尿痛、尿频、尿急 2 天，伴发热、腰痛、恶心、呕吐，血压 120/80mmHg，尿常规检查有红、白细胞及白细胞管型，其诊断可能是

- A. 急性膀胱炎
- B. 急性肾盂肾炎
- C. 慢性肾盂肾炎
- D. 急性肾炎
- E. 慢性肾炎

答案：B

解析：急性肾盂肾炎常发生于育龄妇女，临床表现有：①泌尿系统症状：膀胱刺激征、腰痛和（或）下腹部痛、肋脊角及输尿管点压痛、肾区压痛和叩击痛；腰痛程度不一，多为钝痛、酸痛；②全身感染症状：寒战、发热、头痛、恶心呕吐、食欲不振等，体温多在 38℃~39℃，常伴有血白细胞计数升高和血沉增快。血常规急性肾盂肾炎时，血白细胞及中性粒细胞可升高。尿常规出现白细胞管型多提示为肾盂肾炎。

77. 女性，48 岁，反复尿频、尿急、尿痛、夜尿增多、低热 1 年余，近 2 天来高热，上述症状加剧入院。每次发作抗菌素治疗有效，既往有肺结核病史，血压 165/95mmHg，尿蛋白（+），白细胞 8 个/HP，静脉肾盂造影示肾盂肾盏瘢痕狭窄扩张，尿菌培养阴性，诊断最可能的

- A. 慢性肾小球肾炎
- B. 慢性肾盂肾炎
- C. 急性肾盂肾炎
- D. 肾结石
- E. 肾结核

答案：B

解析：慢性肾盂肾炎诊断要点：①反复发作的尿路感染病史；②影像学显示肾外形凹凸不平且双肾大小不等，或静脉肾盂造影见肾盂肾盏变形、缩窄；③合并持续性肾小管功能损害。

78. 女性，20 岁，因疲乏、无力、烦躁、易激动、注意力不集中等就诊，诊断为缺铁性贫血，支持该诊断检查结果是

- A. 血清铁浓度正常
- B. 总铁结合力降低
- C. 转铁蛋白饱和度升高
- D. 血清铁蛋白降低
- E. 骨髓铁染色弱阳性

答案：D

解析：符合以下条件诊断为缺铁性贫血：①贮铁耗尽①血清铁蛋白 < 12 μg/L；②骨髓铁染色阴性，铁粒幼红细胞 < 15%。具备其中一条即可。②缺铁性红细胞生成①符合贮铁耗尽的诊断；②血清铁 < 8.95 μmol/L，总铁结合力 > 64.4 μmol/L，转铁蛋白饱和度 < 15%；FEP/Hb > 4.5 μg/gHb。

79. 男性，56 岁，身高 175cm，体重 75kg，因 2 个月内体重下降 5kg 而就诊，查空腹血糖 7.9mmol/L，下列正确的是

- A. 可诊断糖尿病
- B. 应进行口服葡萄糖耐量试验
- C. 可诊断继发性糖尿病
- D. 可诊断糖耐量减低
- E. 应进行 100g 口服葡萄糖耐量试验

答案：A

解析：患者 2 个月内体重下降 5kg 并伴有空腹血糖 7.9mmol/L ≥ 7.0mmol/L 因此诊断为糖尿病。糖尿病诊断标准：1. 空腹血糖：3.9~6.0mmol/L 为正常；6.1~6.9mmol/L 为空腹血糖受损；≥7.0mmol/L 应考虑糖尿病。2. 口服葡萄糖耐量试验：2hPG 低于 7.7mmol/L 为正常糖耐量；7.8~11.0mmol/L 为糖耐量减低；≥11.1mmol/L 应考虑糖尿病。3. 糖尿病的诊断标准：糖尿病症状加任意时间血浆葡萄糖 ≥ 11.1mmol/L 或空腹血糖 ≥ 7.0mmol/L，或口服葡萄糖耐量试验 2hPG ≥ 11.1mmol/L。需重复一次确认，诊断才能成立。

80. 男性，39 岁，发作时先觉胃部一股气体上升，并有咀嚼、吞咽动作，喃喃自语，走动，似在找东西，呼唤无反应，持续约 4 分钟。其癫痫的发作类型是

- A. 强直-阵挛性发作
- B. 失神发作

- C. 复杂部分性发作
- D. 脑缺血发作
- E. 假性发作

答案：C

解析：根据患者癫痫发作时的症状“先觉胃部一股气体上升，并有咀嚼、吞咽动作，喃喃自语，走动，似在找东西，呼唤无反应，持续约4分钟。”可知为癫痫复杂部分性发作。癫痫复杂部分性发作：均有意识障碍，发作时患者对外界刺激无反应，发作后不能或部分不能复述发作的细节。其典型发作特征为发作起始出现错觉、幻觉、似曾相识感、恐惧、胃气上升感、心悸等症状，随后出现意识障碍、自动症和遗忘症；有时发作开始即为意识障碍，持续数分钟至数十分钟；有的仅有意识障碍。自动症患者往往先瞪视不动，然后做出协调无意识

81. 患者高热、胸痛、咳嗽、咳痰，经检查诊断为肺炎链球菌肺炎，其治疗应首选的药物

- A. 青霉素
- B. 红霉素
- C. 甲硝唑
- D. 氧氟沙星
- E. 头孢唑啉钠

答案：A

解析：肺炎链球菌肺炎一经确诊即应予以抗生素治疗，不必等待细菌培养结果。首选青霉素G，用药途径及剂量视病情轻重及有无并发症而定。对青霉素过敏者，可用红霉素或阿奇霉素、林可霉素等。

82. 患者59岁，COPD病史11年，近来因咳嗽、喘加重就诊，查体示P2亢强，剑突下可触及心脏搏动，该患者最可能的诊断是

- A. 合并支气管肺炎
- B. 合并支气管扩张
- C. 合并冠心病
- D. 慢性肺源性心脏病
- E. COPD急性加重期

答案：D

解析：依据病史诊断为慢性肺源性心脏病。患者COPD病史11年，近来咳嗽、喘加重。且P2亢强，剑突下可触及心脏搏动是肺动脉高压和右心室肥大的表现，符合慢性肺源性心脏病的临床表现：1. 原发疾病表现 COPD

病史最常见。2. 肺动脉高压和右心室肥大体征（1）肺动脉高压：肺动脉瓣区S2亢进。

（2）右心室肥大：心浊音界向左扩大，剑突下触及心脏收缩期搏动，三尖瓣区闻及收缩期杂音。

83. 男性，36岁，反复浮肿，高血压4年，近日气喘明显，深大呼吸，查血红蛋白60g/L，双肺呼吸音清晰，未闻及啰音，心率92次/分，节律整齐。患者气喘最可能的原因是

- A. 心功能不全
- B. 贫血
- C. 酸中毒
- D. 上呼吸道感染
- E. 水肿

答案：C

解析：患者无明显其他疾病，高血压4年，反复浮肿，考虑慢性肾衰竭导致代谢产物潴留，电解质和酸碱平衡失调及各系统损害的临床综合征，严重酸中毒时出现深大呼吸。

84. 女性，54岁，类风湿关节炎病史5年，可生活自理，不能参加工作，活动受限，其关节功能障碍的分级是

- A. I级
- B. II级
- C. III级
- D. IV级
- E. V级

答案：C

解析：关节功能障碍分级应为II级。关节功能障碍分为4级：I级：能照常进行日常生活和工作；II级：能生活自理，并参加一定工作，但活动受限；III级：仅能生活自理，不能参加工作和其他活动；IV级：生活不能自理。

85. 女性，29岁，因手部关节疼痛、肿胀就诊。发病前有病毒性呼吸道感染史，慢性起病，逐渐加重。下列检查结果中，有助于鉴别类风湿关节炎与系统性红斑狼疮的是

- A. 轻度贫血
- B. 血沉增快
- C. C反应蛋白升高
- D. 心脏超声示少量心包积液
- E. 手部X线检查未见骨质改变

答案：E

解析：手部 X 线检查是否见骨质改变是二者主要区别。系统性红斑狼疮早期出现手部关节炎时，须与类风湿关节炎相鉴别。系统性红斑狼疮特点：①X 线检查无关节骨质改变；②多为女性；③常伴有面部红斑等皮肤损害；④多数有肾损害或多脏器损害；⑤血清抗核抗体和抗双链 DNA 抗体显著增高。

86. 女性，47 岁，既往健康，晨练时突然出现剧烈头痛伴喷射性呕吐，拟诊为蛛网膜下腔出血，尽快确诊应首选的检查是

- A. 脑血流图
- B. 脑脊液检查
- C. 脑血管造影
- D. 出凝血项目检测
- E. 免疫学检查

答案：B

解析：蛛网膜下腔出血腰穿如果有脑脊液呈血性，即可给予确诊。所以选 B。

87. 急性上消化道出血患者，查体心率 122 次/分，血压 70/50mmHg，估计患者出血量至少是

- A. 500mL
- B. 1000mL
- C. 1200mL
- D. 1500mL
- E. 2000mL

答案：D

解析：患者急性上消化道出血，且心率为 122 次/分，血压 70/50mmHg，考虑发生失代偿性休克。估计出血量：数小时内出血量 > 1500ml（循环血容量的 30%），发生失代偿性休克。根据收缩压可估计失血量，血压降至 90~100mmHg 时，失血量约为循环血容量的 20%；血压降至 60~80mmHg 时，失血量约为循环血容量的 30%；血压降至 40~50mmHg 时，失血量 > 循环血容量的 40%。提示严重出血的征象是：收缩压 < 80mmHg 或较基础压降低 > 25%；心率 > 120 次/分，血红蛋白 < 70g/L。故此题选 D。

88. 女性，45 岁，上腹痛 2 天，呕吐，腹胀，血淀粉酶 750U/L（Somogyi），血压 80/50mmHg，脉搏 120 次/分，最可能的诊断为

- A. 急性胃炎
- B. 急性胰腺炎
- C. 急性心肌梗死
- D. 急性肾功能衰竭
- E. 急性肝炎

答案：B

解析：根据患者腹痛、呕吐、腹胀等症状及实验室检查，考虑为急性胰腺炎

89. 男性，40 岁，慢性肝炎病史 14 年，近来腹胀、消瘦。查体：巩膜黄染，右上腹部触到拳头大、质硬、表面不光滑包块。最可能的诊断是

- A. 原发性肝癌
- B. 转移性肝癌
- C. 慢性活动性肝炎
- D. 肝脓肿
- E. 肝硬化

答案：A

解析：凡有肝病史的中年人，尤其是男性患者，如有不明原因的肝区疼痛、消瘦、进行性肝肿大，肝质地坚硬，边缘不规则，表面呈结节状应考虑原发性肝癌，需进一步明确诊断。

90. 男，24 岁。突然意识不清，跌倒，全身强直数秒钟后抽搐，咬破舌。2 分钟后抽搐停止。醒后活动正常。首选应考虑的疾病是

- A. 脑出血
- B. 脑血栓
- C. 蛛网膜下腔出血
- D. 癫痫
- E. 脑栓塞

答案：D

解析：由于脑供血不足所引起的短暂性、弥漫性缺血性晕厥与癫痫发作的主要区别是前者的缺血症状多于刺激症状，肢体的无力、肌张力低下更多见。脑源性的晕厥多有动脉硬化的指征。癫痫全身发作，可表现意识丧失，双侧强直后紧接着有阵挛的序列活动；全身骨骼肌持续性收缩；眼球上翻或凝视，咀嚼肌收缩出现口强张，随后猛烈闭合，之后转为痉挛，过后肌张力松弛，意识逐渐恢复。

91. 应进一步做的检查是

- A. 头颅 X 线片

- B. 脑电图
- C. 脑脊液检查
- D. 脑血管造影
- E. 经颅超声多普勒 (TCD)

答案: B

解析: 脑电图是诊断癫痫最重要的辅助诊断依据。

92. 治疗的首选药物是

- A. 降颅压药
- B. 溶栓治疗
- C. 止血药
- D. 扩血管药
- E. 抗癫痫药

答案: E

解析: 通过脑电图与临床症状诊断为癫痫, 因此服用抗癫痫药。

93. 男性, 55 岁的心房颤动患者, 近期反复出现发作性眩晕, 眼球震颤, 伴有恶心、呕吐, 每次持续 10 分钟。查体无神经系统异常。急诊 CT 未发现与症状相关的病灶。目前可能的诊断是

- A. 脑动脉瘤
- B. 脑血栓形成
- C. 脑出血
- D. 脑血管畸形
- E. 短暂性脑缺血发作

答案: E

解析: 发作性的运动性失语, 均于 24 小时内缓解, 查体无神经系统异常, 脑 CT 无异常, 符合短暂性脑缺血发作。

94. 出现以上症状及体征, 完全恢复最长应在

- A. 6 小时内
- B. 12 小时内
- C. 24 小时内
- D. 48 小时内
- E. 72 小时内

答案: C

解析: 短暂性脑缺血发作 (TIA) 是指局部脑动脉血供不足引起局部脑组织或视网膜缺血, 出现短暂的神经功能缺失的一组疾病, 临床症状一般持续不超过 1 小时, 24 小时内完全恢复, 无本次事件的责任病灶的证据。

95. 预防复发应首先的药物是

- A. 阿司匹林
- B. 低分子右旋糖酐
- C. 丙戊酸钠
- D. 胞二磷胆碱
- E. 降纤酶

答案: A

解析: 血小板抑制剂, 如阿司匹林, 可减少栓子发生, 预防复发。

96. 男, 45 岁。吃海鲜后夜间突发左足第 1 跖趾关节剧烈疼痛 1 天。查体关节局部红肿, 压痛明显。既往无类似发作。化验: 血尿酸 602mmol/L。目前最主要的治疗药物是

- A. 苯溴马隆
- B. 别嘌醇
- C. 抗生素
- D. 非甾体类抗炎药
- E. 甲氨蝶呤

答案: D

解析: 痛风急性发作期的治应尽早 (24h 以内) 使用非甾体消炎药、秋水仙碱和糖皮质激素可有效抗炎镇痛, 发作间歇期和慢性期从小剂量开始应用降尿酸药。

97. 不恰当的治疗和处理的

- A. 足部制动, 抬高患肢
- B. 使用激素
- C. 口服秋水仙碱
- D. 禁酒
- E. 口服吲哚美辛

答案: B

解析: 糖皮质激素的应用需要注意, 只有在非甾体消炎药和秋水仙碱治疗无效或不耐受者, 以及肾功能不全的患者, 才考虑短期单用。

98. 13 岁女性, 两年前起病, 于生气后突然大叫一声, 随之倒地呼之不应, 牙关紧闭, 双眼上视, 头颈后仰, 四肢抽搐, 无二便失禁, 无舌咬伤。发作停止后对整个过程中不能回忆, 未给予特殊处置, 照常上学。2 个月于夜间入睡后又出现抽搐, 有小便失禁, 抽搐停止后, 突然起床冲出门外。无目的漫游, 呼之不应, 冲动毁物, 持续 2 小时后恢复清醒, 对经过全无记忆。此后反复有类似发作, 平均每月 3 次。在以下检查中最

可能见到异常的是

- A. 心理测试
- B. CT
- C. MRI
- D. EEG
- E. 头颅平片

答案：D

解析：考虑患者为癫痫，故应查 EEG（脑电图）。

99. 该患者最可能的诊断是

- A. 神经症
- B. 癔症
- C. 急性应激障碍
- D. 癫痫
- E. 脑肿瘤所致精神障碍

答案：D

解析：由于异常放电的起始部位和传递方式的不同，癫痫发作的临床表现复杂多样，可表现为发作性运动、感觉、自主神经、意识及精神障碍。以突发意识丧失、全身强直、抽搐为特征，典型的发作过程可分为强直期、阵挛期和发作后期。一次发作持续时间一般小于5分钟，常伴有舌咬伤、尿失禁等，并容易造成窒息等伤害。患者的两年前起病，于生气后突然大叫一声，随之倒地呼之不应，牙关紧闭，双眼上视，一头颈后仰，四肢抽搐，无二便失禁，无舌咬伤。发作停止后对整个过程不能回忆，未给予特殊处置，照常上学，是癫痫发作的表现。

100. 下列选项中最有效的治疗措施是A.

- 心理治疗
- B. 氯丙嗪治疗C.
- 卡马西平治病D.
- 手术治疗
- E. 电休克

答案：C

解析：卡马西平对癫痫部分性发作、复杂部分性发作、简单部分性发作和继发性全身发作、全身性发作、强直阵挛强直阵挛发作均有效。

- A. 收敛肺气
- B. 安蛔止痛
- C. 生津止渴
- D. 涩精止遗

E. 固冲止血

101. 二陈汤中乌梅的配伍意义是

102. 乌梅丸中乌梅的配伍意义是

101. 答案：A

解析：乌梅收敛肺气，与半夏、橘红相伍，散中兼收，防其燥散伤正。

102. 答案：B

解析：方中重用味酸之乌梅，取其酸能安蛔，使蛔静则痛止，为君药。

- A. 猪苓汤
- B. 真武汤
- C. 实脾散
- D. 五苓散
- E. 苓桂术甘汤

103. 主治阳虚水泛证的首选方剂是

104. 主治脾肾阳虚，水气内停之阴水的首选方剂是

103. 答案：B

解析：真武汤主治：阳虚水泛证。畏寒肢厥，小便不利，心下悸动不宁，头目眩晕，身体筋肉瞤动，站立不稳，四肢沉重疼痛，浮肿，腰以下为甚；或腹痛，泄泻；或咳喘呕逆。舌质淡胖，边有齿痕，舌苔白滑，脉沉细。104. 答案：C

解析：实脾散主治：脾肾阳虚，水气内停之阴水。身半以下肿甚，手足不温，口中不渴，胸腹胀满，大便溏薄，舌苔白腻，脉沉弦而迟者。

- A. 透邪解郁，疏肝理脾
- B. 寒热平调，消痞散结
- C. 温阳健脾，行气利水
- D. 清胆利湿，和胃化痰
- E. 肝疏解郁，养血健脾

105. 四逆散的功用是

106. 逍遥散的功用是

105. 答案：A

解析：四逆散功用：透邪解郁，疏肝理脾。

106. 答案：E

解析：逍遥散功用：肝疏解郁，养血健脾。

- A. 泻热破瘀，散结消肿
- B. 攻下冷积，温补脾阳
- C. 温阳健脾，行气利水
- D. 清胆利湿，和胃化痰
- E. 峻下热结

107. 大黄牡丹汤的功用是

108. 大承气汤的功用是

107. 答案: A

解析: 大黄牡丹汤功用: 泻热破瘀, 散结消肿。

108. 答案: E

解析: 大承气汤功用: 峻下热结。

A. 清营解毒, 透热养阴

B. 清泻肺热, 止咳平喘

C. 清热解毒, 凉血散瘀

D. 清肺化痰, 逐瘀排脓

E. 清泻肝火, 降逆止呕

109. 左金丸的功用是

109. 答案: E

解析: 左金丸功用: 清泻肝火, 降逆止呕。

110. 苇茎汤的功用是

110. 答案: D

解析: 苇茎汤功用: 清肺化痰, 逐瘀排脓A. 干姜、半夏

B. 干姜、茯苓 C.

肉桂、当归 D.

人参、代赭石E.

柴胡、苏叶

111. 属于旋覆代赭汤的组成药物的是

答案: D

解析: 旋覆代赭汤组成: 旋覆花、人参、生姜、代赭石、炙甘草、半夏、大枣。方歌: 旋覆代赭重用姜, 半夏人参甘枣尝, 降逆化痰益胃气, 胃虚痰阻痞暖康。

112. 属于苏子降气汤的组成药物的是

答案: C

解析: 苏子降气汤组成: 紫苏子、半夏、川当归、炙甘草、前胡、厚朴、肉桂、生姜、大枣、苏叶。方歌: 苏子降气祛痰方, 夏朴前苏甘枣姜, 肉桂纳气归调血, 上实下虚痰喘康。

A. 大补阴丸

B. 一贯煎

C. 百合固金汤

D. 地黄饮子 E.

六味地黄丸

113. 主治肝肾阴虚, 肝气郁滞证的方剂是

113. 答案: B

解析: 一贯煎的主治: 肝肾阴虚, 肝气郁滞证。症见胸脘胁痛, 吞酸吐苦, 咽干口燥, 舌红少津, 脉细弱或虚弦。亦治疝气瘕聚。

114. 主治暗瘕证的方剂是

114. 答案: D

解析: 地黄饮子的主治: 暗瘕证。症见舌强不能言, 足废不能用, 口干不欲饮, 足冷面赤, 脉沉细弱。

A. 桑杏汤 B.

泻白散 C.

止嗽散 D.

麦门冬汤E.

桑菊饮

115. 咳嗽气喘, 咽喉不利, 咳唾涎沫, 口干咽燥, 手足心热, 舌红少苔, 脉虚数, 应选用

115. 答案: D

解析: 麦门冬汤主治虚热肺痿。咳嗽气喘, 咽喉不利, 咯痰不爽, 或咳唾涎沫, 口干咽燥, 手足心热, 舌红少苔, 脉虚数。

116. 干咳少痰, 痰粘难吐, 咽干鼻燥, 身热不甚, 口渴, 舌红, 脉浮数, 应选用

116. 答案: A

解析: 桑杏汤主治: 外感温燥证。身热不甚, 微恶风寒, 口渴, 咽干鼻燥, 干咳无痰或痰少而黏, 舌红, 苔薄白而干, 脉浮数而右脉大者。

A. 甲状腺呈弥漫性或结节性肿大, ^{131}I 摄取率高但能够被 T3 所抑制, 对 TRH 反应正常

B. 心悸、出汗、怕热、粗大肌肉震颤, 但测定甲状腺功能正常, 无突眼

C. 甲状腺肿大呈弥漫性、对称性, 较软, 可伴震颤及杂音, 有突眼, 吸碘率增高伴高峰前移

D. 有发热, 短期内甲状腺肿大, 触之坚硬而疼痛。白细胞正常或升高, 血沉增高, 摄 ^{131}I 碘率下降

E. 易疲劳、怕冷、体重增加、嗜睡, 血清 TSH 增高, TT_3 、 TT_4 降低

117. Graves 病的特点是

117. 答案: C

解析: 甲状腺肿大呈弥漫性、对称性, 较软, 可伴震颤及杂音, 有突眼, 吸碘率增高伴高峰前移是 Graves 病的特点。

118. 亚急性甲状腺炎的特点是

118. 答案: D

解析: 发病与病毒感染有关。多有发热, 短期内甲状腺肿大, 触之坚硬而疼痛。白细胞正常或升高, 血沉增高, 摄¹³¹碘率下降, TGA b, TPOAb 正常或轻度升高。

- A. PaO₂为 50mmHg, PaCO₂为 40mmHg
- B. PaO₂为 50mmHg, PaCO₂为 60mmHg
- C. PaO₂为 65mmHg, PaCO₂为 40mmHg
- D. PaO₂为 70mmHg, PaCO₂为 40mmHg
- E. PaO₂为 70mmHg, PaCO₂为 45mmHg

119. 符合 I 型呼吸衰竭的动脉血气标准是

119. 答案: A

解析: I 型呼吸衰竭的动脉血气标准是 PaO₂为 50mmHg, PaCO₂为 40mmHg。

120. 符合 II 型呼吸衰竭的动脉血气标准是

120. 答案: B

解析: II 型呼吸衰竭的动脉血气标准是 PaO₂为 50mmHg, PaCO₂为 60mmHg。

- A. 黄疸
- B. 呕吐
- C. 腹泻
- D. 血便
- E. 急性发热

121. 肠梗阻可见腹痛, 并伴有

121. 答案: B

解析: 腹痛伴腹胀, 呕吐隔餐或隔日食物, 见于幽门梗阻; 伴腹胀, 呕吐, 停止排便排气, 提示肠梗阻。

122. 肠套叠可见腹痛, 并伴有

122. 答案: D

解析: 腹痛伴血便, 急性者见于急性细菌性痢疾、肠套叠、绞窄性肠梗阻、急性出血性坏死性结肠炎、过敏性紫癜等; 慢性者可见于慢性菌痢、肠结核、结肠癌等; 柏油样便提示上消化道出血; 鲜血便提示下消化道出血。

- A. 幽门梗阻 B. 过敏性紫癜
- C. 急性心肌梗死
- D. 急性溶血
- E. 肾结石

123. 上述各项, 表现为腹痛伴黄疸的是

123. 答案: D

解析: 腹痛伴黄疸, 提示肝、胆、胰腺疾病, 以及急性溶血等。

124. 上述各项, 表现为腹痛伴休克的是

124. 答案: C

解析: 腹痛伴休克, 常见于腹腔内脏大出血、急性胃肠穿孔、急性心肌梗死、中毒性菌痢等。

- A. 急性白血病
- B. 传染性单核细胞增多症
- C. 再生障碍性贫血
- D. 类白血病反应
- E. 特发性血小板减少性紫癜

125. 肝炎病毒可诱发的血液病是

125. 答案: C

解析: 再障可以发生于病毒性肝炎之后, 且病情较重。

126. 人类T 淋巴细胞病毒 I 型可诱发的血液病是

126. 答案: A

解析: 成人 T 细胞白血病是由 I 型人类 T 细胞白血病 / 淋巴瘤病毒 (HTLV-1) 所致。A 肌红蛋白

- B. 肌钙蛋白
- C. 肌酸激酶同工酶
- D. 肌酸激酶
- E. α-酮戊二酸脱氢酶

127. 心梗起病 2 小时内升高的是

127. 答案: A

解析: 肌红蛋白是心梗早期诊断的指标, 起病 2 小时内即可升高, 12 小时达高峰, 24~48 小时恢复正常。

128. 心梗起病后 4 小时内升高的是

128. 答案: C

解析: 肌酸激酶同工酶 (CK-MB) 在起病后 4 小时内升高, 16~24 小时达高峰, 3~4 天恢复正常。

- A. 口服碳酸钙
- B. 必需氨基酸疗法
- C. 补充 (OH)
- D. 促红细胞生成素
- E. 血液透析治疗

129. 慢性肾功能不全出现肾性贫血最合适的治疗药物是

129. 答案: D

解析：肾性贫血患者 EPO 水平较低，在进行治疗过程中，往往通过注射 EPO 来提高体内 EPO 水平进行治疗，从而帮助病人增加红细胞数量，此时 EPO 水平有所上升。

130. 尿毒症患者伴高钾血症最有效降血钾疗法是

130. 答案：E

解析：急诊透析可用于：药物不能控制的高血钾（超过 6.5 毫摩尔/升）。

- A. 慢性阻塞性肺气肿
- B. 慢性支气管炎
- C. 支气管扩张症
- D. 肺炎
- E. 急性肺水肿

131. 咳嗽痰量大有分层现象的疾病是

131. 答案：C

解析：支气管扩张症与肺脓肿患者痰量多时，痰可出现分层现象：上层为泡沫，中层为浆液或浆液脓性，下层为坏死性物质。132. 咳嗽咯粉红色泡沫样痰的疾病是

132. 答案：E

解析：粉红色泡沫痰是肺水肿的特征。A. 扁平胸
B. 鸡胸 C. 桶状胸D. 漏斗胸

E. 胸廓局限变形

133. 慢性消耗性疾病患者的胸廓是

133. 答案：A

解析：扁平胸见于瘦长体型者，也可见于慢性消耗性疾病，如肺结核等。

134. 慢性阻塞性肺气肿患者的胸廓是

134. 答案：C

解析：桶状胸常见于慢性阻塞性肺气肿及支气管哮喘发作时，亦可见于一部分老年人。A. 食管癌

- B. 肠梗阻
- C. 胃肠道穿孔D. 消化性溃疡 E. 食管静脉曲张

135. 立位腹部平片，显示两侧膈下有半月形透亮气体影的疾病是

答案：C

解析：胃或十二指肠穿孔，立位 X 线透视或

腹部平片可见：两侧膈下有弧形或半月形透亮气体影。

136. 立位腹部平片，显示肠管扩张呈阶梯状气液平面影的疾病是

136. 答案：B

解析：肠梗阻典型 X 线表现为：梗阻上段肠管扩张，积气、积液，立位或侧位水平位摄片可见肠管扩张，呈阶梯状气液平，梗阻以下的肠管闭合，无气体或仅有少量气体。A. 稽留热

- B. 弛张热
- C. 间歇热
- D. 回归热
- E. 波状热

137. 斑疹伤寒高热期的热型是

137. 答案：A

解析：稽留热：体温持续于 39℃~40℃ 以上，24 小时波动范围不超过 1℃，达数日或数周。见于肺炎链球菌性肺炎、伤寒和斑疹伤寒高热期。

138. 败血症的热型是

138. 答案：B

解析：弛张热：体温在 39℃ 以上，但波动幅度大，24 小时内体温差达 2℃ 以上，最低时仍高于正常水平。常见于败血症、风湿热、重症肺结核、化脓性炎症等。

- A. 正极接左上肢，负极接右上肢
- B. 正极接左下肢，负极接右上肢
- C. 正极接左下肢，负极接左上肢
- D. 正极接左上肢，负极接右下肢
- E. 正极接左下肢，负极接右下肢

139. I 导联是指

答案：A

解析：I 导联：正极接左上肢，负极接右上肢。

140. II 导联是指

140. 答案：B

解析：II 导联：正极接左下肢，负极接右上肢。

- A. 皮下出血直径 < 2mm
- B. 皮下出血直径 3~5mm
- C. 皮下出血直径 > 5mm
- D. 片状出血伴有皮肤显著隆起
- E. 片状出血伴有皮下握雪感

141. 紫癜引起皮下出血的特征为

141. 答案: B

解析: 皮下出血: 皮肤或黏膜下出血, 出血面的直径小于 2mm 者, 称为瘀点; 小的出血点容易和小红色皮疹或小红痣相混淆, 皮疹压之退色, 而出血点压之不退色, 小红痣加压虽不退色, 但触诊时可稍高出平面, 并且表面发亮。皮下出血直径在 3~5mm 者, 称为紫癜; 皮下出血直径 >5mm 者, 称为瘀斑; 片状出血并伴有皮肤显著隆起者, 称为血肿。皮肤黏膜出血常见于造血系统疾病、重症感染、某些血管损害的疾病, 以及某些毒物或药物中毒等。

142. 瘀斑引起皮下出血的特征为

142. 答案: C

解析: 皮下出血: 皮肤或黏膜下出血, 出血面的直径小于 2mm 者, 称为瘀点; 小的出血点容易和小红色皮疹或小红痣相混淆, 皮疹压之退色, 而出血点压之不退色, 小红痣加压虽不退色, 但触诊时可稍高出平面, 并且表面发亮。皮下出血直径在 3~5mm 者, 称为紫癜; 皮下出血直径 >5mm 者, 称为瘀斑; 片状出血并伴有皮肤显著隆起者, 称为血肿。皮肤黏膜出血常见于造血系统疾病、重症感染、某些血管损害的疾病, 以及某些毒物或药物中毒等。

- A. 无肢体活动, 也无肌肉收缩, 为完全性瘫痪
- B. 可见肌肉收缩, 但无肢体活动
- C. 肢体能在床面上做水平移动, 但不能抬起。肢体能抬离床面, 但不能抵抗阻力
- D. 肢体能抬离床面, 但不能抵抗阻力
- E. 能做抵抗阻力的动作, 但较正常差

143. 肌力分级分为 6 级, 2 级的表现为

143. 答案: C

解析: 肌力分级分为 6 级: 0 级: 无肢体活动, 也无肌肉收缩, 为完全性瘫痪。1 级: 可见肌肉收缩, 但无肢体活动。2 级: 肢体能在床面上做水平移动, 但不能抬起。3 级: 肢体能抬离床面, 但不能抵抗阻力。4 级: 能做抵抗阻力的动作, 但较正常差。5 级: 正常肌力。

144. 肌力分级分为 6 级, 3 级的表现为

144. 答案: D

解析: 肌力分级分为 6 级: 0 级: 无肢体活动, 也无肌肉收缩, 为完全性瘫痪。1 级:

可见肌肉收缩, 但无肢体活动。2 级: 肢体能在床面上做水平移动, 但不能抬起。3 级: 肢体能抬离床面, 但不能抵抗阻力。4 级: 能做抵抗阻力的动作, 但较正常差。5 级: 正常肌力。

A. 忽视了生命的生物复杂性和社会复杂性B.

形式单一不具有统一观念

C. 忽视了人与自然的协调统一

D. 忽视了社会环境、个体行为、生活方式、心理因素等对人体健康和疾病的影响

E. 忽视了心理变化对身体的影响

145. 机械论医学模式的缺点是

146. 属于体格检查的道德要求的是

145. 答案: A

解析: 机械论医学模式忽视了生命的生物复杂性和社会复杂性。

146. 答案: D

解析: 体格检查的道德要求 1. 全面系统, 认真细致。2. 关心体贴, 减少痛苦。3. 尊重病人, 心正无私。

A. 继承发展了历史上幸福论和快乐主义的伦理传统

B. 认为人的生命是宝贵的, 人的生命和尊严具有最高的价值, 应当受到尊重

C. 将生命的内在价值和外在价值统一起来D. 强调医务人员的责任和义务

E. 研究和探讨人应该具有什么样的美德和品格

147. 符合“人道论”的是

148. 符合“美德论”的是

147. 答案: B

解析: 医学人道主义的内涵包括: 在关于人的价值标准问题上, 认为人的生命是宝贵的, 人的生命和尊严具有最高的价值, 应当受到尊重。

148. 答案: E

解析: 美德论, 是研究和探讨人应该具有什么样的美德和品格的理论。

A. 认为人的本性就是追求快乐和幸福

B. 研究和探讨人应该具有什么样的美德和品格

C. 人道主义思想在医学领域中的具体体现

- D. 强调人的责任. 义务
- E. 生命神圣与生命质量统一

149. 符合“功利论”的是

149. 答案: A

解析: 功利论, 是以“功利”作为道德标准的学说。功利论继承发展了历史上幸福论和快乐主义的伦理传统, 认为人的本性就是追求快乐和幸福。

150. 符合“道义论”的是

- A. 认为人的本性就是追求快乐和幸福
- B. 研究和探讨人应该具有什么样的美德和品格
- C. 人道主义思想在医学领域中的具体体现
- D. 强调人的责任. 义务
- E. 生命神圣与生命质量统一

答案: D

解析: 道义论强调人的责任. 义务。人与人之间的相互尊重. 关心. 帮助成为社会道义。

第三单元

A1 型题

1. 治疗咳血之燥热伤肺证, 应首选

- A. 麦门冬汤
- B. 清燥救肺汤
- C. 沙参麦冬汤
- D. 桑杏汤
- E. 百合固金汤

答案: D

解析: 咳血之燥热伤肺证。证候主症: 喉痒咳嗽, 痰中带血, 口干鼻燥, 或有身热, 舌质红, 少津, 苔薄黄, 脉数。治法: 清热润肺, 宁络止血。代表方: 桑杏汤加减。

2. 厥证的基本病机是

- A. 失血过多, 气随血脱
- B. 气血凝滞, 脉络瘀阻
- C. 气虚下陷, 清阳不升
- D. 气机逆乱, 升降乖戾
- E. 痰随气升, 上蒙清窍

答案: D

解析: 厥证的基本病机为气机逆乱, 升降乖戾, 气血阴阳不相顺接。

3. 下列不属于外感腰痛的致病病邪是

- A. 热
- B. 燥
- C. 风
- D. 寒
- E. 湿

答案: B

解析: 腰痛的病因为内伤. 外感与跌仆挫伤, 其中外感主要为风. 寒. 湿. 热诸邪痹阻经脉所致。

4. 尿血与血淋的鉴别, 主要在于

- A. 有无尿痛
- B. 尿味的情况
- C. 尿色的深浅
- D. 尿量的多少
- E. 以上均非

答案: A

解析: 尿血与血淋都有小便出血, 尿色红赤, 甚至尿出纯血。其鉴别要点在于有无尿痛。尿血多无疼痛, 虽亦间有轻微的胀痛或热痛, 但终不若血淋的小便滴沥而疼痛难忍。

5. 治疗胃痛饮食伤胃证的中医治法是

- A. 温胃散寒, 行气止痛
- B. 疏肝解郁, 理气止痛
- C. 清化湿热, 理气和胃
- D. 消食导滞, 和胃止痛
- E. 以上均非

答案: D

解析: 胃痛饮食伤胃证。证候主症: 胃脘疼痛, 胀满拒按, 噎腐吞酸, 或呕吐不消化食物, 其味腐臭, 吐后痛减, 不思饮食, 大便不爽, 得矢气及便后稍舒, 舌苔厚腻, 脉滑。治法: 消食导滞, 和胃止痛。

6. 治疗呃逆气机郁滞证, 应首选

- A. 竹叶石膏汤
- B. 橘皮竹茹汤
- C. 丁香散
- D. 益胃汤

E. 五磨饮子

答案：E

解析：呃逆气机郁滞证。证候主症：呃逆连声，常因情志不畅而诱发或加重，胸胁满闷，脘腹胀满，暖气纳减，肠鸣矢气，苔薄白，脉弦。治法：顺气解郁，和胃降逆。代表方：五磨饮子加减。

7. 治疗胃痛脾胃虚寒证，应首选

A. 良附丸

B. 黄芪建中汤

C. 小建中汤 D.

理中丸

E. 附子理中丸

答案：B

解析：胃痛之脾胃虚寒证。证候主症：胃痛隐隐，绵绵不休，喜温喜按，空腹痛甚，得食则缓，劳累或受凉后发作或加重，泛吐清水，神疲纳呆，四肢倦怠，手足不温，大便溏薄，舌淡苔白，脉虚弱或迟缓。治法：温中健脾，和胃止痛。代表方：黄芪建中汤加减。

8. 气秘的治法是

A. 通便止痛

B. 益气润肠

C. 润肠通便

D. 顺气导滞

E. 以上均非

答案：D

解析：气秘证候主症：大便干结，或不甚干结，欲便不得出，或便而不爽，肠鸣矢气，腹中胀痛，暖气频作，纳食减少，胸胁痞满，舌苔薄腻，脉弦。治法：顺气导滞。

9. 以下哪项是健忘的表现

A. 神情呆滞

B. 精神恍惚

C. 善忘前事

D. 告知不晓

E. 智能减退

答案：C

解析：痴呆与健忘的鉴别。健忘是以记忆力减退，遇事善忘为主症的一种病证。而痴呆

则以神情呆滞，或神志恍惚，告知不晓为主要表现。其不知前事或问事不知等表现，与健忘之“善忘前事”有根本区别。痴呆根本不晓前事，而健忘则晓其事却易忘，且健忘不伴有智能减退。神情呆钝。健忘可以是痴呆的早期临床表现，这时可不予鉴别。由于外伤、药物所致健忘，一般经治疗后可以恢复。

10. 鼓胀与下列哪些脏腑关系最为密切

A. 肺、肝、肾

B. 心、脾、肾

C. 肺、脾、肾

D. 肝、脾、肾

E. 心、脾、肝

答案：D

解析：鼓胀的基本病机是肝、脾、肾密切相关。

11. 内伤发热虚证的治疗原则不包括的是A.

清热

B. 养血

C. 滋阴

D. 温阳

E. 益气

答案：A

解析：实火宜清，虚火宜补，故答案A为内伤发热实证的治疗原则。

12. 脾肾两虚型痴呆的治法是

A. 补肾益髓，填精养神

B. 健脾化浊，豁痰开窍

C. 活血化瘀，开窍醒脑

D. 益气养血，清心宣窍

E. 补肾健脾，益气生精

答案：E

解析：痴呆之脾肾两虚证。证候主症：表情呆滞，沉默寡言，记忆减退，失认失算，口齿含糊，词不达意，伴腰膝酸软，肌肉萎缩，食少纳呆，气短懒言，口涎外溢，或四肢不温，腹痛喜按，鸡鸣泄泻，舌质淡白，舌体胖大，苔白，或舌红，苔少或无苔，脉沉细弱，双尺尤甚。证机概要：气血亏虚，肾精不足，髓海失养。治法：补肾健脾，益气生

精。

13. 冷哮咳痰特点

- A. 臭脓痰
- B. 痰稠黄胶黏
- C. 痰少咯吐不爽，色白而多泡沫
- D. 痰如白沫量多
- E. 痰黄白相兼

答案：C

解析：冷哮证证候主症：喉中哮鸣如水鸡声，呼吸急促，喘憋气逆，胸膈满闷如塞，咳不甚，痰少咯吐不爽，色白而多泡沫，口不渴或渴喜热饮，形寒怕冷，天冷或受寒易发，面色青晦，舌苔白滑，脉弦紧或浮紧。

14. 下列情况对胃痞和胸痹的鉴别诊断最有价值者为

- A. 诱因
- B. 转归
- C. 病位
- D. 病程
- E. 起病

答案：C

解析：胸痹是胸中痞塞不通，而致胸膈内外疼痛之证，以胸闷、胸痛、短气为主症，偶兼脘腹不舒。而胃痞则以脘腹满闷不舒为主症，多兼饮食纳运无力之症，偶有胸膈不适，并无胸痛等表现。所以胃痞和胸痹二者的鉴别，病位较为有价值。

15. 下列哪个部位是胃痞的基本病位

- A. 肝胆
- B. 脾胃
- C. 肝脾
- D. 脾
- E. 胃

答案：E

解析：胃痞的病位在胃，与肝、脾的关系密切。

16. 咳嗽之风寒袭肺证，首选方剂是

- A. 荆防达表汤
- B. 沙参麦冬汤
- C. 桑菊饮

D. 三拗汤合止嗽散

E. 桑杏汤

答案：D

解析：咳嗽之风寒袭肺证。证候主症：咳嗽声重，气急，咽痒，咳痰稀薄色白，常伴鼻塞，流清涕，头痛，肢体酸楚，或见恶寒、发热、无汗等风寒表证，舌苔薄白，脉浮或浮紧。治法：疏风散寒，宣肺止咳。代表方：三拗汤合止嗽散加减。

17. 肺痈初期，首选治疗方剂是

- A. 沙参清肺汤
- B. 桔梗杏仁煎
- C. 银翘散
- D. 《千金》苇茎汤
- E. 加味桔梗汤

答案：C

解析：肺痈初期。证候主症：恶寒发热，咳嗽，咯白色黏痰，痰量日渐增多，胸痛，咳则痛甚，呼吸不利，口干鼻燥，舌苔薄黄，脉浮数而滑。治法：疏风散热，清肺化痰。代表方：银翘散加减。

18. 下列各项，属淋证主要病理因素的是A.

- 瘀血
- B. 气滞C.
- 正虚 D.
- 湿热 E.
- 痰浊 答

案：D

解析：淋证其病理因素主要为湿热之邪。

19. 下列各项，不属于黄疸病因的是

- A. 病后续发
- B. 情志内伤
- C. 外感疫毒
- D. 饮食不节
- E. 劳倦

答案：B

解析：黄疸的病因：外感湿热疫毒、饮食不节、劳倦、病后续发。

20. 胃痛脾胃虚寒证的疼痛特点为

A. 胀痛 B.

刀绞痛C.

刺痛

D. 灼痛E.

隐痛 答

案：E

解析：食则缓，劳累或受凉后发作或加重，泛吐清水，神疲纳呆，四肢倦怠，手足不温，大便溏薄，舌淡苔白，脉虚弱或迟缓。

21. 治疗颤证阳气虚衰证，应首选的方剂是A.

人参养荣汤

B. 地黄饮子 C.

附子理中丸D.

龟鹿二仙膏

E. 金匱肾气丸

答案：B

解析：颤证之阳气虚衰证。证候主症：头摇肢颤，筋脉拘挛，面色（白光）白，畏寒肢冷，四肢麻木，心悸懒言，动则气短，自汗，小便清长或自遗，大便溏；舌质淡，舌苔薄白，脉沉迟无力。治法：补肾助阳，温煦筋脉。代表方：地黄饮子加减。

22. 虚劳辨证中，首先要辨别的要点是A.

辨明有无因虚致实的表现

B. 辨明原有疾病是否还继续存在

C. 辨别五脏气血阴阳亏虚

D. 辨本症与并发症

E. 是否兼夹外邪

答案：C

解析：虚劳辨证中，首先辨别五脏气血阴阳亏虚。

23. 下列各项，不符合痿证临床特征的是A.

肢体关节疼痛

B. 可有肌肉萎缩

C. 肢体筋脉弛缓

D. 肢体软弱无力

E. 肢体运动不利

答案：A

解析：“肢体关节疼痛”属于痹证的临床特征。

24. 不属于消渴并发症的是

A. 水肿

B. 中风

C. 夜盲

D. 疮疖痈疽

E. 肺胀

答案：E

解析：消渴病常病及多个脏腑，病变影响广泛，未及时医治以及病情严重的患者，常可并发多种病证。如肺失滋养，日久可并发肺癆；肾阴亏损，肝失濡养，肝肾精血不能上承于耳目，则可并发白内障、雀目、耳聋；燥热内结，营阴被灼，脉络瘀阻，蕴毒成脓，则发为疮疖痈疽；阴虚燥热，练液成痰，以及血脉瘀滞，痰瘀阻络，脑脉闭阻或血溢脉外，发为中风偏瘫；阴损及阳，脾肾衰败，水湿潴留，泛滥肌肤，则发为水肿。

25. 下列各项，不属腹痛病理因素的是

A. 食积

B. 瘀血

C. 风邪

D. 气滞

E. 火郁

答案：C

解析：腹痛之病理因素主要有寒凝、火郁、食积、气滞、血瘀。

26. 肝气犯胃型呕吐的特点是

A. 清水

B. 酸腐量多，气味难闻

C. 苦水、黄水

D. 浊痰涎沫

E. 呕吐吞酸，暖气频繁

答案：E

解析：呕吐之肝气犯胃证。证候主症：呕吐吞酸，暖气频繁，胸胁胀痛，舌淡红，苔薄，脉弦。治法：疏肝理气，和胃降逆。代表方：四七汤加减。

27. 痴呆的病位在

A. 肝

B. 脾

C. 心

D. 肾

E. 脑

答案: E

解析: 痴呆病位在脑, 与心. 肾. 肝. 脾均有关系。

28. 痴呆的基本病机为A.

以虚为本, 虚实夹杂B.

气滞血瘀, 痰浊内阻C.

阴精不足, 气血亏虚D.

髓海不足, 神机失用

E. 脏腑亏虚, 痰瘀内阻

答案: D

解析: 痴呆的基本病机为髓海不足, 神机失用。

29. 不寐的病位主要为

A. 脾

B. 肝

C. 心

D. 脑

E. 肾

答案: C

解析: 不寐其病位主要在心, 与肝. 脾. 肾密切相关。

30. 不属心悸病理因素的是

A. 寒凝

B. 水饮

C. 气滞

D. 痰浊

E. 血瘀

答案: A

解析: 心悸的病理因素包括气滞. 血瘀. 痰浊. 水饮。

31. 十二经脉的命名主要是结合了哪几方面的内容

A. 五行. 手足. 阴阳

B. 手足. 阴阳. 五行

C. 脏腑. 手足. 阴阳

D. 脏腑. 手足. 五行

E. 阴阳. 五行. 脏腑

答案: C

解析: 十二经脉的名称由手足. 阴阳. 脏腑三部分组成。

32. 上肢内侧面, 经脉从前到后正确分布顺序是

A. 心包经. 心经. 肺经 B.

肺经. 大肠经. 小肠经C.

大肠经. 小肠经. 心经D.

肺经. 心经. 心包经

E. 肺经. 心包经. 心经

答案: E

解析: 阴经分布于四肢的内侧, 手三阴经在上肢内侧的排列是太阴在前, 厥阴在中, 少阴在后。

33. 治疗落枕的主穴是

A. 天柱. 肩井. 阿是穴. 肩贞

B. 养老. 后溪. 合谷. 阳池. 风池 C.

阿是穴. 外关. 合谷. 肩井. 内关

D. 外劳宫. 天柱. 阿是穴. 后溪. 悬钟

E. 后溪. 外关. 束骨. 昆仑. 合谷

答案: D

解析: 落枕的针灸治疗主穴: 外劳宫. 天柱. 阿是穴. 后溪. 悬钟。

34. 治疗遗尿伴夜梦多, 除主穴外, 应加A.

百会. 神门

B. 脾俞. 内关

C. 肾俞. 内关

D. 肾俞. 肺俞

E. 肺俞. 足三里

答案: A

解析: 夜梦多, 属心神不安, 当选百会. 神门以宁心安神。百会位于巅顶, 神门为心经原穴, 两穴合用, 可以调补气以安心神, 心神得安, 则夜能安寐。其余选项中配穴安神之力均较弱, 故不选。

35. 下列不属于足太阴经主治范围的是

A. 肾病

B. 脾胃病

C. 妇科病

D. 口舌病

E. 前阴病

答案：A

解析：足太阴脾经主要治疗的病症有脾胃病、妇科病、前阴病以及经脉循行处病，如口舌病。肾脏病为足少阴肾经的主治病症，不归属于脾经。

36. 用俞募配穴法治疗胃病，应选的穴位是A.

脾俞、中脘

B. 胃俞、中脘

C. 脾俞、胃俞

D. 胃俞、太白

E. 胃俞、足三里

答案：B

解析：俞穴是脏腑之气输注之处，均位于背腰部，即背俞穴，而募穴是脏腑之气汇聚之处，均位于胸腹部，又称为腹募穴。俞募配用可治疗相应脏腑疾病。选项中胃俞为胃俞穴，中脘为胃募穴，两穴合用，即为俞募配穴法，其余选项均配伍有误。

37. 位于耳前的耳门、听宫、听会三穴，其所归属经脉分别是

A. 胆经、三焦经、小肠经

B. 三焦经、胆经、小肠经

C. 三焦经、小肠经、胆经

D. 胆经、小肠经、三焦经

E. 小肠经、胆经、三焦经

答案：C

解析：位于耳前的耳门、听宫、听会三穴，其所归属经脉分别是三焦经、小肠经、胆经。38. 下列哪项属于表里经配穴

A. 咳嗽取尺泽、鱼际

B. 感冒取列缺、合谷

C. 膝痛取阳陵泉、足三里

D. 胃痛取中脘、内庭

E. 痛经取地机、隐白

答案：B

解析：表里经配穴法：表里经配穴法是以脏腑、经脉的阴阳表里配合关系为依据的配穴方法。当某一脏腑经脉发生疾病时，取本经

和其相表里经脉的腧穴配合组成处方。

39. 下列穴位与关元相平的是

A. 大赫

B. 大横

C. 外陵

D. 水道

E. 归来

答案：D

解析：关元属任脉，位于下腹部，前正中线，当脐中下3寸。水道穴属足阳明胃经，位于下腹部，当脐中下3寸，距前正中线2寸，与关元相平。归来亦属胃经，位于水道下1寸，大赫属肾经，位于下腹部，当脐中下4寸，距前正中线旁开0.5寸。大横属脾经，在腹中部，距脐中4寸。外陵亦属胃经，位于水道上2寸，均不与关元穴齐平。

40. 任脉之络的别称为

A. 俞府

B. 虚里

C. 鸠尾

D. 大包

E. 天池

答案：C

解析：鸠尾为任脉之络，大包为脾之大络。

41. 足太阴脾经的五输穴不包括

A. 地机

B. 商丘

C. 太白

D. 隐白

E. 大都

答案：A

解析：地机为脾经的郄穴。

42. 下列哪项是脾经中用于治疗妇科疾病的常用穴位

A. 大横 B.

阴陵泉 C.

地机 D.

公孙

E. 商丘

答案：C

解析：脾经腧穴中有不少用来治疗妇科疾病，但在所给 5 个选择中，地机最为常用。

43. 十二经脉中，相表里的阴经与阳经的交接部位在

- A. 胸部
- B. 腹部
- C. 头部
- D. 面部
- E. 四肢部

答案：E

解析：相表里的阴经与阳经在手足末端交接，如手太阴肺经在食指端与手阳明大肠经相交接。

44. 针灸治疗郁证的主穴不包括的是A.

- 太冲
- B. 水沟
- C. 内关
- D. 神门
- E. 风池

答案：E

解析：针灸治疗郁证主穴：百会、印堂、水沟、内关、神门、太冲。可见答案 E 是错误的。45. 下列腧穴中，可以治疗胆道蛔虫症的是

- A. 手三里
- B. 迎香 C.
- 商阳 D.
- 合谷
- E. 阳溪

答案：B

解析：迎香【主治】①鼻塞、鼽衄等鼻病。②口喎、面痒、面肿等面部病证。③胆道蛔虫症。

46. 在胸部，距前正中线 4 寸循行的经脉是

- A. 足太阴脾经
- B. 手厥阴心包经
- C. 足少阴肾经 D.
- 足阳明胃经
- E. 手太阴肺经

答案：D

解析：足阳明胃经，在胸部距离前正中线 4

寸，在腹部距离前正中线 2 寸。

47. 在腹部，脐中旁开 0.5 寸的腧穴是

- A. 育俞
- B. 天枢
- C. 膏肓
- D. 气海
- E. 大横

答案：A

解析：育俞【定位】在腹部，脐中旁开 0.5 寸。

48. 下列对百会穴的描述，不正确的是

- A. 可治疗气虚下陷证
- B. 可用灸法
- C. 位于头部，前发际正中直上 7 寸
- D. 可治疗神志病证
- E. 可治疗头面病证

答案：C

解析：百会穴【定位】在头部，前发际正中直上 5 寸。

49. 在手指，小指末节桡侧，指甲根角侧上方 0.1 寸的腧穴是

- A. 少商
- B. 中冲
- C. 少冲
- D. 少府
- E. 少泽

答案：C

解析：少冲【定位】在手指，小指末节桡侧，指甲根角侧上方 0.1 寸（指寸）。

50. 大包穴位于侧胸部腋中线上

- A. 当第 6 肋间隙处
- B. 当第 7 肋间隙处
- C. 当第 3 肋间隙处
- D. 当第 4 肋间隙处
- E. 当第 5 肋间隙处

答案：A

解析：大包【定位】在侧胸部，腋中线上，当第 6 肋间隙处。

51. 主客原络配穴指的是

- A. 阳经的原穴与后病的相表里阴经的络穴

相配合

- B. 同一条经脉的原穴与络穴相配合
- C. 先病经脉的原穴与后病的相表里经脉的络穴相配合
- D. 后病经脉的原穴与先病的相表里经脉的络穴相配合
- E. 阴经的原穴与后病的相表里阳经的络穴相配合

答案：C

解析：临床上常把先病经脉的原穴和后病的相表里经脉的络穴相配合，称为“原络配穴法”或“主客原络配穴法”，是表里经配穴法的典型用法。

52. 阴脉之海是指

- A. 任脉
- B. 冲脉 C. 阴跷脉D. 阴维脉

E. 带脉

答案：A

解析：奇经八脉中督、任、冲脉因其功能特点又有别称。其中任脉总任六阴经，调节全身阴经经气，故被称为阴脉之海。冲脉涵蓄十二经气血，称为十二经之海，血海。

53. 下列腧穴中，小肠的募穴是

- A. 神阙
- B. 中脘
- C. 中极
- D. 关元
- E. 气海

答案：D

解析：关元为小肠的募穴。

54. 位于足背第 2、3 趾间，趾蹼缘后方赤白肉际处的腧穴是

- A. 太白
- B. 然谷
- C. 内庭
- D. 行间
- E. 侠溪

答案：C

解析：内庭【定位】在足背，第 2、3 趾间，趾蹼缘后方赤白肉际处。

55. 胃阴不足型胃痛，除主穴外，还应加用

- A. 胃俞、肺俞
- B. 下脘、梁门 C. 三阴交、内庭D. 膈俞、胃俞

E. 气海、命门

答案：C

解析：胃痛的配穴：寒邪客胃配胃俞；饮食伤胃配梁门、下脘；肝气犯胃配期门、太冲；瘀血停胃配膈俞、三阴交。脾胃虚寒配关元、脾俞、胃俞；胃阴不足配胃俞、三阴交、内庭。

56. 足少阴肾经的络穴是

- A. 复溜
- B. 大钟
- C. 涌泉
- D. 然谷
- E. 太溪

答案：B

解析：大钟为足少阴肾经的络穴。

57. 不属于足太阳膀胱经的腧穴是A.

- 申脉
- B. 攒竹
- C. 大椎
- D. 天柱
- E. 昆仑

答案：C

解析：大椎属于督脉的穴位。

58. 治疗郁证的主穴是

- A. 百会、印堂、水沟、内关、神门、太冲
- B. 四神聪透百会、神庭透上星
- C. 内关、神门、巨阙
- D. 照海、申脉、神门、印堂、神门、百会
- E. 内关、水沟、丰隆、后溪、照海

答案：A

解析：郁证针灸治疗的处方：主穴：百会、印堂、水沟、内关、神门、太冲。

59. 下列各项中，不属于大椎穴主治病证的

是

- A. 痢疾. 脱肛
- B. 风疹. 痤疮
- C. 热病. 疟疾
- D. 项强. 脊痛
- E. 癫狂. 惊风

答案: A

解析: 大椎【主治】①恶寒发热. 疟疾等外感病证; ②热病, 骨蒸潮热; ③咳嗽. 气喘等肺气失于宣降病证; ④癫狂病. 小儿惊风等神志病证; ⑤风疹. 痤疮等皮肤疾病; ⑥项强. 脊痛等脊柱病证。

60. 治疗鼻鼾应主选的是

- A. 局部腧穴. 手阳明经穴
- B. 局部腧穴. 手太阴经穴
- C. 局部腧穴. 足阳明经穴
- D. 局部腧穴. 足少阴经穴
- E. 局部腧穴. 手少阳经穴

答案: A

解析: 治疗鼻鼾应主选的是: 局部腧穴. 手阳明经穴。

A2 型题

61. 某患者尿血日久, 体倦乏力, 气短声低, 面色不华, 舌质淡, 脉弱, 治疗应首选

- A. 归脾汤 B. 十灰散 C. 小蓟饮子
- D. 知柏地黄丸
- E. 无比山药丸

答案: A

解析: 尿血之脾不统血证。证候主症: 久病尿血, 甚或兼见齿衄. 肌衄, 食少, 体倦乏力, 气短声低, 面色不华, 舌质淡, 脉细弱。治法: 补中健脾, 益气摄血。代表方: 归脾汤加减。

62. 患者胸胁支满, 心下痞闷, 胃中有振水音, 脘腹喜温畏冷, 背寒, 呕吐清水痰涎, 水入易吐, 口渴不欲饮, 心悸, 气短, 头晕目眩, 食少, 形体逐渐消瘦, 舌苔白滑, 脉弦细而滑。其治法是

- A. 温化寒湿
- B. 逐水化饮
- C. 宣肺化饮
- D. 淡渗利水
- E. 温脾化饮

答案: E

解析: 痰饮之脾阳虚弱证: 证候主症: 胸胁支满, 心下痞闷, 胃中有振水音, 脘腹喜温畏冷, 泛吐清水痰涎, 饮入易吐, 口渴不欲饮水, 头晕目眩, 心悸气短, 食少, 大便或溏, 形体逐渐消瘦, 舌苔白滑, 脉弦细而滑。证机概要: 脾阳虚弱, 饮停于胃, 清阳不升。治法: 温脾化饮。

63. 患者低热, 头晕眼花, 身倦乏力, 心悸不宁, 面白少华, 唇甲色淡, 舌质淡, 脉细弱。其主治方剂是

- A. 清骨散
- B. 补中益气汤
- C. 归脾汤
- D. 金匱肾气丸
- E. 以上均非

答案: C

解析: 内伤发热之血虚发热证。证候主症: 发热, 热势多为低热, 头晕眼花, 身倦乏力, 心悸不宁, 面白少华, 唇甲色淡, 舌质淡, 脉细弱。治法: 益气养血。代表方: 归脾汤加减。

64. 患者, 女性, 31岁, 症见入寐困难1个月, 多梦, 胸闷肋胀, 急躁易怒, 伴头晕头胀, 口干口苦, 小便短赤, 舌红苔黄, 脉弦数。治疗方剂是

- A. 泻心汤
- B. 当归龙荟丸
- C. 龙胆泻肝汤
- D. 滋水清肝饮
- E. 礞石滚痰丸

答案: C

解析: 不寐之肝火扰心证。证候主症: 不寐多梦, 甚则彻夜不眠, 急躁易怒, 伴头晕头胀, 目赤耳鸣, 口干而苦, 不思饮食, 便秘溲赤, 舌红苔黄, 脉弦而数。证机概要: 肝

郁化火，上扰心神。治法：疏肝泻火，镇心安神。代表方：龙胆泻肝汤加减。

65. 患者，女性，56岁。有15年肺胀病史，1周前劳累后出现面部水肿，呼吸喘促难续，心悸，胸脘痞闷，尿少，怕冷，纳呆，舌苔白滑，脉沉细。治疗应首选

- A. 参附汤
- B. 金匱肾气丸
- C. 济生肾气丸
- D. 真武汤合五苓散
- E. 实脾饮

答案：D

解析：肺胀之阳虚水泛证

证候主症：胸部膨满，憋闷如塞，咳痰清稀，胸闷心悸，面浮，下肢浮肿，甚则一身悉肿，腹部胀满有水，脘痞，纳差，尿少，怕冷，面唇青紫，舌苔白滑，舌体胖质黯，脉沉细。证机概要：心肾阳虚，水饮内停。

治法：温肾健脾，化饮利水。

代表方：真武汤合五苓散加减。

66. 患者平素眩晕，耳鸣，突然发生口舌歪斜，舌强语謇，半身不遂，但其神志清楚，舌红，脉弦细数。其治法是

- A. 平肝潜阳，活血通络
- B. 祛风化痰通络
- C. 息风清火，豁痰开窍
- D. 滋阴潜阳，息风通络
- E. 以上均非

答案：D

解析：根据题干所述，可以明确诊断为中风（中经络），证型为阴虚风动证。肝肾阴虚，风阳内动，风痰瘀阻经络，故可出现上述症状。治疗宜选用能滋阴潜阳，息风通络的镇肝熄风汤。

67. 某患者，有哮喘反复发作史。气短声低，自汗，怕风，常易感冒，倦怠无力，食少便溏，或喉中时有轻度哮鸣，痰多质稀色白，舌质淡，苔白，脉细弱。其诊断是

- A. 虚喘，肺虚证
- B. 虚喘，肾虚证
- C. 哮喘缓解期，肺脾气虚证

D. 哮喘缓解期，脾虚证

E. 哮喘缓解期，肾虚证

答案：C

解析：哮喘缓解期之肺脾气虚证

证候主症：有哮喘反复发作史。气短声低，自汗，怕风，常易感冒，倦怠无力，食少便溏，或喉中时有轻度哮鸣，痰多质稀色白，舌质淡，苔白，脉细弱。

68. 患者腹内积块明显，硬痛不移，面黯消瘦，纳食减少，时有寒热，舌紫暗苔薄，脉细涩。其证候是

- A. 瘀血内结证
- B. 正虚瘀结证
- C. 肝气郁滞证
- D. 食滞痰阻证
- E. 气滞血阻证

答案：A

解析：积证之瘀血内结证

证候主症：腹部积块明显，质地较硬，固定不移，隐痛或刺痛，形体消瘦，纳谷减少，面色晦暗黧黑，面颈胸臂或有血痣赤缕，女子可见月事不下，舌质紫或有瘀斑瘀点，脉细涩。

69. 患者胃痛隐隐，喜温喜按，空腹痛甚，得食痛减，神疲乏力，大便溏薄，舌淡苔白，脉虚弱。其治法是

- A. 清化湿热，理气和胃
- B. 化痰通络，理气和胃
- C. 养阴益胃，和中止痛
- D. 温中健脾，和胃止痛
- E. 以上均非

答案：D

解析：胃痛之脾胃虚寒证

证候主症：胃痛隐隐，绵绵不休，喜温喜按，空腹痛甚，得食则缓，劳累或受凉后发作或加重，泛吐清水，神疲纳呆，四肢倦怠，手足不温，大便溏薄，舌淡苔白，脉虚弱或迟缓。

治法：温中健脾，和胃止痛。

70. 胸痹患者，女性，45岁。胸闷重而心痛微，痰多气短，肢体沉重，形体肥胖，遇阴

雨天而易发作或加重，伴有倦怠乏力，纳呆便溏，咯吐痰涎，舌体胖大且边有齿痕，舌苔浊腻，脉滑。其证候是

- A. 寒凝气滞证
- B. 气虚血瘀证
- C. 饮邪上犯证
- D. 痰浊闭阻证
- E. 心血瘀阻证

答案：D

解析：胸痹之痰浊闭阻证

证候主症：胸闷重而心痛微，痰多气短，肢体沉重，形体肥胖，遇阴雨天而易发作或加重，伴有倦怠乏力，纳呆便溏，咯吐痰涎，舌体胖大且边有齿痕，苔浊腻或白滑，脉滑。

71. 患者，男，46岁，头痛以前额为甚，面红，牙痛，便干，舌红苔黄，脉弦。处方用药加用白芷，其经络归属为

- A. 厥阴经
- B. 少阳经
- C. 太阳经
- D. 阳明经
- E. 少阴经

答案：D

解析：患者头痛特点是前额痛，牙痛，且用药有白芷，则可判断为阳明经。

72. 张某，女性，28岁。10分钟前进食冰淇淋后，出现呃逆，呃声沉缓有力，胸膈及胃脘不舒，得热则减，口淡不渴，舌苔白润，脉迟缓。其诊断是

- A. 呃逆脾胃阳虚证 B.
- 呃逆气机郁滞证 C.
- 呃逆之胃寒气逆证D.

胃痛脾胃虚寒证

- E. 呃逆胃火上逆证

答案：C

解析：呃逆之胃寒气逆证

证候主症：呃声沉缓有力，胸膈及胃脘不舒，得热则减，遇寒更甚，进食减少，喜食热饮，口淡不渴，舌苔白润，脉迟缓。

73. 李某，男性，40岁。反复胃脘疼痛8年，近2天，胃脘疼痛，似刀割，痛有定处，按

之痛甚，痛时持久，食后加剧，入夜尤甚，黑便，舌质紫暗，脉涩。其治疗应首选的方剂是

- A. 身痛逐瘀汤
- B. 复元活血汤
- C. 血府逐瘀汤
- D. 失笑散合丹参饮
- E. 桃核承气汤

答案：D

解析：胃痛之瘀血停胃证

证候主症：胃脘疼痛，如针刺，似刀割，痛有定处，按之痛甚，痛时持久，食后加剧，入夜尤甚，或见吐血黑便，舌质紫黯或有瘀斑，脉涩。

治法：化瘀通络，理气和胃。

代表方：失笑散合丹参饮加减。

74. 张某，男，70岁。5年来时感眼前发黑，周围景物旋转，甚至无法站立，精神萎靡，腰酸膝软，两目干涩，耳鸣如蝉，舌红少苔，脉细数。其病证诊断是

- A. 眩晕肾精不足证
- B. 厥证之血厥
- C. 中风中经络之阴虚风动证
- D. 眩晕气血亏虚证
- E. 中风肝肾亏虚证

答案：A

解析：眩晕之肾精不足证

证候主症：眩晕日久不愈，精神萎靡，腰酸膝软，少寐多梦，健忘，两目干涩，视力减退，或遗精滑泄，耳鸣齿摇。或颧红咽干，五心烦热，舌红少苔，脉细数；或面色（白光）白，形寒肢冷，舌淡嫩，苔白，脉弱尺甚。

75. 李某，男性，35岁。7天前因外出淋雨，出现高热，时时振寒，汗出烦躁，咳嗽痰多。现症：胸满作痛，转侧不利，咳吐浊痰，呈黄绿色，自觉喉间有腥味，口干咽燥，舌苔黄腻，脉滑数。其诊断是

- A. 肺痈溃脓期
- B. 咳嗽痰热蕴肺证
- C. 肺痈初期

D. 肺痈恢复期

E. 肺痈成痈期

答案：E

解析：肺痈之成痈期

证候主症：身热转甚，时时振寒，继则壮热，汗出烦躁，咳嗽气急，胸满作痛，转侧不利，咳吐浊痰，呈黄绿色，自觉喉间有腥味，口干咽燥，舌苔黄腻，脉滑数。

76. 患者，女性，40岁。咳嗽1个月，呈阵发性，咳时面赤，咽干口苦，常感痰滞咽喉而咯之难出，量少质黏，胸胁胀痛，咳时引痛，舌红，舌苔薄黄，脉弦数。此病证的治法是

- A. 滋阴润肺，化痰止咳
- B. 疏风清肺，润燥止咳
- C. 清热肃肺，豁痰止咳
- D. 燥湿化痰，理气止咳
- E. 清肺泻肝，顺气降火

答案：E

解析：咳嗽之肝火犯肺证

证候主症：咳嗽呈阵发性，表现为上气咳逆阵作，咳时面赤，咽干口苦，常感痰滞咽喉而咯之难出，量少质黏，或如絮条，胸胁胀痛，咳时引痛，症状可随情绪波动而增减，舌红或舌边红，舌苔薄黄少津，脉弦数。治法：清肺泻肝，顺气降火。

77. 王某，女性，30岁。5天来每日一次寒战，发热，寒甚热微，呕吐腹泻，嗜睡不语，神志昏蒙，舌苔厚腻色白，脉弦。3周前曾去贵州旅游。治疗此病证首选的方剂是

- A. 加味不换金正气散
- B. 柴胡截疟饮
- C. 截疟七宝饮
- D. 何人饮
- E. 清瘴汤

答案：A

解析：冷瘴

证候主症：寒甚热微，或但寒不热，或呕吐腹泻，甚则嗜睡不语，神志昏蒙，舌苔厚腻色白，脉弦。

证机概要：瘴毒内盛，湿浊蒙蔽心窍。

治法：解毒除瘴，芳化湿浊。

代表方：加味不换金正气散。

78. 患者，女，40岁，精神抑郁，情绪不宁，胸部满闷，胁肋胀痛，痛无定处，脘闷暖气，不思饮食，大便不调，苔薄腻，脉弦。方药宜选

- A. 半夏厚朴汤
- B. 甘麦大枣汤
- C. 平胃散
- D. 丹栀逍遥散合左金丸
- E. 柴胡疏肝散

答案：E

解析：郁证之肝气郁结证

证候主症：精神抑郁，情绪不宁，胸部满闷，胁肋胀痛，痛无定处，脘闷暖气，不思饮食，大便不调，苔薄腻，脉弦。

治法：疏肝解郁，理气畅中。

代表方：柴胡疏肝散加减。

79. 林某，男性，18岁。3天来双膝关节、肌肉疼痛酸楚，屈伸不利，疼痛呈游走性，初起有恶风、发热。舌苔薄白，脉浮。此病证的证机概要是

- A. 寒邪兼夹风湿，留滞经脉，闭阻气血
- B. 痰瘀互结，留滞肌肤，闭阻经脉
- C. 湿邪兼夹风寒，留滞经脉，闭阻气血
- D. 风邪兼夹寒湿，留滞经脉，闭阻气血
- E. 风湿热邪壅滞经脉，气血闭阻不通

答案：D

解析：行痹

证候主症：肢体关节、肌肉疼痛酸楚，屈伸不利，疼痛呈游走性，初起可见有恶风、发热等表证，舌苔薄白，脉浮或浮缓。

证机概要：风邪兼夹寒湿，留滞经脉，闭阻气血。

80. 患者，女，60岁。年老体虚，近1年来，心悸气短，劳则尤甚，自汗面色（白光）白，头昏神疲，肢体无力，舌苔淡白，脉细软弱。治疗本病的首选方剂是

- A. 七福饮
- B. 加味四君子汤

C. 天王补心丹

D. 养心汤

E. 大补元煎

答案：A

解析：虚劳之心气虚证。证候主症：心悸，气短，劳则尤甚，神疲体倦，自汗。治法：益气养心。代表方：七福饮加减。

81. 患者王某，男，36岁。呃声洪亮有力，冲逆而出，口臭烦渴，多喜冷饮，脘腹满闷，大便秘结，小便短赤，苔黄燥，脉滑数。诊断为

A. 呃逆之气机郁滞证

B. 呃逆之胃中寒冷证

C. 呃逆之胃火上逆证

D. 呃逆之脾胃阳虚证

E. 呃逆之胃阴不足证

答案：C

解析：呃逆之胃火上逆证

证候主症：呃声洪亮有力，冲逆而出，口臭烦渴，多喜冷饮，脘腹满闷，大便秘结，小便短赤，苔黄燥，脉滑数。

82. 患者，孙某。饮食稍多即吐，时作时止，面色（白光）白，倦怠乏力，喜暖恶寒，四肢不温，大便溏薄，舌质淡，脉濡弱。诊断为

A. 呕吐之外邪犯胃证

B. 呕吐之脾胃阳虚证

C. 呕吐之痰饮内阻证

D. 呕吐之肝气犯胃证

E. 呕吐之胃阴不足证

答案：B

解析：呕吐之脾胃阳虚证

证候主症：饮食稍多即吐，时作时止，面色（白光）白，倦怠乏力，喜暖恶寒，四肢不温，大便溏薄，舌质淡，脉濡弱。

83. 王某，女性，45岁。脘腹痞闷而胀，进食尤甚，拒按，噎腐吞酸，恶食呕吐，或大便不调，矢气频作，味臭如败卵，舌苔厚腻，脉滑。治疗应首选的方剂是

A. 保和丸

B. 越鞠丸

C. 枳实导滞丸

D. 平胃散

E. 旋覆代赭汤

答案：A

解析：胃痞之饮食内停证。

证候主症：脘腹痞闷而胀，进食尤甚，拒按，噎腐吞酸，恶食呕吐，或大便不调，矢气频作，味臭如败卵，舌苔厚腻，脉滑。

治法：消食和胃，行气消痞。

代表方：保和丸加减。

84. 张某，女，58岁。时常感到头痛，头痛隐隐，时时昏晕，心悸失眠，面色少华，神疲乏力，遇劳加重，舌质淡，苔薄白，脉细弱。其诊断是

A. 痰浊头痛

B. 肝阳头痛

C. 肾虚头痛

D. 瘀血头痛

E. 血虚头痛

答案：E

解析：血虚头痛

证候主症：头痛隐隐，时时昏晕，心悸失眠，面色少华，神疲乏力，遇劳加重，舌质淡，苔薄白，脉细弱。

85. 患者，女，18岁。头痛昏蒙，兼胸闷脘胀，苔白腻，脉滑。治疗除主穴外，应配选

A. 血海. 合谷

B. 中脘. 丰隆

C. 上星. 头维

D. 百会. 通天

E. 率谷. 太阳

答案：B

解析：头痛昏蒙，兼胸闷脘胀，苔白腻，脉滑者为痰浊头痛，痰浊头痛配中脘. 丰隆。

86. 患者，男性，26岁。因夜吹风扇，晨起出现右颈项痛，转动受限，并向同侧肩部放射。

针灸治疗除主穴外，宜选取

A. 风池. 合谷

B. 曲池. 合谷

C. 血海. 膈俞

D. 合谷. 大椎

E. 风池. 内关

答案: A

解析: 根据题干症状辨证为外邪内侵导致的漏肩风。漏肩风, 外邪内侵配合谷. 风池。87.

患者, 女性, 23 岁。月经不调, 常提前 7 天以上, 甚至 10 余日一行。治疗应首选

A. 气海. 三阴交. 归来

B. 关元. 三阴交. 肝俞 C.

足三里. 脾俞. 太冲 D.

命门. 三阴交. 足三里

E. 关元. 三阴交. 血海

答案: E

解析: 本病属月经先期。针灸治疗主穴: 关元. 三阴交. 血海。

88. 患者, 男性, 62 岁。咳嗽一个月, 劳累后加重, 咳吐黏稠痰, 胸脘痞闷, 胃纳减少, 舌苔白腻, 脉濡滑。治疗除主穴外, 还应取

A. 尺泽. 列缺 B.

脾俞. 阴陵泉C.

风门. 大椎 D.

丰隆. 阴陵泉

E. 脾俞. 胃俞

答案: D

解析: 本患者属内伤咳嗽痰湿阻肺。痰湿阻肺配丰隆. 阴陵泉。

89. 患者, 男, 23 岁。目赤肿痛, 眼涩难开, 流泪, 畏光, 伴发热. 恶风. 头痛, 舌苔薄黄, 脉浮数。治疗除取主穴外, 还应加

A. 四白. 养老

B. 风池. 侠溪

C. 印堂. 内庭

D. 少商. 外关

E. 关冲. 支沟

答案: D

解析: 目赤肿痛的针灸治疗。本证为外感风热型目赤肿痛, 治疗除取主穴外, 还应加少商. 外关。

90. 患者, 男, 45 岁, 天冷外出突觉胸前区刺痛, 心痛彻背, 心慌汗出, 面色晦暗, 唇

甲青紫, 舌质紫暗, 脉涩, 针灸治疗除主穴外, 应配

A. 内关. 阴郄

B. 心俞. 脾俞

C. 膻中. 心俞

D. 神阙. 关元

E. 神阙. 至阳

答案: E

解析: 遇寒诱发, 唇甲青紫, 心痛如刺, 心痛彻背, 舌质紫暗, 脉涩者为寒邪凝滞。根据患者主诉, 应考虑为心绞痛之寒邪凝滞证, 应配神阙. 至阳。

91. 患者体质素弱, 近 2 个月来, 呕吐时作时止, 倦怠乏力, 脘腹痛而喜温喜按, 舌苔薄白, 脉弱。治疗除主穴外, 应选用

A. 期门. 太冲

B. 脾俞. 胃俞

C. 丰隆. 公孙

D. 上脘. 胃俞

E. 梁门. 天枢

答案: B

解析: 根据题干诊断为脾胃虚寒之呕吐, 针灸宜配脾俞. 胃俞。

92. 患者突然出现左半身活动不利, 舌强语蹇, 兼眩晕头痛, 烦躁, 舌红, 苔黄, 脉弦而有力。针灸治疗除主穴外, 应加用

A. 足三里. 气海

B. 太溪. 风池 C.

丰隆. 合谷 D.

曲池. 内庭

E. 太冲. 太溪

答案: E

解析: 根据题干症状“烦躁, 脉弦”判断病位在肝, 应该为中风之肝阳暴亢证。肝阳暴亢针灸宜配太冲. 太溪

93. 患者, 女性, 35 岁。2 个月前突发高热, 热退后出现周身乏力, 并见下肢痿软无力, 食少纳呆, 腹胀便溏, 神疲乏力。治疗本病应选用主要经脉是

A. 手足阳明经穴. 夹脊穴

B. 手足太阳经穴. 夹脊穴

C. 手足太阴经穴. 夹脊穴

D. 手足厥阴经穴. 夹脊穴

E. 手足少阳经穴. 夹脊穴

答案: A

解析: 痿证的针灸治疗: 治法: 祛邪通络, 濡养筋脉。以手足阳明经穴和夹脊穴为主。

94. 患者, 女性, 48 岁。失眠 1 年, 多梦少寐, 入睡迟, 易惊醒, 多疑善惊, 气短头晕, 舌淡, 脉弦细。治疗除选取主穴外, 应加用的腧穴是

A. 肝俞. 间使

B. 脾俞. 胃俞

C. 心俞. 胆俞

D. 心俞. 肾俞

E. 心俞. 脾俞

答案: C

解析: 不寐之心胆气虚证, 配心俞. 胆俞 95.

患者, 男, 70 岁。右侧肢体活动不利 1 月, 神志清楚, 伴舌强语蹇, 右侧口角下垂。治疗应首选的经穴是

A. 督脉. 手厥阴及足太阴经穴

B. 督脉. 手厥阴及足少阴经穴

C. 督脉. 手少阴及足太阴经穴

D. 督脉. 手少阴及足厥阴经穴

E. 督脉. 手少阴及足少阴经穴

答案: A

解析: 中风中经络主症: 意识清楚, 半身不遂, 口角喎斜, 语言不利。治法: 疏通经络, 醒脑调神。取督脉. 手厥阴及足太阴经穴为主。

96. 患者, 女, 66 岁。夜间难以入睡 2 月, 平素急躁易怒, 时有心烦, 舌红, 苔黄, 脉弦数。针刺选穴中具有调理阴阳. 安神助眠作用的腧穴是

A. 后溪. 太溪

B. 后溪. 照海

C. 列缺. 申脉

D. 太溪. 申脉

E. 照海. 申脉

答案: E

解析: 难以入睡, 急躁易怒, 舌红, 苔黄, 脉弦数者为不寐肝火扰神证。不寐主穴为百会. 安眠. 神门三阴交. 照海. 申脉。跷脉主寤寐, 司眼睑开阖, 照海通阴跷脉, 申脉通阳跷脉, 两穴同用可调节阴阳跷脉以安神助眠。

97. 患者, 男, 79 岁。哮喘反复发作, 声低气怯, 气息短促, 体质虚弱, 舌淡, 脉细无力。治疗除相应背俞少外, 还应选取的经穴是

A. 手太阴. 手阳明经穴

B. 手阳明. 足太阴经穴

C. 手太阴. 足少阴经穴

D. 手少阴. 足太阴经穴

E. 手少阴. 足少阴经穴

答案: C

解析: 哮喘虚证: 病程长, 反复发作或当缓解期, 哮喘声低气怯, 气息短促, 深吸为快, 体质虚弱, 脉弱无力。虚证的治法: 补益肺肾, 止哮平喘。取相应背俞穴及手太阴. 足少阴经穴为主。

98. 患者, 女, 26 岁。产后乳少, 乳房胀满疼痛, 胸胁胀闷, 舌红, 苔薄黄, 脉弦。除乳根. 膻中. 少泽外, 应加取

A. 太冲. 内关

B. 外关. 肝俞

C. 膈俞. 期门

D. 中脘. 天枢. 期门

E. 足三里. 脾俞. 胃俞

答案: E

解析: 乳少汁稀, 兼面色少华. 倦怠乏力者为缺乳气血虚弱证。气血虚弱配足三里. 脾俞. 胃俞。

99. 患者咽喉肿痛, 咽干, 口渴, 便秘, 舌红, 苔黄, 脉洪大。除少商. 合谷. 尺泽. 关冲外, 应加取

A. 内庭. 关冲

B. 厉兑. 天突

C. 内庭. 鱼际

D. 列缺. 照海

E. 曲池. 鱼际

答案: C

解析: 咽喉肿痛主症为咽喉部红肿疼痛. 吞咽不适, 兼吞咽困难, 高热, 口渴喜饮, 大便秘结, 小便黄赤, 舌红, 苔黄, 脉数有力者为肺胃热盛. 肺胃热盛配内庭. 鱼际。

100. 患者, 女, 41 岁。精神抑郁善忧, 情绪不宁, 伴咽中有物梗塞, 舌苔白腻, 脉弦滑。治疗除取主穴外, 还应选用的穴位是

A. 曲泉. 膻中. 期门 B.

行间. 侠溪. 外关 C.

通里. 心俞. 三阴交 D.

太溪. 三阴交. 肝俞

E. 丰隆. 阴陵泉. 天突

答案: E

解析: 郁证主症精神抑郁善忧, 情绪不宁或易怒易哭. 兼咽中如有物梗塞, 舌苔白腻, 脉弦滑者为痰气郁结证. 痰气郁结配丰隆. 阴陵泉. 天突。

101. 患者, 女, 52 岁。月经时多时少, 伴有心烦易怒, 烘热汗出, 腰膝酸软, 舌质红, 脉弦细。针灸治疗除主穴外, 还应选取的配穴是

A. 照海. 阴谷

B. 风池. 太冲

C. 关元. 命门

D. 中脘. 丰隆

E. 心俞. 神门

答案: B

解析: 绝经前后诸证主症为月经紊乱, 潮热出汗, 心悸, 情绪不稳定. 兼头晕目眩, 心烦易怒, 烘热汗出, 腰膝酸软, 经来量多, 舌质红, 脉弦细而数者为肝阳上亢证. 肝阳上亢配风池. 太冲。

102. 患者, 男, 35 岁。后腰肾区突发绞痛, 向腹部. 同侧阴囊放射, 伴有排尿中断, 尿血, 舌红, 苔黄腻, 脉弦滑数。治疗除取主穴外, 还应选用的穴位是

A. 神阙. 关元

B. 气海. 关元

C. 太冲. 丘墟

D. 胆俞. 至阳

E. 委阳. 合谷

答案: E

解析: 突发绞痛, 疼痛从后腰肾区, 向腹部. 同侧阴囊. 大腿内侧放射, 兼小便时有中断, 尿血, 舌红, 苔黄腻, 脉弦滑数者为肾绞痛下焦湿热证. 下焦湿热配委阳. 合谷。

A3 型题

患者男性, 56 岁, 肢体颤动粗大, 程度较重, 不能自制, 眩晕耳鸣, 面赤烦躁, 易激动, 心情紧张时颤动加重, 伴有肢体麻木, 口苦而干, 语言迟缓不清, 流涎, 尿赤, 大便干, 舌质红, 苔黄, 脉弦。

103. 该病诊断为

A. 颤证

B. 痹证

C. 痿证

D. 癩证

E. 癲证

答案: A

解析: 颤证风阳内动证

肢体颤动粗大, 程度较重, 不能自制, 眩晕耳鸣, 面赤烦躁, 易激动, 心情紧张时颤动加重, 伴有肢体麻木, 口苦而干, 语言迟缓不清, 流涎, 尿赤, 大便干, 舌质红, 苔黄, 脉弦。

治法: 镇肝息风, 舒筋止颤。

代表方: 天麻钩藤饮合镇肝息风汤加减。

104. 该病治法为

A. 平肝潜阳, 熄风活络

B. 舒筋止颤, 镇肝熄风

C. 填精补髓, 育阴熄风

D. 益气养血, 濡养筋脉

E. 清热化痰, 平肝熄风

答案: B

解析: 颤证风阳内动证

肢体颤动粗大，程度较重，不能自制，眩晕
耳鸣，面赤烦躁，易激动，心情紧张时颤动加
重，伴有肢体麻木，口苦而干，语言迟缓不清，
涎，尿赤，大便干，舌质红，苔黄，脉弦。

治法：镇肝息风，舒筋止颤。

代表方：天麻钩藤饮合镇肝息风汤加减。

105. 该病代表方剂是

- A. 导痰汤合羚角钩藤汤
- B. 人参养荣汤
- C. 龟鹿二仙膏
- D. 天麻钩藤汤合镇肝熄风汤加减
- E. 地黄饮子

答案：D

解析：颤证风阳内动证

肢体颤动粗大，程度较重，不能自制，眩晕
耳鸣，面赤烦躁，易激动，心情紧张时颤动加
重，伴有肢体麻木，口苦而干，语言迟缓不清，
涎，尿赤，大便干，舌质红，苔黄，脉弦。

治法：镇肝息风，舒筋止颤。

代表方：天麻钩藤饮合镇肝息风汤加减。

患者，女性，48岁。既往有焦虑、忧愁病史，
常因情志抑郁起病。此次因与他人发生争执后，
症状加重。遂来就诊。现症见：情绪不宁，心
悸健忘，失眠多梦，五心烦热，盗汗，口咽干燥，
舌红少津，脉细数。

106. 其中医诊断为

- A. 郁证
- B. 癲证
- C. 痫证
- D. 狂证
- E. 虚火喉痹

答案：A

解析：郁证的诊断要点：

(1) 以忧郁不畅，情绪不宁，胸胁胀满疼
痛为主要临床表现，或有易怒易哭，或有咽
中如有炙脔，吞之不下，咯之不出等特殊症状。

(2) 患者大多数有忧愁、焦虑、悲哀、恐惧、
愤懑等情志内伤的病史。并且郁证病情的反
复常与情志因素密切相关。

(3) 多发于青中年女性。无其他病证的症
状及体征。

107. 其中医辨证为

- A. 心脾两虚证
- B. 气郁化火证
- C. 心肾阴虚证
- D. 肝气郁结证
- E. 心神失养证

答案：C

解析：郁证心肾阴虚证

证候主症：情绪不宁，心悸，健忘，失眠，
多梦，五心烦热，盗汗，口咽干燥，舌红少
津，脉细数。

证机概要：阴精亏虚，阴不涵阳。

治法：滋养心肾。

代表方：天王补心丹合六味地黄丸加减

108. 治疗宜首选的方剂是

- A. 归脾汤
- B. 天王补心丹
- C. 羚角钩藤汤
- D. 镇肝息风汤
- E. 甘麦大枣汤

答案：B

解析：郁证心肾阴虚证

证候主症：情绪不宁，心悸，健忘，失眠，多梦，五心烦热，盗汗，口咽干燥，舌红少津，脉细数。

证机概要：阴精亏虚，阴不涵阳。

治法：滋养心肾。

代表方：天王补心丹合六味地黄丸加减
109. 若心肾不交而见心烦失眠，多梦遗精者，可加用药物

- A. 黄连. 肉桂 B. 芡实. 莲须 C. 芡实. 金樱子 D. 黄连. 金樱子 E. 黄柏. 金樱子

答案：A

解析：郁证心肾阴虚证

证候主症：情绪不宁，心悸，健忘，失眠，多梦，五心烦热，盗汗，口咽干燥，舌红少津，脉细数。

证机概要：阴精亏虚，阴不涵阳。

治法：滋养心肾。

代表方：天王补心丹合六味地黄丸加减。

常用药：地黄. 怀山药. 山茱萸. 天冬. 麦冬.

玄参. 西洋参. 茯苓. 五味子. 当归. 柏子仁.

酸枣仁. 远志. 丹参. 丹皮。

加减：心肾不交而见心烦失眠，多梦遗精者，可合交泰丸（黄连. 肉桂）交通心肾；遗精较频者，可加芡实. 莲须. 金樱子补肾固涩。

患者于某，女性，58岁。两年前曾患“中风”，经治已愈，之后逐渐出现善忘呆滞，言语模糊不清，行为古怪孤僻，时哭时笑，症见两目黯晦，舌黯，脉细涩。

110. 其诊断是

- A. 中风恢复期

B. 中风后遗症

C. 郁证

D. 健忘

E. 痴呆

答案：E

解析：痴呆是由髓减脑消，神机失用所导致的一种神志异常的疾病，以呆傻愚笨. 智能低下. 善忘等为主要临床表现。

111. 其辨证分型是

A. 髓海不足证

B. 瘀血内阻证

C. 风痰瘀阻证

D. 气虚络瘀证

E. 痰浊蒙窍证

答案：B

解析：瘀血内阻证

证候：表情迟钝，言语不利，善忘，易惊恐，或思维异常，行为古怪，伴肌肤甲错，口干不欲饮，双目晦暗，舌质暗或有瘀点瘀斑，脉细涩。

证机概要：瘀血阻滞，脑脉痹阻。

治法：活血化瘀，开窍醒脑。

代表方：通窍活血汤加减。

112. 其治法是

A. 活血化瘀，开窍醒脑

B. 豁痰开窍，健脾化浊

C. 祛风化痰，通络化瘀

D. 益气养血，化瘀通络

E. 搜风化痰，行瘀通络

答案：A

解析：瘀血内阻证

证候：表情迟钝，言语不利，善忘，易惊恐，或思维异常，行为古怪，伴肌肤甲错，口干

不欲牧，双目晦暗，舌质暗或有瘀点瘀斑，脉细涩。

证机概要：瘀血阻滞，脑脉痹阻。

治法：活血化瘀，开窍醒脑。

代表方：通窍活血汤加减。

113. 其治疗应首选的方剂是

- A. 七福饮加减
- B. 天麻钩藤饮加减
- C. 涤痰汤加减
- D. 通窍活血汤加减
- E. 还少丹加减

答案：D

解析：瘀血内阻证

证候：表情迟钝，言语不利，善忘，易惊恐，或思维异常，行为古怪，伴肌肤甲错，口干不欲牧，双目晦暗，舌质暗或有瘀点瘀斑，脉细涩。

证机概要：瘀血阻滞，脑脉痹阻。

治法：活血化瘀，开窍醒脑。

代表方：通窍活血汤加减。

患者，男，25岁。腹痛伴剧烈呕吐2天。病初腹痛呈阵发性加剧，曾吐出咖啡色物，已2天未进食，腹胀拒按，大便秘结，小便短黄，口燥咽干。2年前曾做过阑尾炎手术。检查：于脐旁可触到条索状肿物。舌质红，苔黄燥，脉滑数。

114. 其辨证是

- A. 气滞腹痛证
- B. 寒积腹痛证
- C. 湿热壅滞证
- D. 中阳不足证
- E. 瘀血阻滞证

答案：C

解析：腹痛，湿热壅滞证

证候主症：腹痛拒按，烦渴引饮，大便秘结，或溇滞不爽，潮热汗出，小便短黄，舌质红，苔黄燥或黄腻，脉滑数。

证机概要：湿热内结，气机壅滞，腑气不通。治

法：泄热通腑，行气导滞。

代表方：大承气汤加减。

115. 其治法是

- A. 理气止痛
- B. 温中散寒，健脾和胃
- C. 泻热通腑，行气导滞
- D. 温补脾胃，缓急止痛
- E. 活血化瘀

答案：C

解析：腹痛，湿热壅滞证

证候主症：腹痛拒按，烦渴引饮，大便秘结，或溇滞不爽，潮热汗出，小便短黄，舌质红，苔黄燥或黄腻，脉滑数。

证机概要：湿热内结，气机壅滞，腑气不通。治

法：泄热通腑，行气导滞。

代表方：大承气汤加减。

116. 治疗应首选的方剂是

- A. 木香顺气散加减
- B. 良附丸加减
- C. 大承气汤加减
- D. 黄芪建中汤加减
- E. 少腹逐瘀汤加减

答案：C

解析：腹痛，湿热壅滞证

证候主症：腹痛拒按，烦渴引饮，大便秘结，或溇滞不爽，潮热汗出，小便短黄，舌质红，苔黄燥或黄腻，脉滑数。

证机概要：湿热内结，气机壅滞，腑气不通。治

法：泄热通腑，行气导滞。

代表方：大承气汤加减。

患者，男，50岁。1个月前因劳累过度出现形体倦怠，头晕恶心，纳食不佳，厌食油腻，过1周后两目黄染，随后皮肤亦黄，黄色尚鲜明，伴胁痛，脘胀，头重如裹，小便短黄，大便稀溏。舌苔黄腻，脉濡数。

117. 其辨证是

- A. 热重于湿证
- B. 湿重于热证
- C. 寒湿阻遏证
- D. 疫毒炽盛证
- E. 脾虚湿滞证

答案：B

解析：黄疸，阳黄，湿重于热证

证候主症：身目俱黄，黄色不及前者鲜明，头重身困，胸脘痞满，食欲减退，恶心呕吐，腹胀或大便溏垢，舌苔厚腻微黄，脉濡数或濡缓。

证机概要：湿遏热伏，困阻中焦，胆汁不循常道。

治法：利湿化浊运脾，佐以清热。

代表方：茵陈五苓散合甘露消毒丹加减。

118. 其治法是

- A. 清热通腑，利湿退黄
- B. 清热解毒，凉血开窍
- C. 温中化湿，健脾和胃
- D. 利湿化浊运脾，佐以清热
- E. 健脾养血，利湿退黄

答案：D

解析：黄疸，阳黄，湿重于热证

证候主症：身目俱黄，黄色不及前者鲜明，头重身困，胸脘痞满，食欲减退，恶心呕吐，腹胀或大便溏垢，舌苔厚腻微黄，脉濡数或

濡缓。

证机概要：湿遏热伏，困阻中焦，胆汁不循常道。

治法：利湿化浊运脾，佐以清热。

代表方：茵陈五苓散合甘露消毒丹加减。

119. 治疗应首选的方剂是

- A. 茵陈五苓散合甘露消毒丹
- B. 《千金》犀角散
- C. 茵陈术附汤
- D. 茵陈蒿汤 E.

黄芪建中汤

答案：A

解析：黄疸，阳黄，湿重于热证

证候主症：身目俱黄，黄色不及前者鲜明，头重身困，胸脘痞满，食欲减退，恶心呕吐，腹胀或大便溏垢，舌苔厚腻微黄，脉濡数或濡缓。

证机概要：湿遏热伏，困阻中焦，胆汁不循常道。

治法：利湿化浊运脾，佐以清热。

代表方：茵陈五苓散合甘露消毒丹加减。

120. 下列哪项不属于阳黄与阴黄鉴别要点的是

- A. 病程较长与较短
- B. 起病急与起病缓
- C. 黄疸鲜明与晦暗
- D. 小便黄与不黄
- E. 热证与寒证

答案：D

解析：黄疸的辨证，应首辨阳黄、阴黄。阳黄黄色鲜明，发病急，病程短，常伴身热、口干苦、舌苔黄腻、脉弦数。阴黄黄色晦暗，病程长，病势缓，常伴纳少、乏力、舌淡、脉沉迟或细缓。

B 型题

- A. 小便混浊，白如泔浆，尿道不痛
- B. 小便混浊，状如脂膏，尿热涩痛
- C. 发热，小便赤热，尿时灼痛
- D. 排出砂石，排尿中断，腰酸绞痛
- E. 小腹胀满，尿涩疼痛，余沥不尽

121. 膏淋的临床特点是

答案：B

解析：A 是尿浊的临床特点。B 是膏淋的临床特点。C 是热淋的临床特点。D 是石淋的临床特点。E 是气淋的临床特点。膏淋与尿浊的最大区别就是有无尿痛。

122. 尿浊的临床特点是

答案：A

解析：A 是尿浊的临床特点。B 是膏淋的临床特点。C 是热淋的临床特点。D 是石淋的临床特点。E 是气淋的临床特点。膏淋与尿浊的最大区别就是有无尿痛。

- A. 左归丸 B.
- 大补元煎
- C. 滋水清肝饮
- D. 黄连阿胶汤
- E. 二阴煎

123. 治肾精不足之眩晕首选

答案：A

解析：眩晕肾精不足证

证候主症：眩晕日久不愈，精神萎靡，腰酸膝软，少寐多梦，健忘，两目干涩，视力减退，或遗精滑泄，耳鸣齿摇。或颧红咽干，五心烦热，舌红少苔，脉细数；或面色（白光）白，形寒肢冷，舌淡嫩，苔白，脉弱尺甚。

治法：滋养肝肾，益精填髓。

代表方：左归丸加减。

124. 治疗肾虚头痛首选

答案：B

解析：肾虚头痛

证候主症：头痛且空，眩晕耳鸣，腰膝酸软，神疲乏力，滑精或带下，舌红少苔，脉细无力。

治法：养阴补肾，填精生髓。

代表药：大补元煎加减。

- A. 暖气呃逆，呕吐痰涎
- B. 水饮不下，面浮足肿
- C. 胸膈痞胀，暖气则舒
- D. 胸膈刺痛，痛处固定不移
- E. 食道干涩，饮食难下

125. 噎膈痰气交阻证的主症特点是

答案：A

解析：噎膈之痰气交阻证

证候主症：吞咽梗阻，胸膈痞满，或疼痛，情志抑郁时则加重，暖气呃逆，呕吐痰涎，口干咽燥，大便艰涩，舌质红，苔薄腻，脉弦滑。

126. 噎膈瘀血内结者的主症特点是

答案：D

解析：噎膈之瘀血内结证

证候主症：饮食梗阻难下，或虽下而复吐出，甚或呕出物如赤豆汁，胸膈疼痛，固着不移，肌肤枯燥，形体消瘦，舌质紫暗，脉细涩。

- A. 黄芩. 黄连
- B. 金钱草. 海金沙
- C. 延胡索. 川楝子
- D. 茵陈. 黄柏
- E. 大黄. 芒硝

127. 胁痛肝胆湿热证，若兼见发热. 黄疸，应加用

答案：D

解析：胁痛肝胆湿热证，若兼见发热. 黄疸

者，加茵陈、黄柏以清热利湿退黄。

128. 胁痛肝胆湿热证，如砂石阻滞胆道，应加用

答案：B

解析：若湿热煎熬，结成砂石，阻滞胆道，症见胁肋剧痛，连及肩背者，可加金钱草、海金沙、郁金、川楝子。

- A. 地黄、当归
- B. 银柴胡、地骨皮
- C. 竹茹、竹叶
- D. 天花粉、川贝母
- E. 沙参、玉竹

129. 肺痿虚热证，出现虚烦、呕逆者，应加用

答案：C

解析：肺痿虚热证，如火盛，出现虚烦、呛、呕逆者，则去大枣，加竹茹、竹叶清热和胃降逆。

130. 肺痿虚热证，出现津伤甚者，应加用

答案：E

解析：肺痿虚热证，津伤甚者加沙参、玉竹以养肺津。

- A. 五味子、牡蛎、浮小麦
- B. 党参、白术
- C. 苍术、牛膝、黄柏、薏苡仁
- D. 秦艽、银柴胡、白薇
- E. 黄芩、栀子、柴胡

131. 盗汗阴虚火旺证，潮热甚者，应加用的药物是

答案：D

解析：盗汗阴虚火旺证，潮热甚者，加秦艽、银柴胡、白薇清退虚热。

132. 自汗肺卫不固证，气虚甚者，应加用的药物是

答案：B

解析：自汗肺卫不固证，气虚甚加党参、白术健脾补肺。

- A. 枳实导滞丸
- B. 小柴胡汤
- C. 厚朴温中汤
- D. 葛根芩连汤
- E. 枳术丸

133. 胃痛寒邪客胃证，兼见有纳呆、身重、恶心想吐、苔白腻者，可加

答案：C

解析：胃痛寒邪客胃证，兼有纳呆、身重、恶心想吐、苔白腻等寒湿症状，可用厚朴温中汤

温中燥湿。

134. 胃痛饮食伤胃证，胃脘胀痛而便秘者，可用

答案：A

解析：胃痛饮食伤胃证，若胃脘胀痛而便秘者，可合用小承气汤或改用枳实导滞丸以通腑行气。

- A. 石斛、芦根
- B. 金银花、连翘
- C. 石膏、郁金
- D. 黄芩、桑白皮
- E. 栀子、黄连

135. 呃逆胃阴不足证，若咽喉不利，胃火上炎者，应加用

答案：A

解析：呃逆胃阴不足证，若咽喉不利，胃火上炎者，应加用石斛、芦根以养阴清热。136. 呃逆气机郁滞证，若心烦口苦，气郁化热者，应加用

答案：E

解析：呃逆气机郁滞证，若心烦口苦，气郁化热者，应加用栀子、黄连泄肝和胃。

- A. 病人呼气时进针，吸气时出针
B. 进针时疾速刺入，多捻转，徐徐出针
C. 进针时徐徐刺入，少捻转，疾速出针
D. 出针时摇大针孔而不按

E. 病人吸气时进针，呼气时出针

137. 属于疾徐补法操作的是

答案：C

解析：疾徐补泻法中，进针时徐徐刺入，少捻转，疾速出针者为补法。

138. 属于呼吸泻法操作的是

答案：E

解析：呼吸补泻法中，病人吸气时进针，呼气时出针为泻法。

- A. 四肢疼痛
B. 全身疼痛
C. 乳痈
D. 咳嗽
E. 瘾疹

139. 常用大包穴治疗的是

答案：B

解析：大包【主治】①气喘；②胸胁痛；③周身疼痛。四肢无力等肌肉病症。

140. 常用血海穴治疗的是

答案：E

解析：血海【主治】①月经不调、痛经、经闭等妇科病；②瘾疹、湿疹、丹毒，皮肤瘙痒等皮外科病；③膝股内侧痛。

- A. 神门
B. 通里
C. 少府
D. 阴郄
E. 少海

141. 在腕横纹上 0.5 寸，尺侧腕屈肌腱的桡侧缘的腧穴是

答案：D

解析：阴郄在前臂前区，腕掌侧远端横纹上 0.5 寸，尺侧腕屈肌腱的桡侧缘。

142. 在腕横纹上 1 寸，尺侧腕屈肌腱的桡侧缘的腧穴是

答案：B

解析：通里在前臂前区，腕掌侧远端横纹上 1 寸，尺侧腕屈肌腱的桡侧缘。

- A. 外踝高点上 3 寸，腓骨前缘
B. 外踝高点上 4 寸，腓骨前缘
C. 内踝前下方凹陷中，当舟骨结节与内踝尖连线的中点处
D. 外踝前下方，趾长伸肌腱的外侧凹陷中

外踝高点上 2 寸，腓骨前缘

143. 悬钟穴的定位是

答案：A

解析：悬钟穴：外踝高点上 3 寸，腓骨前缘。

144. 丘墟穴的定位是

答案：D

解析：丘墟穴：在外踝前下方，趾长伸肌腱的外侧凹陷中。

- A. 目内眦
B. 目外眦
C. 目上
D. 目下
E. 鼻旁

鼻旁

145. 手少阳经与足少阳经相交接的部位是

答案：B

解析：手少阳经与足少阳经交接于目外眦。

146. 手太阳经与足太阳经相交接的部位是

答案：A

解析：手太阳经与足太阳经交接于目内眦。

- A. 先深后浅，轻插重提，提插幅度大，频率快，操作时间长
B. 先浅后深，重插轻提，提插幅度小，频率慢，操作时间短

- C. 病人吸气时进针，呼气时出针
- D. 出针时摇大针孔而不按压
- E. 出针后迅速按压针孔

147. 属于提插补法操作的是

答案：B

解析：提插补泻操作：①补法：针下得气后，先浅后深，重插轻提，提插幅度小，频率慢，操作时间短者为补法；②泻法：针下得气后，先深后浅，轻插重提，提插幅度大，频率快，操作时间长者为泻法。

148. 属于开阖补法操作的是

答案：E

解析：开阖补泻操作：①补法：出针后迅速揉按针孔为补法；②泻法：出针时摇大针孔而不按为泻法。

- A. 陷下则灸之
- B. 热则疾之
- C. 寒则留之
- D. 标本同治
- E. 三因制宜

149. 以上哪项属于补虚泻实的治疗原则

答案：A

解析：补虚泻实包括三方面的含义：①虚则补之，陷下则灸之；②实则泻之，菀陈则除之；③不盛不虚以经取之。

150. 以上哪项属于治病求本的治疗原则

答案：D

解析：治病求本包括三方面的含义：①急则治标；②缓则治本；③标本同治。

第四单元

A1 型题

1. 治疗经行头痛血虚证，应首选的方剂是

- A. 归脾汤
- B. 补中益气汤
- C. 八珍汤
- D. 十全大补汤
- E. 人参养荣汤

答案：C

解析：经行头痛之血虚证

主要证候：经期或经后头晕，头部绵绵作痛，月经量少，色淡，质稀；心悸少寐，神疲乏力；舌淡，苔薄，脉虚细。

治法：养血益气。

方药：八珍汤加首乌、蔓荆子。

2. 滑胎之肾阳亏虚证的主治方剂

- A. 补肾固冲丸
- B. 育阴汤
- C. 肾气丸
- D. 安奠二天汤
- E. 以上均非

答案：C

解析：滑胎之肾阳亏虚证

主要证候：屡孕屡堕；腰膝酸软，甚则腰痛如折，头晕耳鸣，畏寒肢冷，小便清长，夜尿频多，大便溏薄；舌淡，苔薄而润，脉沉迟或沉弱。

治法：温补肾阳，固冲安胎。

方药：肾气丸加减。

3. 持“阳非有余，阴常不足”学术观点的医家是

- A. 薛己
- B. 陈自明
- C. 赵献可
- D. 陈修园
- E. 张介宾

答案：E

解析：《景岳全书》是张介宾总结前人及毕生经验，博采众说，于晚年编辑而成。其学术观点“阳非有余，阴常不足”是张介宾对人体阴阳状态的著名观点，强调阴阳相互为用，相互转化，“阴以阳为主，阳以阴为根”，“阴不可以无阳，阳不可以无阴”。

4. 脾失统摄，冲任不固可导致的妇科疾病是

- A. 经期延长
- B. 带下臭秽
- C. 经行吐衄
- D. 痛经
- E. 闭经

答案：A

解析：脾失统摄：脾气虚弱，中气不足，统摄无权，冲任不固，可出现月经过多、经期延长、崩漏、胎漏、产后恶露不绝、乳汁自出。

5. 经行乳房胀痛肝气郁结证的治法是

- A. 疏肝解郁，行气止痛
- B. 疏肝理气，和胃通络
- C. 疏肝解郁，活血止痛
- D. 疏肝理气，柔肝止痛
- E. 疏肝解郁，养血止痛

答案：B

解析：经行乳房胀痛肝气郁结证

主要证候：经前或经行乳房胀满疼痛，或乳头痒痛，甚则痛不可触衣。经行不畅，血色黯红，小腹胀痛；胸闷肋胀，精神抑郁；苔薄白，脉弦。

治法：疏肝理气，和胃通络。

方药：逍遥散加减。

6. 治疗经行浮肿脾肾阳虚证，应首选的方剂是

- A. 参苓白术散
- B. 二仙汤合苓桂术甘汤
- C. 肾气丸合苓桂术甘汤
- D. 金匮肾气丸

E. 右归丸合苓桂术甘汤

答案：C

解析：经行浮肿脾肾阳虚证

主要证候：经行面浮肢肿，按之没指，晨起头面肿甚，月经推迟，经行量多，色淡，质薄；腹胀纳减，腰膝酸软，大便溏薄；舌淡，苔白腻，脉沉缓，或濡细。

治法：温肾化气，健脾利水。

方药：肾气丸合苓桂术甘汤。

7. 治疗经行浮肿气滞血瘀证，应首选的方剂是

A. 四物汤

B. 八物汤

C. 逍遥散

D. 四神丸合健固汤

E. 六味地黄丸

答案：B

解析：经行浮肿气滞血瘀证

主要证候：经行肢体肿胀，按之随手而起，经血色黯有块，脘闷肋胀，善叹息；舌紫黯，苔薄白，脉弦涩。

治法：理气行滞，养血调经。

方药：八物汤加泽泻、益母草。

8. 治疗经断复来血热证，应首选的方剂是A.

安老汤

B. 知柏地黄丸

C. 益阴煎

D. 萆薢渗湿汤

E. 易黄汤

答案：C

解析：经断复来血热证

主要证候：自然绝经2年以上经水复来，色深红，质稠，带下增多，色黄，有臭味，口苦口干，小便短赤，大便秘结；舌红，苔黄，脉弦滑。

治法：清热凉血，固冲止血。

方药：益阴煎加味。

9. 妊娠小便不通气虚证的代表方剂为

A. 导赤散

B. 加味五苓散

C. 补中益气汤

D. 益气导溺汤

E. 肾气丸

答案：D

解析：妊娠小便不通气虚证

主要证候：妊娠期间，小便不通，或频数量少，小腹胀急疼痛，坐卧不安，面色（白光）白，神疲倦怠，头重眩晕；舌淡，苔薄白，脉虚缓滑。

治法：补中益气，导溺举胎。

方药：益气导溺汤。

10. 治疗阴疮寒湿证，应首选的方剂是

A. 仙方活命饮

B. 龙胆泻肝汤

C. 蛇床子散 D.

萆薢渗湿汤

E. 托里消毒散

答案：E

解析：阴疮之寒湿证

主要证候：阴部肌肤肿溃，触之坚硬，色晦黯不泽，日久不愈，脓水淋漓，疼痛绵绵；伴面色（白光）白，精神不振，疲乏无力，畏寒肢冷，食少纳呆；舌淡苔白腻，脉沉细缓。

治法：温经散寒，除湿消疮

方药：阳和汤或托里消毒散。

11. 月经产生机制是

A. 肾气.天癸.冲任.经络协调作用于胞宫B.

脏腑.天癸.气血.经络协调作用于胞宫C.

肾气.天癸.气血.冲任调作用于胞宫 D.

脏腑.气血.天癸.冲任调作用于胞宫

E.脾胃.气血.冲任.经络调作用于胞宫

答案：B

解析：月经的产生，是女子发育到成熟年龄阶段后，脏腑.天癸.气血.经络协调作用于胞宫的生理现象。

12. 分泌晚期，子宫内膜正常厚度为A.

子宫内膜厚达 3mm

B. 子宫内膜厚达 5mm

C. 子宫内膜厚达 7mm

D. 子宫内膜厚达 8mm

E. 子宫内膜厚达 10mm

答案：E

解析：分泌晚期子宫内膜厚达 10mm，并呈海绵状。

13. 小儿稚阴稚阳学说，是指其生理状态为A.

脏气清灵，易趋健康

B. 脾常不足，肝常有余

C. 阳常有余，阴常不足

D. 脏腑娇嫩，形气未充

E. 生机蓬勃，发育迅速

答案：D

解析：古人将小儿脏腑娇嫩、形气未充这一生理特点归纳为“稚阴稚阳”。

14. 治疗蛔虫病肠虫证，应首选的方剂是A.

乌梅丸

B. 驱虫粉 C.

使君子散D.

化虫丸

E. 追虫丸

答案：C

解析：蛔虫病之肠虫证

证候：脐腹部疼痛，轻重不一，时作时止，或不思饮食，或嗜食异物，大便不调，或泄泻或便秘，或便下蛔虫，面色多黄滞，可见面部白斑，白睛蓝斑，唇内粟状白点，夜寐齟齬。甚者，腹部可扪及条索状物，时聚时散，形体消瘦，肚腹胀大，青筋显露。舌苔多见花剥或腻，舌尖红赤，脉弦滑。

治法：驱蛔杀虫，调理脾胃。

代表方剂：使君子散。

15. 7 周岁小儿的身长应为

A. 95cm

B. 100cm

C. 105cm

D. 124cm

E. 90cm

答案：D

解析：临床可用以下公式估算 2 岁后至 12 岁儿童的身高：身高 (cm) = 75 + 7 × 年龄。

16. 尿频脾肾气虚证的症状特点是

A. 起病急，小便频数，滴沥不尽，小腹坠胀B.

病程长，小便频数，尿液清晰

C. 病程长，小便频数，尿急，尿痛

D. 病程长，小便频数，滴沥不尽，纳差畏寒E.

病程长，小便频数短赤，五心烦热

答案：D

解析：尿频之脾肾气虚证

证候：病程日久，小便频数，滴沥不尽，尿液不清，神倦乏力，面色萎黄，食欲不振，甚则畏寒怕冷，手足不温，大便稀薄，眼睑浮肿，舌质淡或有齿痕，苔薄腻，脉细弱。

治法：温补脾肾，升提固摄。

代表方剂：缩泉丸。

17. 治疗小儿厌食脾失健运证，应首选的方剂是

A. 异功散

B. 平胃散

C. 不换金正气散

D. 保和丸

E. 健脾丸

答案：C

解析：厌食之脾失健运证

证候：食欲不振，厌恶进食，食而乏味，或伴胸脘痞闷，嗳气泛恶，大便不调，偶尔多食后则脘腹饱胀，形体尚可，精神正常，舌淡红，苔薄白或薄腻，脉尚有力。

治法：调和脾胃，运脾开胃。

代表方剂：不换金正气散。

18. 治疗小儿厌食脾胃气虚证，应首选的方剂是

- A. 补中益气汤
- B. 不换金正气散
- C. 保和丸
- D. 异功散
- E. 四君子汤

答案：D

解析：厌食之脾胃气虚证

证候：不思进食，食而不化，大便溏薄夹不消化食物，面色少华，形体偏瘦，肢倦乏力，舌质淡，苔薄白，脉缓无力。

治法：健脾益气，佐以助运。

代表方剂：异功散、参苓白术散。

19. 小儿遗尿的病机主要是

- A. 肝经郁热，疏泄失司
- B. 脾肾气虚，下元不固
- C. 肾气不足，膀胱虚寒
- D. 肺脾气虚，水道失约
- E. 心肾失交，水火不济

答案：C

解析：遗尿多与膀胱和肾的功能失调有关，其中尤以肾气不足、膀胱虚寒为多见。

20. 小儿睡时露睛，属于

- A. 脾胃不和
- B. 肝脾不和
- C. 脾虚气弱
- D. 胃气不降
- E. 肾不纳气

答案：C

解析：小儿寐时眼睑张开而不能闭合，属于脾虚气弱。

21. 乳蛾热毒炽盛证应首选的方剂是

- A. 银翘马勃散
- B. 牛蒡甘桔汤
- C. 养阴清肺汤

D. 普济消毒饮

E. 荆防败毒散

答案：B

解析：乳蛾热毒炽盛证

证候：喉核赤肿明显，甚至溃烂化脓，吞咽困难，壮热不退，口干口臭，大便干结，小便黄少，舌红，苔黄，脉数或指纹青紫。治法：清热解毒，利咽消肿。

代表方剂：牛蒡甘桔汤。

22. 反复呼吸道感染最常见的发病年龄是

- A. 2~3 岁
- B. 1~3 岁
- C. 6 个月~3 岁
- D. 6 个月~6 岁
- E. 2~5 岁

答案：B

解析：反复呼吸道感染一年四季均可发生，以冬春气候变化剧烈时尤易反复不已。发病年龄多见于 6 个月~6 岁的小儿，1~3 岁的婴幼儿最为常见。

23. 患儿，3 岁。闻爆竹巨响后出现惊惕不安，身体战栗，间断抽搐伴神志不清，大便色青，脉律不整。治疗应首选的方剂是

- A. 清瘟败毒饮
- B. 羚角钩藤汤
- C. 天麻钩藤饮
- D. 大定风珠
- E. 琥珀抱龙丸

答案：E

解析：急惊风-惊恐惊风证

证候：暴受惊恐后惊惕不安，身体战栗，喜投母怀，夜间惊啼，甚至惊厥。抽风，神志不清，大便色青，脉律不整，指纹紫滞。治法：镇惊安神，平肝息风。

代表方剂：琥珀抱龙丸。

24. 以下哪个不是小儿腹痛发病原因

- A. 腹部中寒
- B. 乳食积滞

C. 胃肠热结

D. 脾胃虚寒

E. 外邪犯肺

答案：E

解析：小儿腹痛的发病原因较多，或因腹部中寒，或因乳食积滞，或因胃肠结热，或因素体脾胃虚寒，或因瘀血内阻所致。

25. 不适合用清热法治疗的是

A. 流痰后期，阴虚火旺，虚热不退者

B. 药物性皮炎皮损色红灼热

C. 局部红. 肿. 热. 痛 D.

热毒内传之走黄内陷

E. 疮色晦暗不泽，皮温较低

答案：E

解析：“疮色晦暗不泽，皮温较低”考虑寒邪较重，而非热胜之证，所以不适合用清热法。

27. 中医外科学中，温阳托毒法的代表方剂是

A. 右归丸

B. 托里消毒散

C. 金匱肾气丸

D. 六君子汤

E. 神功内托散

答案：E

解析：中医外科学中内托法的相关代表方剂：透托方，如透脓散；益气托毒方，如托

里消毒散；温阳托毒方，如神功内托散。

28. 痛的病因病机

A. 内郁湿火，外感风邪

B. 营卫不和，气血凝滞

C. 汗出不畅，湿热蕴蒸肌肤

D. 搔抓痒子，破伤染毒

E. 感受暑毒

答案：B

解析：外感六淫邪毒，或外来伤害，感染毒邪，或过食膏粱厚味，聚湿生浊，邪毒湿浊留阻肌肤，郁结不散，致使营卫不和，气血凝滞，经络壅遏，化火成毒而成。

29. 属于瘾疹的特点是

A. 呈带状分布的红斑上成簇的水疱

B. 大小不等的风团，色鲜红，骤起骤退

C. 皮肤上浅在性脓疱和脓痂

D. 皮肤油腻，出现红斑，覆有鳞屑

E. 对称分布，多形损害，剧烈瘙痒

答案：B

解析：“呈带状分布的红斑上成簇的水疱”是蛇串疮的特点；

“大小不等的风团，色鲜红，骤起骤退”是瘾疹的特点；

“皮肤上浅在性脓疱和脓痂”是黄水疮的特点；

“皮肤油腻，出现红斑，覆有鳞屑”是脂溢性皮炎的特点；

“对称分布，多形损害，剧烈瘙痒”是湿疮的特点。

30. 桃红四物汤宜用于脱疽的哪一证型

A. 气阴两虚证

B. 血脉瘀阻证

C. 热毒伤阴证

D. 寒湿阻滞证

E. 湿热毒盛证

答案：B

解析：脱疽之血脉瘀阻证

证候：患趾（指）酸胀疼痛加重，夜难入寐，步履艰难，患趾（指）皮色暗红或紫暗，下垂更甚，皮肤发凉干燥，肌肉萎缩，趺阳脉搏动消失；舌暗红或有瘀斑，苔薄白，脉弦涩。
治法：活血化瘀，通络止痛。
代表方：桃红四物汤加减。

31. 颜面疔的内治治疗大法，主要是

- A. 行瘀活血
- B. 透脓托毒
- C. 清热解毒
- D. 散风清热
- E. 调补气血

答案：C

解析：颜面疔内治以清热解毒为大法，火毒炽盛证宜凉血清热解毒。外治根据初起、成脓、溃后，分别采用箍毒消肿、提脓祛腐、生肌收口治疗。

32. 关于白秃疮，说法错误的是A.

- 头皮有覆盖灰白色鳞屑的斑片B.
- 毛发干枯无光泽
- C. 发缘处一般不被累及
- D. 可形成永久性脱发
- E. 病发根部有白色菌鞘包绕

答案：D

解析：白秃疮相当于西医的白癣。本病是头癣的一种，多见于学龄儿童，男性多于女性。皮损特征是在头皮有圆形或不规则的覆盖灰白鳞屑的斑片。病损区毛发干枯无泽，常在距头皮0.3~0.8cm处折断而呈参差不齐。头发易于拔落且不疼痛，病发根部包绕有白色鳞屑形成的菌鞘。自觉瘙痒。发病部位以头顶、枕部居多，但发缘处一般不被累及。青春后可自愈，秃发也能再生，不遗留疤痕。

33. 脂瘤痰湿化热证最佳选方为

- A. 丹栀逍遥散
- B. 清肝芦荟丸
- C. 化痰开郁方

D. 芩连二母丸合凉血地黄汤

E. 龙胆泻肝汤合仙方活命饮

答案：E

解析：脂瘤之痰湿化热证

证候：瘤体红肿、灼热、疼痛，甚至跳痛化脓；伴发热，恶寒，头痛，尿黄；舌红，苔薄黄，脉数。

治法：清热化湿，和营解毒。

方药：龙胆泻肝汤合仙方活命饮加减。

34. 脂溢性皮炎肠胃湿热证最佳方药为

- A. 五味消毒饮
- B. 通窍活血汤
- C. 四物汤合六味地黄汤
- D. 消风散合当归饮子
- E. 参苓白术散合茵陈蒿汤

答案：E

解析：脂溢性皮炎之肠胃湿热证

证候：皮损为潮红斑片，有油腻性痂屑，甚至糜烂、渗出；伴口苦口黏，脘腹痞满，小便短赤，大便臭秽；舌质红，舌苔黄腻，脉滑数。

治法：健脾除湿，清热止痒。

方药：参苓白术散合茵陈蒿汤。

35. 精癯脾肾气虚证，采用的治疗方药为A.

- 补中益气汤
- B. 八正散
- C. 沉香散
- D. 知柏地黄丸
- E. 济生肾气丸

答案：A

解析：精癯脾肾气虚证

证候：尿频，滴沥不畅，尿线细甚或夜间遗尿或尿闭不通，神疲乏力，纳谷不香，面色无华，便溏脱肛。舌淡，苔白，脉细无力。

治法：补脾益气，温肾利尿。

方药：补中益气汤加减。

36. 石瘕应首选的治疗原则是

- A. 早期，中药外敷

- B. 早期, 中药内治
- C. 早期化学治疗 D. 早期手术切除
- E. 早期放射治疗

答案: D

解析: 石瘿的治疗原则: 石瘿为恶性肿瘤, 应及早诊断并早期手术治疗。

37. 自然疫源性传染病是

- A. 患者
- B. 病原携带者
- C. 隐性感染者
- D. 家禽
- E. 野生动物

答案: E

解析: 野生动物为传染源的传染病, 称为自然疫源性传染病, 如鼠疫. 钩端螺旋体病. 流行性出血热等。

38. 中毒型菌痢好发年龄是

- A. 青壮年
- B. 10~14 岁
- C. 2~7 岁
- D. 2 岁以下
- E. 老年

答案: C

解析: 中毒型菌痢多见于 2~7 岁儿童。

39. 有关乙型肝炎流行特征的叙述, 不正确的是

- A. 重叠感染 HDV 易演变为重型肝炎
- B. 发病无明显季节性
- C. 多为散发
- D. HBsAg 携带者男性多于女性
- E. 家庭集聚现象少见

答案: E

解析: 乙型肝炎常有家庭集聚现象。

40. 戊型肝炎病毒为

- A. 杯状病毒
- B. 嗜肝 DNA 病毒
- C. 黄病毒
- D. 单股正链 RNA
- E. 缺陷的负链 RNA 病毒

答案: D

解析: 戊型肝炎病毒 (HEV) 简称戊肝病毒, 为单股正链 RNA。

41. 下列有关脑膜炎奈瑟菌的叙述, 正确的是

- A. 革兰阴性杆菌, 在体外存活力强
- B. 革兰阴性双球菌, 在体外存活力低
- C. 革兰阴性球菌, 在体外存活力强
- D. 革兰阳性双球菌, 在体外存活力低
- E. 革兰阳性双球菌, 在体外存活力强

答案: B

解析: 脑膜炎奈瑟菌属奈瑟菌属, 革兰染色阴性双球菌, 呈肾形或卵圆形, 有荚膜, 无芽孢。依据表面特异性荚膜多糖抗原的不同, 分为 13 个菌群, 其中以 A. B. C 三群最常见。在我国长期流行菌群为 A 群, C 群流行也增多。该菌仅存在于人体, 可从带菌者鼻咽部及患者的血液. 脑脊液. 皮肤瘀点中检出, 专性需氧, 对营养要求较高。细菌裂解后可释放内毒素, 具有强烈致病性, 是重要的致病因子。该菌在体外能形成自溶酶, 易死亡, 对寒冷. 干燥. 阳光. 紫外线及一般消毒剂均敏感。

42. 下列各项除哪项外均是丙型肝炎的传播途径

- A. 静脉药瘾者
- B. 性接触
- C. 血液透析者
- D. 肾移植者
- E. 粪-口

答案: E

解析: 丙型肝炎尤以输血与使用血制品者. 静脉药瘾者. 血液透析者. 肾移植者. 同性恋者等为多见, 发病无季节性。

43. 下列有关流脑传染源的叙述, 不正确的是

- A. 人不是唯一宿主
- B. 带菌者是重要的传染源
- C. 患者是本病的传染源
- D. 流行期间以 A 群为主
- E. B 和 C 群以散发为主

答案: A

解析: 流脑传染源: 患者和带菌者是本病的传染源, 人是唯一宿主。带菌者不易被发现, 是重要的传染源。流行期间以 A 群为主, B 和 C 群以散发为主。

44. 下列有关消毒方法的描述, 不正确的是A.

高效消毒法能杀灭一切细菌繁殖体

- B. 中效消毒法能杀灭除细菌芽孢以外的各种微生物
- C. 低效消毒法只能消灭细菌繁殖体, 部分真菌和亲脂性病毒
- D. 灭菌法可以杀灭包括细菌芽孢的一切微生物
- E. 超声波消毒法属于低效消毒法

答案: E

解析: 中效消毒法能杀灭除细菌芽孢以外的各种微生物。主要有超声波消毒法和中效消毒剂如醇类、碘类、酚类消毒剂等。

45. 属于随时消毒的是 A.

传染病患者的尸体处理B.

传染病室日常消毒

- C. 传染病患者转科后病室的消毒
- D. SARS 患者入院后对其原居住地的消毒
- E. 传染病患者出院后对其所用物品的消毒

答案: B

解析: 随时消毒指在传染源仍然存在的疫源地内, 对传染源的排泄物、分泌物及其污染过的物品进行的及时性消毒处理。如患者住院时的卫生处理(沐浴、更衣等); 对患者呕吐物、痰液、尿液、粪便及卫生敷料的消毒

处理; 对病室空气、地面、家具的消毒和接触患者或其污染物品脱手套后的洗手等。

46. 下列肝功能检查指标中, 对诊断重型肝炎有重要意义的是

- A. 胆碱酯酶下降
- B. 血清胆红素升高
- C. 胆酶分离
- D. 凝血酶原活动度(PTA) $\leq 40\%$
- E. 血清白/球比值倒置

答案: D

解析: PTA $\leq 40\%$ 为肝细胞大量坏死的肯定界限, 为重型肝炎诊断及判断预后的重要指标, 如 PTA $< 20\%$ 则预后不良。

47. 下列有关霍乱补液治疗的叙述, 错误的是

- A. 轻、中型患者可予以口服补液
- B. 重型患者按常规浓度积极补充氯化钾
- C. 静脉补液多采用 5:4:1 溶液
- D. 最初 24 小时重型患者的补液量为 8000~12000ml
- E. 补液原则是早期、快速、足量, 先盐后糖, 先快后慢, 见尿补钾

答案: B

解析: 霍乱补液多采用与患者丧失液体电解质浓度相似的 5:4:1 溶液, 即每升液体含氯化钠 5g, 碳酸氢钠 4g 和氯化钾 1g, 而非常规浓度。

48. 预防肺结核的最主要措施是

- A. 禁止随地吐痰
- B. 隔离和有效治疗排菌患者
- C. 健全防痨组织
- D. 加强登记管理
- E. 接种卡介苗, 化疗

答案: B

解析: 预防肺结核的最主要措施是: 隔离和有效治疗排菌患者。

49. 发生传染病暴发时，要求有关单位向所在地县级人民政府卫生行政主管部门报告的时限为

- A. 1 小时内
- B. 2 小时内
- C. 3 小时内
- D. 4 小时内
- E. 5 小时内

答案：B

解析：突发事件的报告情形和报告时限要求突发事件监测机构、医疗卫生机构和有关单位发现有下列情形之一的，应当在 2 小时内向所在地县级人民政府卫生行政主管部门报告；接到报告的卫生行政主管部门应当在 2 小时内向本级人民政府报告，并同时向上级人民政府卫生行政主管部门和国务院卫生行政主管部门报告：

- (1) 发生或者可能发生传染病暴发、流行的；
- (2) 发生或者发现不明原因的群体性疾病的；
- (3) 发生传染病菌种、毒种丢失的；
- (4) 发生或者可能发生重大食物和职业中毒事件的。

50. 中医诊断开办错误的是

- A. 中医诊所应当将本诊所的诊疗范围在诊所的明显位置公示
- B. 中医医师的姓名在诊所的明显位置公示
- C. 中医诊所的执业范围在诊所的明显位置公示
- D. 设备完善的情况下可进行外科手术治疗
- E. 需将诊所的名称、地址、诊疗范围、人员配备情况等报所在地县级人民政府中医药主管部门备案

答案：D

解析：举办中医诊所的，将诊所的名称、地址、诊疗范围、人员配备情况等报所在地县级人民政府中医药主管部门备案后即可开展执业活动。中医诊所应当将本诊所的诊疗范围、中医医师的姓名及其执业范围在诊所

的明显位置公示，不得超出备案范围开展医疗活动。

51. 未经批准擅自开办医疗机构行医应承担的行政责任主要是

- A. 经济补偿
- B. 赔礼道歉
- C. 赔偿责任
- D. 行政处分
- E. 行政处罚

答案：E

解析：卫生行政处罚是指卫生行政机关或者法律法规授权组织在职权范围内对违反卫生行政管理秩序而尚未构成犯罪的公民、法人和其他组织实施的一种卫生行政制裁。

52. 属于医技人员行为规范的是

- A. 使用适宜诊疗技术和药物
- B. 不违规进行试验性医疗
- C. 竭诚协助医生诊治，密切观察
- D. 严格遵循临床诊疗规范和技术操作规范
- E. 指导和帮助患者配合检查，耐心帮助患者

查询结果

答案：E

解析：医技人员行为规范第三十三条：指导和帮助患者配合检查，耐心帮助患者查询结果，对接触传染性物质或放射性物质的相关人员，进行告知并给予必要的防护。

53. 以下属于二级医疗负责指导医疗纠纷人民调解工作的部门是

- A. 县级以上人民政府
- B. 卫生主管部门
- C. 司法行政部门
- D. 公安机关
- E. 财政、民政、保险监督管理部门

答案：C

解析：司法行政部门负责指导医疗纠纷人民调解工作。

54. 以下各项, 属于药学技术人员行为规范的是

- A. 规范书写, 妥善保存病历材料
- B. 不违规签署医学证明文件
- C. 使用适宜诊疗技术和药物
- D. 认真履行处方审核调配职责
- E. 严格执行医嘱

答案: D

解析: 药学技术人员行为规范: 第三十六条 认真履行处方审核调配职责, 坚持查对制度, 不得对处方所列药品擅自更改或代用。

二、A₂型选择题 (55~87 题)

答题说明: 每一道考题是以一个小案例出现的, 其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案, 请从中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

55. 患者月经周期延后, 量少, 色暗淡, 质清稀, 平时带下清稀; 腰膝酸软, 头晕耳鸣, 面色晦暗; 舌淡, 苔薄白, 脉沉细。其证候是

- A. 虚寒证
- B. 肾虚证
- C. 气滞证
- D. 血瘀证
- E. 血虚证

答案: B

解析: 月经后期之肾虚证

主要证候: 周期延后, 量少, 色黯淡, 质清稀, 或带下清稀; 腰膝酸软。头晕耳鸣, 面色晦黯, 或面部黯斑; 舌淡, 苔薄白, 脉沉细。

治法: 补肾养血调经。

方药: 当归地黄饮。

56. 患者月经先后无定期, 经量或多或少, 色黯红或经行不畅; 胸胁. 乳房. 少腹胀痛, 脘闷不舒, 时叹息, 暖气食少; 苔薄白, 脉弦。其证候是

- A. 肝郁证

- B. 肾虚证
- C. 脾虚证
- D. 肝郁肾虚证
- E. 以上均非

答案: A

解析: 月经先后无定期之肝郁证

主要证候: 经来先后无定, 经量或多或少, 色黯红或紫红, 或有血块, 或经行不畅; 胸胁. 乳房. 少腹胀痛, 脘闷不舒, 时叹息, 暖气食少; 苔薄白或薄黄, 脉弦。

治法: 疏肝理气调经。

方药: 逍遥散。

57. 患者经血过期不净, 量多, 色淡, 质稀; 倦怠乏力, 气短懒言, 小腹空坠。面色 (白光) 白; 舌淡, 苔薄, 脉缓弱。其治法是

- A. 补气摄血, 固冲调经
- B. 健脾养血, 调经止血
- C. 补益脾肾, 摄血固冲
- D. 健脾益气, 调经止血
- E. 健脾固冲, 养血止血

答案: A

解析: 经期延长之气虚证

主要证候: 经血过期不净, 量多, 色淡, 质稀; 倦怠乏力, 气短懒言, 小腹空坠, 面色 (白光) 白; 舌淡, 苔薄, 脉缓弱。

治法: 补气摄血, 固冲调经。

方药: 举元煎加减。

58. 患者下腹部肿块, 疼痛月余, 伴低热, 经行量多, 带下量多, 色黄如脓; 身热口渴, 心烦不宁, 大便秘结, 小便黄赤。妇检盆腔右侧触及鸭卵大包块, 形不整, 触压痛阳性; 舌红苔黄, 有瘀斑, 脉弦滑数。其治法是

- A. 清热利湿, 缓急止痛
- B. 清热解毒, 利湿止带
- C. 清热利湿, 化瘀消癥
- D. 清热利湿, 消癥止血
- E. 清热利湿, 止血调经

答案: C

解析: 根据患者表现诊断为癥瘕之湿热瘀阻

证

主要证候：下腹部肿块，热痛起伏，触之痛剧，痛连腰骶，经血量多，经期延长，带下量多，色黄如脓，或赤白兼杂；兼见身热口渴，心烦不宁，大便秘结，小便黄赤；舌黯红，有瘀斑，苔黄，脉弦滑数。

治法：清热利湿，化瘀消癥。

方药：大黄牡丹汤。

59. 患者，女性，30岁，已婚。患崩漏1余年，经血非时而至，经量甚多，色淡质稀，面色苍白，气短懒言，纳呆便溏，舌淡苔薄白，脉沉弱。其证候是

- A. 血瘀证
- B. 脾虚证
- C. 肾阴虚
- D. 肾阳虚
- E. 以上均非

答案：B

解析：崩漏脾虚证

主要证候：经血非时暴下不止，或淋漓日久不尽，血色淡，质清稀；面色（白光）白，神疲气短，或面浮肢肿，小腹空坠，四肢不温，纳呆便溏；舌质淡胖，边有齿印，苔白，脉沉弱。

60. 陈某，女，婚后5年未怀孕，月经多推后几天，经来小腹胀痛，经色紫黯，有血块，块下痛减，有时经行不畅；伴见肛门坠痛，性交痛；舌质紫黯，脉弦细涩。治疗选用

- A. 少腹逐瘀汤
- B. 苍附导痰丸
- C. 百灵调肝汤
- D. 养精神玉汤
- E. 以上均非

答案：A

解析：不孕症之瘀滞胞宫证

主要证候：婚久不孕，月经多推后或周期正常，经来腹痛，甚或呈进行性加剧，经量多少不一，经色紫黯，有血块，块下痛减；有时经行不畅，淋漓难净，或经间出血；或肛

门坠胀不适，性交痛；舌质紫暗或舌边有瘀点，苔薄白，脉弦或弦细涩。

治法：逐瘀荡胞，调经助孕。

方药：少腹逐瘀汤。

61. 已婚女性，26岁。月经延后2周，量少，色淡，质稀，心悸少寐，小腹绵绵作痛，面色苍白，舌淡苔薄白，脉细弱。治疗应首选

- A. 大补元煎
- B. 十全大补汤
- C. 人参养营汤
- D. 补中益气汤
- E. 四君子汤

答案：A

解析：月经后期之血虚证

主要证候：周期延后，量少，色淡红，质清稀，或小腹绵绵作痛；或头晕眼花，心悸少寐，面色苍白或萎黄；舌质淡红，脉细弱。

治法：补血益气调经。

方药：大补元煎。

62. 患者张某，经期烦躁易怒，头晕目眩，口苦咽干，胸胁胀满，不思饮食，月经量多，色深红，舌红，苔黄，脉弦数。其治法是

- A. 清肝泄热，解郁安神
- B. 清热化痰，宁心安神
- C. 补血养心，安神定志
- D. 祛痰通络，安神定志
- E. 以上均非

答案：A

解析：经行情志异常肝经郁热证

主要证候：经前或经期，烦躁易怒，或抑郁不乐，头晕目眩，口苦咽干，胸胁胀满，不思饮食，月经量多，色深红；舌红，苔黄，脉弦数。

治法：清肝泄热，解郁安神。

方药：丹栀逍遥散加減。

63. 患者每值月经前后，大便泄泻，或五更泄泻，经色淡，质清稀；腰膝酸软，头晕耳鸣，畏寒肢冷；舌淡，苔白，脉沉迟。中医

治法可采用

- A. 健脾和胃，益气和血
- B. 疏肝健脾，燥湿止泻
- C. 温阳补肾，健脾止泻
- D. 健脾渗湿，理气调经
- E. 以上均非

答案：C

解析：经行泄泻之肾虚证

主要证候：经行或经后，大便泄泻，或五更泄泻，经色淡，质清稀；腰膝酸软，头晕耳鸣，畏寒肢冷；舌淡，苔白，脉沉迟。

治法：温阳补肾，健脾止泻。

方药：健固汤合四神丸。

64. 患者带下量多，色黄，如豆渣状，阴部瘙痒；脘闷纳差，舌红，苔黄腻，脉滑数。其治法是

- A. 健脾益气，升阳除湿
- B. 温肾培元，固涩止带
- C. 滋肾益阴，清热利湿
- D. 清热利湿，疏风化浊
- E. 清利湿热，佐以解毒杀虫

答案：E

解析：带下过多湿热下注证

主要证候：带下量多，色黄或呈脓性，质黏稠，有臭气，或带下色白质黏，呈豆渣样，外阴瘙痒；小腹作痛，口苦口腻，胸闷纳呆，小便短赤；舌红，苔黄腻，脉滑数。

治法：清利湿热，佐以解毒杀虫。

方药：止带方。

65. 患者，女，25岁，未婚。近半年经前。经期小腹胀痛，经血量少，行而不畅，血色黯有块，块下痛减，伴经行情志抑郁，乳房胀痛，舌紫暗，有瘀斑，脉弦涩。治疗应首选的方剂是

- A. 少腹逐瘀汤
- B. 当归芍药散
- C. 调肝汤
- D. 圣愈汤

E. 膈下逐瘀汤

答案：E

解析：痛经之气滞血瘀证

主要证候：经前或经期小腹胀痛拒按，经血量少，行而不畅，血色紫黯有块，块下痛暂减；乳房胀痛，胸闷不舒；舌质紫黯或有瘀点，脉弦。

治法：理气行滞，化瘀止痛。

方药：膈下逐瘀汤。

66. 患儿，3岁。平素饮食肥甘厚味，现症见汗出，以自汗为主，以额、心胸为甚，汗出肤热，汗渍色黄，口臭，口渴不欲饮，小便色黄，舌质红，苔黄腻，脉滑数。诊断为汗证，其治法为

- A. 益气养阴
- B. 调和营卫
- C. 益气固表
- D. 清热泻脾
- E. 清热固表

答案：D

解析：汗证之湿热迫蒸证

证候：汗出过多，以额、心胸为甚，汗出肤热，汗渍色黄，口臭，口渴不欲饮，小便色黄，舌质红，苔黄腻，脉滑数。

治法：清热泻脾。

代表方剂：泻黄散。

67. 患儿，5岁。诊断为猩红热，现壮热不解，烦躁口渴，咽喉肿痛，伴有糜烂白腐，皮疹密布，色红如丹，疹由颈、胸开始，继而弥漫全身，压之退色，舌面光红起刺，状如草莓，脉数有力。治疗首选的方剂是

- A. 益胃汤
- B. 沙参麦冬汤
- C. 竹叶石膏汤
- D. 增液承气汤
- E. 凉营清气汤

答案：E

解析：猩红热之毒炽气营证

症候：壮热不解，烦躁口渴，咽喉肿痛，伴

有糜烂白腐，皮疹密布，色红如丹，甚则色紫如瘀点，疹由颈、胸开始，继而弥漫全身，压之退色，见疹后的1~2天舌苔黄糙，舌质起红刺，3~4天后舌苔剥落，舌面光红起刺，状如草莓，脉数有力。

治法：清气凉营，泻火解毒。

代表方剂：凉营清气汤。

68. 患儿，3岁，诊断为肺炎喘嗽，证见咳喘日久不愈，伴有低热盗汗，手足心热，干咳少痰，面色潮红，口干便结，舌红少津，脉细数。

其中医辨证为

- A. 肺脾气虚证
- B. 阴虚肺热证
- C. 气阴两虚证
- D. 风热郁肺证
- E. 毒热闭肺证

答案：B

解析：肺炎喘嗽之阴虚肺热证

证候：咳喘持久，低热盗汗，手足心热，干咳少痰，面色潮红，口干便结，舌红少津，苔少或花剥，脉细数，指纹淡紫。

治法：养阴清肺，润肺止咳。

代表方剂：沙参麦冬汤。

69. 患儿，4岁。突然出现神昏惊厥，伴发热头痛，咳嗽流涕，咽红，舌苔薄黄，脉象浮数。治疗应首选的方剂是

- A. 桑菊饮
- B. 紫雪丹
- C. 柴葛解肌汤
- D. 银翘散
- E. 银翘散合羚角钩藤汤

答案：D

解析：小儿急惊风之风热动风证

证候：起病急骤，常突然出现神昏惊厥，伴发热，头痛，鼻塞，流涕，咳嗽，咽痛，随即出现烦躁、神昏、惊风，舌苔薄白或薄黄，脉浮数。

治法：疏风清热，息风定惊。

代表方剂：银翘散。

70. 患儿，2岁。患有痫证，起病前常有惊吓史。每次发作时惊叫，吐舌，急啼，面色时红时白，惊惕不安，四肢抽搐，大便黏稠，舌淡红，舌苔白，指纹色青。治疗应首选的方剂是

- A. 镇惊丸
- B. 涤痰汤
- C. 定痫丸
- D. 远志丸
- E. 定魄丸

答案：A

解析：惊痫证

证候：起病前常有惊吓史。发作时惊叫，吐舌，急啼，神志恍惚，面色时红时白，惊惕不安，如人将捕之状，四肢抽搐，舌淡红，舌苔白，脉弦滑，乍大乍小，指纹色青。治法：镇惊安神。

代表方剂：镇惊丸。

71. 患儿，7岁，男。症见多动难静，急躁易怒，冲动任性，难以自控，神思涣散，注意力不集中，难以静坐，伴有遗尿、腰酸乏力。舌质红，舌苔薄，脉细弦。治疗应首选方剂是

- A. 清心涤痰汤
- B. 黄连温胆汤
- C. 龙胆泻肝汤
- D. 泻心导赤散
- E. 杞菊地黄丸

答案：E

解析：注意力缺陷多动障碍之肝肾阴虚证
证候：多动难静，急躁易怒，冲动任性，难以自控，神思涣散，注意力不集中，难以静坐，或有记忆力欠佳、学习成绩低下，或有遗尿、腰酸乏力，或有五心烦热、盗汗、大便秘结，舌质红，舌苔薄，脉细弦。

治法：滋养肝肾，平肝潜阳。

代表方剂：杞菊地黄丸。

72. 患儿，8个月。晨起啼哭不安，阵阵捧腹

啼叫，已解清稀大便 3 次，便多泡沫，臭气轻，可闻肠鸣，恶寒发热，鼻流清涕，指纹淡红。其证候是

- A. 脾虚泻
- B. 脾肾阳虚泻
- C. 湿热泻
- D. 风寒泻
- E. 伤食泻

答案：D

解析：风寒泻证

证候：大便清稀，夹有泡沫，臭气不甚，肠鸣腹痛，或伴恶寒发热，鼻流清涕，咳嗽，舌质淡，苔薄白，脉浮紧，指纹淡红。

治法：疏风散寒，化湿和中。

代表方剂：藿香正气散。

73. 患儿，1 岁。形体消瘦显著，面色萎黄，食欲不振，肚腹膨胀，青筋暴露，毛发稀疏结穗，精神烦躁，夜卧不宁，舌淡苔腻，脉沉细而滑。诊断为疳证，治疗宜用

- A. 健脾丸
- B. 资生健脾丸
- C. 消食导滞丸
- D. 肥儿丸
- E. 八珍汤

答案：D

解析：疳证之疳积证：

症状：形体明显消瘦，面色萎黄，肚腹膨胀，甚则青筋暴露，毛发稀疏结穗，精神烦躁，夜卧不宁，或见揉眉挖鼻，吮指磨牙，动作异常，食欲不振或善食易饥，或嗜食异物，舌淡苔腻，脉沉细而滑。

治法：消积理脾。

方药：肥儿丸加减。

74. 患儿流涕。咳嗽 4 天后，高热不退咳嗽喘促，鼻扇，喉中痰声漉漉，口唇发绀。其证A. 痰热咳嗽

- B. 心阳虚衰
- C. 风寒闭肺

D. 风热闭肺

E. 痰热闭肺

答案：E

解析：患儿咳嗽 4 天后，高热不退咳嗽喘促，鼻扇，喉中痰声漉漉，口唇发绀，属肺炎喘咳之痰热闭肺。

75. 患儿，3 岁。面色苍白，神疲乏力，发黄稀疏，消瘦 3 个月，诊断为营养性缺铁性贫血。选用铁剂治疗时，正确的停药时间为

- A. 血红蛋白恢复至正常后 4 个月左右
- B. 血红蛋白恢复至正常后 6 个月左右
- C. 血红蛋白开始升高时
- D. 血红蛋白恢复正常时
- E. 血红蛋白恢复至正常后 2 个月左右

答案：E

解析：小儿贫血的西医治疗：使用铁剂治疗。一般用硫酸亚铁口服，每次 5~10mg/kg，1 日 2~3 次，同时口服维生素 C 有助吸收，服用至血红蛋白达正常水平后 2 个月左右再停药。

76. 患儿，1 岁，患有奶麻，现身热已退，肌肤出现玫瑰红色小丘疹，皮疹始见于躯干部，很快延及全身，约经 1~2 天皮疹消退，肤无痒感，舌质偏红，苔薄少津，指纹淡紫。其治法为

- A. 辛凉解表，清宣肺卫
- B. 清热解毒，解表透疹
- C. 疏风清热，解表透疹
- D. 清热解毒，凉血透疹
- E. 清热生津，以助康复

答案：E

解析：奶麻之毒透肌肤证

证候：身热已退，肌肤出现玫瑰红色小丘疹，皮疹始见于躯干部，很快延及全身，约经 1~2 天皮疹消退，肤无痒感，或有口干。纳差，舌质偏红，苔薄少津，指纹淡紫。

治法：清热生津，以助康复。

代表方剂：银翘散合养阴清肺汤。

77. 患者，女性，28岁，产后乳房胀痛，位于乳房外上方皮肤嫩红，肿块形似鸡卵，压痛明显，按之中软，有波动感，伴壮热口渴。切开引流的部位及切口是

- A. 以乳头为中心的弧形切口
- B. 脓肿波动明显处做切口
- C. 循乳络方向做放射状切口
- D. 乳晕旁弧形切口
- E. 脓肿处做任意切口

答案：C

解析：乳房处应循乳络方向做放射状切口。

78. 患者，男，40岁。急性子痛2天，左侧附睾肿大疼痛，阴囊皮肤红肿，焮热疼痛，少腹抽痛，舌红苔黄腻，脉滑数，治疗方剂为

- A. 橘核丸
- B. 枸橘汤
- C. 透脓散
- D. 滋阴除湿汤
- E. 萆薢化毒汤

答案：B

解析：子痛之湿热下注证：多见于成年人。睾丸或附睾肿大疼痛，阴囊皮肤红肿，焮热疼痛，少腹抽痛，局部触痛明显，脓肿形成时，按之应指，伴恶寒发热。苔黄腻，脉滑数。

治法：清热利湿，解毒消肿。

方药：枸橘汤或龙胆泻肝汤加减。疼痛剧烈者，加延胡索、金铃子。

79. 患者，男，65岁。颈部肿块溃破年余，长期渗流脓血，不能愈合，疮面苍白水肿，肉芽高低不平，赘肉翻花。伴低热，乏力，消瘦等。舌质淡，苔白或无苔，脉沉细。治疗应首选

- A. 归脾汤
- B. 香贝养荣汤
- C. 和营散坚丸
- D. 开郁散
- E. 八珍汤合四妙勇安汤

答案：E

解析：失荣之气血两亏证

证候：颈部肿块溃破以后，长期渗流脓血，不能愈合，疮面苍白水肿，肉芽高低不平，赘肉翻花。伴低热，乏力，消瘦等。舌质淡，苔白或无苔，脉沉细。

治法：补益气血，解毒化瘀。

方药：八珍汤合四妙勇安汤加减。

80. 患者王某，患有筋瘤，久站久行或劳累时瘤体增大，下坠不适感加重；常伴气短乏力，脘腹坠胀，腰酸；舌淡，苔薄白，脉细缓无力。

辨证为

- A. 寒湿凝筋证
- B. 外伤瘀滞证
- C. 湿热下注证
- D. 劳倦伤气证
- E. 血瘀阻滞证

答案：D

解析：筋瘤之劳倦伤气证

证候：久站久行或劳累时瘤体增大，下坠不适感加重；常伴气短乏力，脘腹坠胀，腰酸；舌淡，苔薄白，脉细缓无力。

治法：补中益气，活血舒筋。

代表方：补中益气汤加减。

81. 患者，右足怕冷，麻木、疼痛，间歇性跛行年余。近两个月来足痛加剧，夜难入寐，步履艰难，足背动脉搏动消失。应诊断为

- A. 痹证
- B. 脱疽
- C. 糖尿病足
- D. 下肢静脉炎
- E. 雷诺综合征

答案：B

解析：脱疽，其临床特点是好发于四肢末端，以下肢多见，初起患肢末端发凉、怕冷，苍白，麻木，可伴间歇性跛行，继则疼痛剧烈，日久患趾（指）坏死变黑，甚至趾（指）节脱落。部分患者起病急骤，进展迅速，预后严重，需紧急处理。

82. 患者王某，便时肛内常有肿物脱出，色紫黯，甚则表面溃破。糜烂，肛门坠痛，肛内指检有灼热感。舌红，苔黄腻，脉弦数。治疗宜选用

- A. 萆薢渗湿汤
- B. 补中益气汤
- C. 马勃散
- D. 升麻葛根汤
- E. 以上均非

答案：A

解析：脱肛，湿热下注证

肛内肿物脱出，色紫黯或深红，甚则表面溃破。糜烂，肛门坠痛，肛内指检有灼热感。舌红，苔黄腻，脉弦数。

治法：清热利湿。

方药：萆薢渗湿汤加减。出血多者，加地榆、槐花、侧柏炭。

83. 患者外生殖器出现疣状赘生物，色灰，质软，表面秽浊潮湿，触之易出血，恶臭；伴小便黄或不畅；苔黄腻，脉滑或弦数。其证候是

- A. 血脉瘀阻证
- B. 湿热壅盛证
- C. 营血两伤证
- D. 邪毒内陷证
- E. 湿毒下注证

答案：E

解析：尖锐湿疣之湿毒下注证

证候：外生殖器或肛门等处出现疣状赘生物，色灰或褐或淡红，质软，表面秽浊潮湿，触之易出血，恶臭；伴小便黄或不畅；苔黄腻，脉滑或弦数。

治法：利湿化浊，清热解毒。

方药：萆薢化毒汤酌加黄柏、土茯苓、大青叶。

84. 患者，被毒蜂叮咬后引发皮炎，皮疹较多，成片红肿，水疱较大，瘀斑明显，皮疹附近淋巴结肿大；伴畏寒，发热，头痛，恶心，胸闷；舌红，苔黄，脉数。治疗方剂为

- A. 龙胆泻肝汤
- B. 五味消毒饮合黄连解毒汤
- C. 萆薢化毒汤合黄连解毒汤
- D. 萆薢渗湿汤合龙胆泻肝汤
- E. 清瘟败毒饮合黄连解毒汤

答案：B

解析：虫咬皮炎热毒蕴结证

证候：皮疹较多，成片红肿，水疱较大，瘀斑明显，皮疹附近淋巴结肿大；伴畏寒，发热，头痛，恶心，胸闷；舌红，苔黄，脉数。治法：清热解毒，消肿止痒。

方药：五味消毒饮合黄连解毒汤加减。

85. 患者，女，46岁。肛门部突然剧烈疼痛，肛缘皮下有一触痛性肿物，排便、坐下、行走，甚至咳嗽等动作均可使疼痛加剧。其诊断是

- A. 静脉曲张性外痔
- B. 结缔组织性外痔
- C. 血栓性外痔
- D. 混合痔
- E. 内痔脱出

答案：C

解析：血栓性外痔的诊断：多发于截石位3、9点，病前有便秘、饮酒或用力负重等诱因。肛门部突然剧烈疼痛，肛缘皮下有一触痛性肿物，排便、坐下、行走，甚至咳嗽等动作均可使疼痛加剧。检查时在肛缘皮肤表面有一暗紫色圆形硬结节，界限清楚，触按痛剧。有时经3~5天血块自行吸收，疼痛缓解而自愈。

86. 患者尿路结石，发病急骤，腰腹疼痛，尿流突然中断，尿频，尿急，尿赤，血尿，舌红，苔黄腻，脉弦数。治疗应首选的方剂是

- A. 济生肾气丸
- B. 龙胆泻肝汤
- C. 化坚二陈丸合石韦散
- D. 三金排石汤

E. 金铃子散合石韦散

答案：D

解析：尿石症，湿热蕴结证：腰痛或小腹痛，或尿流突然中断，尿频，尿急，尿痛，小便混赤，或为血尿，口干欲饮。舌红，苔黄腻，脉弦数。

治法：清热利湿，通淋排石。

方药：三金排石汤加减。

87. 患者，男，38岁。左足大趾剧痛，日轻夜重，局部肿胀，皮肤紫暗，溃破腐烂，身热口干，舌红，苔黄腻，脉弦数。其辨证是

A. 寒湿阻络证

B. 血脉瘀阻证

C. 湿热毒盛证

D. 热毒伤阴证

E. 气阴两虚证

答案：C

解析：脱疽，湿热毒盛证

证候：患肢剧痛，日轻夜重，局部肿胀，皮肤紫暗，浸淫蔓延，溃破腐烂，肉色不鲜；身热口干，便秘溲赤；舌红，苔黄腻，脉弦数。

治法：清热利湿，解毒活血。

代表方：四妙勇安汤加减。

三. A₃型选择题（88~114题）

答题说明：以下提供若干个案例，每个案例下设3道考题。请根据题干所提供的信息，在每一道考题下面的A. B. C. D. E.五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

患者，女，35岁。经前小腹冷痛拒按，得热痛减，月经推后，量少，经色黯而有瘀块，面色青白，肢冷畏寒，舌黯，苔白，脉沉紧。88. 根据患者症状此病辨证为

A. 肾阳虚证

B. 虚寒证

C. 气血虚弱证

D. 阳虚内寒证

E. 寒凝血瘀证

89. 此病治疗时的治法是

A. 温经扶阳，暖宫止痛

B. 温经散寒，化瘀止痛

C. 温经散寒，活血调经

D. 温肾益气，固冲调经

E. 活血化瘀，暖宫止痛

90. 治疗采用的代表方为

A. 清热固经汤

B. 逐瘀止血汤

C. 少腹逐瘀汤

D. 温经汤

E. 固冲汤88.

答案：E

解析：痛经寒凝血瘀证。主要证候：经前或经期小腹冷痛拒按，得热痛减，月经或见推后，量少，经色黯而有瘀块，面色青白，肢冷畏寒，舌黯，苔白，脉沉紧。治法：温经散寒，化瘀止痛。方药：少腹逐瘀汤。89. 答案：B

解析：痛经寒凝血瘀证。主要证候：经前或经期小腹冷痛拒按，得热痛减，月经或见推后，量少，经色黯而有瘀块，面色青白，肢冷畏寒，舌黯，苔白，脉沉紧。治法：温经散寒，化瘀止痛。方药：少腹逐瘀汤。90. 答案：C

解析：痛经寒凝血瘀证。主要证候：经前或经期小腹冷痛拒按，得热痛减，月经或见推后，量少，经色黯而有瘀块，面色青白，肢冷畏寒，舌黯，苔白，脉沉紧。治法：温经散寒，化瘀止痛。方药：少腹逐瘀汤。90. 答案：C

解析：痛经寒凝血瘀证。主要证候：经前或经期小腹冷痛拒按，得热痛减，月经或见推后，量少，经色黯而有瘀块，面色青白，肢冷畏寒，舌黯，苔白，脉沉紧。治法：温经散寒，化瘀止痛。方药：少腹逐瘀汤。90. 答案：C

解析：痛经寒凝血瘀证。主要证候：经前或经期小腹冷痛拒按，得热痛减，月经或见推后，量少，经色黯而有瘀块，面色青白，肢冷畏寒，舌黯，苔白，脉沉紧。治法：温经散寒，化瘀止痛。方药：少腹逐瘀汤。

解析：痛经寒凝血瘀证。主要证候：经前或经期小腹冷痛拒按，得热痛减，月经或见推后，量少，经色黯而有瘀块，面色青白，肢冷畏寒，舌黯，苔白，脉沉紧。治法：温经散寒，化瘀止痛。方药：少腹逐瘀汤。

患者，女，27岁，未婚。月经周期33天，经期持续8~10余日，量少，色红，质稠，手足心热；舌红，少苔，脉细数。伴经行腹痛隐隐。平时乳房胀痛。

91. 应首先考虑的是

- A. 经行乳房胀痛
- B. 月经后期
- C. 经期延长
- D. 痛经
- E. 崩漏

92. 辨证为

- A. 虚热证
- B. 血瘀证
- C. 气虚证
- D. 气郁证
- E. 肾虚证

93. 首选治法为A.

养阴清热止血B.

补气摄血调经C.

养血益气调经D.

活血祛瘀止血E.

补肾益精止血91.

答案：C

解析：经期延长之虚热证。主要证候：经行时间延长，量少，色鲜红，质稠；咽干口燥，或见潮热颧红，或手足心热；舌红，少苔，脉细数。治法：养阴清热止血。方药：两地汤合二至丸。

92. 答案：A

解析：经期延长之虚热证。主要证候：经行时间延长，量少，色鲜红，质稠；咽干口燥，或见潮热颧红，或手足心热；舌红，少苔，脉细数。治法：养阴清热止血。方药：两地汤合二至丸。

93. 答案：A

解析：经期延长之虚热证。主要证候：经行时间延长，量少，色鲜红，质稠；咽干口燥，或见潮热颧红，或手足心热；舌红，少苔，脉细数。治法：养阴清热止血。方药：两地汤合二至丸。

患者，女，33岁，已婚。经血非时而下，淋漓不尽，色紫暗，有块，小腹胀痛，舌紫苔薄白，脉涩。

94. 辨病为

- A. 崩漏
- B. 经间期出血
- C. 经期延长
- D. 月经先后无定期
- E. 痛经

95. 辨证为

- A. 血瘀证
- B. 脾虚证
- C. 虚热证
- D. 肾虚证
- E. 气虚证

96. 治疗首选

- A. 固冲汤
- B. 固本止崩汤
- C. 右归丸
- D. 清热固经汤
- E. 逐瘀止血汤

94. 答案：A

解析：崩漏之血瘀证。主要证候：经血非时而下，量时多时少，时出时止，或淋漓不断，或停闭数月又突然崩中，继之漏下，经色暗有血块；小腹疼痛或胀痛；舌质紫黯或尖边有瘀点，脉弦细或涩。治法：活血化瘀，固冲止血。方药：逐瘀止血汤

95. 答案：A

解析：崩漏之血瘀证。主要证候：经血非时而下，量时多时少，时出时止，或淋漓不断，或停闭数月又突然崩中，继之漏下，经色暗有血块；小腹疼痛或胀痛；舌质紫黯或尖边有瘀点，脉弦细或涩。治法：活血化瘀，固冲止血。方药：逐瘀止血汤。

96. E

解析：崩漏之血瘀证。主要证候：经血非时而下，量时多时少，时出时止，或淋漓不断，

或停闭数月又突然崩中，继之漏下，经色暗有血块；小腹疼痛或胀痛；舌质紫黯或尖边有瘀点，脉弦细或涩。治法：活血化瘀，固冲止血。方药：逐瘀止血汤

患儿，2岁。发热咳嗽2天，高热烦躁，咳嗽喘促，气急鼻煽，呼吸困难，突见面色苍白，口唇紫绀，精神萎靡，肋下痞块，舌质紫，苔薄白，指纹紫滞。

97. 根据患者症状此病辨证为

- A. 风热闭肺
- B. 毒热闭肺
- C. 邪陷厥阴
- D. 心阳虚衰

E. 痰热闭肺

98. 治疗宜采用的治法为

- A. 辛温宣肺，化痰止咳。
- B. 温补心阳，救逆固脱。

C. 清心开窍，平肝息风。

D. 补肺益气，健脾化痰

E. 清热涤痰，开肺定喘

99. 治疗采用的代表方为

- A. 麻杏石甘汤合葶苈大枣泻肺汤
- B. 人参五味子汤
- C. 参附龙牡救逆汤
- D. 羚角钩藤汤合牛黄清心丸
- E. 麻杏石甘汤

97. 答案：D

解析：小儿肺炎喘嗽心阳虚衰证。证候：面色苍白，唇指紫绀，呼吸浅促。困难，四肢不温，多汗，肋下痞块，心悸动数，虚烦不安，神委淡漠，小便减少，舌质淡紫，脉细弱疾数，指纹紫滞，可达命关。治法：温补心阳，救逆固脱。代表方剂：参附龙牡救逆汤。

98. 答案：B

解析：小儿肺炎喘嗽心阳虚衰证。证候：面色苍白，唇指紫绀，呼吸浅促。困难，四肢不温，多汗，肋下痞块，心悸动数，虚烦不安，神委淡漠，小便减少，舌质淡紫，脉细弱疾数，指纹紫滞，可达命关。治法：温补心阳，救逆固脱。代表方剂：参附龙牡救逆汤。

99. 答案：C

解析：小儿肺炎喘嗽心阳虚衰证。证候：面色苍白，唇指紫绀，呼吸浅促。困难，四肢不温，多汗，肋下痞块，心悸动数，虚烦不安，神委淡漠，小便减少，舌质淡紫，脉细弱疾数，指纹紫滞，可达命关。治法：温补心阳，救逆固脱。代表方剂：参附龙牡救逆汤。

患儿，1岁。昨起舌上溃破，舌红疼痛，进食哭闹，心烦不安，口干欲饮，小便短赤。舌尖红，苔薄黄，脉数，指纹紫。

100. 诊断为

- A. 口疮
- B. 厌食
- C. 积滞
- D. 夜啼
- E. 鹅口疮

101. 辨证为

- A. 风热乘脾证
- B. 心火上炎证
- C. 虚火上浮证
- D. 心脾积热证
- E. 脾胃气虚证

102. 治疗首选

- A. 泻心导赤散
- B. 凉膈散
- C. 清胃散

- D. 泻心汤
- E. 六味地黄丸

100. 答案: A

解析: 口疮之心火上炎证。证候: 舌上. 舌边溃疡, 色赤疼痛, 饮食困难, 心烦不安, 口干欲饮, 小便短黄, 舌尖红, 苔薄黄, 脉数, 指纹紫。治法: 清心凉血, 泻火解毒。代表方剂: 泻心导赤散。

101. 答案: B

解析: 口疮之心火上炎证。证候: 舌上. 舌边溃疡, 色赤疼痛, 饮食困难, 心烦不安, 口干欲饮, 小便短黄, 舌尖红, 苔薄黄, 脉数, 指纹紫。治法: 清心凉血, 泻火解毒。代表方剂: 泻心导赤散。

102. 答案: A

解析: 口疮之心火上炎证。证候: 舌上. 舌边溃疡, 色赤疼痛, 饮食困难, 心烦不安, 口干欲饮, 小便短黄, 舌尖红, 苔薄黄, 脉数, 指纹紫。治法: 清心凉血, 泻火解毒。代表方剂: 泻心导赤散。

患儿, 7 岁。咳嗽喘促 3 小时。证见恶寒发热, 咳嗽, 喘促气急, 喉间痰鸣, 鼻塞, 流清涕, 咯痰黄稠, 烦躁, 口渴, 大便干, 舌红, 苔白, 脉浮紧。

103. 根据患者症状此病辨证为

- A. 风寒束肺证
- B. 外寒内热证
- C. 肺实肾虚证
- D. 肺肾阴虚证
- E. 肺脾气虚证

104. 治疗宜采用的治法为

- A. 补肺固表, 健脾益气
- B. 温补脾肾, 固摄纳气

C. 解表清里, 止咳定喘

D. 养阴清热, 敛肺补肾

E. 温肺散寒, 涤痰定喘

105. 治疗采用的代表方为

- A. 麻黄汤
- B. 华盖散
- C. 麻杏石甘汤
- D. 大青龙汤
- E. 小青龙汤

103. 答案: B

解析: 哮喘, 外寒内热证。证候: 气喘, 喉间哮鸣, 咳嗽痰黏, 色黄难咯, 胸闷, 喷嚏, 鼻塞, 流清涕, 恶寒, 发热, 面色红赤, 夜卧不安, 无汗, 口渴, 小便黄赤, 大便干, 咽红, 舌质红, 苔薄白或黄, 脉浮紧或滑数, 指纹浮红或沉紫。治法: 解表清里, 止咳定喘。代表方剂: 大青龙汤。

104. 答案: C

解析: 哮喘, 外寒内热证。证候: 气喘, 喉间哮鸣, 咳嗽痰黏, 色黄难咯, 胸闷, 喷嚏, 鼻塞, 流清涕, 恶寒, 发热, 面色红赤, 夜卧不安, 无汗, 口渴, 小便黄赤, 大便干, 咽红, 舌质红, 苔薄白或黄, 脉浮紧或滑数, 指纹浮红或沉紫。治法: 解表清里, 止咳定喘。代表方剂: 大青龙汤。

105. 答案: D

解析: 哮喘, 外寒内热证。证候: 气喘, 喉间哮鸣, 咳嗽痰黏, 色黄难咯, 胸闷, 喷嚏, 鼻塞, 流清涕, 恶寒, 发热, 面色红赤, 夜卧不安, 无汗, 口渴, 小便黄赤, 大便干, 咽红, 舌质红, 苔薄白或黄, 脉浮紧或滑数, 指纹浮红或沉紫。治法: 解表清里, 止咳定喘。

喘。代表方剂：大青龙汤。

患者肉癭，急躁易怒，汗出心悸，失眠多梦，消谷善饥，形体消瘦，手部震颤。舌红，苔薄，脉弦。

106. 辨证为

- A. 肝郁气滞证
- B. 气滞痰凝证
- C. 气阴两虚证
- D. 肝肾不足证
- E. 冲任失调证

107. 治法为

- A. 理气解郁，化痰散结
- B. 益气养阴，软坚散结
- C. 疏肝解郁，化痰软坚
- D. 调摄冲任，理气散结
- E. 调补气血，清热解毒

108. 治疗应选代表方剂为

- A. 生脉散合海藻玉壶汤
- B. 逍遥散合海藻玉壶汤
- C. 二仙汤合开郁散
- D. 逍遥萎贝散
- E. 人生养荣汤

106. 答案：C

解析：肉癭之气阴两虚证。证候：颈部肿块柔韧，随吞咽动作上下移动；常伴有急躁易怒、汗出心悸、失眠多梦、消谷善饥、形体消瘦、月经不调、手部震颤等；舌红，苔薄，脉弦。治法：益气养阴，软坚散结。方药：生脉散合海藻玉壶汤加减。

107. 答案：B

解析：肉癭之气阴两虚证。证候：颈部肿块柔韧，随吞咽动作上下移动；常伴有急躁易怒、汗出心悸、失眠多梦、消谷善饥、形体消瘦、月经不调、手部震颤等；舌红，苔薄，脉

弦。治法：益气养阴，软坚散结。方药：生脉散合海藻玉壶汤加减。

108. 答案：A

解析：肉癭之气阴两虚证。证候：颈部肿块柔韧，随吞咽动作上下移动；常伴有急躁易怒、汗出心悸、失眠多梦、消谷善饥、形体消瘦、月经不调、手部震颤等；舌红，苔薄，脉弦。治法：益气养阴，软坚散结。方药：生脉散合海藻玉壶汤加减。

患者，女，52岁。肉癭病史3年，近来颈前肿块突然增大，质地坚硬如石，推之不动。

109. 应首先考虑的是

- A. 失荣
- B. 瘰疬
- C. 癭瘤
- D. 气癭
- E. 石癭

110. 以下不属于此病病因病机的是

- A. 情志不畅
- B. 气滞血瘀
- C. 肉癭日久转化而来
- D. 痰瘀互结
- E. 外感风邪

111. 首选治疗方法为

- A. 手术切除
- B. 化疗
- C. 理疗
- D. 化疗配理疗
- E. 阳和膏外涂

109. 答案：E

解析：瘰疬坚硬如石不可移动者，称为石癭。其特点是结喉两侧结块，坚硬如石，高低不平，推之不移。故《三因方》说：“坚硬不可移者，名曰石癭。”好发于40岁以上中

年人。相当于西医的甲状腺癌。石瘿病因病机：由于情志内伤，肝脾气逆，痰湿内生，气滞则血瘀，瘀血与痰湿凝结，上逆于颈部而成。亦有由肉瘿日久转化而来。石瘿的治疗原则：石瘿为恶性肿瘤，一旦确诊，宜早期手术切除。

110. 答案：E

解析：瘿病坚硬如石不可移动者，称为石瘿。其特点是结喉两侧结块，坚硬如石，高低不平，推之不移。故《三因方》说：“坚硬不可移者，名曰石瘿。”好发于40岁以上中年人。相当于西医的甲状腺癌。石瘿病因病机：由于情志内伤，肝脾气逆，痰湿内生，气滞则血瘀，瘀血与痰湿凝结，上逆于颈部而成。亦有由肉瘿日久转化而来。石瘿的治疗原则：石瘿为恶性肿瘤，一旦确诊，宜早期手术切除。

111. 答案：A

解析：瘿病坚硬如石不可移动者，称为石瘿。其特点是结喉两侧结块，坚硬如石，高低不平，推之不移。故《三因方》说：“坚硬不可移者，名曰石瘿。”好发于40岁以上中年人。相当于西医的甲状腺癌。石瘿病因病机：由于情志内伤，肝脾气逆，痰湿内生，气滞则血瘀，瘀血与痰湿凝结，上逆于颈部而成。亦有由肉瘿日久转化而来。石瘿的治疗原则：石瘿为恶性肿瘤，一旦确诊，宜早期手术切除。

患者，女，27岁。手背部有5到6枚表面光滑的扁平丘疹。如针头到米粒大，呈淡褐色，偶有瘙痒感。

112. 其诊断是

- A. 传染性软疣
- B. 寻常疣
- C. 掌跖疣
- D. 丝状疣
- E. 扁平疣

113. 此疣风热蕴结证的治法是

- A. 疏风清热，解毒散结
- B. 活血化瘀，清热散结
- C. 养血活血，清热解毒
- D. 清化湿热，活血化瘀
- E. 活血化瘀，消肿散结

114. 此疣最常用的外治法是

- A. 洗涤法. 涂法
- B. 推疣法
- C. 摩擦法
- D. 敷贴法
- E. 针挑法

112. 答案：E

解析：不同疣的特点与好发部位：因其皮损形态及发病部位不同而名称各异，如发于手背、手指、头皮等处者，称千日疮、疣目、枯筋箭或瘰子；发于颜面、手背、前臂等处者，称扁瘡（扁平疣）；发于胸背部有脐窝的赘疣，称鼠乳；发于足跖部者，称跖疣；发于颈周围及眼睑部位，呈细软丝状突起者，称丝状疣或线瘡。扁平疣（扁瘡）①风热蕴结证：治以疏风清热，解毒散结，方选马齿苋合剂去桃仁、红花加木贼草、郁金、浙贝母、板蓝根。②热瘀互结证：治以活血化瘀，清热散结，方选桃红四物汤加生黄芪、板蓝根、紫草、马齿苋、浙贝母、薏苡仁。外治疗法①疣目可选用推疣法、鸦胆子散敷贴法、荸荠或菱蒂摩擦法。②扁瘡可选用洗

涤法.涂法。③鼠乳用消毒针头挑破患处，挤尽白色乳酪样物，再用碘酒或浓石炭酸溶液点患处。若损害较多，应分批治疗，注意保护周围皮肤。

113. 答案：A

解析：不同疣的特点与好发部位：因其皮损形态及发病部位不同而名称各异，如发于手背.手指.头皮等处者，称千日疮.疣目.枯筋箭或瘰子；发于颜面.手背.前臂等处者，称扁瘡（扁平疣）；发于胸背部有脐窝的赘疣，称鼠乳；发于足跖部者，称跖疣；发于颈周围及眼睑部位，呈细软丝状突起者，称丝状疣或线瘡。扁平疣（扁瘡）①风热蕴结证：治以疏风清热，解毒散结，方选马齿苋合剂去桃仁.红花加木贼草.郁金.浙贝母.板蓝根。②热瘀互结证：治以活血化瘀，清热散结，方选桃红四物汤加生黄芪.板蓝根.紫草.马齿苋.浙贝母.薏苡仁。外治疗法①疣目可选用推疣法.鸦胆子散敷贴法.荸荠或菱蒂摩擦法。②扁瘡可选用洗涤法.涂法。③鼠乳用消毒针头挑破患处，挤尽白色乳酪样物，再用碘酒或浓石炭酸溶液点患处。若损害较多，应分批治疗，注意保护周围皮肤。

114. 答案：A

解析：不同疣的特点与好发部位：因其皮损形态及发病部位不同而名称各异，如发于手背.手指.头皮等处者，称千日疮.疣目.枯筋箭或瘰子；发于颜面.手背.前臂等处者，称扁瘡（扁平疣）；发于胸背部有脐窝的赘疣，称鼠乳；发于足跖部者，称跖疣；发于颈周

围及眼睑部位，呈细软丝状突起者，称丝状疣或线瘡。扁平疣（扁瘡）①风热蕴结证：治以疏风清热，解毒散结，方选马齿苋合剂去桃仁.红花加木贼草.郁金.浙贝母.板蓝根。②热瘀互结证：治以活血化瘀，清热散结，方选桃红四物汤加生黄芪.板蓝根.紫草.马齿苋.浙贝母.薏苡仁。

外治疗法①疣目可选用推疣法.鸦胆子散敷贴法.荸荠或菱蒂摩擦法。②扁瘡可选用洗涤法.涂法。③鼠乳用消毒针头挑破患处，挤尽白色乳酪样物，再用碘酒或浓石炭酸溶液点患处。若损害较多，应分批治疗，注意保护周围皮肤。

四. B₁型选择题（115~150题）

答题说明：以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A. B. C. D. E五个备选答案，请从中选择一个与问题最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某一个备选答案可能被选择一次.多次或不被选择。

- A. 小产肾阳亏虚证
- B. 滑胎血热证
- C. 小产肾气不足证
- D. 滑胎气血虚弱证
- E. 滑胎血瘀证

115. 屡孕屡堕；头晕目眩，神疲乏力，面色（白光）白，心悸气短；舌质淡，苔薄白，脉细弱。辨证为

116. 屡孕屡堕，孕后阴道出血，色深红质稠；腰酸腹痛，面赤唇红，口干咽燥，便结尿黄，舌红苔黄，脉弦滑数。辨证为

115. 答案：D

解析：滑胎气血虚弱证。主要证候：屡孕屡堕；头晕目眩，神疲乏力，面色（白光）白，心悸气短；舌质淡，苔薄白，脉细弱。治法：益气养血，固冲安胎。方药：泰山磐石散。116. 答案：B

解析：滑胎血热证。主要证候：屡孕屡堕，

孕后阴道出血，色深红质稠；腰酸腹痛，面赤唇红，口干咽燥，便结尿黄，舌红苔黄，脉弦滑数。治法：清热养血，滋肾安胎。方药：保阴煎和二至丸加白术。

- A. 补气摄血固冲
- B. 养血益气调经
- C. 补肾益气，调理冲任
- D. 补气摄血，固冲调经
- E. 补肾益精，养血调经

117. 月经过少肾虚证的治法是

118. 月经过少血虚证的治法是

117. 答案：E

解析：月经过少之肾虚证。主要证候：经量素少或渐少，色黯淡，质稀；腰膝酸软，头晕耳鸣，足跟痛，或小腹冷，或夜尿多；舌淡，脉沉弱或沉迟。治法：补肾益精，养血调经。方药：归肾丸或当归地黄饮。

118. 答案：B

解析：月经过少之血虚证。主要证候：经来血量渐少，或点滴即净，色淡，质稀；或伴小腹空坠，头晕眼花，心悸怔忡，面色萎黄；舌淡红，脉细。治法：养血益气调经。方药：滋血汤或小营煎。

- A. 疏肝理气，散瘀除热
- B. 滋养肝肾，育阴清热
- C. 补益血气，甘温除热
- D. 补益肾气，清热调经
- E. 活血化瘀，清热凉血

119. 经行发热肝肾阴虚证的治法是

120. 经行发热血气虚弱证的治法是

119. 答案：B

解析：经行发热肝肾阴虚证。主要证候：经期或经后，午后潮热，月经量少，色红；两颧红赤，五心烦热，烦躁少寐；舌红而干，脉细数。治法：滋养肝肾，育阴清热。方药：蒿芩地丹四物汤。

120. 答案：C

解析：经行发热血气虚弱证。主要证候：经行或经后发热，热势不扬，动则自汗出，经量多，色淡质薄；神疲肢软，少气懒言；舌

淡，苔白润，脉虚缓。治法：补益血气，甘温除热。方药：补中益气汤。

- A. 血热证
- B. 血虚证
- C. 气虚证
- D. 血瘀证
- E. 气滞证

121. 恶露量多，色紫红，有块，腹痛拒按，其辨证是

122. 恶露量多，色红有臭气，其辨证是

121. 答案：D

解析：恶露量多或少。色紫红。有块。小腹痛拒按，多属血瘀；恶露量多。色红有臭气，多属血热；恶露量多。色淡质稀。神疲乏力，多属气虚；产后大便干涩难下，大多属津血不足；乳汁甚少。质稀薄，食少神疲。面色无华者，多属气血虚弱。

122. 答案：A

解析：恶露量多或少。色紫红。有块。小腹痛拒按，多属血瘀；恶露量多。色红有臭气，多属血热；恶露量多。色淡质稀。神疲乏力，多属气虚；产后大便干涩难下，大多属津血不足；乳汁甚少。质稀薄，食少神疲。面色无华者，多属气血虚弱。

A. 热. 烦. 渴. 饮，疹稠色暗，神昏抽搐

B. 热. 咳. 喘. 痰，疹稠色暗

C. 热. 咳. 涕. 泪，麻疹黏膜斑

D. 热. 烦. 汗出，皮疹透发 E.

疹没脱屑，低热不退

123. 麻疹邪犯肺卫证的主要证候是

124. 麻疹邪入肺胃证的主要证候是

123. 答案：C

解析：麻疹之邪犯肺卫证（初热期）。证候：发热咳嗽，微恶风寒，喷嚏流涕，咽喉肿痛，两目红赤，泪水汪汪，畏光羞明，神烦哭闹，纳减口干，小便短少，大便不调。发热第2~3天，口腔两颊黏膜红赤，贴近白齿处可见麻疹黏膜斑，周围红晕。舌质偏红，苔薄白或薄黄，脉象浮数。治法：辛凉透表，清宣肺卫。代表方剂：宣毒发表汤。

124. 答案: D

解析: 麻疹之邪入肺胃证(出疹期)。证候: 壮热持续, 起伏如潮, 肤有微汗, 烦躁不安, 目赤眵多, 咳嗽阵作, 皮疹布发, 疹点由细小稀少而逐渐稠密, 疹色先红后暗, 皮疹凸起, 触之碍手, 压之退色, 大便干结, 小便短少, 舌质红赤, 苔黄腻, 脉数有力。治法: 清凉解毒, 透疹达邪。代表方剂: 清解透表汤。

- A. 透疹凉解汤
- B. 银翘散合养阴清肺汤
- C. 桑菊饮
- D. 麻杏石甘汤
- E. 银翘散

125. 奶麻邪郁肌表首选的方剂是

126. 奶麻毒透肌肤首选的方剂是

125. 答案: E

解析: 奶麻之邪郁肌表证。证候: 骤发高热, 持续 3~4 天, 神情正常或稍有烦躁, 饮食减少, 偶有凶填, 或见抽风, 咽红, 舌质偏红, 苔薄黄, 指纹浮紫。治法: 疏风清热, 宣透邪毒。代表方剂: 银翘散。

126. 答案: B

解析: 奶麻之毒透肌肤证。证候: 身热已退, 肌肤出现玫瑰红色小丘疹, 皮疹始见于躯干部, 很快延及全身, 约经 1~2 天皮疹消退, 肤无痒感, 或有口干, 纳差, 舌质偏红, 苔薄少津, 指纹淡紫。治法: 清热生津, 以助康复。代表方剂: 银翘散合养阴清肺汤。

- A. 清心泻火, 滋阴生津
- B. 温阳健脾, 利水消肿
- C. 调脾健运
- D. 消积理脾
- E. 补益气血

127. 疳积证的主要治法是

128. 口疳证的主要治法是

127. 答案: D

解析: 疳积证。证候: 形体明显消瘦, 面色萎黄, 肚腹膨胀, 甚则青筋暴露, 毛发稀疏结穗, 性情烦躁, 夜卧不宁, 或见揉眉挖鼻,

吮指磨牙, 动作异常, 食欲不振, 或善食易饥, 或嗜食异物, 舌淡苔腻, 脉沉细而滑。

治法: 消积理脾。代表方剂: 肥儿丸。 128.

答案: A

解析: 口疳证。证候: 口舌生疮, 甚或满口糜烂, 秽臭难闻, 面赤心烦, 夜卧不宁, 小便短黄, 或吐舌, 弄舌, 舌质红, 苔薄黄, 脉细数。治法: 清心泻火, 滋阴生津。代表方剂: 泻心导赤散。

- A. 乌梅丸
- B. 鹤虱丸
- C. 驱蛔承气汤
- D. 使君子散 E.

驱虫粉

129. 治疗蛔虫病肠虫证首选

130. 治疗蛔虫病蛔厥证首选

129. 答案 D

解析: 蛔虫病辩证治疗。肠虫证。症状: 证候: 脐腹部疼痛, 轻重不一, 时作时止, 或不思饮食, 或嗜食异物, 大便不调, 或泄泻或便秘, 或便下蛔虫, 面色多黄滞, 可见面部白斑, 白睛蓝斑, 唇内粟状白点, 夜寐齟齿。甚者, 腹部可扪及条索状物, 时聚时散, 形体消瘦, 肚腹胀大, 青筋显露。舌苔多见花剥或腻, 舌尖红赤, 脉弦滑。治法: 驱蛔杀虫, 调理脾胃。主方: 使君子散加减。 130. 答案: A

解析: 蛔虫病辩证治疗。蛔厥证。症状: 有肠蛔虫证, 突然腹部绞痛, 弯腰曲背, 辗转不安, 肢冷汗出, 恶心呕吐, 常吐胆汁或蛔虫。腹部绞痛呈阵发性, 疼痛部位在右上腹或剑突下, 疼痛可暂时缓解减轻, 但又反复 发作。重者腹痛持续而阵发性加剧, 可伴畏寒发热, 甚至出现黄疸。舌苔多黄腻, 脉弦数或滑数。治法: 安蛔定痛, 继之驱虫。主方: 乌梅丸加减。

- A. 防风通圣散
 - B. 龙胆泻肝汤
 - C. 当归饮子 D.
- 消风散

E. 麻黄桂枝各半汤

131. 治疗瘾疹风寒束表证, 采用的治疗方药为

132. 治疗瘾疹风热犯表证, 采用的治疗方药为

131. 答案: E

解析: 瘾疹之风寒束表证。证候: 风团色白, 遇寒加重, 得暖则减; 恶寒怕冷, 口不渴; 舌淡红, 苔薄白, 脉浮紧。治法: 疏风散寒止痒。方药: 麻黄桂枝各半汤加减。

132. 答案: D

解析: 瘾疹之风热犯表证。证候: 风团鲜红, 灼热剧痒, 遇热加重, 得冷则减; 伴有发热, 恶寒, 咽喉肿痛; 舌质红, 苔薄白或薄黄, 脉浮数。治法: 疏风清热止痒。方药: 消风散加减。

A. 清热凉血, 解毒消斑

B. 清利湿热, 解毒通络

C. 养血滋阴, 润肤息风

D. 清热泻火, 凉血解毒

E. 活血化瘀, 解毒通络

133. 治疗白疮湿毒蕴阻证, 采用的治疗方法为

134. 治疗白疮火毒炽盛证, 采用的治疗方法为

133. 答案: B

解析: 白疮湿毒蕴阻证。证候: 皮损多发生在腋窝、腹股沟等皱褶部位, 红斑糜烂, 痂屑黏厚, 瘙痒剧烈; 或掌跖红斑、脓疱、脱皮; 或伴关节酸痛、肿胀、下肢沉重; 舌质红, 苔黄腻, 脉滑。治法: 清利湿热, 解毒通络。方药: 萆薢渗湿汤加减。

134. 答案: D

解析: 白疮火毒炽盛证。证候: 全身皮肤潮红、肿胀、灼热痒痛, 大量脱皮, 或有密集小脓疱; 伴壮热、口渴、头痛、畏寒, 大便干燥, 小便黄赤; 舌红绛, 苔黄腻, 脉弦滑数。治法: 清热泻火, 凉血解毒。方药: 清瘟败毒饮加减。

A. 7%, 深 II 度

B. 7%, 浅 II 度

C. 9%, 深 II 度

D. 9%, 浅 II 度

E. 12%, 深 II 度

135. 患者, 男, 25 岁。左上肢完全被开水烫伤, 红斑、水疱, 剧烈疼痛, 患者被烫伤的面积和深度是

136. 患者, 男, 65 岁。双足完全被开水烫伤, 水疱, 基底苍白, 疼痛迟钝, 患者被烫伤的面积和深度是

135. 答案: D

解析: 中国九分法: 将全身体表面积分为 11 个 9 等份。成人头、面、颈部为 9%; 双上肢为 $2 \times 9\%$; 躯干前后包括外阴部为 $3 \times 9\%$; 双下肢包括臀部为 $5 \times 9\% + 1\% = 46\%$ 。II 度(水疱)烧伤中的浅 II 度达真皮浅层, 部分生发层健在, 疮面表现为剧痛, 感觉过敏, 有水疱, 基底部呈均匀红色, 潮湿, 局部肿胀, 疮面无感染时 1~2 周愈合, 无斑痕, 有色素沉着; 深 II 度烧伤达真皮深层, 有皮肤附件残留, 疮面表现为感觉迟钝, 有水疱, 基底苍白, 间有红色斑点, 潮湿, 疮面无感染时 3~4 周愈合, 可有斑痕。

136. 答案: A

解析: 中国九分法: 将全身体表面积分为 11 个 9 等份。成人头、面、颈部为 9%; 双上肢为 $2 \times 9\%$; 躯干前后包括外阴部为 $3 \times 9\%$; 双下肢包括臀部为 $5 \times 9\% + 1\% = 46\%$ (双臀 5%, 双足 7%, 双小腿 13%, 双大腿 21%)。II 度(水疱)烧伤中的浅 II 度达真皮浅层, 部分生发层健在, 疮面表现为剧痛, 感觉过敏, 有水疱, 基底部呈均匀红色, 潮湿, 局部肿胀, 疮面无感染时 1~2 周愈合, 无斑痕, 有色素沉着; 深 II 度烧伤达真皮深层, 有皮肤附件残留, 疮面表现为感觉迟钝, 有水疱, 基底苍白, 间有红色斑点, 潮湿, 疮面无感染时 3~4 周愈合, 可有斑痕。

A. 血癭

B. 癭痈

C. 肉癭

D. 石癭

E. 气瘰

137. 患者颈前区弥漫性肿大，按之肿块柔软，皮色如常，并不疼痛。其诊断是

138. 患者颈前肿块，表面高低不平，质地坚硬如石，随吞咽动作移动减少。其诊断是

答案：E

解析：气瘰初起时无明显不适感，甲状腺呈弥漫性肿大，腺体表面较平坦，质软不痛，皮色如常，腺体随吞咽动作而上下移动。

139. 答案：D

解析：石瘰多见于 40 岁以上患者，女多于男，或既往有肉瘰病史。颈前多年存在的肿块，生长迅速，质地坚硬如石，表面凹凸不平，推之不移，并可出现吞咽时移动受限。可伴有疼痛，若颈丛神经浅支受侵，则耳、枕、肩部剧痛。

A. 土壤

B. 体液

C. 吸血节肢动物

D. 消化道

E. 呼吸道

139. 甲型肝炎的主要传播途径是

140. 丙型肝炎的主要传播途径是

139. 答案：D

解析：甲、戊型肝炎主要经粪-口途径传播。粪便中排出的病毒通过污染手、水、食物等经口感染。散发病例以日常生活接触传播为主要方式，如水源或食物（如贝类海产品等）被污染可引起局部暴发或流行。甲、戊型肝炎在少见的情况下也可通过输血或血制品等传播。

140. 答案：B

解析：乙、丙、丁型肝炎病毒可通过传染源的各
种体液排出体外，通过皮肤或黏膜的破损口（显性或隐性）进入易感者的体内而传播。传播途径包括：①输血及血制品以及使用污染的注射器或针刺器具等传播；②母婴传播；③性接触传播；④其他，如日常生活密切接触传播。

A. 被诊断为疑似病例，且与其有共同暴露史

的人被诊断为确诊病例者

B. 被诊断为疑似病例，出现 ARDS 者
周内有接触史，出现流感样症状

D. 有发热、咳嗽等典型流感样症状

E. 有流行病学史和临床表现，呼吸道分泌物标本甲型流感病毒和 H5 单克隆抗体抗原检测阳性

141. 属人禽流感医学观察病例的是

142. 属人禽流感临床诊断病例的是

141. 答案：C

解析：人禽流感医学观察病例：1 周内有流行病学接触史者，出现流感样症状，对其进行 7 日医学观察。

142. 答案：A

解析：人禽流感临床诊断病例：被诊断为疑似病例，且与其有共同暴露史的人被诊断为确诊病例者。

A. 鲍氏志贺菌 B.

舒氏痢疾杆菌 C.

宋内志贺菌 D.

痢疾志贺菌 E.

福氏志贺菌

143. 抵抗力最强的痢疾杆菌是

144. 感染后易转为慢性的痢疾杆菌是

143. 答案：C

解析：痢疾志贺菌感染病情较重，福氏志贺菌感染易转为慢性，宋内志贺菌感染病情轻，多不典型。我国的优势血清型为福氏 2a、宋内氏、痢疾 I 型，其他血清型相对比较少见。宋内志贺菌抵抗力最强，福氏志贺菌次之，痢疾志贺菌最弱。

144. 答案：E

解析：痢疾志贺菌感染病情较重，福氏志贺菌感染易转为慢性，宋内志贺菌感染病情轻，多不典型。我国的优势血清型为福氏 2a、宋内氏、痢疾 I 型，其他血清型相对比较少见。宋内志贺菌抵抗力最强，福氏志贺菌次之，痢疾志贺菌最弱。

A. 鼠疫、霍乱

B. 狂犬病、流行性乙型脑炎

- C. 登革热. 炭疽
- D. 阿米巴性痢疾. 肺结核
- E. 黑热病. 包虫病

145. 丙类传染病是
146. 甲类传染病是

145. 答案: E

解析: 甲类传染病是指: 鼠疫. 霍乱。丙类传染病是指: 流行性感冒. 流行性腮腺炎. 风疹. 急性出血性结膜炎. 麻风病. 流行性和地方性斑疹伤寒. 黑热病. 包虫病. 丝虫病, 除霍乱. 细菌性和阿米巴性痢疾. 伤寒和副伤寒以外的感染性腹泻病。

146. 答案: A

解析: 甲类传染病是指: 鼠疫. 霍乱。丙类传染病是指: 流行性感冒. 流行性腮腺炎. 风疹. 急性出血性结膜炎. 麻风病. 流行性和地方性斑疹伤寒. 黑热病. 包虫病. 丝虫病, 除霍乱. 细菌性和阿米巴性痢疾. 伤寒和副伤寒以外的感染性腹泻病。

- A. 肥达反应
- B. 临床表现
- C. 尿培养D.
- 粪便培养E.
- 血培养

147. 流脑确诊的依据是
148. 伤寒确诊的依据是

147. 答案: E

解析: 取流脑患者的血液. 脑脊液. 骨髓等作病原菌培养, 阳性者可确诊。

148. 答案: E

解析: 伤寒确诊有赖于血或骨髓培养检出伤寒杆菌。

- A. 医师的社会地位
- B. 医师的执业条件
- C. 医师的职责
- D. 医师的权利
- E. 医师的义务

149. 医师在执业活动中遵守法律规定和技术操作规范体现了

150. 医师在执业活动中, 人格尊严. 人身安全

全不受侵犯体现了

149. 答案: E

解析: 遵守法律. 法规, 遵守技术操作规范属于执业医师的义务。

150. 答案: D

解析: 在执业活动中, 人格尊严. 人身安全不受侵犯属于执业医师的权利。