

初级开课测评第二天答案与解析(内2)

1、答案: B

解析:原发性肝癌常发生于肝硬化患者。临床症状包括:①食欲明显减退:腹部闷胀,消化不良,有时出现恶心、呕吐;②右上腹隐痛:肝区可有持续性或间歇性疼痛。③乏力、消瘦、不明原因的发热及水肿;④黄疸、血性腹水、皮肤瘙痒;故选 B

2、答案: E

解析:①氨等含氮物质及其他毒物增加的诱因:如进食过量的蛋白质、输血、消化道大出血致肠道内大量积血;②低钾碱中毒:常由于大量利尿或放腹水引起,碱中毒时,体液中 H+减低,NH4+容易变成 NH3,增加了氨通过血脑屏障的弥散能力,导致氨中毒。③加重门体分流及肝损伤的因素:如自发性门体分流。④镇静剂:对大脑产生抑制作用。故选 E。

3, E

解析: 浅昏迷: 随意活动消失, 对疼痛刺激有反应, 各种生理反射(吞咽、咳嗽、角膜反射、瞳孔对光反应等)存在, 体温、脉搏、呼吸多无明显改变, 可伴谵妄或躁动。深昏迷: 随意活动完全消失, 对各种刺激皆无反应, 各种生理反射消失, 可有呼吸不规则、血压下降、大小便失禁、全身肌肉松弛、去大脑强直等。故选 E。

4、答案: A

解析: 肝性脑病是严重肝病引起的、以代谢紊乱为基础的中枢神经系统功能失调的综合病征, 其主要临床表现是意识障碍、行为失常和昏迷, 消化道大量出血时可导致出血性休克, 诱发腹水和肝性脑病, 甚至休克死亡。该患者有肝硬化病史, 大量呕血伴神志改变, 并出现休克的征象, 此时应警惕发生肝性脑病。故选 A

5、答案: E

解析:安静卧床,保温、防止着凉或过热,一般不用热水袋保温,过热可使周围血管扩张,血压下降,避免不必要的搬动,呕血时应立即将病人头偏向一侧,以免血液呛入气管而造成窒息。在呕血、恶心、呕吐和休克的情况下应禁食。缓慢静脉注射或静脉输血管加压素入,速度不宜过快,以防出现副作用。故选 E。



6、答案: C

解析:引起肝硬化的病因很多,其中主要是病毒性肝炎所致,如乙肝、丙肝等。同时还有酒精肝、脂肪肝、胆汁淤积、工业毒物或药物、营养、循环障碍、代谢障碍、血吸虫病等方面的因素长期损害所致。故选 C。

7、答案: A

解析: 肝性脑病是由于急、慢性肝病或各种原因的门一体分流所引起的,以代谢紊乱为基础的神经精神方面的异常。临床表现可以是仅仅用智力测验或电生理检测方法才能检测到的轻微异常,也可表现为行为异常、意识障碍,甚至昏迷。常伴有肌张力增高、腱反射亢进、扑翼征、踝阵挛阳性,或巴彬斯基氏征阳性等神经系统异常。故选 A。

8、答案: C

解析:慢性呼吸衰竭,是慢性肺部疾病发展到严重阶段的表现,最主要的诱因是呼吸道感染或持续哮喘发作。故选 C。

9、答案: B

解析: SLE 的皮肤护理: ①保持皮肤清洁干燥,每天用温水擦洗,忌用碱性肥皂;②有皮疹、红斑或光敏感者,指导病人外出时采取遮阳措施,避免阳光直接照射裸露皮肤,忌日光浴。皮疹或红斑处可遵医嘱用抗生素治疗,做好局部清创换药处理;③避免接触刺激性物品,如染发烫发剂、定型发胶、农药等;④避免服用容易诱发风湿病症状的药物,如普鲁卡因胺、肼屈嗪等。

10、答案: D

解析: T3、T4 过多综合症的临床表现为: ①高代谢症候群: 怕热、多汗、皮肤温暖湿润、低热、体重下降等; ②精神神经系统: 神经过敏、多言好动、易激动等; ③心血管系统: 心率增快、脉压增大、心律失常以房性期前收缩最常见; ④消化系统: 食欲亢进、消瘦、大便频繁甚至慢性腹泻; ⑤运动系统: 慢性甲亢性肌病等; ⑥血液系统: 白细胞计数偏低, 贫血等; ⑦生殖系统: 女性月经少、闭经, 男性阳痿等。故选 D。

11、答案: C

解析: 阿米巴痢疾又叫做阿米巴肠病,是一种由溶组织内阿米巴感染肠道引起的肠道传染病,腹泻表现是果酱样大便。

12、答案: A

解析: 巴宾斯基征: 患者仰卧, 髋、膝关节伸直, 检查者左手握踝上部固定小腿, 右手持钝尖的金属棒自足底外侧从后向前快速轻划至小指根部, 再 转向拇趾侧。如出现拇



趾背屈,其余四趾成扇形分开,称巴宾斯基征阳性。巴宾斯基征多见于锥体束损伤,亦可见于深睡、深度麻醉、药物或酒精中毒、脊髓病变、脑卒中、癫痫发作后的 Todd 麻痹时和低血糖休克等。故选 A.

13、答案: D

解析:白血病病人常有持续性发热或反复感染、进行性贫血、出血、骨骼关节疼痛、肝、脾和淋巴结肿大等临床特征;外周血象中白细胞计数增加并出现原始或幼稚细胞;骨髓象中骨髓增生活跃,原始细胞占全部骨髓有核细胞的30%以上。

14、答案: A

解析: 十二指肠溃疡伴有肠粘膜出血的,会出现柏油样大便。

15、答案: D

解析:糖尿病酮症酸中毒呼吸中会出现烂苹果的味道,其实这种烂苹果的气味是由于呼出的气体中酮体的浓度比较高而导致的。

16、答案: A

解析:急性胰腺炎治疗原则为尽量解除胰腺的自身消化。可通过禁食、胃肠减压及应用酶抑制剂等减少胰腺酶的分泌。此外,防止继发感染、缓解疼痛、纠正水、电解质紊乱、维持主要脏器功能也极为重要。故选 A。

17、答案: A

解析:护理程序是护士在从事护理工作时使用的工作方法,内科护士在护理内科病人同样也要以护理程序为框架。如当病人入院后,护士要对病人生理、心理、社会等方面的状况和功能进行评估,即收集这些方面的有关资料,根据这些资料判断病人存在哪些护理问题即作出护理诊断,围绕护理诊断制定护理计划,之后实施计划中制定的护理措施,并对执行后的效果进行评价。可见,病人评估资料的主要来源是 A. 病人本身

18、答案: D

解析: 5级,力量正常; 4+级,在强负荷下力量轻度下降; 4级,能够对抗中等负荷; 4-级,能够对抗轻度负荷; 3级,能对抗重力,但不能对抗阻力; 2级,不能对抗重力; 1级,仅有肌肉收缩; 0级,无任何运动。故选 D

19、答案: D

解析:病理性血红蛋白减少的原因:①造血物质缺乏或利用障碍所致的贫血:如缺铁性贫血、叶酸及维生素 B12 缺乏所致的巨幼细胞性贫血;②骨髓造血功能衰竭:如再生障碍性贫血、骨髓纤维化所伴发的贫血;③红细胞丢失过多:失血过多、由于各种原因造



成的急性或慢性失; ④红细胞破坏过多而导致的贫血: 如遗传性球形红细胞增多症、海洋性贫血、阵发性睡眠性血红蛋白尿、异常血红蛋白病、免疫性溶血性贫血、心脏体外循环的大手术或某些生物性和化学性等因素所致的溶血性贫血等。故选 D。

20、答案: E

解析:脑死亡的诊断标准:无自主呼吸。不可逆性深昏迷:无自主性肌肉活动;对外界刺激毫无反应,但此时脊髓反射仍可存在。脑干神经反射消失:如瞳孔对光反射、角膜反射、咳嗽反射、吞咽反射等均消失,瞳孔散大或固定。脑电图呈持续平坦波形。心跳停止不作为脑死亡的判断标准。故选 E。

