

# 实践技能模拟试卷答案及解析

## 模拟试题（一）

病史采集：

女，28岁，牙龈出血2年。

解析：

### 1. 病史采集要点

- (1) 牙龈出血的部位？
- (2) 有无牙龈自发出血？
- (3) 牙龈是否肿胀、疼痛？
- (4) 有无牙松动、脱落？
- (5) 有无高血压及是否服用抗凝药物？
- (6) 有无体重减轻、发热和乏力等全身症状？
- (7) 是否处于妊娠时期？（女性）
- (8) 有无外伤史？

### 2. 可能的诊断

- 1) 慢性龈炎
- (2) 牙周病
- (3) 白血病
- (4) 妊娠性龈炎
- (5) 血友病
- (6) 急性坏死溃疡性龈炎
- (7) 牙外伤
- (8) 青春期龈炎(青春期人群)
- (9) 艾滋病性龈病损

病例分析：

### 1. 诊断：

左上6慢性牙髓炎

### 2. 诊断依据：

自发隐痛，冷测敏感，热测迟钝反应痛，深龋近髓，叩诊不适等。

### 3. 鉴别诊断：

①深龋：无自发痛，温度刺激反应不持续，无迟缓性疼痛反应，叩诊(-)。2可复性牙髓炎：无自发痛，温度刺激反应为短暂的持续即一过性敏感。

### 4. 治疗计划：

左上6牙髓治疗

## 模拟试题（二）

男性，58岁，牙齿松动半年，影响咀嚼。

解析：

1. 病史采集要点

- (1) 是否有牙周反复肿胀史？
- (2) 有无咬合不适、牙齿伸长感或不敢咬合？
- (3) 是一颗牙松动还是多颗牙松动？
- (4) 是否有外伤史？
- (5) 有无颌骨膨隆及膨隆的时间？
- (6) 是否有高热、寒战或头痛史？
- (7) 是否有牙痛史？

2. 可能的诊断和鉴别诊断

- (1) 牙周炎
- (2) 急性根尖周炎
- (3) 牙外伤
- (4) 颌骨囊肿或肿瘤
- (5) 颌骨骨髓炎

病例分析：

1. 诊断：

左上4急性根尖周炎

2. 诊断依据：

- ①病史：可定位的自发持续痛，咬合痛，浮出感。龋洞充填史。
- ②检查：深大龋洞，露髓，冷热测均无反应，叩(+++)，松(II°)，龈颊沟变平，压痛明显，X线示骨硬板消失，根周膜略宽。

3. 鉴别诊断：

- ①急性牙髓炎：患牙有放散痛，叩诊可有不适，但不表现疼痛。冷热测引发疼痛。
- ②慢性根尖炎：患牙叩诊不适，无明显自发痛，X线可见根尖区明显阴影。
- ③蜂窝织炎：颌面部软组织的红、肿、热、痛等急性炎症表现突出，重者出现功能障碍；全身反应明显。

4. 治疗计划：

- ①开髓开放引流，消炎止痛。
- ②急性炎症消退后行根管治疗。

## 模拟试题（三）

女，33岁，舌侧边缘溃疡5天。

解析：

1. 病史采集要点

- 溃疡的时间、大小、部位、数目和形态？  
有无溃疡反复发作史、自己康复的病史？  
有无局部创伤史？  
(4) 有无皮肤病史？

- (5)有无外生殖器溃疡史?
- (6)有无眼部病史?
- (7)有无体重下降和消瘦?(用于溃疡时间长的,考虑癌)
- (8)有没有盗汗或诊断过结核病?
- (9)溃疡之前有没有起水泡或发热的症状?

## 2. 可能的诊断和鉴别诊断

- (1)复发性溃疡
- (2)创伤性溃疡
- (3)恶性肿瘤引起的溃疡
- (4)结核性溃疡
- (5)白塞病
- (6)手足口
- (7)单纯疱疹性口炎
- (8)带状疱疹

## 病例分析:

### 1. 诊断:

左上7深龋

### 2. 诊断依据:

冷热刺激痛,龋损达牙本质深层,探诊敏感,冷测无异常,无穿髓点。

### 3. 鉴别诊断:

- ①可复性牙髓炎:常规冷测(不入洞)即可产生一过性疼痛,刺激去除后症状仍持续数秒。
- ②慢性牙髓炎:有自发痛史,叩诊异常,温度测诱发迟缓痛等。
- ③牙髓坏死:探诊无反应,冷热测、电活力测均无反应。

### 4. 治疗设计:

间接盖髓,垫底充填。

## 模拟试题(四)

男,30岁,面部瘻管2个月

## 解析:

### 1. 病史采集要点

- (1)瘻管的部位,大小,时间是一直有还是好了又有
- (2)瘻管里面流出物的性状
- (3)是否伴有牙痛,牙齿松动
- (4)是否伴有发热
- (5)是否伴有面部的肿胀疼痛
- (6)既往是否有牙齿的疼痛史治疗史
- (7)是否有外伤史
- (8)既往是否有牙周出血溢脓、牙齿松动病史是否有牙周治疗史
- (9)家里人是否有同样的情况

- (10) 是否有放疗存在
2. 可能的诊断和鉴别诊断
- (1) 急性根尖脓肿
  - (2) 慢性根尖脓肿
  - (3) 牙周脓肿
  - (4) 颌骨骨髓炎
  - (5) 放射性骨髓炎
  - (6) 智齿冠周炎
  - (7) 外伤
  - (8) 囊肿和肿瘤
  - (9) 先天性畸形

病情分析:

- 1) 诊断:慢性牙周炎
- 2) 诊断依据:
  - ①局部有菌斑, 牙石等刺激物;
  - ②全口牙龈普遍有炎症, 有牙周袋和附着丧失, 牙齿松动
  - ③X 线检查有牙槽骨吸收:
  - ④疾病进展缓慢。
- 3) 鉴别诊断:

边缘性龈炎:假性牙周袋, 无附着丧失, 无牙槽骨吸收。
- 3) 治疗设计:
  - ①口腔卫生宣教;
  - ②全口牙洁治;
  - ③大于等于 4mm 的深袋刮治, 必要时牙周手术治疗;
  - ④定期复查, 维护治疗。

## 模拟试题 (五)

女, 45 岁, 口干三个月。

解析:

1. 病史采集要点
  - (1) 询问口干的症状、特点:口干的时间、程度?
  - (2) 是否伴有眼部等其他部位干燥?
  - (3) 有无服用能够引起口干的药物?
  - (4) 有无风湿性关节炎、红斑狼疮等自身免疫性疾病?
  - (5) 是否有放疗病史?
  - (6) 是否有大量服用抗生素或长期戴义齿的情况?
  - (7) 是否存在营养不良的情况?
  - (8) 有无糖尿病?
  - (9) 是否服用了导致口干的药物?像抗抑郁药、抗组胺药、抗高血压药和利尿药
  - (10) 精神因素如何?
2. 可能的诊断和鉴别诊断

- (1) 舍格伦综合征
- (2) 放疗后
- (3) 生理性
- (4) 营养性的口炎
- (5) 念珠菌性口炎
- (6) 糖尿病
- (7) 药物性的口干
- (8) 营养性的口炎
- (9) 瘰疬

病例分析:

1) 诊断:

复发性口腔溃疡(轻型)

2) 诊断依据:

- ①口腔溃疡反复发作的病史。
- ②溃疡发作有自限性。
- ③本次发作溃疡数目单一，发作部位为非角化黏膜。

3) 鉴别诊断:

- ①白塞病:口腔反复溃疡，外阴部复发性溃疡，眼部虹膜睫状体炎等;皮肤红斑结节，针刺反应阳性;多个关节肿痛、发炎等。
- ②疱疹性口炎:病毒感染引起，有全身症状，如发热等，口腔病损可同时发生于角化和非角化黏膜，成簇分布，可累及皮肤。

4) 治疗:

- ①局部消炎、止痛，使用促进愈合的药物，如 1/5000 的洗必泰含漱，养阴生肌散外涂。
- ②补充维生素和微量元素。
- ③内科诊治胃肠道疾病。
- ④全身免疫调节治疗，免疫增强剂:转移因子、胸腺素、左旋咪唑等。

## 模拟试题（六）

男，68 岁。 双侧后牙松动、咀嚼无力 3 年。

解析:

1. 病史采集要点

- (1) 单个牙或多个牙松动?
- (2) 牙龈有无肿胀、出血?
- (3) 咬合时是否疼痛?
- (4) 是否伴有牙齿移位?
- (5) 相应部位有无肿物或颌骨膨隆及出现的时间?

2. 可能的疾病

- (1) 慢性牙周炎
- (2) 牙外伤
- (3) 颌骨囊肿或肿瘤

病情分析：

1) 诊断:边缘性龈炎

2) 诊断依据:

- ①牙龈发红、水肿;
- ②探诊出血;
- ③虽有假性牙周袋, 但无附着丧失;
- ④X 线检查未见牙槽骨吸收。

3) 鉴别诊断:

早期牙周炎:有附着丧失;X 线可见牙槽嵴顶硬骨板消失, 牙槽骨吸收。

4) 治疗设计:

- ①口腔卫生宣教;
- ②龈上洁治;
- ③定期复查, 防止复发。

## 模拟试题 (七)

女, 35 岁。左下后牙松动 3 天、不敢咬合。

解析:

1. 病史采集要点

- (1) 松动牙是否伴有牙痛?
- (2) 咬合或咬物时是否疼痛?
- (3) 患牙部位的牙龈有无溢脓?
- (4) 患牙是否咬到硬物而硌伤?
- (5) 患牙相应部位有无肿物或颌骨膨隆及出现的时间?
- (6) 有无发热、寒战等全身症状?

2. 可能的疾病

- (1) 急性根尖周炎或慢性根尖周炎急性发作
- (2) 牙外伤
- (3) 急性牙周脓肿
- (4) 牙周炎
- (5) 颌骨骨髓炎

病情分析:

(1) 诊断:

- ①面部左侧割伤。
- ②左侧面部神经损伤(颧支、颊支)。
- ③左侧腮腺导管损伤。

(2) 诊断依据:

- ①病史:3 小时前, 患者被人用“西瓜刀”砍伤左侧面部。
- ②检查:左侧颧弓中部纵行向下达下颌骨下缘处可见一约 2cmx3cm 伤口, 创缘齐;左侧鼻唇沟变浅, 左侧眼睑闭合功能障碍。
- ③伤口深达腮腺, 左侧腮腺导管无分泌。

(3) 鉴别诊断:

①面部左侧割伤与刺伤、挫伤、擦伤、撕裂伤鉴别:创缘整齐不整齐,裂开程度,根据创口深度和位置考虑与邻近窦腔的关系。

②左侧面部神经损伤(颧支、颊支)与面神经下颌缘支、颧支损伤鉴别:仔细检查面神经下颌缘支、颧支支配部位的功能。

(4) 治疗设计:

①急诊全麻下清创缝合。

②左侧面神经颧支、颊支显微外科吻合。

③左侧腮腺导管吻合。

## 模拟试题(八)

男, 31岁。牙龈白发出血,晨起时口角有血迹3天。

解析:

1. 病史采集要点

(1) 牙龈出血的部位?

(2) 牙龈有无疼痛、肿胀?

(3) 近来是否工作紧张、劳累、熬夜?

(4) 以前是否有牙龈出血不易止住现象?

(5) 有无体重减轻、发热和乏力等全身症状?

(6) 有无牙松动?

2. 可能的疾病

(1) 急性坏死性龈炎

(2) 白血病

(3) 血友病

(4) 牙周炎

(5) 慢性龈炎

病例分析:

(1) 主诉疾病的诊断:左下第三磨牙干槽症。

(2) 主诉疾病的诊断依据:

有拔牙史,术后3~4天出现剧痛,拔牙窝空虚。

(3) 主诉疾病的鉴别诊断:拔牙后疼痛。

(4) 治疗设计:

在局麻下,彻底清除拔牙窝内的腐败坏死物质,3%过氧化氢和生理盐水冲洗,填入碘仿纱条数日后复诊更换碘仿纱条直至肉芽组织覆盖。

## 模拟试题(九)

男, 28岁。上下前牙区牙龈肥大5年。

解析:

1. 病史采集要点

- (1) 后牙区是否也有牙龈肥大?
- (2) 有无癫痫、高血压或肾移植等病史及服药史?
- (3) 牙龈是否易出血, 且不易止住?
- (4) 有无牙萌出困难史和家族遗传史?
- (5) 有无发热、乏力、体重减轻等现象?

2. 可能的疾病

- (1) 药物性牙龈肥大
- (2) 白血病
- (3) 遗传性牙龈纤维瘤病

病例分析:

(1) 主诉疾病的诊断

① 11. 21 嵌入性脱位: 上唇挫裂伤。

② 非主诉疾病的诊断: 38, 48 冠周炎。

(2) 主诉疾病的诊断依据:

① 患牙有外伤史, 1121 牙龈红肿, 龈沟渗血, 牙冠完整, 内倾, 但比邻牙短 2mm, 叩痛(++), 松动(+). 中切牙开牙合。

② 上唇粘膜红肿, 约有 1cm 长的裂口, 渗血。

③ X 线片示: 11. 21 根尖周膜间隙消失, 未见根折线。

(3) 非主诉疾病的诊断依据: 3848 低位垂直阻生, 龈瓣红、水肿, 覆盖咬合面远中, 盲袋无分泌物。

(4) 主诉疾病治疗原则:

- ① 局麻下复位、固定。
- ② 局麻下行上唇挫裂伤缝合。
- ③ 观察牙髓症状, 酌情行根管治疗。
- (5) 全口其他疾病的治疗设计: 3848 龈瓣切除术。

## 模拟试题 (十)

女, 27 岁。 牙龈肥大 3 个月。

解析:

1. 病史采集要点

- (1) 牙龈肥大的部位和范围?
- (2) 牙龈有无自发出血或刷牙出血? 能否止住?
- (3) 是否在妊娠期?
- (4) 有无癫痫、高血压或肾移植等病史及服药史?
- (5) 有无发热、乏力、体重减轻等现象?

2. 可能的疾病

- (1) 妊娠期龈炎
- (2) 白血病



### (3) 药物性牙龈肥大

病情分析：

(1) 主诉疾病的诊断

- ①左下8冠周炎。
- ②左侧下颌下间隙感染。

(2) 主诉疾病的诊断依据：

- ①病史：先出现左下后牙疼痛，后出现左侧下颌下肿胀。
- ②检查：下颌下三角区肿胀，下颌骨下缘轮廓消失，皮肤紧张、牙痛，按压有凹陷性水肿。

(3) 主诉疾病的鉴别诊断：

- ①化脓性淋巴结炎：脓肿局限于一个或多个淋巴结内，皮肤表面无明显凹陷性水肿。

(5) 主诉疾病的治疗原则：

- ①抗感染治疗。
- ②脓肿切开引流。
- ③局部冲洗。
- ④全身症状明显者给予支持疗法。

