

病案分析

陈某，女，35岁，已婚。患者1年前出现右侧乳房间断胀痛，可触及乳房肿块，在当地医院B超提示“乳腺囊性增生”，平素善郁易怒，时有胸闷、胁胀。眠不实，纳谷不香，二便尚可，苔薄黄，脉弦滑，请与乳岩相鉴别。

要求:根据上述摘要,在答题卡上完成书面分析

项目	评分标准	分值
中医疾病诊断	乳癖	3
中医证候诊断	肝郁痰凝证	3
中医辨病辨证依据 (含病因病机分析)	患者双侧乳房均出现肿块，伴疼痛，与情绪相关，故诊断为乳癖。情志不舒，肝郁气滞，脾失健运，痰浊内生，气血瘀滞，痰凝瘀血阻于乳络，故致乳房肿块。疼痛，肝郁不舒，故胸闷胁胀，善郁易怒，眠不实，肝郁克土，脾失健运。故见纳谷不香，苔薄黄，脉弦滑均为肝郁痰凝之象。	4
中医类证鉴别	乳癖与乳岩的鉴别:二者都可以见到乳房肿块，区别在于，乳岩多发生于40-60岁中老年妇女。多无疼痛，逐渐长大，肿块质地坚硬如石，表面凹凸不平，边缘不清，活动度差，后期破溃如预花样，后较差。乳癖是以乳房有形状大小不一的肿块，兼疼痛，与月经周期相关为主要表现的病证。一般预后较好	3
中医治法	疏肝解郁，化痰散结	2
方剂名称	逍遥萎贝散加减	2
药物组成、剂量及煎服法	柴胡10g 白芍12g 当归20g 白术9g 瓜蒌20g 贝母10g 法半夏6g 胆南星6g 生牡蛎30g(先煎) 茯苓12g 山慈菇6g 3剂，水煎服，每日1剂，早晚分服。	3