

2024初级护师

《相关专业知识》

对答案

1. 【题干】可减少内脏血流量，临床上多用于食管胃底静脉曲张的药物（ ）。

【选项】

- A. 奥美拉唑
- B. 西咪替丁
- C. 生长抑素
- D. 去甲肾上腺素
- E. 乳果糖

【答案】C

【解析】生长抑素对上消化道出血止血效果较好，可减少30%~40%内脏血流量，临床上多用于食管—胃底静脉曲张破裂出血。

【解析】

【考点】

【知识点】

2. 【题干】血型不合引起输血反应的患者尿液呈（ ）。

【选项】

2024初级护师考试4月13、14日

考生回顾版

【考后估分】



2024初级
护师《基础
知识》考点
复盘1-88...



2024初级
护师《相关
专业知识》
考点复盘...



2024初级
护师《专业
实践能力》
考点复盘...



2024初级
护师《专业
知识》考点
复盘1-78...



扫码添加助教老师
免费领取完整版PDF

- A. 酱油色
- B. 无色
- C. 红色
- D. 深黄色
- E. 乳白色

【答案】A

【解析】大量红细胞在血管内破坏，形成血红蛋白尿，呈浓红茶色或酱油色，隐血试验呈阳性。见于血型不合输血后的溶血、恶性疟疾及阵发性睡眠性血红蛋白尿等。

【解析】

【考点】

【知识点】

3. 【题干】糖尿病酮症酸中毒的患者呼出的气味是（ ）。

【选项】

- A. 氨臭味
- B. 烂苹果味
- C. 粪臭味
- D. 恶臭味
- E. 刺激性蒜味

【答案】B

【解析】烂苹果味可见于糖尿病酮症酸中毒病人。

【解析】

【考点】

【知识点】

4. 【题干】应用 β_2 受体激动剂控制哮喘发作时，首选的给药方式是（ ）。

【选项】

- A. 口服法

- B. 静脉滴注法
- C. 吸入法
- D. 肌内注射法
- E. 舌下含化法

【答案】C

【解析】 β_2 受体激动剂除有迅速松弛支气管平滑肌作用外，还具有一定的抗气道炎症，增强黏膜纤毛功能的作用，是控制症状的首选药。用药方法首选吸入法。

【解析】

【考点】

【知识点】

5. 【题干】奇脉见于（ ）。

【选项】

- A. 心包积液
- B. 肺气肿
- C. 胸腔积液
- D. 胸腔积气
- E. 肺淤血

【答案】A

【解析】奇脉指平静吸气时脉搏明显减弱或消失，又称吸停脉，见于心包积液和缩窄性心包炎病人。

【解析】

【考点】

【知识点】

6. 【题干】意识全部消失，所有反射均消失的状态称为（ ）。

【选项】

- A. 嗜睡
- B. 昏睡

- C. 意识模糊
- D. 浅昏迷
- E. 深昏迷

【答案】E

【解析】深昏迷状态时，意识完全丧失，对各种刺激均无反应，深浅反射均消失。

【解析】

【考点】

【知识点】

7. 【题干】大咯血窒息的首要抢救措施是（ ）。

【选项】

- A. 清除呼吸道内积血
- B. 立即切开支气管
- C. 加压湿化吸氧
- D. 用呼吸中枢兴奋剂
- E. 平卧头偏向一侧

【答案】A

【解析】大咯血病人一旦出现窒息，立即置病人于头低足高位，轻拍背部以利血块排出；或迅速用机械吸引，以清除呼吸道内积血，必要时立即行气管插管或气管镜直视下吸取血块。

【解析】

【考点】

【知识点】

8. 【题干】前列腺增生的临床表现是（ ）。

【选项】

- A. 排尿困难、点滴状排尿及尿痛
- B. 尿急、尿频、尿痛
- C. 阴茎、会阴和下腹壁青紫肿胀，排尿困难，尿道口滴血

- D. 尿频，夜尿次数明显增加，进行性排尿困难，尿潴留
- E. 无痛性、间歇性，全程肉眼血尿，腰部隐痛

【答案】D

【解析】前列腺增生的临床表现包括：尿频（早期仅表现为夜尿次数明显增多）、排尿困难、尿潴留、血尿。结合选项，最佳答案选D。

【解析】

【考点】

【知识点】

9. 【题干】符合肾癌的临床表现是（ ）。

【选项】

- A. 排尿困难、点滴状排尿及尿痛
- B. 尿急、尿频、尿痛
- C. 阴茎、会阴和下腹壁青紫肿胀，排尿困难，尿道口滴血
- D. 尿频，夜尿次数明显增加，进行性排尿困难，尿潴留
- E. 无痛性、间歇性，全程肉眼血尿，腰部隐痛

【答案】E

【解析】肾癌的临床表现有无痛间歇性全程肉眼血尿，间歇性随病变发展而缩短。腰痛多为钝痛或隐痛。

【解析】

【考点】

【知识点】

10. 【题干】属于儿童轻型肥胖的为（ ）。

【选项】

- A. 大于平均体重的 20%
- B. 大于平均体重 20%—29%
- C. 大于平均体重 30%—49%
- D. 大于平均平均体重的 50%

E. 大于平均体重的 10%—19%

【答案】 B

【解析】 以同性别、同身高/长正常小儿体重均值为标准，体重超过均值 20%~29%者为轻度肥胖；超过 30%~49%者为中度肥胖；超过 50%者为重度肥胖。

【解析】

【考点】

【知识点】

11. **【题干】** 属于儿童中度肥胖为（ ）。

【选项】

A. 大于平均体重的 20%

B. 大于平均体重 20%~29%

C. 大于平均体重 30%~49%

D. 大于平均体重的 50%

E. 大于平均体重的 10%~19%

【答案】 C

【解析】 以同性别、同身高/长正常小儿体重均值为标准，体重超过均值 20%~29%者为轻度肥胖；超过 30%~49%者为中度肥胖；超过 50%者为重度肥胖。

【解析】

【考点】

【知识点】

12. **【题干】** 属于儿童重度肥胖的是（ ）。

【选项】

A. 大于平均体重的 20%

B. 大于平均体重 20%~29%

C. 大于平均体重 30%~49%

D. 大于平均体重的 50%

E. 大于平均体重的 10%~19%

【答案】 D

【解析】单纯性肥胖的患儿体重超过均值 20%~29%者为轻度肥胖；超过 30%~49%者为中度肥胖；超过 50%者为重度肥胖。

【解析】

【考点】

【知识点】

13. **【题干】**符合前尿道损伤的临床表现是（ ）。

【选项】

- A. 排尿困难、点滴状排尿及尿痛
- B. 尿急、尿频、尿痛
- C. 阴茎、会阴和下腹壁青紫肿胀，排尿困难，尿道口滴血
- D. 尿频，夜尿次数明显增加，进行性排尿困难，尿潴留
- E. 无痛性、间歇性，全程肉眼血尿，腰部隐痛

【答案】 C

【解析】前尿道损伤后即可见尿道外有鲜血滴出或溢出是前尿道损伤最常见的症状。前尿道损伤多发生于球部，尿道球部损伤时受伤处疼痛，排尿时疼痛加重并向阴茎头及会阴部放射。

【解析】

【考点】

【知识点】

14. **【题干】**原发性肝癌最有效的治疗方法是（ ）。

【选项】

- A. TACE
- B. 免疫治疗
- C. 放射性治疗
- D. 冰冻治疗
- E. 手术治疗

【答案】 E

【解析】 手术治疗是目前根治原发性肝癌的最好方法，适合手术者应及早手术切除。

【解析】

【考点】

【知识点】

15. **【题干】** 原发性肾病综合征患者必有表现是（ ）。

【选项】

- A. 膀胱刺激征
- B. 高钾血症
- C. 高钙血症
- D. 大量蛋白尿
- E. 血尿

【答案】 D

【解析】 肾病综合征指由各种肾脏疾病所致的，以大量蛋白尿、低白蛋白血症、水肿、高脂血症为临床表现的一组综合征。24 小时尿蛋白 $>3.5\text{g}$ 即可定义为大量蛋白尿，是肾病综合征最主要的诊断依据。

【解析】

【考点】

【知识点】

16. **【题干】** 慢性骨髓炎 X 线表现为（ ）。

【选项】

- A. codman 三角
- B. 虫蚀样改变
- C. 密度增高的死骨
- D. 葱皮样改变
- E. 肥皂泡样改变

【答案】 C

【解析】慢性血源性化脓性骨髓炎平片显示骨骼增粗、变形、骨质硬化、骨髓腔不规则，可见密度增高的死骨。虫蚀样改变一般见于骨肿瘤、骨结核。葱皮样改变骨膜刺激导致骨质增生。肥皂泡样改变是故居细胞瘤的表现。

【解析】

【考点】

【知识点】

17. **【题干】**肾盂肾炎患者常见的临床症状是（ ）。

【选项】

- A. 膀胱刺激征
- B. 高钾血症
- C. 高钙血症
- D. 大量蛋白尿
- E. 血尿

【答案】 A

【解析】肾盂肾炎的临床表现：高热、寒战、腰痛、膀胱刺激征。

【解析】

【考点】

【知识点】

18. **【题干】**小儿肥胖病主要的治疗手段是（ ）。

【选项】

- A. 不控制食物总量的摄入
- B. 培养良好的饮食习惯
- C. 控制饮食，进行有效的运动
- D. 解除患儿的心理负担
- E. 多吃饱腹感明显的食物

【答案】 C

【解析】儿童单纯性肥胖是指长期能量摄入超过人体的消耗，导致体内脂肪蓄积过多，体重超过一定范围的营养障碍性疾病。在其治疗过程中，饮食治疗和运动疗法是两项主要措施。药物应慎用。外科手术并发症严重，不宜用于儿童。

【解析】

【考点】

【知识点】

19. **【题干】**患儿男，2岁，因偏食、厌食入院，查体患儿易激惹，注意力集中，口唇、甲床及口腔黏膜苍白，血常规骨髓象结果显示呈小细胞低色素性贫血，以晚幼红细胞增生为主。考虑该患儿为（ ）。

【选项】

- A. 营养性缺铁性贫血
- B. 慢性淋巴细胞性白血病
- C. 再生障碍性贫血
- D. 营养性巨幼红细胞性贫血
- E. 生理性贫血

【答案】 A

【解析】缺铁性贫血为小细胞、低色素性贫血。骨髓中见中晚幼红细胞增生活跃。该患者口唇、甲床及口腔黏膜苍白，结合骨髓象结果，考虑诊断为缺铁性贫血。

【解析】

【考点】

【知识点】

20. **【题干】**男性贫血的指标是血红蛋白低于（ ）。

【选项】

- A. 110g/L
- B. 140g/L
- C. 120g/L
- D. 100g/L

E. 130g/L

【答案】C

【解析】我国海平面地区，以成年男性血红蛋白 <120 克每升，成年女性血红蛋白 <110 克每升，孕妇血红蛋白 <100 克每升作为贫血的诊断标准。

【解析】

【考点】

【知识点】

21. 【题干】医院手术室非限制区选（ ）。

【选项】

- A. 更衣室
- B. 手术室
- C. 手术洗手室
- D. 物品准备室
- E. 病房

【答案】A

【解析】手术室依据清洁程度可划分为3区。(1)限制区：也称无菌区，包括麻醉准备间、手术间（麻醉诱导间）、手术准备间、无菌物品存放间、外科手消毒区、贵重仪器房、洁净走廊等。(2)半限制区：也称清洁区，包括药品储存间、复苏室、办公室、库房、更衣室、生活区（值班室、会议室、休息室、卫生间）。

(3)非限制区：也称污染区，包括更鞋前区、接收患者处、器械清洗间、污洗间、杂用间、标本存放间、医废暂存处等。

【考点】

【知识点】

22. 【题干】患者女，62岁，外阴瘙痒伴疼痛不适来诊。检查左侧大阴唇中下部见溃疡，直径1.5cm。首选辅助检查是（ ）。

【选项】

- A. 阴道外阴组织活检

- B. 阴道分泌物检查
- C. 阴道镜
- D. 宫颈刮片
- E. 白带

【答案】A

【解析】外阴瘙痒、局部肿块或溃疡是外阴癌最常见症状，该患者检查外阴瘙痒伴疼痛不适，左侧大阴唇中下部有溃疡，考虑外阴癌的可能，首选活组织病理检查。

【考点】

【知识点】

23. 【题干】类风湿性关节炎最常累及的关节是（ ）。

【选项】

- A. 膝关节
- B. 四肢小关节
- C. 肘关节
- D. 肩关节
- E. 髋关节

【答案】B

【解析】类风湿关节炎主要侵犯小关节，尤其是手关节，其次是趾、膝、踝、肘、肩等关节。

【考点】

【知识点】

24. 【题干】水痘的皮疹特点是（ ）。

【选项】

- A. 皮肤弥漫性红疹
- B. 疹间无正常皮肤
- C. 皮疹按斑疹、丘疹、疱疹、结痂的顺序演变

- D. 出血性皮炎
- E. 糠皮样脱屑

【答案】 C

【解析】水痘患儿的皮疹按斑疹、丘疹、疱疹、结痂的顺序演变。连续分批出现，同一部位可见不同性状的皮疹。

【考点】

【知识点】

25. **【题干】**膀胱镜检查适应证，以下哪项是错误的（ ）。

【选项】

- A. 膀胱癌
- B. 逆行肾盂造影
- C. 膀胱结石
- D. 尿道尖锐湿疣
- E. 结核性尿道狭窄

【答案】 E

【解析】结核性尿道狭窄可通过尿路造影进一步明确诊断，故选 E。

【考点】

【知识点】

26. **【题干】**患者女，38岁，孕10周，一周前偶发下腹痛，可忍受，今晨出现不规则阴道流血，检查 HCG186532U/L，B超提示宫腔无妊娠囊，充满不均质密集状或短条状回声，呈“落雪状”可能发生了（ ）。

【选项】

- A. 异位妊娠
- B. 先兆流产
- C. 稽留流产
- D. 不全流产
- E. 葡萄胎

【答案】 E

【解析】 葡萄胎患者可有腹痛，最常见的症状是停经后阴道流血，一般在停经 8—12 周左右开始出现。超声检查是临床上常用的辅助检查，完全性葡萄胎的典型超声图像表现为无妊娠囊，宫腔内充满不均质密集状或短条状回声，呈“落雪状”，本题答案选 E。

【考点】

【知识点】

27. **【题干】** 10 个月男婴突起阵发性哭闹一天，哭闹间歇时嬉戏如常，2 小时前出现果酱样大便。首先考虑（ ）。

【选项】

- A. 肠系膜淋巴结炎
- B. 细菌性痢疾
- C. 肠扭转
- D. 肠炎
- E. 肠套叠

【答案】 E

【解析】 肠套叠的临床表现包括患儿突然发生剧烈的阵发性肠绞痛，哭闹不安，屈膝缩腹，面色苍白，出汗，拒食。约 85% 病例在发病后 6—12h 发生血便，呈果酱样黏液血便，或作直肠指检时发现血便。

【考点】

【知识点】

28. **【题干】** 低钾血症最早出现的临床表现是（ ）。

【选项】

- A. 肌无力
- B. 肠麻痹
- C. 心律失常
- D. 神志模糊或淡漠

E. 腱反射减退或消失

【答案】 A

【解析】 肌无力是低钾血症最早的临床表现。

【考点】

【知识点】

29. **【题干】** 系统性红斑狼疮特异性检查是 ()。

【选项】

A. 狼疮细胞

B. 核抗体

C. 抗 SM 抗体

D. 抗 DNA 抗体

E. 白细胞总数

【答案】 C

【解析】 一般认为抗 SM 抗体是 SLE 的标志抗体。SM 是细胞核中的酸性核蛋白，特异性很高。

【考点】

【知识点】

30. **【题干】** 治疗食管癌的首选方法是 ()。

【选项】

A. 化疗

B. 中药治疗

C. 手术治疗

D. 内镜治疗

E. 放疗

【答案】 C

【解析】 食管癌以手术治疗为主，辅以放射、化学药物等综合治疗。

【考点】

【知识点】

31. **【题干】**患者男，60岁。出院前6分钟步行试验，行走距离为320m。该患者的心力衰竭程度为（ ）。

【选项】

- A. 极轻度心力衰竭
- B. 轻度心力衰竭
- C. 中度心力衰竭
- D. 重度心力衰竭
- E. 极重度心力衰竭

【答案】C

【解析】6分钟步行试验指让病人在平直走廊里尽可能快地行走，测定其6分钟的步行距离：<150m为重度心衰；150—450m为中度心衰；>450m为轻度心衰。

【考点】

【知识点】

32. **【题干】**门腔静脉吻合术的主要目的是（ ）。

【选项】

- A. 减少腹水形成
- B. 降低门静脉压力
- C. 消除脾功能亢进
- D. 改善肝功能
- E. 阻断侧支循环

【答案】B

【解析】门腔静脉吻合术是一种非选择性门体分流术，是通过在门静脉系统与腔静脉系统间建立分流通道，降低门静脉压力，达到止血效果的一类手术。

【考点】

【知识点】

33. 【题干】患者男性，47岁，因大量饮酒致左上腹疼痛3小时入院。查体，体温36.5℃，脉搏110次/分，呼吸30次/分，血压80/50mmHg，面色苍白，四肢湿冷，腹部膨隆，全腹压痛明显，左上腹局部出现反跳痛，肌紧张，腹部移动性浊音阳性。血常规：血红蛋白90g/L，白细胞 $11 \times 10^9/L$ ，腹部X线：未见明显膈下游离气体。患者诊断为（ ）。

【选项】

- A. 小肠损伤
- B. 胰腺损伤
- C. 肝损伤
- D. 胃穿孔
- E. 脾损伤

【答案】D

【解析】胃十二指肠溃疡急性穿孔后，具有强烈刺激性的胃酸、胆汁、胰液等消化液和食物进入腹腔，引起化学性腹膜炎和腹腔内大量液体渗出。病情严重者可出现休克。

【考点】

【知识点】

34. 【题干】患者女，32岁，婚后三年未孕，查体基础体温双相，子宫内膜为增生期改变，输卵管通畅，男方无异常，应进行的检查为（ ）。

【选项】

- A. 宫颈刮片
- B. 宫腔镜
- C. 阴道镜
- D. 性交后精子穿透率检查
- E. 女性激素

【答案】B

【解析】该患者婚后三年未孕，考虑为不孕症可能性大。不孕症的女方检查除妇科检查内外生殖器官的发育和病变情况外，还需进行卵巢功能检查、输卵管通畅

检查、宫腔镜及腹腔镜检查。该患者基础体温双相，输卵管通畅，故考虑进行宫腔镜检查。

【考点】

【知识点】

35. **【题干】**对开放性损伤进行清创术的时限，一般不可超过伤后的（ ）。

【选项】

- A. 1—2h
- B. 3—5h
- C. 6—8h
- D. 9—10h
- E. 11—16h

【答案】 C

【解析】开放性创伤早期为污染伤口，采用清创术，对伤口进行清洗、扩创、直接缝合或延期缝合。清创时间越早越好，伤后6—8h是最佳时间，此时清创一般可达到一期缝合。

【考点】

【知识点】

36. **【题干】**关于高血压病人的用药正确的是（ ）。

【选项】

- A. 大剂量开始
- B. 可联合用药
- C. 降压宜快
- D. 间断用药
- E. 可自行调整剂量

【答案】 B

【解析】使用降压药物应遵循以下4项原则，即小剂量开始，优先选择长效制剂，联合用药及个体化。

【考点】

【知识点】

37. **【题干】**血尿素氮用于（ ）。

【选项】

- A. 呼吸系统监测
- B. 循环系统监测
- C. 消化系统监测
- D. 泌尿系统监测
- E. 神经系统监测

【答案】 D

【解析】血尿素氮和血肌酐测定是常用的肾功能检查。

【考点】

【知识点】

38. **【题干】**白细胞核左移提示（ ）。

【选项】

- A. 急性感染
- B. 过敏
- C. 脱水
- D. 休克
- E. 中暑

【答案】 A

【解析】急性感染时白细胞总数增高或有核左移。

【考点】

【知识点】

39. **【题干】**肠套叠患者的粪便呈（ ）。

【选项】

- A. 白陶土色便
- B. 果酱样便
- C. 暗红色便
- D. 柏油样便
- E. 鲜红色便

【答案】 B

【解析】非正常情况若出现粪便颜色改变可提示消化系统疾病的存在，白陶土色便提示有胆道梗阻；粪便表面有鲜血提示患有痔疮或肛裂；果酱样便见于肠套叠、阿米巴痢疾。

【考点】

【知识点】

40. **【题干】**未婚女性，为了解卵巢功能，下列检查中最为合适的是（ ）。

【选项】

- A. 刮诊
- B. 阴道脱落细胞检查
- C. 基础体温测定
- D. 宫颈黏液结晶检查
- E. 宫腔镜检查

【答案】 C

【解析】基础体温测定是测定排卵简单易行的方法。

【考点】

【知识点】

41. **【题干】**血气分析用于（ ）。

【选项】

- A. 呼吸系统监测
- B. 循环系统监测
- C. 消化系统监测

- D. 泌尿系统监测
- E. 神经系统监测

【答案】 A

【解析】 血气分析检查是监测用氧效果的客观指标，当患者氧分压低于 50mmHg 时，应给予吸氧。

【考点】

【知识点】

42. **【题干】** 关于结核病药物的治疗原则不正确的叙述是 ()。

【选项】

- A. 规律用药
- B. 早期治疗
- C. 酌情停药
- D. 联合用药
- E. 剂量适宜

【答案】 C

【解析】 抗结核化学药物治疗的治疗原则是早期、联合适量、规律和全程治疗。

【考点】

【知识点】

43. **【题干】** 肾移植供、受者淋巴细胞毒性试验的要求是 ()。

【选项】

- A. <50%
- B. <10%或为阴性
- C. <30%
- D. <40%
- E. <20%

【答案】 B

【解析】 细胞毒性试验是指器官移植受者的血清与供者淋巴细胞之间的配合，淋

巴细胞毒性试验必须小于 10%或为阴性才能施行肾移植手术。

【考点】

【知识点】

44. **【题干】**腹膜刺激征是指（ ）。

【选项】

- A. 腹痛、腹胀、肠鸣音亢进
- B. 压痛、反跳痛、腹肌紧张
- C. 腹胀、压痛、反跳痛
- D. 恶心呕吐、腹泻、牙痛
- E. 发热、腹痛、压痛

【答案】 B

【解析】腹部压痛、反跳痛、腹肌紧张是腹膜炎的标志性体征，称为腹膜刺激征。

【考点】

【知识点】

45. **【题干】**目前已知的抑制胃酸分泌最强的药物是（ ）。

【选项】

- A. 雷尼替丁
- B. 奥曲肽
- C. 奥美拉唑
- D. 硫糖铝
- E. 阿莫西林

【答案】 C

【解析】质子泵抑制剂以奥美拉唑为代表，是目前最强的胃酸分泌抑制剂。

【考点】

【知识点】

46. **【题干】**特发性血小板减少性紫癜的治疗首选（ ）。

【选项】

- A. 输血小板
- B. 长春新碱
- C. 肾上腺糖皮质激素
- D. 脾切除
- E. 静脉输注免疫球蛋白

【答案】 C

【解析】 糖皮质激素一般为特发性血小板减少性紫癜治疗的首选药物。

【考点】

【知识点】

47. **【题干】** 患者男，48岁，腰椎间盘突出病史两年，并逐年加重，已严重影响生活和工作，且出现尿便障碍，其治疗方法应选择（ ）。

【选项】

- A. 按摩
- B. 牵引
- C. 手术
- D. 理疗
- E. 用药

【答案】 C

【解析】 腰椎间盘突出症患者出现单根神经受累或马尾神经症状，括约肌功能障碍的，需要进行手术治疗。本题患者病情已严重影响生活和工作，且出现尿便障碍，治疗应选择手术。

【考点】

【知识点】

48. **【题干】** 抢救小脑幕裂孔疝首先应采用哪种措施（ ）。

【选项】

- A. 快速静脉点滴高渗性脱水剂

- B. 颅内钻孔脑室外引流
- C. 脑室-腹腔分流
- D. 去骨瓣减压
- E. 开颅病变切除

【答案】A

【解析】当病人出现典型的脑疝症状，应立即静脉快速输入高渗脱水药，争取时间尽快手术，去除病因。

【考点】

【知识点】

49. 【题干】孕妇，25岁。孕24周，近日来子宫急剧增大，孕妇自觉呼吸费力、不能平卧。体检：口周紫、下肢水肿，经辅助检查排除胎儿畸形。此时，最佳的处理是（ ）。

【选项】

- A. 及时终止妊娠
- B. 人工破膜引产
- C. 经腹穿刺放羊水
- D. 控制饮食和水分
- E. 单纯利尿消肿

【答案】C

【解析】急性羊水过多发生于妊娠20—24周。病人出现呼吸困难，不能平卧，甚至出现发绀，孕妇表情痛苦，该患者符合以上表现，考虑为急性羊水过多。羊水过多但仍为正常胎儿者若症状严重可经腹行羊膜腔穿刺放出适量羊水，缓解压迫症状。

【考点】

【知识点】

50. 【题干】患者，男，28岁。上腹痛1年伴反酸、夜间疼醒及黑便，X线钡餐未见异常，下一步检查选择（ ）。

【选项】

- A. 胃液分析
- B. 复查 X 线钡餐
- C. 胃泌素测定
- D. 便潜血
- E. 胃镜检查

【答案】E

【解析】该患者上腹痛 1 年伴反酸、夜间疼醒及黑便，考虑消化性溃疡，胃镜检查与黏膜活检可直接观察溃疡病变部位、大小、性质，并可进行 Hp 检测，对消化性溃疡有确诊价值。

【考点】

【知识点】

51. **【题干】**不需要做造影剂过敏试验的是（ ）。

【选项】

- A. 支气管造影
- B. 食管钡餐造影
- C. 胆道造影
- D. 肾盂造影
- E. 心血管造影

【答案】B

【解析】食管钡餐造影服用的是医用硫酸钡，无需做造影剂过敏试验。

【考点】

【知识点】

52. **【题干】**吉兰巴雷综合征典型的脑脊液改变为（ ）。

【选项】

- A. 血性脑脊液
- B. 蛋白—细胞分离现象

- C. 蛋白含量与细胞数均增高
- D. 浑浊呈毛玻璃状
- E. 淋巴细胞明显增多

【答案】B

【解析】吉兰巴雷综合征 80%—90%的患儿脑脊液蛋白含量增高，2—3 周可达正常时的 2 倍。4 周后逐渐下降。细胞数正常，蛋白细胞分离现象为本病的特征，糖含量正常，细菌培养阴性。

【考点】

【知识点】

53. 【题干】受伤后预防破伤风最可靠的方法是（ ）。

【选项】

- A. 应用抗生素
- B. 彻底清洁伤口
- C. 注射破伤风免疫球蛋白
- D. 注射破伤风类毒素
- E. 注射破伤风抗毒素

【答案】B

【解析】创伤后早期彻底清创，改善局部循环，是预防破伤风发生的重要措施。

【考点】

【知识点】

54. 【题干】II 度内痔表现为（ ）。

【选项】

- A. 分布在齿状线上线下的痔块
- B. 排便时痔块不脱出肛门，便时滴血
- C. 排便时痔块脱出肛门，便后可自行还纳
- D. 排便时痔块脱出肛门，便后需手推还纳
- E. 肛门处剧痛，暗紫色圆形肿块，伴触痛

【答案】 C

【解析】 II度内痔的表现是便血加重，严重时呈喷射状，排便时痔块脱出，但便后能自行回纳。

【考点】

【知识点】

55. **【题干】** 判断急性胰腺炎最有意义的检查是（ ）。

【选项】

- A. B超
- B. 甲胎蛋白
- C. 血淀粉酶
- D. CT
- E. 碱性磷酸酶

【答案】 C

【解析】 血清淀粉酶超过正常值3倍即可诊断急性胰腺炎。

【考点】

【知识点】

56. **【题干】** 早期支气管肺癌的首选治疗方法为（ ）。

【选项】

- A. 放射治疗
- B. 手术
- C. 免疫疗法
- D. 非手术综合疗法
- E. 药物治疗

【答案】 B

【解析】 肺癌的治疗以手术治疗为主，结合放射、化学药物、靶向治疗、中医中药以及免疫治疗等。

【考点】

【知识点】

57. **【题干】**混合痔指的是（ ）。

【选项】

- A. 分布在齿状线上线下的痔块
- B. 排便时痔块不脱出肛门，便时滴血
- C. 排便时痔块脱出肛门，便后可自行还纳
- D. 排便时痔块脱出肛门，便后需手推还纳
- E. 肛门处剧痛，暗紫色圆形肿块，伴触痛

【答案】 A

【解析】混合痔是直肠上下静脉丛互相吻合，齿状线上下静脉丛同时曲张而形成，临床上兼有内、外痔的特征。

【考点】

【知识点】

58. **【题干】**下列关于糖尿病对孕妇的影响的叙述中不正确的是（ ）。

【选项】

- A. 手术产率相对高
- B. 羊水过多发生率高
- C. 流产率相对高
- D. 受孕率相对高
- E. 妊娠期高血压疾病发生率相对高

【答案】 D

【解析】糖尿病对孕妇影响为：受孕率基本不受影响；流产率相对较高；妊娠期高血压疾病发生率相对高。

【考点】

【知识点】

59. **【题干】**肿瘤的定性检查方法是（ ）。

【选项】

- A. 核素检查
- B. 病理检查
- C. CT 扫描
- D. B 型超声
- E. 磁共振

【答案】 B

【解析】 病理检查为肿瘤定性诊断的检查，包括细胞学检查和活体组织检查。

【考点】

【知识点】

60. **【题干】** 急性心肌梗死患者心肌酶变化最早的是（ ）。

【选项】

- A. 肌酸磷酸激酶
- B. 丙氨酸氨基转移酶
- C. 乳酸脱氢酶
- D. 转肽酶
- E. 胆碱酯酶

【答案】 A

【解析】 急性心肌梗死患者可出现肌酸磷酸激酶同工酶、肌酸磷酸激酶、天冬氨酸氨基转移酶、乳酸脱氢酶升高，其中肌酸磷酸激酶是出现最早、恢复最早的酶。

【考点】

【知识点】

61. **【题干】** 对血液病诊断，最有价值的检查方法是（ ）。

【选项】

- A. B 超
- B. 肝功能检查
- C. CT

- D. 骨髓检查
- E. X 线检查

【答案】D

【解析】骨髓检查是血液病诊断最重要的依据。

【考点】

【知识点】

62. 【题干】患者，女，28 岁。因一氧化碳中毒送入院，护士观察病情时，应特别警惕的并发症是（ ）。

【选项】

- A. 脑水肿
- B. 水电解质紊乱
- C. 迟发性脑病
- D. 肺水肿
- E. 昏迷

【答案】C

【解析】重度一氧化碳中毒病人抢救清醒后，经过约 2—60 日的“假愈期”，可出现迟发性脑病的症状。表现为去大脑皮质状态、帕金森病综合征、肢体瘫痪、癫痫、周围神经病变。

【考点】

【知识点】

63. 【题干】有机磷农药中毒的机制是（ ）。

【选项】

- A. 胆碱酯酶活性受抑制
- B. 碳氧血红蛋白在体内蓄积
- C. 高铁血红蛋白在体内蓄积
- D. 交感神经过度兴奋
- E. 迷走神经过度兴奋

【答案】 A

【解析】有机磷农药的毒性作用是与体内胆碱酯酶迅速结合，形成磷酸化胆碱酯酶而失去酶活性，丧失分解乙酰胆碱的能力，导致乙酰胆碱在体内大量蓄积，引起胆碱能神经先兴奋后抑制，从而产生一系列临床中毒症状。

【考点】

【知识点】

64. **【题干】** 12—14 岁小儿血红蛋白正常值的低限是（ ）。

【选项】

- A. 120g/L
- B. 90g/L
- C. 100g/L
- D. 110g/L
- E. 80g/L

【答案】 A

【解析】 12—14 岁的儿童血红蛋白 < 120g/L，可诊断为贫血。

【考点】

【知识点】

65. **【题干】** 26 岁妇女，停经 12 周，阴道不规则流血 10 余天，量不多，暗红色，血中伴有小水泡物。妇科检查：血压 150/90mmHg，子宫前倾，如孕 4 个月大，两侧附件可触到鹅卵大、囊性、活动良好、表面光滑的肿物。本病例最可能的诊断是（ ）。

【选项】

- A. 双胞胎妊娠
- B. 葡萄胎
- C. 先兆流产
- D. 妊娠合并卵巢囊肿
- E. 妊娠合并子宫肌瘤

【答案】 B

【解析】 葡萄胎的病人有停经史，一般停经 8—12 周，并出现不规则阴道流血。由于大量 hCG 的刺激，双侧或一侧卵巢往往呈多发性囊肿改变，称之卵巢黄素化囊肿。该患者停经 12 周伴阴道不规则流血，子宫大，两侧附件可触到鹅卵大、囊性肿物，因此考虑答案选 B。

【考点】

【知识点】

66. **【题干】** 急性脑疝的首要处理措施为 ()。

【选项】

- A. 应用糖皮质激素
- B. 静脉输入高渗脱水剂
- C. 紧急手术
- D. 静脉输入抗生素
- E. 低温冬眠

【答案】 B

【解析】 脑疝发生后应保持呼吸道通畅，并吸氧，立即静脉快速输入甘露醇、地塞米松、呋塞米等，以暂时降低颅内压。

【考点】

【知识点】

67. **【题干】** 原发性肝癌肝外血行转移最多见于 ()。

【选项】

- A. 肾
- B. 脑
- C. 皮肤
- D. 骨
- E. 肺

【答案】 E

【解析】肝外血行转移以肺最常见，也可转移至脑、肾上腺、肾及骨骼等。

【考点】

【知识点】

68. **【题干】**下列哪项是呼吸衰竭患者的典型体征（ ）。

【选项】

- A. 心率增快
- B. 憋喘
- C. 昏迷抽搐
- D. 呼吸困难
- E. 发绀

【答案】E

【解析】发绀是呼吸衰竭患者缺氧的典型表现。

【考点】

【知识点】

69. **【题干】**可区别急性白血病和再生障碍性贫血最主要的检查项目是（ ）。

【选项】

- A. 束臂试验
- B. 血小板计数
- C. 骨髓检查
- D. 出血时间（BT）测定
- E. 网织红细胞数

【答案】C

【解析】骨髓检查是诊断白血病的重要依据，骨髓一般增生明显活跃或极度活跃，主要细胞为白血病原始细胞和幼稚细胞，正常粒系、红系细胞及巨核细胞系统均显著减少。再障患者受损部位骨髓象造血细胞明显减少，增生部位粒红两系减少不显著。

【考点】

【知识点】

70. **【题干】**患者女，27岁，已婚。既往月经规律，因月经过期10天就诊，要求明确是否怀孕，对确诊的帮助最大的检查是（ ）。

【选项】

- A. 超声多普勒
- B. 免疫法测定HCG
- C. 测宫底高度
- D. 测孕激素
- E. 宫颈黏液涂片镜检

【答案】 A

【解析】 超声检查是检查早期妊娠快速准确的方法。该患者月经过期十天就诊，要求明确是否怀孕，首先考虑早期妊娠的可能，因此答案选A。

【考点】

【知识点】