

# 2024年国家中医执业医师资格

## (医学综合笔试部分)

报考类别：中医执业医师

金英杰医学®  
JINYINGJIE.COM

1.(A2型选择题)患者，女，42岁。眩晕昏蒙，头重如裹，胸闷恶心，纳呆多寐，舌苔白腻，脉濡滑。其病机是：

- A.风湿
- B.气虚
- C.血虚
- D.痰浊
- E.肾虚

答案：D

解析：脘闷，纳呆呕恶，多寐为痰湿中阻，气机不畅。晕眩昏蒙为痰浊蒙蔽清窍，清阳不升。苔白腻，脉滑皆痰湿之征。故选D。

2.(B1型选择题)血瘀证可见的症状是：

- A.刺痛拒按，固定不移，舌暗，脉涩
- B.气短疲乏，脘腹坠胀，舌淡，脉弱
- C.胸胁胀闷窜痛，时轻时重，脉弦
- D.面色淡白，口唇爪甲色淡，舌淡，脉细
- E.少气懒言，疲乏无力，自汗，舌淡，脉虚

答案：A

解析：

3.(A1型选择题)治疗胸痹心血瘀阻证的代表方剂是：

- A.生脉饮
- B.瓜蒌薤白白酒汤
- C.血府逐瘀汤
- D.瓜蒌薤白半夏汤
- E.苏合香丸

答案：C

解析：胸痹心血瘀阻治宜活血化瘀，通脉止痛，用血府逐瘀汤，故选C。痰浊内阻用瓜蒌薤白半夏汤通阳泄浊，豁痰开结；阴寒凝滞用瓜蒌薤白白酒汤辛温通阳，开痹散寒；气阴两虚用生脉饮益气养阴，活血通络；苏合香丸用于胸痹急救时。

4.(A2型选择题)患者不易入睡，多梦易醒，心悸健忘，神疲食少，伴头晕目眩，四肢倦怠，舌淡苔薄，脉细无力。治疗应首选：

- A.酸枣仁汤
- B.归脾汤
- C.交泰丸
- D.天王补心丹

E.安神定志丸

答案：B

解析：不寐心脾两虚证，治宜补养心脾，补气生血，用归脾汤。故选B。A滋阴补血，但是补气不足；C用于心肾不交；D用于阴虚内热；E用于心胆气虚。

5.(A2型选择题)患者吐血缠绵不止，时轻时重，血色暗淡，神疲乏力，心悸气短，面色苍白，舌质淡，脉细弱。其治法是：

- A.健脾和胃，宁络止血
- B.和中宁络，凉血止血
- C.益气养阴，宁络止血
- D.健脾益气，摄血止血
- E.健脾升阳，化瘀止血

答案：D

解析：脾气不足，摄血无力，故吐血缠绵不止，时轻时重，血色暗淡，神疲乏力，心悸气短，面色苍白，舌质淡，脉细弱都属脾虚表现。治宜健脾益气，摄血止血。故选D。无气阴两虚症状，故不选C；脾阳虚、瘀血症状都不明显，故不选E。

6.(B1型选择题)治疗咳血肝火犯肺证，应首选：

- A.百合固金丸
- B.泻心汤
- C.泻白散
- D.知柏地黄丸
- E.龙胆泻肝汤

答案：C

解析：

7.(A2型选择题)患者胸胁疼痛，咳唾引痛，咳逆气喘，息促不能平卧，喜向右侧偏卧，右侧肋间胀满，舌苔白，脉沉弦，其治法是：

- A.攻下逐饮
- B.和解宣利
- C.理气和络
- D.泻肺祛饮
- E.发表化饮

答案：D

解析：饮停胸胁，肺气郁滞，故胀痛咳逆，喘不得卧；水停于肺，故右侧偏卧。治宜泻

肺祛饮。A适用于位置较低的下焦水饮。B、C不去饮邪。故选 D。

8.(B1型选择题)治疗虚劳肺阴虚证，应首选：

- A.六味地黄丸
- B.玉女煎
- C.左归丸
- D.沙参麦冬汤
- E.麦门冬汤

答案：D

解析：消渴中消证见多食易饥，胃热炽盛，故用玉女煎清胃泻火，养阴增液；虚劳肺阴虚证见干咳，咽燥，用沙参麦冬汤养阴润肺。

9.(A1型选择题)虚劳以气虚为主时，主要病变的脏是：

- A.肺、脾
- B.心、肾
- C.肺、肾
- D.脾、肾
- E.心、肺

答案：A

解析：虚劳是多脏虚弱。肺主气，气虚肯定有肺。肺金脾土，肺虚日久，子盗母气，脾气也虚。故主要是肺脾。故选 A。

10.(A1型选择题)气厥实证反复发作的原因，常是：

- A.精神刺激
- B.头部外伤
- C.嗜食肥甘
- D.思虑过度
- E.先天禀赋

答案：A

解析：气厥的常见病因是情志内伤，饮食劳倦，亡血失津，痰饮内伏。故选 A。

11.(A2型选择题)患者，男，28岁。3天来尿道口红，尿急、尿频、尿痛，淋沥不止，尿液混浊如脂，尿道口溢脓，舌红苔黄腻，脉滑数。西医诊断为急性淋病，治疗应首选：

- A.知柏地黄丸
- B.龙胆泻肝汤
- C.清营汤

D.萆薢渗湿汤

E.四妙勇安汤

答案：B

解析：湿热毒蕴型(急性淋病)为外感热毒，湿热秽浊之邪，郁于肌肤，故见尿道口红肿；湿热毒邪下注膀胱，膀胱气化不利，故尿急，尿频，尿痛，淋沥不止，或见尿液混浊如脂；湿毒炽盛，则尿道黏膜水肿，附近淋巴结、前庭大腺红肿疼痛；热盛肉腐，则尿道口溢脓，宫颈有脓性分泌物；湿毒蕴伏血络，则宫颈充血、触痛；舌红、苔黄腻、脉滑数为湿热毒蕴之象，治法清热利湿，解毒化浊，方药用龙胆泻肝汤。故选 B。A 选项适合阴虚毒恋型慢性淋病。

12.(A2型选择题)患者，女，23岁。患尖锐湿疣，外生殖器及肛门出现疣状赘生物、色灰，质柔软，表面秽浊潮湿，触之易出血，恶臭，小便色黄，不畅，舌苔黄腻，脉弦数。治拟利湿化浊，清热解毒。应首选：

- A.黄连解毒汤
- B.萆薢化毒汤
- C.龙胆泻肝汤
- D.知柏地黄丸
- E.土茯苓合剂

答案：B

解析：尖锐湿疣主要由于感受秽浊之毒，毒邪聚，酿生湿热，湿热下注皮肤黏膜，故见外生殖器、肛门等处出现疣状赘生物，色灰或褐或淡红，质软，表面秽浊湿润，恶臭；湿毒蕴伏血络，则触之易出血；湿毒下注，扰及膀胱，则小便黄或不畅；苔黄腻、脉滑或弦数为湿毒下注之象，治法利湿化浊，清热解毒，方药用萆薢化毒汤。故选 B。

13.(A2型选择题)患者，男，39岁。尿道中有白色分泌物滴出3年，伴腰膝酸软，头晕眼花，失眠多梦，遗精，舌红少苔，脉细数。治疗应首选：

- A.右归丸
- B.左归丸
- C.大分消饮
- D.龙胆泻肝丸
- E.知柏地黄丸

答案: E

解析: 本病为病久伤阴, 肾阴暗耗, 出现阴虚火旺的证候, 宜滋阴降火, 故选 E。

14.(A2型选择题)患者, 男, 38岁。患急性子痈2天, 恶寒发热, 左侧睾丸肿大疼痛, 疼痛引及子系(精索), 舌红苔黄腻, 脉滑数。证属湿热下注, 气血壅滞, 经络阻隔为患。治宜清热解毒, 利湿消肿, 应首选:

- A.透脓散
- B.滋阴除湿汤
- C.萆薢化毒汤
- D.龙胆泻肝汤
- E.枸橘汤加减

答案: E

解析: 湿热下注肾子, 气血壅阻, 经络不畅, 故见睾丸或附睾肿大疼痛, 阴囊皮肤红肿, 皱纹消失, 燥热疼痛, 少腹抽痛, 局部压痛明显; 热盛肉腐, 则局部形成脓肿, 按之应指; 正邪相争, 营卫不和, 故见恶寒发热; 苔黄腻、脉滑数为湿热之象, 治法清热利湿, 解毒消肿, 方药选枸橘汤。故选 E。

15.(A1型选择题)蛇咬伤后(神经毒)者, 其治法是:

- A.活血祛风
- B.清热解毒, 凉血止血
- C.清利湿热, 凉血熄风
- D.凉血熄风, 豁痰开窍
- E.清热解毒, 活血祛风, 凉血止血

答案: A

解析: 蛇咬伤后, 辨证为风毒(神经毒)者治则为活血祛风。故选 A。

16.(A1型选择题)患者, 男, 24岁。颈项强痛, 活动受限, 头向患侧倾斜, 项背牵拉痛, 颈项部压痛明显, 兼见恶风畏寒。治疗除取主穴外。还应选用的穴位是:

- A.内关、外关
- B.肩井、后溪
- C.风池、合谷
- D.血海、阴陵泉
- E.肾俞、关元

答案: C

解析: 由本病患者的症状可以得出所患疾病为落枕, 兼见恶风畏寒, 所以治疗上应该兼顾落枕和疏风散寒, 故选取疏风散寒的风池穴和合谷穴。故选 C。

17.(A1型选择题)治疗虚火牙痛, 除取主穴外, 还应加:

- A.外关、风池
- B.太溪、行间
- C.太溪、外关
- D.太冲、曲池
- E.太冲、阳溪

答案: B

解析: 虚火牙痛应配合太溪、行间以滋阴降火。故选 B。

18.(A1型选择题)下列有关风府穴针刺操作的叙述, 正确的是

- A.正坐位, 头微后倾, 顶部放松
- B.向下颌方向缓慢刺入0.5~1寸
- C.向鼻尖方向缓慢刺入0.5~1寸
- D.向上缓慢刺入0.5~1寸
- E.向上缓慢刺入1~1.5寸

答案: B

解析:

19.(A1型选择题)以下哪项不是痰饮病的常用治法

- A.温脾化饮
- B.攻下逐饮
- C.温肺化饮
- D.理气化饮
- E.发表化饮

答案: D

解析:

20.(A1型选择题)消渴之下消证, 若出现阴阳气血俱虚证, 治疗应首选

- A.补中益气汤
- B.六味地黄丸
- C.归脾汤
- D.鹿茸丸
- E.金匮肾气丸

答案: E

解析:

21.(A1型选择题)《理虚元鉴·治虚有三本》

中指出下列何为治虚之道毕矣

- A.治心、治脾、治肾
- B.治肺、治脾、治肾
- C.治肺、治肝、治肾
- D.治心、治肝、治肾
- E.治心、治脾、治肝

答案：B

解析：

22.(A1型选择题)下列各项，不属于真心痛标实证的是

- A.寒凝血脉
- B.心气阻滞
- C.痰浊阻络
- D.湿热阻络
- E.瘀血痹阻

答案：D

解析：

23.(A1型选择题)结节疼痛，中医辨证多属

- A.风湿郁阻
- B.血虚风燥
- C.气血凝滞
- D.热毒炽盛
- E.肝肾不足

答案：C

解析：

24.(A2型题)患者，男，70岁。两日来心中悸动不安，头眩，畏寒肢冷，下肢浮肿，渴不欲饮，恶心吐涎，舌质淡胖苔水滑，脉弦。其治法是

- A.健脾化湿，安神定悸
- B.温补心阳，安神定悸
- C.补血养心，益气安神
- D.振奋心阳，化气行水
- E.清热化痰，以安心神

答案：D

解析：无

25.(A1型题)治疗不寐之痰热扰心证，宜选用的方剂是

- A.黄连阿胶汤
- B.礞石滚痰丸
- C.半夏秫米汤
- D.朱砂安神丸
- E.黄连温胆汤

答案：E

解析：不寐之痰热扰心证，治疗要清化痰热，和中安神，代表方是黄连温胆汤加减。

26.(A2型题)患者，女，35岁。症见腹中气聚，攻窜胀痛，时聚时散，脘闷纳呆，舌苔白腻，脉象弦缓。治法宜用

- A.疏肝解郁，行气消聚
- B.导滞通便，理气化痰
- C.温中散寒，行气化湿
- D.理气活血，通络消积
- E.以上都不是

答案：A

解析：腹中气聚，攻窜胀痛，时聚时散，为聚证，脘闷纳呆，舌苔白腻，脉象弦缓，为肝气郁结之象，治宜疏肝解郁，行气消聚。

27.(A1型题)鼓胀患者，腹胀以上腹为重，按之不坚，胁下胀满，食少嗳气，食后胀甚，尿少，舌苔白腻，脉沉弦。其证候是

- A.气滞湿阻
- B.脾肾阳虚
- C.寒湿困脾
- D.湿热蕴积
- E.肝脾血瘀

答案：A

解析：鼓胀患者腹胀以上腹为重，按之不坚，胁下胀满，嗳气，食后胀甚，是气滞湿阻证。

28.(B1型题)大柴胡汤适用于

- A.黄疸之热重于湿证
- B.黄疸之湿重于热证
- C.黄疸之胆腑郁热证
- D.黄疸之疫毒炽盛证
- E.黄疸之寒湿阻遏证

答案：C

解析：无

29.(A1型题)溃疡疮口太小，脓腐难去，常用的腐蚀药是

- A.红灵丹
- B.白降丹
- C.七三丹
- D.八宝丹
- E.九黄丹

答案：B

解析：无

30.(A1型题)下列各项，不属溻渍法适应证的是

- A.阳证疮疡初起
- B.阴证疮疡
- C.美容
- D.保健
- E.创面干燥，僵而不敛

答案：E

解析：无

31.(B1型题)易发生内陷的疾病是

- A.痈
- B.瘰疬
- C.流痰
- D.有头疽
- E.红丝疔

答案：D

解析：无

32.(A1型题)蛇串疮的皮损特点是

- A.瘙痒性风团，发无定处，骤起骤退
- B.皮肤黏膜交界处成群的水疱
- C.皮肤上浅在性脓疱和脓痂
- D.呈带状分布的红斑上成簇的水疱
- E.对称分布，多形损害，剧烈瘙痒

答案：D

解析：蛇串疮是一种皮肤上出现成簇水疱，多呈带状分布，痛如火燎的急性疱疹性皮肤病，相当于西医的带状疱疹。

33.(A2型题)患者，男，38岁。两手出现皮下小水疱，疱壁破裂，叠起白皮，中心已愈，四周续起疱疹。诊断为鹅掌风，外治应首选的药物是

- A.雄黄膏
- B.皮脂膏
- C.疯油膏
- D.青黛膏
- E.复方土槿皮酊

答案：E

解析：无

34.(A1型题)下列哪项不是湿疮的发病特点

- A.皮损对称分布
- B.皮损呈多形损害
- C.病情反复发作
- D.有明显的接触史
- E.自觉瘙痒剧烈

答案：D

解析：湿疮是一种过敏性炎症性皮肤病，相

当于西医的湿疹。其发病特点是对称分布，多形性损害，剧烈瘙痒，反复发作，易成慢性。其病因主要是禀赋不耐，饮食失节，脾胃受损，湿热内生，又兼外受风邪，内外两邪相搏，风湿热邪浸淫肌肤所致，不具有明显的接触史。

35.(A1型题)牛皮癣的皮损特点是

- A.瘙痒性风团，发无定处，骤起骤退，消退后不留任何痕迹
- B.对称分布，多形损害，剧烈瘙痒
- C.皮损呈圆形或多角形的扁平丘疹，常融合成片，极易形成苔藓样变
- D.皮损为暗红、淡紫色或肤色多角形扁平丘疹，有蜡样光泽、网状纹
- E.皮损基底淡红色，上覆银白色鳞屑，剥后有薄膜现象和点状出血

答案：C

解析：本病相当于西医的神经性皮炎，特点为皮损多呈圆形或多角形的扁平丘疹，常融合成片，剧烈瘙痒，搔抓后皮损肥厚，皮沟加深，皮嵴隆起，极易形成苔藓化。

36.(A2型题)患者，男，28岁。外生殖器及肛门出现单个质坚韧丘疹，四周焮肿，腹股沟部有杏核样大、色白坚硬之肿块，伴口苦纳呆，尿短赤，大便秘结，舌苔黄腻，脉弦数。西医诊断为梅毒。其证候是

- A.肝经湿热
- B.痰瘀互结
- C.脾虚湿蕴
- D.气血两虚
- E.气阴两虚

答案：A

解析：无

37.(A1型题)下列各项，不属于子痰溃后症状的是

- A.脓液清稀如痰涎
- B.脓液中夹有败絮状物
- C.疮口凹陷
- D.容易形成瘘管
- E.疮口容易愈合

答案：E

解析：子痰是发生于附睾部的慢性化脓性疾病。溃破后脓液清稀，或带豆腐渣样絮状物，腥味较浓，易形成长期不愈合的阴囊部窦道。

疮口凹陷，形成瘘管，愈合缓慢，或虽愈合，反复发作，全身虚热不退，病久不愈。

38.(A2型题)患者，男，40岁。小便频急，茎中热痛，刺痒不适，尿色黄浊，尿末或大便时有白浊滴出，会阴、腰骶、睾丸有明显的胀痛不适，舌红，苔黄腻，脉弦滑。诊为慢性前列腺炎，其证候是

- A.肾阳不足
- B.肝肾不足
- C.阴虚火动
- D.湿热壅结
- E.气滞血瘀

答案：D

解析：无

39.(A1型题)小面积烧伤初期可用

- A.清凉油
- B.红油膏
- C.金黄膏
- D.冲和膏
- E.黄连膏

答案：A

解析：无

40.(A1型题)治疗筋瘤之寒凝筋脉证用

- A.补中益气汤
- B.活血散瘀汤
- C.活血通脉汤
- D.暖肝煎
- E.复元活血汤

答案：D

解析：无

41.(B1型题)治疗脱疽热毒伤阴证，应首选

- A.阳和汤
- B.桃红四物汤
- C.顾步汤
- D.人参养荣汤
- E.附桂八味丸

答案：C

解析：无

42.(A1型题)手太阴肺经的起止穴是

- A.少商、中府
- B.中府、少商
- C.商阳、中府
- D.中府、商阳
- E.商阳、迎香

答案：B

解析：手太阴肺经起于中府，止于少商。

43.(A1型题)下列各项中，不属于手阳明大肠经腧穴的主治病证的是

- A.热病
- B.神志病
- C.皮肤病
- D.胸胁病
- E.头面五官疾患

答案：D

解析：手阳明大肠经腧穴主治热病、神志病、胃肠病、皮肤病、头面五官疾患。胸胁病为少阳所主。

44.(A1型题)常用于治疗心痛、昏迷、热病的腧穴是

- A.极泉
- B.少海
- C.通里
- D.阴郄
- E.少冲

答案：E

解析：以上诸穴均可以治疗心痛，少冲位于小指末端，是心经的井穴，还可以治疗昏迷、热病等症。

45.(A1型题)位于腕背尺骨头桡侧凹陷中的腧穴是

- A.后溪
- B.支正
- C.外关
- D.养老
- E.支沟

答案：D

解析：后溪位于第5掌指关节后方赤白肉际处。支正位于腕横纹上5寸。外关位于腕背横纹上2寸。支沟位于腕背横纹上3寸，尺桡骨之间。

46.(A1型题)内关穴治疗胃心胸部疾病常配伍的腧穴是

- A.公孙
- B.劳宫
- C.间使
- D.外关
- E.曲泽

答案：A

解析：内关为八脉交会穴之一，通阴维脉，常配伍公孙治疗胃心胸疾患。

**47.(A1型题)**下列有关提插补泻中补法的叙述，错误的是

- A.先深后浅
- B.重插轻提
- C.提插幅度小，频率慢
- D.操作时间短
- E.以下插用力为主

答案：A

解析：针下得气后，先浅后深，重插轻提，提插幅度小，频率慢，操作时间短者为补法。针下得气后，先深后浅，轻插重提，提插幅度大，频率快，操作时间长者为泻法。

**48.(A1型题)**遗尿肾气不足者，除主穴外还应取

- A.肾俞、命门、太溪
- B.行间、阳陵泉
- C.四神聪、列缺
- D.肺俞、气海、足三里
- E.百会、命门、阴陵泉

答案：A

解析：无

**49.(A2型题)**患者胁部皮肤灼热疼痛 2 天后患部皮肤出现簇集粟粒大小丘状疱疹，呈带状排列，疱壁紧张，口苦，心烦，脉弦数。治疗本病除局部阿是穴、夹脊外，还应选取

- A.神门、大陵
- B.合谷、列缺
- C.血海、三阴交
- D.阴陵泉、内庭
- E.行间、侠溪

答案：E

解析：根据症状辨证为肝胆火盛型蛇串疮。肝胆火盛配行间、侠溪；脾胃湿热配阴陵泉、内庭；瘀血阻络配血海、三阴交。便秘配天枢；心烦配神门。

**50.(A1型题)**列有关扭伤的针灸辨证论治的叙述，不正确的是

- A.扭伤多为关节伤筋，属经筋病
- B.以受伤局部腧穴为主
- C.可配合循经远取
- D.可在扭伤部位上下循经邻近取穴
- E.陈旧性损伤不宜用灸法

答案：E

解析：无

**51.(A2型题)**患者初起眼有异物感，视物不清，继而目赤肿痛，羞明，流泪，眵多，口苦咽干，苔黄，脉弦数。治疗除主穴外，还应选取

- A.少商、外关
- B.侠溪、行间
- C.太冲、外关
- D.合谷、太冲
- E.太阳、行间

答案：B

解析：无

**52.(B1型题)**治疗胃火牙痛，宜选用

- A.肾俞、太溪
- B.太溪、行间
- C.内庭、二间
- D.外关、风池
- E.大杼、束骨

答案：C

解析：无

**53.(A1型题)**治疗肾绞痛，主穴除肾俞、中极外，还应选取

- A.膀胱俞、阴陵泉、委阳
- B.三焦俞、三阴交、委阳
- C.三焦俞、三阴交、阳陵泉
- D.膀胱俞、三阴交、阴陵泉
- E.三焦俞、阴陵泉、委中

答案：D

解析：肾绞痛主穴用肾俞、中极、膀胱俞、三阴交、阴陵泉。本病病位在肾与膀胱，肾俞、膀胱俞为二者的背俞穴，可助膀胱气化，清利下焦湿热，达调气止痛的目的；中极为膀胱募穴；三阴交为肝、脾、肾三经之交会，滋补肾阴，利尿通淋；阴陵泉清利湿热，通淋止痛。

**54.(A1型题)**气陷证可见的症状是

- A.少气懒言，疲乏无力，自汗，舌淡，脉虚
- B.气短疲乏，脘腹坠胀，舌淡，脉弱
- C.胸胁胀窜痛，时轻时重，脉弦
- D.面色淡白，口唇爪甲色淡，舌淡，脉细
- E.刺痛拒按，固定不移，舌暗，脉涩

答案：B

解析：无

55.(A1型题)颜面部疖和疔的鉴别要点是

- A.脓的形质
- B.皮肤颜色
- C.根脚深浅
- D.起病速度
- E.发热程度

答案: C

解析: 颜面部疖和疔的鉴别: 疔好发于颜面部, 但红肿范围不超过3cm, 无明显根脚, 一般无全身症状。疔肿势范围约3~6cm, 但根深坚硬, 状如钉丁。

56.(A1型题)臀痈的特点是

- A.位置浅、范围大、来势急、易腐溃、收口慢
- B.位置深、范围小、来势急、易腐溃、收口慢
- C.位置深、范围大、来势急、易腐溃、收口慢
- D.位置深、范围大、来势急、难腐溃、收口慢
- E.位置深、范围大、来势缓、易腐溃、收口慢

答案: D

解析: 无

57.(A2型题)患者, 男, 40岁。有消渴病史。项后发际处多个红色结块, 灼热疼痛, 溃脓后愈合, 但不久又发, 经年难愈。其诊断是

- A.痈
- B.疔疮
- C.暑疖
- D.疖病
- E.有头疽

答案: E

解析: 无

58.(A1型题)上星穴的定位是

- A.在头部, 前发际正中
- B.在头部, 前发际正中直上0.5寸
- C.在头部, 前发际正中直上1寸
- D.在头部, 前发际正中直上1.5寸
- E.在头部, 前发际正中直上2寸

答案: C

解析: 无

59.(A2型选择题)A.龙胆泻肝汤 B.柴胡疏肝散 C.复元活血汤 D.一贯煎 E.茵陈蒿汤患者, 男, 60岁, 久患胁痛, 悠悠不休, 遇劳加重, 头晕目眩, 口干咽燥, 舌红少苔, 脉弦细。

治疗应首选:

- A.柴胡疏肝散
- B.逍遥散
- C.杞菊地黄丸
- D.一贯煎
- E.二阴煎

答案: D

解析: 肝阴不足, 阴血难以濡养肝络, 故见胁痛悠悠不休, 劳则耗气, 故遇劳加重, 精血亏虚故头晕目眩, 口干咽燥, 舌红少苔, 脉弦细。证属肝阴不足, 治宜养阴柔肝, 方用一贯煎。故选D。柴胡舒肝散、逍遥散用于肝气郁结; 杞菊地黄丸用于肝肾阴虚; 二阴煎用于滋阴肺肾。

60.(B1型选择题)A.龙胆泻肝汤 B.柴胡疏肝散 C.复元活血汤 D.一贯煎 E.茵陈蒿汤患者, 男, 60岁, 久患胁痛, 悠悠不休, 遇劳加重, 头晕目眩, 口干咽燥, 舌红少苔, 脉弦细。

治疗应首选:

- A.柴胡疏肝散
- B.逍遥散
- C.杞菊地黄丸
- D.一贯煎
- E.二阴煎

答案: D

解析: 肝阴不足, 阴血难以濡养肝络, 故见胁痛悠悠不休, 劳则耗气, 故遇劳加重, 精血亏虚故头晕目眩, 口干咽燥, 舌红少苔, 脉弦细。证属肝阴不足, 治宜养阴柔肝, 方用一贯煎。故选D。柴胡舒肝散、逍遥散用于肝气郁结; 杞菊地黄丸用于肝肾阴虚; 二阴煎用于滋阴肺肾。

61.(A2型选择题)A.二阴煎 B.滋水清肝饮 C.天王补心丹 D.左归丸 E.黄连阿胶汤患者小便短赤灼热, 尿血鲜红, 心烦口渴, 舌红, 脉数。其证候是:

- A.肾气不固
- B.下焦热盛
- C.脾不统血
- D.肾虚火旺
- E.以上均非

答案：B

解析：尿色鲜红，排除虚证肾气不固、脾不统血。小便短赤灼热，心烦口渴，舌红，脉数，为热象，但无肾阴虚的症状，故排除肾虚火旺。下焦热盛全部符合，故选 B。

62.(B1 型选择题)A.二阴煎 B.滋水清肝饮 C.天王补心丹 D.左归丸 E.黄连阿胶汤患者小便短赤灼热，尿血鲜红，心烦口渴，舌红，脉数。其证候是：

- A.肾气不固
- B.下焦热盛
- C.脾不统血
- D.肾虚火旺
- E.以上均非

答案：B

解析：尿色鲜红，排除虚证肾气不固、脾不统血。小便短赤灼热，心烦口渴，舌红，脉数，为热象，但无肾阴虚的症状，故排除肾虚火旺。下焦热盛全部符合，故选 B。

63.(B1 型选择题)治疗吐血胃热炽盛证，应首选：

- A.百合固金丸
- B.泻心汤
- C.泻白散
- D.知柏地黄丸
- E.龙胆泻肝汤

答案：B

解析：

64.(B1 型选择题)饮流溢于四肢，称为：

- A.痰饮
- B.伏饮
- C.悬饮
- D.溢饮
- E.支饮

答案：D

解析：

65.(B1 型选择题)脱汗的特点是：

- A.白昼时时汗出，动则益甚
- B.寐中汗出，醒来自止
- C.冷汗如珠，气息微弱
- D.咳而汗出，痰黄质稠
- E.汗出色黄，染衣着色

答案：C

解析：自汗是由气虚导致的，可见白昼时时汗出，动则益甚；脱汗是气不固摄所致，可见冷汗如珠，气息微弱。

66.(A1 型选择题)A.二阴煎 B.滋水清肝饮 C.天王补心丹 D.左归丸 E.黄连阿胶汤气厥实证反复发作的原因，常是：

- A.精神刺激
- B.头部外伤
- C.嗜食肥甘
- D.思虑过度
- E.先天禀赋

答案：A

解析：气厥的常见病因是情志内伤，饮食劳倦，亡血失津，痰饮内伏。故选 A。

67.(B1 型选择题)A.二阴煎 B.滋水清肝饮 C.天王补心丹 D.左归丸 E.黄连阿胶汤气厥实证反复发作的原因，常是：

- A.精神刺激
- B.头部外伤
- C.嗜食肥甘
- D.思虑过度
- E.先天禀赋

答案：A

解析：气厥的常见病因是情志内伤，饮食劳倦，亡血失津，痰饮内伏。故选 A。

68.(A1 型选择题)A.二阴煎 B.滋水清肝饮 C.天王补心丹 D.左归丸 E.黄连阿胶汤痰饮的形成与肺脾肾三脏失司有重要关系，其中首当其要的是

- A.肺
- B.脾
- C.肾
- D.肺肾

E.脾肾

答案：B

解析：

69.(B1型选择题)A.二阴煎 B.滋水清肝饮 C.天王补心丹 D.左归丸 E.黄连阿胶汤痰饮的形成与肺脾肾三脏失司有重要关系，其中首当其要的是

A.肺

B.脾

C.肾

D.肺肾

E.脾肾

答案：B

解析：

70.(A1型选择题)A.二阴煎 B.滋水清肝饮 C.天王补心丹 D.左归丸 E.黄连阿胶汤脾胃虚衰，元气不足可导致发热，治当“甘温除热”的说法出于何书

A.《河间六书》

B.《儒门事亲》

C.《格致余论》

D.《景岳全书》

E.《脾胃论》

答案：E

解析：

71.(B1型选择题)A.二阴煎 B.滋水清肝饮 C.天王补心丹 D.左归丸 E.黄连阿胶汤脾胃虚衰，元气不足可导致发热，治当“甘温除热”的说法出于何书

A.《河间六书》

B.《儒门事亲》

C.《格致余论》

D.《景岳全书》

E.《脾胃论》

答案：E

解析：

72.(A1型选择题)A.二阴煎 B.滋水清肝饮 C.天王补心丹 D.左归丸 E.黄连阿胶汤哪一书不仅记载了手足逆冷之厥，而且讨论了昏不知人之厥，并立有专篇

A.《金匱要略》

B.《伤寒论》

C.《诸病源候论》

D.《儒门事亲》

E.《景岳全书》

答案：D

解析：

73.(B1型选择题)A.二阴煎 B.滋水清肝饮 C.天王补心丹 D.左归丸 E.黄连阿胶汤哪一书不仅记载了手足逆冷之厥，而且讨论了昏不知人之厥，并立有专篇

A.《金匱要略》

B.《伤寒论》

C.《诸病源候论》

D.《儒门事亲》

E.《景岳全书》

答案：D

解析：

74.(B1型题)后溪的主治病证是

A.乳痈

B.气喘

C.癫痫

D.目视不明

E.眼睑动

答案：C

解析：颧髎穴位于目外眦直下，颧骨下缘凹陷处。主治口渴、眼睑动、齿痛等病证。后溪通督脉，主治腰背痛、耳目咽喉痛、疟疾盗汗、癫痫等病证。

75.(B1型题)常用于治疗疝气、阴中痛的腧穴是

A.期门

B.大敦

C.隐白

D.章门

E.曲泉

答案：B

解析：无

76.(A1型题)A.期门 B.大敦 C.隐白 D.章门 E.曲泉位于脊柱区，第3胸椎棘突下凹陷中，

后正中线上的腧穴是

- A.命门
- B.身柱
- C.至阳
- D.膈俞
- E.腰阳关

答案：B

解析：第3椎下，后正中线上是身柱。命门在14椎下，至阳在7椎下，膈俞在7椎下旁开1.5寸，腰阳关在16椎下。

77.(B1型题)A.期门 B.大敦 C.隐白 D.章门 E.曲泉位于脊柱区，第3胸椎棘突下凹陷中，后正中线上的腧穴是

- A.命门
- B.身柱
- C.至阳
- D.膈俞
- E.腰阳关

答案：B

解析：第3椎下，后正中线上是身柱。命门在14椎下，至阳在7椎下，膈俞在7椎下旁开1.5寸，腰阳关在16椎下。

78.(A1型题)A.太溪 B.行间 C.足三里、脾俞 D.肾俞、太溪 E.命门、关元治疗湿热型崩漏，宜配用

- A.中极、血海
- B.膈俞、血海
- C.中极、阴陵泉
- D.阴陵泉、太冲
- E.膻中、太冲

答案：C

解析：无

79.(B1型题)A.太溪 B.行间 C.足三里、脾俞 D.肾俞、太溪 E.命门、关元治疗湿热型崩漏，宜配用

- A.中极、血海
- B.膈俞、血海
- C.中极、阴陵泉
- D.阴陵泉、太冲
- E.膻中、太冲

答案：C

解析：无

80.(B1型题)经早虚热证，宜加用

- A.太溪
- B.行间
- C.足三里、脾俞
- D.肾俞、太溪
- E.命门、关元

答案：A

解析：无

81.(B型题)84 用于平喘、宣蜜炙用的药物是

- A.紫苏
- B.荆芥
- C.香薷
- D.麻黄
- E.生姜

答案：D

解析：荆芥发表、透疹、消疮宜生用；止血宜炒用。麻黄发汗解表宜生用，止咳平喘多炙用。故83题选B，84题选D。

82.(B型题)88 可用于治疗温病初起及热毒泻痢的药物是

- A.金银花
- B.板蓝根
- C.白头翁
- D.蒲公英
- E.鱼腥草

答案：C

解析：鱼腥草清热解毒，排脓消痈，利尿通淋。主肺痈吐脓，痰热喘咳，喉蛾，热痢，痈肿疮毒，热淋。白头翁适用于温病初起及热毒泻痢。故87题选E，88题选C。

83.(B型题)93 治疗寒饮呕吐，宜选用

- A.白芥子
- B.杏仁
- C.半夏
- D.桔梗
- E.竹茹

答案：C

解析：A温肺化痰，利气，散结消肿。B止咳平喘，润肠通便。C燥湿化痰，降逆止呕，

消痞散结；外用消肿止痛。其主治证候有：①湿痰，寒痰证；②呕吐；③心下痞，结胸，梅核气；④癰瘤，痰核，痈疽肿毒及毒蛇咬伤。D 宣肺，祛痰，利咽，排脓。E 清热化痰，除烦止呕。故 93 题选 C，94 题选 C。

84.(B 型题)98 具有益肾固精，养心安神功效的药物是

- A.山茱萸
- B.桑螵蛸
- C.莲子
- D.诃子
- E.金樱子

答案：C

解析：A 补益肝肾，收敛固涩。B 固精缩尿，补肾助阳。C 固精止带，补脾止泻，益肾养心。D 涩肠止泻，敛肺止咳，利咽开音。E 固精缩尿止带，涩肠止泻。故 97 题选 C，98 题选 C。

85.(A1 型题)7 下列各项，可治疗恶寒发热，无汗，喘咳，痰多而稀，舌苔白滑，脉浮的是

- A.止嗽散
- B.苏子降气汤
- C.麻黄汤
- D.小青龙汤
- E.败毒散

答案：D

解析：上述症状属于外感风寒，寒饮内停之证。风寒束表，皮毛闭塞，卫阳被遏，营阴郁滞，故见恶寒发热，无汗。素有水饮之人，一旦感受外邪，每致表寒引动内饮，《难经·四十九难》：“形寒饮冷则伤肺”。水寒相搏，内外相引，饮动不居，水寒射肺，肺失宣降，故咳喘痰多而稀；舌苔白滑，脉浮为外寒里饮之佐证。治疗应该解表散寒，温肺化饮。A 主治外感咳嗽，经服用解表宣肺药后而咳仍不止者。B 主治上实下虚之咳喘。C 主治外感风寒表实证。E 主治气虚外感。故本题选 D。

86.(A1 型题)9 桑菊饮的功效是

- A.辛凉宣泄、清肺平喘

- B.疏风清热，宣肺止咳
- C.辛凉透表，清热解毒
- D.疏风解毒，清肺泻热
- E.疏散风热、清肝明目

答案：B

解析：桑菊饮的功效为疏风清热，宣肺止咳。A 是麻杏甘石汤的功效。C 是银翘散的功效。故本题选 B。

87.(A1 型题)16 半夏泻心汤的功效是

- A.和胃消痞、散结除水
- B.益气和胃，消痞止呕
- C.和胃降逆，开结消痞
- D.平调寒热，和胃降逆
- E.泻火解毒，燥湿除痞

答案：C

解析：半夏泻心汤的功效和胃降逆，开结消痞。本方即小柴胡汤去柴胡、生姜，加黄连、干姜而成。因无半表证，故去解表之柴胡、生姜，痞因寒热错杂而成，故加寒热平调之黄连、干姜，变和解少阳之剂，而为调和肠胃之方。后世师其法，随症加减，广泛应用于中焦寒热错杂、升降失调诸症。故本题选 C。

88.(A1 型题)17 小青龙汤和竹叶石膏汤的组成中均含有的药物是

- A.芍药
- B.五味子
- C.半夏
- D.生石膏
- E.竹叶

答案：C

解析：小青龙汤：麻黄、芍药、细辛、干姜、炙甘草、桂枝、五味子、半夏。竹叶石膏汤：竹叶、石膏、半夏、麦门冬、人参、甘草、粳米。故本题选 C。

89.(A1 型题)23 阳明气分热盛，壮热面赤，汗出恶热，烦渴引饮，脉洪数有力者，治疗应选用

- A.黄连解毒汤
- B.白虎汤
- C.竹叶石膏汤

D.葛根黄芩黄连汤

E.麻杏甘石汤

答案: B

解析: 伤寒化热内传阳明之经, 或温邪由卫及气, 皆能出现本证。里热炽盛, 故壮热面赤; 胃热津伤, 乃见烦渴引饮; 里热蒸腾, 逼津外泄, 则汗出; 脉洪大有力为热盛于经所致。气分热盛, 但未致阳明腑实, 故不宜攻下; 热盛津伤, 又不能苦寒直折。唯以清热生津法最宜。属于气分热盛证。治疗选择清热生津的白虎汤。故本题选 B。

90.(A1型题)26 阳和汤的功效是

A.温经散寒, 益气活血

B.温经止痛, 养血益气

C.散结止痛, 补气升阳

D.散寒通滞, 温阳补血

E.通络止痛, 益气健脾

答案: D

解析: 阳和汤温阳补血, 散寒通滞。故本题选 D。

91.(A1型题)31 越鞠丸的组成药物中含有

A.苍术、黄柏

B.苍术、厚朴

C.苍术、白术

D.苍术、羌活

E.苍术、川芎

答案: E

解析: 越鞠丸的药物组成有香附、川芎、苍术、栀子、神曲。故本题选 E。

92.(A1型题)35 四神丸的组成药物中含有

A.芡实

B.诃子

C.山茱萸

D.罂粟壳

E.五味子

答案: E

解析: 四神丸的组成有肉豆蔻、补骨脂、五味子、吴茱萸。故本题选 E。

93.(A1型题)40 温经汤的组成药物中含有

A.丹皮、熟地黄

B.川芎、丹参

C.当归、芍药

D.吴茱萸、干姜

E.半夏、陈皮

答案: C

解析: 温经汤的组成有吴茱萸、当归、芍药、川芎、人参、桂枝、阿胶、牡丹皮、生姜、甘草、半夏、麦冬。故本题选 C。

94.(A1型题)44 小蓟饮子与八正散相同的效果是

A.利水通淋

B.燥湿解毒

C.凉血止血

D.泻火养阴

E.利湿化浊

答案: A

解析: 小蓟饮子凉血止血, 利水通淋。八正散清热泻火, 利水通淋。故本题选 A。

95.(A1型题)49 下列除哪项外, 均是地黄饮子所治暗痱证的临床表现

A.舌强不能言

B.足废不能用

C.高热不能退

D.口干不欲饮

E.脉沉细而弱

答案: C

解析: 地黄饮子主治下元虚衰、痰浊上泛之暗痱证。临床表现为舌强不能言, 足废不能用, 口干不欲饮, 足冷面赤, 脉沉细弱。故本题选 C。

96.(A1型题)53 下列除哪项外, 均宜慎用祛湿剂

A.素体阴虚

B.素体津亏

C.病后体弱

D.妊娠水肿

E.水湿壅盛

答案: E

解析: 祛湿剂多由芳香温燥或甘淡渗利之药组成, 易于耗伤阴津, 故素体阴虚津亏、病后体弱, 以及孕妇均慎用。故本题选 E。

97.(A2型题)64 患者肺阴不足，咳逆上气，咯痰不爽，口干咽燥，手足心热，舌红少苔，脉虚数。治疗首选

- A.麦门冬汤
- B.清燥救肺汤
- C.百合固金汤
- D.杏苏散
- E.增液汤

答案：A

解析：麦门冬汤所治虚热肺痿乃肺胃阴虚，气火上逆所致。病虽在肺，其源在胃，盖土为金母，胃主津液，胃津不足，则肺之阴津亦亏，终成肺胃阴虚之证。肺虚而肃降失职，则咳逆上气；咽喉为肺胃之门户，肺胃阴伤，津不上承，则口干咽燥；虚热内盛，故手足心热。舌红少苔、脉虚数为阴虚内热之佐证。治宜清养肺胃，降逆下气。故本题选 A。

98.(B型题)70 大柴胡汤的功效是

- A.和解少阳，内泻热结
- B.和胃降逆，开结除痞
- C.寒热平调，消痞散结
- D.清胆利湿，和胃化痰
- E.理气化痰，清胆和胃

答案：A

解析：蒿芩清胆汤治少阳胆热偏重，兼有湿热痰浊中阻之证。全方具有清胆热、化痰湿、畅气机、和胃气的功效。故 69 选 D。大柴胡汤是小柴胡汤与小承气汤两方加减合成，具有和解和泻下双重功效。故 70 题选 A。

99.(B型题)77 四神丸的组成药物中含有

- A.芡实
- B.诃子
- C.山茱萸
- D.罂粟壳
- E.五味子

答案：E

解析：四神丸的组成有：肉豆蔻、补骨脂、五味子、吴茱萸。咳血方的组成有：青黛、瓜蒌仁、海粉、山梔子、诃子。故 77 题选 E，故 78 题选 B。

100.(A1型题)5 下列穴组可治疗心、胸、胃疾病的配穴是

- A.公孙、内关
- B.后溪、申脉
- C.足临泣、外关
- D.列缺、照海
- E.膻中、中脘

答案：A

解析：通于冲脉的公孙和通于阴维脉的内关，通合于心、胸、胃，对于气机不利，气逆上冲的心、胃、胸膈的疾患，具有理气降逆，通肠和胃，宣通上下的功效，呕吐、呃逆、胃痛、反胃、噤口痢、干霍乱等，凡适用于上法者，均可取此二穴施治；通于督脉的后溪和通于阳跷脉的申脉，通合于目内眦、颈、项、耳、肩、小肠、膀胱，两穴相配，主治头项、耳、目、肩、腰背疾患；通于阳维脉的外关穴和通于带脉的足临泣，通合于目锐眦、耳后、颈项、肩，二穴配伍，主治耳、目、颈项及肩部病；通于任脉的列缺和通于阴跷脉的照海，通合于肺系、咽喉和胸膈，二穴配伍，主治咳嗽、胸满、咽喉不利等病证；膻中利气，宽胸，催乳，主治哮喘、胸痹、产后乳汁不足等；中脘主治胃部疾患。故本题选 A。

101.(A1型题)10 下列哪项属于表里经配穴

- A.咳嗽取尺泽、鱼际
- B.感冒取列缺、合谷
- C.膝痛取阳陵泉、阴陵泉
- D.胃痛取中脘、内庭
- E.痛经取地机、隐白

答案：B

解析：列缺为手太阴肺经穴，合谷为手阳明大肠经穴。肺与大肠相表里。故本题选 B。

102.(A2型题)16 某男，63岁。头晕目眩，甚则昏眩欲仆，伴耳鸣，腰膝酸软，遗精，舌淡，脉沉细。除风池、百会外，应加用

- A.内关、太冲、行间、侠溪、太溪
- B.内关、太冲、头维、丰隆、中脘
- C.肝俞、肾俞、足三里、脾俞、胃俞
- D.肝俞、肾俞、足三里、太溪、三阴交
- E.头维、血海、膈俞、内关、太溪

答案: D

解析: 患者主诉头晕目眩, 甚则昏眩欲仆, 故可诊断为眩晕。耳鸣, 腰膝酸软, 遗精, 舌淡, 脉沉细为肾精亏损之象。故治法以益气养血定眩。取穴时除风池、百会、肝俞、肾俞、足三里外, 应配以太溪、悬钟、三阴交。故本题选 D。

103.(A2 型题)17 患者, 女, 26 岁。经前腹痛剧烈, 拒按, 经色紫黑, 有血块, 血块下后疼痛缓解。治疗应首选

- A.三阴交、足三里、气海
- B.三阴交、脾俞、胃俞
- C.三阴交、中极、次髎
- D.三阴交、肝俞、肾俞
- E.三阴交、太溪、悬钟

答案: C

解析: 本病诊断为痛经, A、B、D、E 穴位配伍与痛经无关。三阴交养血活血调经, 中极为任脉经穴, 可通调冲任, 次髎为治疗痛经的要穴。故本题选 C。

104.(B 型题)20 特定穴中, 多用于急救的是

- A.原穴
- B.郄穴
- C.络穴
- D.井穴
- E.募穴

答案: D

解析: 特定穴中, 原穴可调整脏腑经络的功能, 既可补虚, 又可泻实; 阴经郄穴有止血作用, 阳经郄穴偏于止痛; 络穴一络通二经, 即络穴不仅治本经病, 也能治其相表里经的病证; 井穴具有交通阴阳气血的作用, 多用于急救, 有开窍醒神, 消炎镇痛之效; 募穴可治本脏腑病及阳经经络病症。故 20 题选 D, 21 题选 C。

105.(A1 型题)9 肺炎热陷心包证, 其主要临床表现除发热夜甚外, 还有

- A.神昏谵语
- B.口燥咽干
- C.五心烦热
- D.大便秘结

E.脉洪而数

答案: A

解析: 肺炎热陷心包证主要表现为发热夜甚, 身灼热, 神昏谵语或昏聩不语, 口燥咽干, 大便秘结, 小便短赤, 舌绛, 无苔或少苔干黄, 脉洪而数。C 多是阴虚火旺证。故本题选 A。

106.(A1 型题)17 慢性心功能不全的基本病因是

- A.严重心律失常
- B.感染
- C.心肌收缩、舒张功能受损
- D.钠盐摄入过多
- E.过度体力劳动

答案: C

解析: 此题暂无解析

107.(A1 型题)26 眩晕肝阳上亢证的治法是

- A.滋阴平肝
- B.补肾填精
- C.平肝潜阳
- D.化痰祛湿
- E.滋阴补阳

答案: C

解析: 眩晕肝阳上亢证应治以平肝潜阳。A 多用于肝肾阴虚、肝阳上亢证。B 多用于肾精不足证。D 多用于痰湿阻滞证。E 多用于阴阳两虚证。故本题选 C。

108.(A1 型题)34 局限前壁心肌梗死特征性心电图改变, 见于

- A.V<sub>3</sub>、V<sub>4</sub>、V<sub>5</sub>
- B.V<sub>1</sub>、V<sub>2</sub>、V<sub>3</sub>、V<sub>4</sub>、V<sub>5</sub>
- C.V<sub>1</sub>、V<sub>2</sub>、V<sub>3</sub>
- D.V<sub>5</sub>、V<sub>6</sub>、V<sub>7</sub>、aVL
- E.II、III、aVF

答案: A

解析: 局限前壁心肌梗死的心电图改变见于 V<sub>3</sub>、V<sub>4</sub>、V<sub>5</sub>。B 提示广泛前壁心肌梗死。C 提示前间隔心肌梗死。D 提示前侧壁心肌梗死。E 提示下壁心肌梗死。故本题选 A。

109.(A1型题)43 治疗消化性溃疡肝胃不和型，应首选

- A.理中丸合黄芪建中汤
- B.一贯煎
- C.化肝煎合左金丸
- D.失笑散合丹参饮
- E.柴胡疏肝散

答案：E

解析：消化性溃疡肝胃不和证应治以疏肝理气、和胃止痛，方用柴胡疏肝散。余选项参见 42 题。故本题选 E。

110.(A1型题)53 肝硬化气滞湿阻证的治法是

- A.温补脾肾，通阳利水
- B.滋阴肝肾，育阴利水
- C.活血化瘀，利水消肿
- D.运脾利湿，行气化水
- E.疏肝理气，行湿散满

答案：E

解析：肝硬化气滞湿阻证常治以疏肝理气、行湿散满。余项参见 52 题。故本题选 E。

111.(A1型题)63 中医学认为，肾病综合征的主要病因病机

- A.脾肾两虚
- B.肝肾阴虚
- C.肺肾气虚
- D.心脾两虚
- E.气阴两虚

答案：A

解析：肾病综合征属于中医学“水肿”范畴，本病发生，多因素体脾肾亏虚，复感风、寒、湿邪所致，而其反复发作，往往与酒色、饮食、劳累及外感客邪等诱因有关。水肿的病机，主要与肺、脾、肾三脏及三焦对水液代谢功能的失调有关。故本题选 A。

112.(A1型题)70 下列不属尿路感染的途径是

- A.上行感染
- B.血行感染
- C.间接感染
- D.直接感染
- E.淋巴道感染

答案：C

解析：参见 68 题。故本题选 C。

113.(A1型题)80 下列哪项不是急性白血病痰热瘀阻证的表现

- A.心烦口苦
- B.头身困重
- C.腹部癥积
- D.痰多胸闷
- E.口渴喜饮

答案：C

解析：急性白血病痰热瘀阻证表现为高热或午后低热，心烦口苦，胁下癥积，胸闷不适，周身疼痛或头痛困重，皮肤瘀斑或内脏出血，大便干结，舌质紫暗，苔黄腻，脉弦或滑。故本题选 C。

114.(A1型题)90 糖尿病最主要的诊断依据是

- A.尿糖
- B.空腹血糖
- C.糖耐量
- D.糖化血红蛋白
- E.血浆胰岛素

答案：B

解析：参见 89 题。故本题选 B。

115.(A2型题)117 患者，男，51 岁。有大量吸烟史 23 年，咳嗽痰中带血 2 月。近 1 月四肢关节疼痛及杵状指。X 线显示右肺上叶肺不张。应首先考虑的诊断是

- A.支气管扩张
- B.肺结核
- C.肺癌
- D.甲状腺功能亢进症
- E.慢性支气管炎阻塞性肺气肿

答案：C

解析：患者有多年吸烟史，病出现咳嗽且痰中带血，这是中央型肺癌常见的症状；并见四肢关节疼痛及杵状指，可为肺癌转移至骨骼；X 线显示右肺上叶肺不张，这是由于癌对支气管阻塞引起的间接征象。而 A、B 的 X 线均有别于肺癌；D、E 不会出现四肢关节疼痛症状。故本题选 C。

116.(A2型题)133 患者，男，70 岁。胸闷胸

痛反复发作，心悸少寐，气短乏力，五心烦热，汗多口干，眩晕耳鸣，两颧潮红，舌红少苔，脉细数无力。心电图示 II、III、aVF 导联 ST 段下移，T 波倒置。心肌酶谱正常。其诊断是

- A. 高血压性心脏病，气阴两虚证
- B. 冠状动脉粥样硬化性心脏病心绞痛，气阴两虚证
- C. 冠状动脉粥样硬化性心脏病心绞痛，寒痰痹阻证
- D. 冠状动脉粥样硬化性心脏病心绞痛，痰瘀痹阻证
- E. 急性心肌梗死，气阴两虚证

答案：B

解析：患者心电图提示有心肌缺血，且心肌酶谱正常，考虑心绞痛。气虚使心气鼓动无力，而导致胸痹。阴虚，致脏腑失于滋养，虚火内生，见心悸少寐、盗汗、眩晕耳鸣、五心烦热、两颧潮红、口干。气虚症见气短乏力、多汗。舌脉均为气阴两虚之证。辨证为气阴两虚证。故本题选 B。

117.(A2 型题)146 患者，男，65岁。晚期胃癌，形体消瘦，面色白，自汗气短，神疲乏力，头晕心悸，舌淡少苔，脉细弱。治疗应首选

- A. 柴胡疏肝散
- B. 海藻玉壶汤
- C. 脾下逐瘀汤
- D. 八珍汤
- E. 附子理中汤

答案：D

解析：患者气虚无以固摄敛汗，而见自汗气短；血虚无以濡养四肢、脏腑，见形体消瘦、面色白、神疲乏力、头晕心悸。舌脉均为气血两虚证的表现，辨证为气血两虚，治以补益气血，方用八珍汤。A 治疗肝气郁滞证。B 治疗瘿瘤初期。C 治疗膈下血瘀证。E 治疗下焦虚寒证。故本题选 D。

118.(A2 型题)159 患者，女，24岁。再生障碍性贫血。症见：面色及唇甲苍白，食欲下降，精神萎靡，腰膝酸软，形寒肢冷，月经色淡，舌胖有齿痕苔白，脉沉细。其证型是

- A. 气血两虚
- B. 肾虚血瘀
- C. 脾气虚弱
- D. 脾肾阳虚
- E. 脾胃虚寒

答案：D

解析：脾肾阳虚，运化吸收水谷精微功能减弱，无以濡养四肢，故见面色及唇甲苍白、精神萎靡。阳虚肢体温煦不足，故见形寒肢冷。肾阳虚无以腰部滋养而见腰膝酸软。舌脉均为阳虚之证。故本题选 D。

119.(A2 型题)180 患者，男，32岁。突然出现剧烈头痛来急诊。查体：神清，颈强直，四肢肌力 5 级，肌张力正常，布鲁辛斯基征(+)，最可能的诊断是

- A. 腰椎间盘突出症
- B. 高血压脑病
- C. 脑出血
- D. 蛛网膜下腔出血
- E. 脑栓塞

答案：D

解析：患者年纪轻，以头痛为主要表现，无神志改变，肌力及肌张力正常，脑膜刺激征阳性，诊断为蛛网膜下腔出血。A 多以腰痛并伴有下肢放射痛为主要表现。B 应有血压高的表现。C 多有肢体的偏瘫，神志的改变。E 头痛不明显，多以偏瘫等肢体语言障碍为主要表现。故本题选 D。

120.(B 型题)191 治疗充血性心力衰竭时，不宜使用

- A. 氢氯噻嗪（双氢克尿噻）
- B. 吲塞米（速尿）
- C. 硫甲丙脯酸（开搏通）
- D. 甘露醇
- E. 氨苯喋啶

答案：D

解析：急性肺水肿发作时，应进行快速利尿，因此选用速尿。充血性心力衰竭时禁用甘露醇，会加重肺淤血或肺水肿。A 用于水肿和高血压病人。C 用于高血压及心力衰竭病人。E 用于治疗心力衰竭、肝硬化和慢性肾炎等引起的顽固性水肿或腹水。故 190 题选 B。

191 题选 D。

121.(B型题)201 治疗风心病心肾阳虚证，应首选

- A.保元汤
- B.天王补心丹
- C.真武汤
- D.苓桂术甘汤合葶苈大枣泻肺汤
- E.五味子汤合桃仁红花煎

答案：C

解析：风心病水气凌心射肺证，应治以温阳化气，泻肺利水，方用苓桂术甘汤合葶苈大枣泻肺汤加减。心肾阳虚证，治以温补心肾，方用真武汤。A 多用于气虚证。B 多用于心肾阴虚证。E 多用于肺气不足证。故 200 题选 C，201 题选 D。

122.(B型题)211 慢性肾小球肾炎肾病型的特点是

- A.中度蛋白尿
- B.贫血及高脂血症
- C.中度以上舒张压升高
- D.全身高度水肿，血脂增高
- E.肾衰竭

答案：D

解析：慢性肾小球肾炎分为五型。其中普通型较为常见，病程迁延，病情相对稳定，多表现为轻度至中度的水肿、高血压和肾功能损害，尿蛋白 (+~+++), 离心尿红细胞 > 10 个/高倍视野和管型尿等。而肾病型除具有普通型的表现外，主要表现为肾病综合征，24h 尿蛋白定量 > 3.5g，血清白蛋白低于 30g/L，水肿一般较重和伴有或不伴高脂血症。B 是肾病综合征的特点。C 是高血压型的特点。E 是急性发作型的特点。故 210 题选 A，211 题选 D。

123.(B型题)222 抗血小板抗体增加，见于

- A.特发性血小板减少性紫癜
- B.再生障碍性贫血
- C.缺铁性贫血
- D.溶血性贫血
- E.慢性粒细胞白血病

答案：A

解析：抗血小板抗体增加常见于原发性血小板减少性紫癜、系统性红斑狼疮、类风湿性关节炎、败血症、高γ球蛋白血症、肝病、母婴血小板不合等。造血原料缺乏常见于缺铁性贫血。故 222 题选 A，223 题选 C。

124.(B型题)232 脑 CT 示基底节区低密度影，周围有水肿带，视神经乳头水肿者，治疗应首选

- A.甘露醇
- B.低分子右旋糖酐
- C.川芎嗪
- D.阿司匹林
- E.肝素

答案：A

解析：脑 CT 显示基底节区低密度影及周围有水肿带，视神经乳头水肿提示脑梗死，并有颅内压增高的表现。故治以降低颅内压，选用甘露醇。而脑血栓形成急性期的血液稀释法，选用低分子右旋糖酐，可以扩充血容量，降低血液黏滞性，改善微循环。C 有抗血小板聚集作用，可用于脑血栓形成，但不属于血液稀释疗法。D 对血小板聚集有抑制作用，阻止血栓形成，临床常用于预防暂时性脑缺血发作。E 有较强抗凝血作用，对无出血倾向者，可采用此法。故 232 题选 A，233 题选 B。

125.(A1型题)8 补托法的代表方剂是

- A.透脓散
- B.托里消毒散
- C.异功散
- D.四君子散
- E.右归丸

答案：B

解析：补托法分益气托毒法和温阳托毒法，益气托毒法的代表方剂是托里消毒散。透脓散是内托法的代表方剂。异功散是调胃法的代表方剂。四君子散是补益法益气方的代表方剂。右归丸是补益法助阳方的代表方剂。故本题选 B。

126.(A1型题)19 外生殖器部位的皮肤消毒，应采取

- A.2.5%碘酊擦涂
- B.0.75%碘酊擦涂
- C.0.1%洗必泰酊擦涂 2 次
- D.0.2%洗必泰酊擦涂 1 次
- E.70%酒精擦涂

答案：C

解析：对婴儿、面部皮肤、口腔、肛门、外生殖器等不能用碘酊消毒处，应选用刺激性小的消毒剂，如 0.75% 吡咯烷酮碘、2% 红汞、0.1% 洗必泰或 0.1% 新洁尔灭溶液涂擦 2 次。70% 酒精多用于植皮时供皮区的消毒。故本题选 C。

**127.(A1型题)28** 下列哪项不是输血的适应证

- A.严重感染
- B.大面积烧伤
- C.心力衰竭
- D.凝血功能异常
- E.低蛋白血症

答案：C

解析：输血的适应证包括急性出血、贫血或低蛋白血症、凝血机制异常和出血性疾病、重症感染、器官移植。故本题选 C。

**128.(A1型题)37** 有头疽的致病菌主要是

- A.大肠杆菌
- B.类杆菌
- C.变形杆菌
- D.金黄色葡萄球菌
- E.溶血性链球菌

答案：D

解析：一般化脓性感染多为金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌。而有头疽的致病菌主要是金黄色葡萄球菌。皮下蜂窝组织炎多为溶血性链球菌致病。故本题选 D。

**129.(A1型题)49** 治疗肠梗阻痞结证，应首选

- A.调胃承气汤
- B.大承气汤
- C.小承气汤
- D.增液承气汤
- E.大黄牡丹皮汤

答案：B

解析：肠梗阻痞结证治宜清热通里攻下，当

选大承气汤。故本题选 B。

**130.(A1型题)57** 膀胱结石的主要症状是

- A.尿频、尿急
- B.脓尿
- C.尿痛
- D.排尿中断
- E.血尿

答案：D

解析：膀胱结石典型症状为排尿突然中断，并感疼痛。尿频、尿急、尿痛为膀胱刺激征，与血尿、脓尿均见于尿路感染。故本题选 D。

**131.(A2型题)77** 患者，男，41岁。头面丹毒，红肿，恶寒发热，口渴，便秘溲黄，舌红苔黄，脉洪数。其证型是

- A.风热化火
- B.气血两燔
- C.湿热化火
- D.热毒蕴结
- E.热毒入营

答案：A

解析：丹毒风热化火证发于头面部，发热恶寒，口干舌燥，舌红，苔薄黄，脉洪数。故本题选 A。

**132.(A2型题)85** 患者，女，32岁。右侧甲状腺内出现单发的圆形肿块，光滑，随吞咽上下活动。甲状腺扫描呈冷结节。应首先考虑的是

- A.甲状腺癌
- B.甲状腺囊肿
- C.单纯性甲状腺肿
- D.甲状腺腺瘤
- E.结节性甲状腺肿

答案：D

解析：甲状腺腺瘤为颈部出现的圆形结节，表面光滑，多为单发，随吞咽上下移动。甲状腺癌多为单发，表面不光滑，不能随吞咽上下移动。单纯性和结节性甲状腺肿表面光滑，随吞咽上下移动，伴有甲状腺肿大。故本题选 D。

**133.(A2型题)98** 患者，男，58岁。突然出现

左腰部疼痛，剧烈难忍受，且向下腹部放射，伴有血尿。查体：左肾区叩击痛阳性。应首先考虑的中医诊断是

- A.石淋
- B.精浊
- C.肠结
- D.子痈
- E.癃闭

答案：A

解析：据患者症状可诊断为泌尿系结石，属于中医淋证中石淋。其余选项均不会出现腰痛症状。故本题选 A。

134.(A1型题)9 孕激素的生理功能是

- A.使阴道上皮细胞增生、角化
- B.使增生期子宫内膜转变为分泌期内膜
- C.促进卵泡发育，使成熟卵泡排卵
- D.促进黄体发育生成
- E.刺激生乳素的分泌

答案：B

解析：①子宫：使子宫内膜由增生期转变为分泌期；降低子宫平滑肌对缩宫素的敏感性，抑制子宫平滑肌收缩，以利于孕卵植入；子宫颈黏液变黏稠，阻止细菌与精子进入宫腔，分泌物涂片呈椭圆体。②输卵管：抑制输卵管的蠕动。③阴道：可使阴道上皮细胞脱落，角化现象消失。涂片可见细胞褶卷，呈舟状。④乳房：使乳腺腺泡增生发育。⑤垂体：通过对下丘脑的负反馈作用，影响垂体促性腺激素的分泌。⑥体温：具有兴奋下丘脑体温调节中枢，升高体温的作用，排卵后，可使基础体温升高  $0.3^{\circ}\text{C} \sim 0.5^{\circ}\text{C}$ 。临幊上测基础体温可用来判断卵巢有无排卵。⑦促进水、钠排出。故本题选 B。

135.(A1型题)17 肾的生理功能是

- A.主生殖
- B.主月经
- C.主血海
- D.主疏血
- E.主统血

答案：A

解析：肾的生理功能是藏精，主生殖。故本题选 A。

136.(A1型题)26 下列各项，属妊娠剧吐肝胃不和证主要症状的是

- A.呕吐血性分泌物
- B.呕吐清水
- C.呕吐痰涎
- D.呕吐食物残渣
- E.呕吐酸水或苦水

答案：E

解析：妊娠剧吐肝胃不和证主要呕吐酸水或苦水。A 为气阴两虚证的表现。B 为脾胃虚弱证的表现。C 为痰湿阻滞证。D 不见于妊娠呕吐。故本题选 E。

137.(A1型题)35 白术散适用于妊娠高血压综合征的哪种证型

- A.脾虚湿盛
- B.肾虚水泛
- C.气滞湿阻
- D.脾虚肝旺
- E.阴虚肝旺

答案：A

解析：参见 32 题。故本题选 A。

138.(A1型题)47 治疗慢性宫颈炎(宫颈糜烂)，应首选

- A.外用黄蝶散 II 号加物理疗法
- B.外用制霉菌素栓加塌痒方
- C.灭滴灵塞药加蛇床子散煎液冲洗
- D.口服知柏地黄汤加 1% 醋酸液冲洗
- E.外用制霉菌素栓加 1% 乳酸液冲洗

答案：A

解析：治疗慢性宫颈炎(宫颈糜烂)应该药物加物理疗法同时应用，宜外用黄蝶散 II 号加物理疗法。故本题选 A。

139.(A1型题)60 治疗黄体功能不全月经先期脾气虚证，应首选

- A.圣愈汤加己烯雌酚
- B.圣愈汤加黄体酮
- C.补中益气汤加己烯雌酚
- D.补中益气汤加黄体酮
- E.补中益气汤加催产素

答案：D

解析：黄体功能不全月经先期脾气虚证的治疗宜用补中益气汤益气摄血，再加黄体酮替代疗法。故本题选 D。

140.(A1型题)73 治疗围绝经期综合征肾阴虚型，应首选

- A.二仙汤
- B.左归饮
- C.坎离既济丸
- D.二至丸
- E.右归饮

答案：B

解析：围绝经期综合征肾阴虚型的治疗宜滋阴养肾，佐以潜阳，应首选左归饮。A、D 用于肾阴阳两虚证。E 用于肾阳虚证。故本题选 B。

141.(A2型题)92 患者，女，27岁，已婚。停经 48 天，阴道少量出血 2 天，腰酸腹坠，舌淡红苔薄白，脉滑。检查：子宫如孕 50 天大小，质软，宫口未开，尿妊娠试验(+)。应首先考虑的是

- A.先兆流产
- B.葡萄胎
- C.异位妊娠流产
- D.不全流产
- E.难免流产

答案：A

解析：先兆流产的临床表现主要表现为停经后虽然妊娠反应呈阳性，但仍出现少量阴道出血，并可伴有下腹痛和下坠感等流产先兆。B 病史与先兆流产相似，但子宫大于相应孕周正常妊娠，HCG 水平持续高值，B 超检查可明确诊断。C 表现为腹部剧烈疼痛，压痛，反跳痛，肛门坠胀感，子宫正常大小。D 妊娠物已部分排出体外，阴道流血持续不止，宫口扩张，子宫小于停经月份。E 为先兆流产发展而来，阴道流血增多，宫口扩张，可见胚胎组织或胎囊堵塞于宫颈口内。故本题选 A。

142.(A2型题)101 患者，女，27岁，已婚。足月顺产后 23 天，阴道流血不止，量少，色淡质稀，无臭气，小腹空坠，精神不振，

面色白，舌淡苔白，脉缓弱。其证型是

- A.气虚
- B.血热
- C.血瘀
- D.气虚夹瘀
- E.气滞血瘀

答案：A

解析：晚期产后出血气虚型症见产后 3 周以上恶露不止，色淡不臭，面色白，倦怠少气，纳少便溏。苔薄，舌淡，脉细弱。故本题选 A。

143.(A2型题)109 患者，女，32岁，已婚。下腹疼痛反复发作 2 个月，午后潮热，手足心热，月经量少，舌红，苔薄黄，脉细数。其中医证型、首选方药是

- A.湿毒壅阻，仙方活命饮
- B.阴虚血热，慢盆方
- C.气滞血瘀，血府逐瘀汤
- D.肝郁化热，丹栀逍遥散
- E.湿热壅阻，银甲丸

答案：B

解析：阴虚血热型证见下腹疼痛反复发作，午后潮热，手足心热，月经量少，舌红，苔薄黄，脉细数。治用慢盆方。故本题选 B。

144.(A2型题)119 患者，女，25岁，未婚。每次行经期间，小腹冷痛拒按，得热则舒，月经量少，色暗有块，畏寒身痛，舌淡暗，苔白腻，脉沉紧。其中医治法是

- A.理气活血，化瘀止痛
- B.理气行滞，化瘀止痛
- C.疏肝行气，缓急止痛
- D.温经祛寒，活血止痛
- E.益气补血，活血止痛

答案：D

解析：据患者临床表现，诊断为痛经寒凝血瘀证。治宜温经祛寒，活血止痛。故本题选 D。

145.(A2型题)130 患者，女，29岁，已婚。自然流产后 5 年，近 3 年一直未孕，月经稀发，量少，偶有闭经，体重增加明显，带下量多，胸闷纳差，舌淡胖，苔白腻，脉濡滑。

基础体温为单相。治疗应首先考虑的方剂是

- A.开郁种玉汤
- B.苍附导痰丸
- C.温胞饮
- D.养精种玉汤
- E.右归丸

答案：B

解析：本患者可诊断为不孕症痰湿内阻证。

治宜燥湿化痰、行滞调经。方用苍附导痰丸。

A 主要治疗肝气郁结证。C、E 治疗肾阳虚证。

D 治疗肾阴虚证。故本题选 B。

146.(B型题)135 患者月经周期 3~7 天/20~

40 天，其诊断是

- A.崩漏
- B.经期延长
- C.月经后期
- D.月经先后无定期
- E.月经先期，月经过多

答案：D

解析：月经先后无定期以月经周期紊乱为特征，一般经期正常，经量不多。月经先期，月经过多的诊断：

- ①多发于青春期及更年期妇女。
- ②月经周期缩短，一般少于 21 天（提前 7 天以上，甚至半月余一行）而有规律性。
- ③连续 2 个周期以上。
- ④无生殖器官器质性病变。崩漏是以月经周期、经期、经量均发生严重紊乱为特征的病证，除周期紊乱，同时出现阴道出血或量多如注，或淋漓不断。经期延长是指月经周期本正常，行经时间超过 7 天以上，甚至淋漓半月方净。月经后期是指月经周期延后 7 天以上，甚至 3~5 个月一行，连续两个周期以上。月经先后无定期指月经时或提前时或延后 7 天以上，连续 3 个周期以上。故 135 题选 D，136 题选 E。

147.(B型题)144 疑诊子宫内膜脱落不全，选择诊断性刮宫的时间是

- A.月经来潮第 6 天
- B.月经来潮第 5 天
- C.月经来潮第 3 天
- D.月经来潮第 2 天
- E.月经来潮 6 小时内

答案：B

解析：对于不孕症或功能失调性子宫出血患者，应选在月经前或月经来潮后 6 小时内刮宫，以判断有无排卵或黄体功能不足。子宫内膜脱落不全的诊断：BBT 高温期有少量子宫出血，BBT 下降后子宫出血增多如月经量，并按时停止。子宫出血第 5 天子宫内膜活检仍有分泌相。故 143 题选 E，144 题选 B。

148.(A1型题)9 可加重变异性心绞痛的药物是

- A.硝苯地平
- B.普萘洛尔
- C.硝酸甘油
- D.哌克昔林
- E.硝酸异山梨醇酯

答案：B

解析：普萘洛尔能明显降低心肌耗氧量及降低后负荷而缓解心绞痛，还能改善缺血区的血流量，可使非缺血区血管阻力增高，促使血液向缺血区低阻力血管流动，常用于稳定型及不稳定型心绞痛的治疗，药物本身可引起心率减慢，故可加重变异性心绞痛。A、D 为钙拮抗药，对冠状动脉痉挛及变异型心绞痛最为有效。C、E 可用于心绞痛急性发作时，可预防及治疗心绞痛。故本题选 B。

149.(A1型题)14 下列药物中，无抗心律失常作用的是

- A.奎尼丁
- B.氢氯噻嗪
- C.维拉帕米
- D.普萘洛尔
- E.胺碘酮

答案：B

解析：氢氯噻嗪的药理作用有：①利尿，抑制远曲小管对 NaCl 的重吸收；②抗利尿，使尿崩症患者尿量明显减少，因其排出  $\text{Na}^+$ 、 $\text{Cl}^-$ ，使血浆渗透压下降，可减轻患者的口渴感；③降压。故本题选 B。

150.(B型题)20 可引起高血钾、咳嗽、血管神经性水肿的药物是

- A.卡托普利
- B.可乐定

- C.哌唑嗪  
D.肼屈嗪  
E.米诺地尔

答案：A

解析：A 适用于各型高血压的治疗，长期应用可出现低血压、头痛、头晕、颜面潮红、乏力、血管神经性水肿、刺激性干咳、高血钾、皮疹、脱发等。B 长期应用可出现口干、瞌睡、头晕、便秘。C 的不良反应有眩晕、疲倦、口干、头痛、恶心。D 服后可出现耐药性及头痛、心悸、恶心等不良反应，长期大剂量使用可引起类风湿性关节炎和红斑狼疮样反应。E 的不良反应有心动过速、多毛症、妇女月经次数增多，结膜充血及血小板计数减少等。故 20 题选 A，21 题选 D。

151.(B 型题)25 治疗心肌收缩力减弱、尿量减少而血容量已补足的休克，应首先考虑的药物是

- A.肾上腺素  
B.去甲肾上腺素  
C.异丙肾上腺素  
D.多巴胺  
E.麻黄碱

答案：D

解析：A 为  $\alpha$  和  $\beta$  受体激动药，可使心肌收缩力加强，心率增快，心排出量增加，适用于严重的急性过敏反应，特别是青霉素等引起的过敏性休克治疗。B 主要应用于早期神经源性休克或药物引起的低血压。C 主要适用于中心静脉压高、心排出量低的感染性休克。D 主要用于感染性休克、心源性休克和出血性休克的治疗，对伴有心肌收缩力减弱及尿量减少而血容量已补足的患者疗效较好。E 使心肌收缩力增强，心输出量增加，可用于因血管扩张引起的休克的治疗。故 24 题选 A，25 题选 D。

152.(A1 型题)4 下列各项，不属咯血特点的是

- A.血内混有食物残渣  
B.血色鲜红  
C.多无黑便  
D.咯血前可有喉部作痒

- E.有肺结核、肺癌等病史

答案：A

解析：咯血前咽喉痒，胸闷，咳嗽；血色鲜红；除非咽下，否则没有黑便；血中混合泡沫、痰；多有肺系疾病病史。呕血前上腹不适，恶心，呕吐；血色棕黑、暗红；有黑便；血中混有食物残渣；多有消化系疾病病史。故本题选 A。

153.(A1 型题)9 下列主诉的内容中，不包括的是

- A.最主要的症状或体征  
B.最明显的症状或体征  
C.治疗经过  
D.最主要症状或体征的性质  
E.最主要症状或体征的持续时间

答案：C

解析：治疗经过属于现病史的内容，而主诉是指促使病人来就诊的最主要、明显的症状与体征的性质和持续时间。故本题选 C。

154.(A1 型题)14 下列各项，可见毛细血管搏动征的是

- A.主动脉瓣狭窄  
B.主动脉瓣关闭不全  
C.低血压性休克  
D.心包积液  
E.心力衰竭

答案：B

解析：毛细血管搏动征是周围血管征的一种，正常人毛细血管搏动极难看出，当脉压增大时，则可出现毛细血管搏动，常见于主动脉关闭不全、动脉导管未闭、主动脉窦瘤破裂、动静脉瘘、甲状腺功能亢进、严重贫血、老年主动脉硬化等疾患。故本题选 B。

155.(A1 型题)20 尿中出现红细胞管型，主要见于

- A.肾结核  
B.肾结石  
C.慢性肾炎  
D.急性肾炎  
E.慢性肾盂肾炎

答案：D

解析：尿液中见红细胞管型主要提示肾小球疾病，如急进性肾小球肾炎、急性肾小球肾炎、慢性肾小球肾炎急性发作、狼疮性肾炎等。故本题选 D。

**156.(B 型题)26** 上述各项，可闻及心尖区粗糙的吹风样收缩期杂音的是

- A.二尖瓣关闭不全
- B.二尖瓣狭窄
- C.主动脉瓣关闭不全
- D.主动脉瓣狭窄
- E.动脉导管未闭

答案：A

解析：吹风样杂音常见于二尖瓣区和肺动脉瓣区，一般呈高调。柔和的吹风样杂音常为功能性杂音；典型的粗糙的吹风样收缩期杂音，常提示二尖瓣关闭不全。隆隆样杂音为低调，心尖区舒张期隆隆样杂音是二尖瓣狭窄的特征。叹气样杂音见于主动脉瓣区，为主动脉瓣关闭不全的特点。机器样杂音主要见于动脉导管未闭，杂音如机器转动声样粗糙。杂音在心尖部最响，提示二尖瓣病变；杂音在主动脉瓣区最响，提示主动脉瓣病变；在肺动脉瓣区最响，提示肺动脉瓣病变；在胸骨下端最响，提示三尖瓣病变。如胸骨左缘第 3、4 肋间听到响亮而粗糙的收缩期杂音，首先应想到室间隔缺损；胸骨左缘第 2、3 肋间有连续性机器样粗糙杂音，应想到动脉导管未闭。故 26 题选 A，27 题选 E。

**157.(B 型题)33** 坐骨神经痛应出现的是

- A.巴宾斯基征
- B.贡达征
- C.拉塞格征
- D.霍夫曼征
- E.布鲁津斯基征

答案：C

解析：脑膜刺激征为脑膜受激惹的体征，见于脑膜炎，同时并有颈强直、克尼格征和布鲁津斯基征。巴宾斯基征、贡达征、霍夫曼征见于椎体束损害。拉塞格征见于神经根受刺激，如坐骨神经痛等。故 32 题选 E，33 题选 C。

**158.(A1 型题)5** 下列各期，流行性出血热患者可出现“三痛”症状的是

- A.发热期
- B.低血压期
- C.少尿期
- D.多尿期
- E.恢复期

答案：A

解析：流行性出血热发热期，患者可出现全身酸痛、头痛和腰痛，少数患者出现眼眶痛。头痛、腰痛和眼眶痛一般称为“三痛”。B 可出现低血压或休克。C 可出现尿毒症、酸中毒和水、电解质紊乱。D 可出现多尿、继发性休克、低钾、低钠症状。E 尿量逐渐恢复，症状、体征基本消失。故本题选 A。

**159.(A1 型题)12** 治疗流行性脑脊髓膜炎，应首选的抗菌药物是

- A.磺胺嘧啶
- B.氯霉素
- C.红霉素
- D.磷霉素
- E.青霉素

答案：E

解析：青霉素对脑膜炎球菌仍是一种高度敏感的杀菌药物，尚未出现明显的耐药，为治疗流行性脑脊髓膜炎首选的抗菌药物。A 对败血症期病人疗效欠佳，急性期病人因颅压高易呕吐而难以接受此药口服，且有较大的毒副作用，一般不做首选。B 对骨髓造血功能有抑制作用，一般不首选。C、D 一般不用做流行性脑脊髓膜炎的治疗。故本题选 E。

**160.(B 型题)20** HBV 复制活跃的标志是

- A.HBsAg 阳性
- B.HBeAg 阳性
- C.抗-HBe 阳性
- D.抗-HBc 阳性
- E.抗-HBs 阳性

答案：B

解析：抗-HBs 是一种保护性抗体，在疾病恢复期出现，临幊上作为判断急性乙型肝炎病人预后的指标。HBeAg 在血清中出现与 HBV-DNA 密切相关，是 HBV 活动性复制的

标志。A 最早于 HBV 感染后 1~2 周，最迟 11~12 周出现于周围血中，在慢性感染和无症状携带者中可持续存在多年。C 出现提示病毒复制减少或终止。D 出现于 HBsAg 出现后 3~5 周，说明病毒感染处于窗口期，在“大三阳”组合中，它是 HBV 活动性复制的标志之一。故 19 题选 E，20 题选 B。

**161.(B型题)29** 霍乱典型表现为

- A. 发热，腹痛，腹泻，洗肉水样大便
- B. 发热，腹痛，腹泻，脓血便，里急后重
- C. 腹泻，呕吐，水样大便，无发热，无腹痛
- D. 发热，腹痛，腹泻，水样大便
- E. 低热，腹痛，腹泻，果酱样大便

答案：C

解析：参见 27~28 题。故 29 题选 C，30 题选 B。

**162.(A1型题)3** 对不伤害原则的解释，正确的是

- A. 不伤害原则就是消除任何医疗伤害
- B. 不伤害原则就是要求医生对患者丝毫不伤害
- C. 因绝大多数医疗行为都存在着不同程度的伤害，所以不伤害原则是做不到的
- D. 不伤害原则要求对医学行为进行受益与伤害的权衡，把可控伤害控制在最低限度之内
- E. 对肿瘤患者进行化疗意味着绝对伤害

答案：D

解析：既界定了个人自由的界限，同时也界定了社会控制的界限。对个人来说，不能伤害他人或社会整体的利益；对社会来说，除非某一个体的行为在未经同意的情况下伤害了他人，就不得任意干涉；对政府来说，作为社会整体的代表，所能合法施用于个人的行政权力也必须符合“不伤害”原则。所以不伤害原则要求对医学行为进行受益与伤害的权衡，把可控伤害控制在最低限度之内。故本题选 D。

**163.(A1型题)8** 下列人体试验类型中，不需要付出道德代价的是

- A. 自体试验

- B. 自愿试验
- C. 欺骗试验
- D. 强迫试验
- E. 天然试验

答案：E

解析：人体试验包括天然试验、自我试验、志愿试验、强迫试验。由于试验途径不同，所付出的道德代价也不同。而天然试验则不同，它是由于战争、饥荒、瘟疫流行等灾害导致大面积人群的疾病流行，形成试验所需要的研究样本群。故本题选 E。

**164.(B型题)17** 各级各类卫生防疫机构按照专业分工应

- A. 在必要时可以采取停工、停业、停课等措施
- B. 承担本单位及负责地段的传染病预防、控制和疫情管理工作
- C. 对甲类传染病疫区实施封锁管理
- D. 承担责任范围内的传染病监测管理工作
- E. 对违反《中华人民共和国传染病防治法》的行为给予行政处罚

答案：D

解析：各级各类卫生防疫机构应承担责任范围内的传染病监测管理工作。各级各类医疗保健机构设立的预防保健组织或人员应承担本单位及负责地段的传染病预防、控制和疫情管理工作。故 17 题选 D，18 题选 B。

**165.(B型题)22** 国家鼓励开展中医药专家学术继承工作，培养高层次的中医临床人才和

- A. 中药技术人才
- B. 中医从业人员
- C. 中医医疗机构
- D. 中医药教育机构
- E. 中医药科研机构

答案：A

解析：《中医药条例》第十五条规定：设立各类中医药教育机构应当符合国家规定的设置标准，并建立符合国家标准的临床教学基地。《中医药条例》第十六条规定：国家鼓励开展中医药专家学术经验和技术专长继承工作，培养高层次的中医临床人才和中药技术人才。故 21 题选 D，22 题选 A。

166.(A1型题)3 下列各项，不属我国《民法通则》规定的承担民事责任的方式是

- A.排除妨碍
- B.返还财产
- C.赔偿损失
- D.罚金
- E.赔礼道歉

答案：D

解析：我国《民法通则》规定的承担民事责任的方式停止侵害，排除妨碍，消除危险，返还财产，恢复原状，修理、重作、更换，赔偿损失，支付违约金，消除影响、恢复名誉，赔礼道歉。卫生法所涉及的民事责任以赔偿损失为主要形式。罚金不属我国《民法通则》规定的承担民事责任的方式。故本题选D。

167.(A1型题)8 医师签署有关医学证明文件，必须亲自诊查、调查，并按照规定及时填写医学文书，对医学文书及有关资料，不得

- A.与同行讨论
- B.用电脑打印
- C.随身携带
- D.向主管医生报告
- E.隐匿、伪造或者销毁

答案：E

解析：《执业医师法》第二十三条规定：医师实施医疗、预防、保健措施，签署有关医学证明文件，必须亲自诊查、调查，并按照规定及时填写医学文书，不得隐匿、伪造或者销毁医学文书及有关资料。故本题选E。

168.(A1型题)12 神志活动与五脏有关，其中关系最密切的脏是

- A.心、肺、肝
- B.心、肝、脾
- C.肺、脾、肾
- D.心、脾、肾
- E.心、肝、肾

答案：B

解析：人体是以五脏为中心的有机整体，故情志活动与五脏精气的关系最为密切。由于心、肝、脾三脏在人体生理活动和精神心理

活动中发挥着重要作用，故情志内伤最易损伤心、肝、脾三脏。所以，神志活动与心、肝、脾关系最密切。故本题选B。

169.(A1型题)16 “天癸”的产生，主要取决于

- A.肾中阳气的蒸腾气化
- B.肾中精气的充盈
- C.肾阴的濡养
- D.肾的封藏功能
- E.元气的充沛

答案：B

解析：天癸，是肾精及肾气充盈到一定程度而产生的一种精微物质，具有促进人体生殖器官的发育成熟和维持人体生殖机能的作用。所以，“天癸”的产生，主要取决于肾中精气的充盈。故本题选B。

170.(A1型题)22 被称为“受盛之官”的是

- A.胆
- B.胃
- C.小肠
- D.大肠
- E.膀胱

答案：C

解析：小肠被称为“受盛之官”。小肠的受盛化物功能表现于以下两个方面：一是指小肠接受由胃腑下传的食糜而盛纳之，即受盛作用；二是指食糜在小肠内必须停留一定的时间，由脾气与小肠的共同作用对其进一步消化，化为精微和糟粕两部分，即化物作用。故本题选C。

171.(A1型题)26 维持机体体温的是

- A.气的推动作用
- B.气的温煦作用
- C.气的防御作用
- D.气的固摄作用
- E.气的中介作用

答案：B

解析：A的主要作用为①推动人体的生长发育；②推动脏腑经络组织器官的功能活动；③推动津液的生成、输布和排泄。B的主要作用为温暖全身。C的主要作用为防御外邪

入侵并驱逐侵入体内之病邪。D 的主要作用为固护统摄体液。E 的主要作用为通过气的运动而产生的各种变化，指精、气、血、津液等物质各自的新陈代谢及相互间的转化。故本题选 B。

172.(A1 型题)32 被称为“十二经脉之海”的是

- A.冲脉
- B.任脉
- C.督脉
- D.带脉
- E.阴维脉

答案：A

解析：参见 31 题。故本题选 A。

173.(A1 型题)40 七情影响脏腑气机，悲则

- A.气上
- B.气消
- C.气缓
- D.气结
- E.气下

答案：B

解析：悲则气消是指过度悲忧伤肺，导致肺失宣降及肺气耗伤的病机变化。临床常见意志消沉、精神不振、气短胸闷、乏力懒言等症。故本题选 B。

174.(A1 型题)45 塞因塞用不适用于下列哪种病证

- A.脾虚腹胀
- B.血枯经闭
- C.气郁胀满
- D.肾虚癃闭
- E.阴虚便秘

答案：C

解析：即以补开塞，是指用补益药物来治疗具有闭塞不通症状的虚证。适用于因体质虚弱，脏腑精气功能减退而出现闭塞症状的真假实证。如血虚而致经闭者，由于血源不足，故当补益气血而充其源，则无须用通药而经自来。因此，以补开塞，主要是针对病证虚损不足的本质而治。而气郁胀满的本质是实。故本题选 C。

175.(B 型题)58 临幊上出现心悸，怔忡，心烦，腰膝酸软或见男子梦遗，女子梦交，多责之于

- A.心与肾
- B.脾与肾
- C.肺与肾
- D.肝与肾
- E.肝与脾

答案：A

解析：临幊上当心脏出现病变时可以见到心慌、心悸、失眠等症状。肾脏出现病变时可有腰膝酸软、牙齿松动、脱落及小儿齿迟、尿频、遗尿、尿失禁、尿少或尿闭二便失调及男子梦遗，女子梦交等表现。所以，临幊上出现水肿、心悸等症，及腰膝酸软或见男子梦遗，女子梦交多责之于心与肾。故 57 题选 A， 58 题选 A。

176.(B 型题)68 大出血病人，临幊上常用独参汤止血，属于

- A.因人制宜
- B.因地制宜
- C.因时制宜
- D.标本论治
- E.异病同治

答案：D

解析：病证急重时的标本取舍原则是标病急重，则当先治、急治其标。标急的情况多出现在疾病过程中出现的急重甚或危重症状，或卒病而病情非常严重时。大出血病人，由于大出血会危及生命，故不论何种原因的出血，均应紧急止血以治标，临幊上常用独参汤止血，待血止，病情缓和后再治其病本。脱肛、子宫脱垂用补中益气汤治疗是因为虽然它们是不同的病，但是它们具有相同的证，根据辨证论治的原则，证相同其治法也相同。故 67 题选 E， 68 题选 D。

177.(A1 型题)4 惊悸而失眠，多见于

- A.胆郁痰扰
- B.心肾不安
- C.心脾两虚
- D.胃气不和

E.以上均非

答案: A

解析: 胆郁痰扰证, 是指胆失疏泄, 痰热内扰所表现的证候。多由情志不遂, 疏泄失职, 生痰化火而引起。临床表现中有惊悸不宁, 烦躁不寐, 头晕目眩耳鸣, 日苦呕恶, 胸闷太息, 舌苔黄腻, 脉弦滑等表现。故本题选 A。

178.(A1型题)13 下列各项, 可见舌淡白裂纹多的是

- A.脾虚湿侵
- B.血虚不润
- C.阴液亏虚
- D.寒湿内盛
- E.痰浊壅滞

答案: B

解析: 血虚不润可致舌淡白裂纹多; 而脾虚湿侵可见舌淡白湿润; 阴液亏虚可见舌红无苔; 寒湿内盛可见舌淡紫而湿润。故本题选 B。

179.(A1型题)23 结脉、促脉、代脉, 其脉象的共同特点是

- A.脉来较数
- B.脉来时止
- C.止无定数
- D.脉来缓慢
- E.止有定数

答案: B

解析: 结脉脉象是脉来缓, 时而一止, 止无定数。促脉脉象是脉来数, 时而一止, 止无定数。代脉的脉象是脉来时见一止, 止有定数, 良久方来。故本题选 B。

180.(A1型题)32 阳虚与气虚的主要区别是

- A.有无少气懒言
- B.小便是否清长
- C.有无神疲乏力
- D.寒象是否明显
- E.舌质是否淡嫩

答案: D

解析: 气虚证, 是指脏腑组织机能减退所表现的证候。常由久病体虚, 劳累过度, 年老

体弱等因素引起。临床表现为少气懒言, 神疲乏力, 头晕目眩, 自汗, 活动时诸证加剧, 舌淡苔白, 脉虚无力。而阳虚证多表现为寒象。通常它是有气虚发展到一定的阶段形成的。所以, 阳虚与气虚的主要区别是寒象是否明显。故本题选 D。

181.(A1型题)39 心气虚、心阳虚、心血虚、心阴虚四证的共同临床表现为

- A.心痛
- B.心烦
- C.失眠
- D.健忘
- E.心悸

答案: E

解析: 心的病变主要表现为血脉运行失常及精神意识思维改变等方面。如心悸, 精神错乱, 脉结代或促等症常是心的病变。故心气虚、心阳虚、心血虚、心阴虚四证的共同临床表现为心悸。故本题选 E。

182.(A1型题)45 胃热证的主要临床特征是

- A.消谷善饥
- B.胃脘隐痛
- C.口燥咽干
- D.舌红少津
- E.干呕呃逆

答案: A

解析: 胃热证, 是指胃火内炽所表现的征候。多因平素嗜食辛辣肥腻, 化热生火, 或情志不遂, 气郁化火, 或热邪内犯等所致。临床表现为胃脘灼痛, 吞酸嘈杂, 或食入即吐, 或渴喜冷饮, 消谷善饥, 或牙龈肿痛, 齿衄口臭, 大便秘结, 小便短赤, 舌红苔黄, 脉滑数等症状。故本题选 A。

183.(A2型题)48 患者吐血, 心烦, 口渴, 身热, 舌红绛, 脉数。其证候是

- A.气虚
- B.气滞
- C.血虚
- D.血热
- E.血瘀

答案: D

解析：血热，即热入血脉之中，使血行加速，脉络扩张，或迫血妄行而致出血的病理状态。血热病变，除一般热盛的证候外，由于血行加速，脉络扩张，故可见面红目赤，肤色发红，舌色红绛，经脉异常搏动等症状。血热炽盛，灼伤脉络，迫血妄行，常可引起各种出血，如吐血、衄血、尿血等。故本题选 D。

184.(B型题)57 上述各项，可见面色淡白且唇色淡症状的是

- A.血虚证
- B.阳气暴脱
- C.脾胃气虚
- D.虚阳上越
- E.阳虚水泛

答案：A

解析：面色淡白且唇色淡，多属于失血或血虚证。阳虚水泛可见面色淡白虚浮。故 57 题选 A，58 题选 E。

185.(B型题)62 患者先有食积内热，复感风寒之邪。此证候是

- A.上寒下热
- B.上热下寒
- C.表寒里热
- D.表热里寒
- E.真寒假热

答案：C

解析：上热下寒：患者在同一时间内，上部表现为热，下部表现为寒的证候。例如患者胸中有热，肠中有寒，既见胸中烦热，咽痛口干的上热证，又见腹痛喜暖，大便稀溏的下寒证，就属上热下寒证。所以，胸中烦热，腹痛喜暖，大便稀薄为上热下寒。表寒里热：患者表里同病，寒在表、热在里的一种证候。常见于本有内热，又外感风寒，或外邪传里化热而表寒未解的病证。例如恶寒发热，无汗头痛身痛，气喘，烦躁，口渴，脉浮紧即是寒在表而热在里的证候。患者先有食积内热，复感风寒之邪。此证候就是表寒里热。故 61 题选 B，62 题选 C。

186.(B型题)67 白带清稀量多，食少腹胀，畏寒怕冷，舌质淡胖，舌苔白滑，脉沉迟无

力。其中医证候是

- A.脾气虚
- B.脾阳虚
- C.脾虚气陷
- D.寒湿困脾
- E.湿热蕴脾

答案：B

解析：脾阳虚衰，机体失于温煦，运化功能失司，所以临幊上多有畏寒怕冷，食少，腹胀腹痛，便溏，舌苔白滑，脉沉迟无力等虛寒证的表现。而脾气虚以食少，腹胀腹痛，便溏等为主要症候；脾虚气陷以脘腹重坠，内脏下陷及气虚症状为主要表现；寒湿困脾以纳呆，腹胀，便溏等为主要症候；湿热蕴脾以纳呆，腹胀，便溏，身重，发热等为主要症候。所以，白带清稀量多，食少腹胀，畏寒怕冷，舌质淡胖，舌苔白滑，脉沉迟无力之中医证候是脾阳虚。故 67 题选 B。白带量多，脘腹胀闷，纳呆便溏，头身困重，舌淡苔白腻，脉濡缓之中医证候是寒湿困脾，故 68 题选 D。

187.(A1型题)5 下列各组药物中，属于配伍禁忌的是

- A.巴豆与牵牛
- B.丁香与三棱
- C.牙硝与郁金
- D.官桂与五灵脂
- E.人参与赤石脂

答案：A

解析：“十八反”甘草反甘遂、大戟、海藻、芫花；乌头反贝母、瓜蒌、半夏、白蔹、白及；藜芦反人参、沙参、丹参、玄参、细辛、芍药。“十九畏”硫黄畏朴硝，水银畏砒霜，狼毒畏密陀僧，巴豆畏牵牛，丁香畏郁金，川乌、草乌畏犀角，牙硝畏三棱，官桂畏赤石脂，人参畏五灵脂。故本题选 A。

188.(A1型题)7 下列解表药中，兼有化湿和中功效的是

- A.紫苏
- B.香薷
- C.生姜
- D.白芷

E.防风

答案: B

解析: 紫苏、香薷、生姜、白芷、防风都是解表药, 香薷化湿和中, 利水消肿; 紫苏理气, 和营; 生姜发汗解表, 温中止呕, 温肺止咳, 解鱼蟹毒, 解药毒; 白芷通窍止痛, 消肿排脓, 燥湿止带; 防风胜湿止痛, 止痉。所以说香薷是解表药兼有化湿和中功效。故本题选 B。

189.(A1型题)12 治疗风热郁闭、咽喉肿痛、大便燥结者, 应首选

- A.薄荷
- B.蝉蜕
- C.菊花
- D.蔓荆子
- E.牛蒡子

答案: E

解析: 牛蒡子疏散风热, 宣肺透疹, 解毒利咽。用于风热感冒、咳嗽痰多、麻疹、风疹、咽喉肿痛、痄腮、丹毒、痈肿疮毒。故本题选 E。

190.(A1型题)18 功擅凉血, 解毒, 养阴的药物是

- A.生地
- B.玄参
- C.牡丹皮
- D.紫草
- E.大青叶

答案: B

解析: 玄参的功效清热凉血, 泻火解毒, 滋阴。生地的功效清热凉血, 养阴, 生津。丹皮功效清热凉血, 活血行瘀。紫草功效凉血, 活血, 解毒透疹。大青叶功效清热, 解毒, 凉血, 止血。所以玄参的功效凉血, 解毒, 养阴。故本题选 B。

191.(A1型题)19 玄参具有的功效是

- A.解毒
- B.止血
- C.活血
- D.利尿
- E.养血

答案: A

解析: 玄参的功效清热凉血, 泻火解毒, 滋阴。所以玄参的功效凉血, 解毒, 养阴。故本题选 A。

192.(A1型题)23 贯众具有的功效是

- A.止血
- B.止泻
- C.止呕
- D.止咳
- E.止痒

答案: A

解析: 贯众的功效为清热解毒, 凉血止血, 杀虫。故本题选 A。

193.(A1型题)26 具有凉血退蒸, 清泻肺热功效的药物是

- A.地骨皮
- B.青蒿
- C.白薇
- D.银柴胡
- E.胡黄连

答案: A

解析: 地骨皮可凉血除蒸, 清肺降火。青蒿可清透虚热, 凉血除蒸, 解暑, 截疟。白薇可清热凉血, 利尿通淋, 解毒疗疮。银柴胡可清虚热, 除疳热, 凉血, 解暑。胡黄连可退虚热, 除疳热, 清湿热。故本题选 A。

194.(A1型题)30 大黄具有的功效是

- A.软坚散结
- B.凉血解毒
- C.蚀疮去腐
- D.消肿生肌
- E.收湿敛疮

答案: B

解析: 大黄具有泻热通肠, 凉血解毒, 逐瘀通经功效。故本题选 B。

195.(A1型题)31 具有消毒散结功效的药物是

- A.番泻叶
- B.牵牛子
- C.甘遂
- D.郁李仁

E.芦荟

答案: C

解析: 甘遂功效泻水逐饮, 用于水肿胀满, 胸腹积水, 痰饮积聚, 气逆喘咳, 二便不利, 消肿散结; 外用可治痈肿疮疡。故本题选 C。

196.(A1型题)39 蒙朮仁的功效是

A.通便

B.清肝

C.清胃

D.除痹

E.解暑

答案: D

解析: 蒙朮仁具有的功效健脾渗湿, 除痹止泻。故本题选 D。

197.(A1型题)43 下列各项, 不属车前子主治病证的是

A.湿盛泄泻

B.目赤肿痛

C.痰热咳嗽

D.心悸失眠

E.湿热淋证

答案: D

解析: 车前子具有利水通淋, 止泻, 清肝明目, 清肺化痰功效。故本题选 D。

198.(A1型题)49 具有疏肝和胃, 燥湿化痰功效的药物是

A.橘皮

B.青皮

C.佛手

D.枳实

E.香附

答案: C

解析: 佛手的功效是疏肝和胃, 燥湿化痰。故本题选 C。

199.(A1型题)53 白及具有的功效是

A.化瘀止血

B.凉血止血

C.收敛止血

D.温经止血

E.益气摄血

答案: C

解析: 白及的功效是收敛止血。故本题选 C。

200.(A1型题)56 具有降逆止呕功效的药物是

A.白前

B.旋覆花

C.桔梗

D.前胡

E.白芥子

答案: B

解析: 旋覆花的功效是降逆止呕。故本题选 B。

201.(A1型题)62 磁石具有的功效是

A.潜阳安神

B.养心安神

C.解郁安神

D.祛痰止咳

E.收敛固涩

答案: A

解析: 参见 61 题。故本题选 A。

202.(A1型题)65 人参具有的功效是

A.托毒生肌

B.安神增智

C.破气消积

D.润肺止咳

E.健脾化湿

答案: B

解析: 人参性甘、微苦, 功效为大补元气, 补脾益肺, 生津, 安神益智。故本题选 B。

203.(A1型题)72 既能收敛止血, 又能收湿敛疮的药物是

A.桑螵蛸

B.五味子

C.蛇床子

D.侧柏叶

E.乌贼骨

答案: E

解析: 桑螵蛸固精缩尿, 补肾助阳。五味子收敛固涩, 益气生津, 补肾宁心。蛇床子杀虫止痒, 燥湿, 温肾壮阳。侧柏叶凉血止血, 化痰止咳, 生发乌发。乌贼骨收敛止血, 固

精止带，制酸止痛，收湿敛疮。故本题选 E。

204.(A2型题)76 患者崩漏下血，色紫黑、有血块，小腹疼痛拒按，血块排出后痛减，舌质紫暗，脉涩，治疗应选用

- A.白及
- B.仙鹤草
- C.地榆
- D.三七
- E.艾叶

答案：D

解析：白及收敛止血，消肿生肌。仙鹤草收敛止血，止痢，截疟，补虚。地榆参见 71 题。三七散瘀止血，消肿定痛。用于各种内、外出血，胸腹刺痛，跌仆肿痛。艾叶温经止血，散寒调经，安胎。故本题选 D。

205.(B型题)85 具有祛痰功效的药物是

- A.白头翁
- B.大青叶
- C.穿心莲
- D.射干
- E.鱼腥草

答案：D

解析：白头翁清热解毒，凉血止痢。大青叶清热解毒，凉血消斑。穿心莲清热解毒，凉血，消肿，燥湿。射干清热解毒，祛痰，利咽。鱼腥草清热解毒，排脓消痈，利尿通淋。故 85 题选 D，86 题选 E。

206.(B型题)88 可用于治疗温病初起及热毒泻痢的药物是

- A.金银花
- B.板蓝根
- C.白头翁
- D.蒲公英
- E.鱼腥草

答案：C

解析：鱼腥草清热解毒，排脓消痈，利尿通淋。主肺痈吐脓，痰热喘咳，喉蛾，热痢，痈肿疮毒，热淋。白头翁适用于温病初起及热毒泻痢。故 87 题选 E，88 题选 C。

207.(B型题)91 既能凉血止血，又能活血祛

瘀的药物是

- A.三七
- B.蒲黄
- C.茜草
- D.白及
- E.白茅根

答案：C

解析：A 化瘀止血，活血定痛。B 止血，化瘀，利尿。C 凉血化瘀止血，通经。D 收敛止血，消肿生肌。E 凉血止血，清热利尿，清肺胃热。故 91 题选 C，92 题选 B。

208.(B型题)94 治疗湿阻胸脘痞闷，宜选用

- A.白芥子
- B.杏仁
- C.半夏
- D.桔梗
- E.竹茹

答案：C

解析：A 温肺化痰，利气，散结消肿。B 止咳平喘，润肠通便。C 燥湿化痰，降逆止呕，消痞散结；外用消肿止痛。其主治证候有：①湿痰，寒痰证；②呕吐；③心下痞，结胸，梅核气；④癰瘤，痰核，痈疽肿毒及毒蛇咬伤。D 宣肺，祛痰，利咽，排脓。E 清热化痰，除烦止呕。故 93 题选 C，94 题选 C。

209.(B型题)97 具有补脾止泻，养心安神功效的药物是

- A.山茱萸
- B.桑螵蛸
- C.莲子
- D.诃子
- E.金樱子

答案：C

解析：A 补益肝肾，收敛固涩。B 固精缩尿，补肾助阳。C 固精止带，补脾止泻，益肾养心。D 涩肠止泻，敛肺止咳，利咽开音。E 固精缩尿止带，涩肠止泻。故 97 题选 C，98 题选 C。

210.(A1型题)1 按照君臣佐使含义分析，麻黄汤中的炙甘草是

- A.臣药

- B.佐药
- C.使药
- D.臣佐药（注：即臣药兼有佐药之用）
- E.佐使药（注：即佐药兼有使药之用）

答案：E

解析：炙甘草既能调和麻、杏之宣降，又能缓和麻、桂相合之峻烈，使汗出不致过猛而耗伤正气，是使药而兼佐药之用。故本题选E。

#### 211.(A1型题)4 桂枝汤的组成中不含有的药物是

- A.麻黄
- B.芍药
- C.生姜
- D.大枣
- E.甘草

答案：A

解析：桂枝汤的组成有桂枝、芍药、甘草、生姜、大枣。故本题选A。

#### 212.(A1型题)10 桑菊饮组成中不含有的药物是

- A.薄荷
- B.连翘
- C.杏仁
- D.桔梗
- E.双花

答案：E

解析：桑菊饮的组成是桑叶、菊花、杏仁、连翘、薄荷、桔梗、生甘草、芦根。故本题选E。

#### 213.(A1型题)12 下列除哪项外，均是大承气汤主治证的临床表现

- A.腹痛便秘
- B.小便频数
- C.潮热谵语
- D.手足汗出
- E.下利清水

答案：B

解析：①阳明腑实证。大便不通，频转矢气，脘腹痞满，腹痛拒按，按之则硬，甚或潮热谵语，手足濶然汗出，舌苔黄燥起刺，或焦

黑燥裂，脉沉实。②热结旁流证。下利清水，色纯青，其气臭秽，脐腹疼痛，按之坚硬有块，口舌干燥，脉滑实。③里热实证之热厥、痉病或发狂等。故本题选B。

#### 214.(A1型题)19 清营汤和青蒿鳖甲汤的组成中均含有的药物是

- A.银花
- B.连翘
- C.生地黄
- D.玄参
- E.丹皮

答案：C

解析：清营汤：犀角(水牛角代)、生地黄、元参、竹叶心、麦冬、丹参、黄连、银花、连翘、莲心。青蒿鳖甲汤：青蒿、鳖甲、细生地、知母、丹皮。故本题选C。

#### 215.(A1型题)21 肝胆实火上扰，头痛，目赤，胁痛，口苦，耳聋耳肿者，治疗应选用

- A.镇肝熄风汤
- B.龙胆泻肝汤
- C.八正散
- D.蒿芩清胆汤
- E.甘露消毒丹

答案：B

解析：上述症状由肝胆实火上炎或肝胆湿热循经下注所致。肝经绕阴器，布胁肋，连目系，入巅顶；胆经起于目外眦，布耳前后，入耳中，一支入股中，绕阴部，另一支布胁肋。肝胆之火循经上炎，则头部、耳目作痛，或听力失聪，旁及两胁则胁痛且口苦；湿热循经下注则为阴痒、阴肿、筋痿、阴汗；舌红苔黄腻，脉弦数有力皆为火盛及湿热之象。治宜清泻肝胆实火，清利肝经湿热。故本题选B。

#### 216.(A1型题)27 脾虚夹湿便溏泄泻者可以选用的方剂是

- A.参苓白术散
- B.归脾汤
- C.生脉散
- D.炙甘草汤
- E.玉屏风散

答案：A

解析：A 益气健脾，渗湿止泻，适用于脾虚湿盛之证。B 益气补血，健脾养心。C 益气生津，敛阴止汗。D 益气滋阴，通阳复脉。E 益气固表止汗。故本题选 A。

217.(A1型题)30 暑热耗气伤液，汗多无热者，治疗应选用

- A.清暑益气汤
- B.生脉散
- C.六一散
- D.玉女煎
- E.当归六黄汤

答案：B

解析：A 清暑益气，养阴生津。B 益气生津，敛阴止汗。适用于温热、暑热，耗气伤阴证以及久咳伤肺，气阴两虚证。C 清暑利湿。D 清胃热，滋肾阴。E 滋阴泻火，固表止汗。故本题选 B。

218.(A1型题)32 朱砂安神丸所治之失眠多梦的病因病机是

- A.心火偏亢，阴血不足
- B.阴亏血少，血不养心
- C.气虚血少，心神失养
- D.阴血不足，虚火扰心
- E.心脾两虚，神志不宁

答案：A

解析：上述症状由心火亢盛，灼伤阴血所致。心火亢盛则心神被扰，阴血不足则心神失养，故见失眠多梦、惊悸怔忡、心烦等症；舌红，脉细数是心火盛而阴血虚之征。治当泻其亢盛之火，补其阴血之虚而安神。故本题选 A。

219.(A1型题)38 生化汤主治证的病机是

- A.下焦蓄血
- B.血虚受寒
- C.气虚血滞
- D.冲任虚损
- E.血瘀气滞

答案：B

解析：生化汤的病机为血虚寒凝，瘀血阻滞证。主治产后恶露不行，小腹冷痛。故本题选 B。

220.(A1型题)44 小蓟饮子与八正散相同的功效是

- A.利水通淋
- B.燥湿解毒
- C.凉血止血
- D.泻火养阴
- E.利湿化浊

答案：A

解析：小蓟饮子凉血止血，利水通淋。八正散清热泻火，利水通淋。故本题选 A。

221.(A1型题)48 下列各项，不属镇肝熄风汤主治证临床表现的是

- A.头目眩晕，目胀耳鸣，脑部热痛，心中烦热，面色如醉
- B.肢体渐觉不利，口角渐行歪斜
- C.眩晕颠仆，昏不知人，移时始醒，或醒后不能复原
- D.舌强不能言，足废不能用，脉沉细弱
- E.脉弦长有力

答案：D

解析：镇肝熄风汤主治肝肾阴虚，肝阳上亢，气血逆乱所致的类中风，临床表现为头目眩晕，目胀耳鸣，脑部热痛，面色如醉，心中烦热，或时常噫气，或肢体渐觉不利，口眼渐形歪斜；甚或眩晕颠仆，昏不知人，移时始醒，或醒后不能复元，脉弦长有力。A、B、C、E 均为类中风的表现；而 D 为喑痱症状，为地黄饮子主治。故本题选 D。

222.(A1型题)52 治疗虚热肺痿，应首先考虑的方剂是

- A.清燥救肺汤
- B.炙甘草汤
- C.麦门冬汤
- D.百合固金汤
- E.养阴清肺汤

答案：C

解析：麦门冬汤主治由肺胃阴虚，痰涎不化所致的虚热肺痿。症状为咳嗽涎沫，短气喘促，咽喉干燥，舌干红少苔，脉虚数。A 主治温燥伤肺证。B 具有滋养阴血，益气温阳，复脉止悸功效，能治疗虚劳肺痿，症见咳嗽，

涎唾多，形瘦短气，虚烦不眠，自汗盗汗等。  
D 主治肺肾阴虚，虚火上炎证。E 主治白喉。故本题选 C。

223.(A1型题)57 保和丸主治证候中，常见

- A.食少难消
- B.腹痛下痢
- C.胸满胁痛
- D.嗳腐吞酸
- E.脘闷不饥

答案：D

解析：保和丸主治食滞胃脘证。脘腹痞满胀痛，嗳腐吞酸，恶食呕逆，或大便泄泻，舌苔厚腻，脉滑。故本题选 D。

224.(A2型题)60 患者素有水饮，复感风寒，恶寒发热，无汗，咳喘，痰多而稀，身体疼重，舌苔白滑，脉浮。治疗应首选

- A.苓桂术白汤
- B.五苓散
- C.小青龙汤
- D.苏子降气汤
- E.麻黄汤

答案：C

解析：上述证型为外感风寒，寒饮内停之证。风寒束表，皮毛闭塞，卫阳被遏，营阴郁滞，故见恶寒发热，无汗，身体疼重。素有水饮之人，一旦感受外邪，每致表寒引动内饮。水寒相搏，内外相引，饮动不居，水寒射肺，肺失宣降，故咳喘痰多而稀；饮动则胃气上逆，故干呕；舌苔白滑，脉浮为外寒里饮之佐证。治疗应该解表散寒，温肺化饮。故本题选 C。

225.(A2型题)62 患者脘腹痞满，胀痛、痢下赤白，里急后重，舌苔黄腻，脉沉实，治疗应选用

- A.木香槟榔丸
- B.芍药汤
- C.白头翁汤
- D.真人养脏汤
- E.乌梅丸

答案：B

解析：上述症状由湿热壅滞肠中，气血失调

所致。湿热下注大肠，搏结气血，酿为脓血，而为下痢赤白；肠道气机阻滞则脘腹痞满胀痛、里急后重；舌苔黄腻，脉象弦数等俱为湿热内蕴之象。此证属于中焦虚寒、肝脾不和证。治疗应该选择清热燥湿、调气和血的芍药汤。故本题选 B。

226.(B型题)69 蒿芩清胆汤的功效是

- A.和解少阳，内泻热结
- B.和胃降逆，开结除痞
- C.寒热平调，消痞散结
- D.清胆利湿，和胃化痰
- E.理气化痰，清胆和胃

答案：D

解析：蒿芩清胆汤治少阳胆热偏重，兼有湿热痰浊中阻之证。全方具有清胆热、化痰湿、畅气机、和胃气的功效。故 69 选 D。大柴胡汤是小柴胡汤与小承气汤两方加减合成，具有和解和泻下双重功效。故 70 题选 A。

227.(B型题)76 四物汤的功效是

- A.补血调血
- B.健脾养心
- C.敛阴止汗
- D.益气健脾
- E.温补肾阳

答案：A

解析：四君子汤益气健脾，适用于脾胃气虚证。四物汤补血和血，调经化瘀，适用于营血虚滞证。故 75 题选 D，76 题选 A。

228.(A1型题)2 脐穴可分为

- A.十二经穴、天应穴、阿是穴
- B.十二经穴、奇穴、阿是穴
- C.十四经穴、不定穴、阿是穴
- D.十四经穴、奇穴、阿是穴
- E.十二经穴、十四经穴、阿是穴

答案：D

解析：人体腧穴虽多，但不外乎以下三类：人体腧穴凡已归属于十四经系统内的穴位称经穴；在原有经穴之外，陆续增加的一些经验效穴，或是因其位置分散，难以归属某一经脉的称奇穴；临幊上除了定位明确并有一定名称的经穴或经外奇穴外，还可根据压

痛来取穴，称作阿是穴。故本题选 D。

229.(A1型题)5 下列穴组可治疗心、胸、胃疾病的配穴是

- A.公孙、内关
- B.后溪、申脉
- C.足临泣、外关
- D.列缺、照海
- E.膻中、中脘

答案：A

解析：通于冲脉的公孙和通于阴维脉的内关，通合于心、胸、胃，对于气机不利，气逆上冲的心、胃、胸膈的疾患，具有理气降逆，通肠和胃，宣通上下的功效，呕吐、呃逆、胃痛、反胃、噤口痢、干霍乱等，凡适用于上法者，均可取此二穴施治；通于督脉的后溪和通于阳跷脉的申脉，通合于目内眦、颈、项、耳、肩、小肠、膀胱，两穴相配，主治头项、耳、目、肩、腰背疾患；通于阳维脉的外关穴和通于带脉的足临泣，通合于目锐眦、耳后、颈项、肩，二穴配伍，主治耳、目、颈项及肩部病；通于任脉的列缺和通于阴跷脉的照海，通合于肺系、咽喉和胸膈，二穴配伍，主治咳嗽、胸满、咽喉不利等病证；膻中利气，宽胸，催乳，主治哮喘、胸痹、产后乳汁不足等；中脘主治胃部疾患。

故本题选 A。

230.(A1型题)10 下列哪项属于表里经配穴

- A.咳嗽取尺泽、鱼际
- B.感冒取列缺、合谷
- C.膝痛取阳陵泉、阴陵泉
- D.胃痛取中脘、内庭
- E.痛经取地机、隐白

答案：B

解析：列缺为手太阴肺经穴，合谷为手阳明大肠经穴。肺与大肠相表里。故本题选 B。

231.(B型题)18 属远治作用的是

- A.中脘治疗呕吐
- B.承泣治疗眼病
- C.内关既治疗心动过速又可治疗心动过缓
- D.合谷治疗牙痛
- E.阿是穴治疗局部疼痛

答案：D

解析：腧穴的远治作用，主要指分布在十四正经四肢部的穴位通过经脉的联系，对头面躯干和内脏疾病起治疗影响。如合谷如位于手部，它不仅能够治疗手部病证，还可以治疗本经手阳明大肠经循行路过的颈部和头面部的病证。A、B、E 都是近治作用，C 是腧穴的双向调节作用。故 18 题选 D。有些腧穴有特殊的双向调节作用，对机体的不同状态有着双向的良性调节作用，如内关既治疗心动过速又可治疗心动过缓，针刺天枢既可止泻又可通便。故 19 题选 C。

232.(A1型题)12 治疗肺结核阴阳两虚型，应首选

- A.月华丸
- B.泻白散合黛蛤散
- C.百合固金汤
- D.保真汤
- E.补天大造丸

答案：E

解析：肺结核阴阳两虚证治以滋阴补阳，方用补天大造丸。A 多用于肺阴亏损证。B 多用于肝火犯肺证。C 多用于阴虚火旺证。D 多用于气阴亏耗证。故本题选 E。

233.(A1型题)21 患者，男，55岁。患慢性冠状动脉供血不足 5 年。其心电图诊断之一为“ I 度房室传导阻滞(房室传导延缓)”。其心电图表现应为

- A.P 波增宽
- B.P-R 间期延长
- C.QRS 波群时限延长
- D.ST 段延长
- E.Q-T 间期延长

答案：B

解析：I 度房室传导阻滞心电图表现为① P-R 间期  $>0.20$  秒；②每个 P 波后均有 QRS 波群。A 是左房肥大的表现。C 多提示心室肥大、心室内传导阻滞及预激综合征等。D、E 多提示心肌缺血、心室肥大、心肌损害、心室内阻滞等。故本题选 B。

234.(A1型题)25 高血压脑病患者出现脑水肿

征时，治疗应首选

- A.静滴止血药物
- B.补钾
- C.给予镇静药
- D.20%甘露醇快速静滴
- E.鼻管吸氧

答案：D

解析：由高血压脑病引起的脑水肿的主要治疗方法有控制血压、降低颅内压（20%甘露醇或山梨醇静滴、口服甘油等）等。故本题选D。

235.(A1型题)34 局限前壁心肌梗死特征性心电图改变，见于

- A.V 3、V 4、V 5
- B.V 1、V 2、V 3、V 4、V 5
- C.V 1、V 2、V 3
- D.V 5、V 6、V 7、aVL
- E.II、III、aVF

答案：A

解析：局限前壁心肌梗死的心电图改变见于V 3、V 4、V 5。B提示广泛前壁心肌梗死。C提示前间隔心肌梗死。D提示前侧壁心肌梗死。E提示下壁心肌梗死。故本题选A。

236.(A1型题)42 治疗消化性溃疡脾胃虚寒证，应首选

- A.理中丸合黄芪建中汤
- B.一贯煎
- C.化肝煎
- D.失笑散合丹参饮
- E.柴胡疏肝散

答案：A

解析：消化性溃疡脾胃虚寒证治以温中健脾、和胃止痛，方用理中丸和黄芪建中汤。B多用于胃阴亏虚证。C多用于肝胃郁热证。D多用于瘀血阻滞证。E多用于肝气犯胃证。故本题选A。

237.(A1型题)54 治疗鼓胀肝肾阴虚型应首选

- A.柴胡疏肝散
- B.胃苓汤
- C.一贯煎合猪苓汤

D.附子理中汤

E.济生肾气丸

答案：C

解析：鼓胀肝肾阴虚证应治以滋阴降火，育阴利水，方用一贯煎合猪苓汤。A用于治疗气滞湿阻证。B用于治疗脾虚湿盛证。D用于治疗脾肾阳虚证。E治疗肾虚水肿证。故本题选C。

238.(A1型题)63 中医学认为，肾病综合征的主要病因病机

- A.脾肾两虚
- B.肝肾阴虚
- C.肺肾气虚
- D.心脾两虚
- E.气阴两虚

答案：A

解析：肾病综合征属于中医学“水肿”范畴，本病发生，多因素体脾肾亏虚，复感风、寒、湿邪所致，而其反复发作，往往与酒色、饮食、劳累及外感客邪等诱因有关。水肿的病机，主要与肺、脾、肾三脏及三焦对水液代谢功能的失调有关。故本题选A。

239.(A1型题)77 下列各项，不属引起再障主要病因的是

- A.药物
- B.接触化学毒物
- C.病毒感染
- D.饮食不当
- E.电离辐射

答案：D

解析：再障常因各种化学、物理及生物因素对骨髓的毒性作用所致。故本题选D。

240.(A1型题)86 治疗甲状腺功能亢进症心肾阴虚证，应选用

- A.六味地黄汤合黄连阿胶汤
- B.天王补心丹
- C.丹栀逍遥散
- D.消瘰丸
- E.白虎汤

答案：A

解析：甲亢心肾阴虚证治以滋阴降火、养心

散结，方用六味地黄汤合黄连阿胶汤。B 多用于阴虚火旺证。C 用于肝郁血虚而偏于火旺之证。D 用于痰火凝结之瘰疬。E 用于阳明热证。故本题选 A。

241.(A1型题)95 下列哪项不是风湿热诊断标准中的主要表现

- A.发热
- B.心脏炎
- C.多关节炎
- D.舞蹈病
- E.环形红斑

答案：A

解析：风湿热主要表现为关节炎（游走性多关节炎，常对称累及大关节；局部红肿热痛；不遗留关节强直和畸形）；心脏炎（心肌炎、心内膜炎、心包炎）；皮肤病变（皮下结节、皮疹：以环形红斑多见）；舞蹈病（多发于 5~12 岁儿童，女童多见）；其他（偶见风湿性胸膜炎、腹膜炎、肾炎和脉管炎）。次要表现：发热、关节痛、血沉增快或 C 反应蛋白阳性、心电图 P-R 间期延长。故本题选 A。

242.(A2型题)115 患者，男，35岁。低热、乏力、盗汗 2 周，咳嗽、咯血 3 天，疑为肺结核。该病确诊的依据是

- A.结核菌素试验
- B.细菌学检查
- C.血沉
- D.胸部 CT
- E.肺功能

答案：B

解析：痰结核分枝杆菌检查是确诊肺结核的主要方法，也是制定化疗方案和考核治疗效果的主要依据，结核分枝杆菌培养常作为结核病诊断的金标准。A 多应用于检出结核分枝杆菌的感染，而非检出结核病。C 常用于观察结核病的病情变化。D 易发现隐匿的病灶。E 多不用于肺结核。故本题选 B。

243.(A2型题)125 患者，男，65岁。患高血压心脏病 8 年，喘促气短，不能平卧，夜间喘甚，心悸不寐，咳痰清稀量多，形寒肢冷，腰膝酸软，小便不利，舌淡紫苔白腻，脉沉

细而滑。治疗应首选

- A.保元汤合桃红四物汤
- B.参附汤合葶苈大枣泻肺汤
- C.真武汤合五苓散
- D.保元汤合温胆汤
- E.四逆汤合参附龙牡汤

答案：C

解析：喘促气短、不能平卧为心衰的表现。脾阳虚不能温运四肢，故见身寒肢冷。肾阳不足，膀胱气化不行，故尿量少。肾虚腰膝无以温养而腰酸膝软。阳虚水饮无以温化，上泛于肺而见痰清稀量多。舌脉均为脾肾阳虚水泛之佐证。辨证为阳虚水泛证，方用真武汤合五苓散。故本题选 C。

244.(A2型题)131 患者，男，60岁。患冠心病多年，现胸闷疼痛，痰多白黏，纳呆脘胀，形寒肢冷。舌淡红苔白腻，脉弦滑。其证型是

- A.痰瘀痹阻
- B.气阴两虚
- C.气滞血瘀
- D.寒痰痹阻
- E.痰热瘀阻

答案：D

解析：患者年至花甲，阳气亏虚，胸阳不振，寒痰之邪入侵，胸阳被遏，致心脉闭阻而见胸闷疼痛。痰湿内盛，见痰多白黏。阳气失于温煦而见形寒肢冷，寒痰阻滞气机，致脾胃失运而见纳呆脘胀。舌淡红、苔白腻、脉弦滑均为寒痰之证。故辨证为寒痰痹阻证。故本题选 D。

245.(A2型题)138 患者，男，60岁。3年前患急性广泛性前壁心肌梗死，现又见持续剧烈胸痛，甚则心痛彻背，背痛彻心，形寒肢冷，神疲气怯，伴心悸气促，手足青紫厥冷，舌紫暗苔滑润，脉沉细。其治法是

- A.益气养阴，化瘀通络
- B.益气温阳，开痹散寒
- C.温阳泻肺，活血利水
- D.益气温阳，清热祛痰
- E.滋阴逐饮，化瘀通络

答案：B

解析：患者有急性心肌梗死病史，且以剧烈胸痛为主证，中医诊断为真心痛。阳虚之体，胸阳不振，阴寒之邪乘虚侵袭，胸阳被遏，导致心脉闭阻而见胸痛剧烈。阳气不能转行于背，故见心痛彻背、背痛彻心。阳虚故见形寒肢冷、神疲气怯。胸阳被遏而见心悸气促。寒主收引见手足青紫厥冷，舌脉亦为阳虚寒凝之证。辨证为心阳气虚、阴寒凝滞。治以益气温阳、散寒开痹。故本题选 B。

**246.(A2型题)146** 患者，男，65岁。晚期胃癌，形体消瘦，面色白，自汗气短，神疲乏力，头晕心悸，舌淡少苔，脉细弱。治疗应首选

- A.柴胡疏肝散
- B.海藻玉壶汤
- C.膈下逐瘀汤
- D.八珍汤
- E.附子理中汤

答案：D

解析：患者气虚无以固摄敛汗，而见自汗气短；血虚无以濡养四肢、脏腑，见形体消瘦、面色白、神疲乏力、头晕心悸。舌脉均为气血两虚证的表现，辨证为气血两虚，治以补益气血，方用八珍汤。A治疗肝气郁滞证。B治疗瘿瘤初期。C治疗膈下血瘀证。E治疗下焦虚寒证。故本题选 D。

**247.(A2型题)154** 患者，男，50岁。反复浮肿，尿血3年。症见：面色无华，少气乏力，易感冒，午后低热，口干咽燥，舌偏红少苔，脉细。检查：血压140/95mmHg，尿蛋白(++)，定量3g/d，尿红细胞20个/高倍视野，内生肌酐清除率48%。其诊断是

- A.慢性肾炎普通型气阴两虚证
- B.慢性肾炎高血压型气阴两虚证
- C.慢性肾炎肾病型肝肾阴虚证
- D.慢性肾炎普通型肝肾阴虚证
- E.慢性肾盂肾炎肾阴亏虚证

答案：A

解析：患者反复浮肿、尿血3年，且蛋白尿阳性、血压轻度偏高、血尿，故考虑为慢性肾炎普通型。而高血压型血压多为中度偏高。气虚无以推动营血，故见面色无华。气虚卫

外不固，故见易感冒，少气乏力亦为气虚之证。午后低热、口干咽燥、舌脉均为阴虚之证。故辨证为气阴两虚证。故本题选 A。

**248.(A2型题)161** 患者，男，35岁。再生障碍性贫血3年。面色无华，头晕，气短，乏力，动则加剧，舌淡，苔薄白，脉细弱。治疗应首先考虑的方剂是

- A.右归丸合当归补血汤
- B.左归丸、右归丸合当归补血汤
- C.八珍汤
- D.六味地黄丸合桃红四物汤
- E.左归丸合当归补血汤

答案：C

解析：患者血虚濡养不足，而见面色无华、头晕。气虚可见气短、乏力、动则加剧。舌脉均为气血两虚之证，故辨证属于气血两虚型，方用八珍汤补益气血。A多用于肾阳虚兼血虚证。B多用于阴阳两亏伴血虚证。D多用于肝肾阴虚血瘀证。E用于肾阴虚兼血虚证。故本题选 C。

**249.(A2型题)166** 患者，女，27岁。皮肤自发性紫癜反复发作3年。面色白，神疲乏力，头晕心悸，舌淡红苔薄白，脉细弱。治疗应首选

- A.归脾汤
- B.四物汤
- C.茜根散
- D.泻心汤
- E.犀角地黄汤

答案：A

解析：根据患者的症状，可辨证为气血两虚证，治以补气益血，方用归脾汤。B治疗血虚证。C治疗鼻衄不止，心神烦闷证。D治疗邪火内盛证。E治疗热入血分证。故本题选 A。

**250.(B型题)199** 治疗真心痛之气阴亏损、心络瘀阻型，应首选

- A.生脉散合血府逐瘀汤
- B.柴胡疏肝散
- C.参附龙牡汤合桃红饮
- D.当归四逆汤

## E.参附汤合枳实薤白桂枝汤

答案: A

解析:真心痛之阳气虚衰、寒凝心络型,应治以温补肾阳、散寒通络,方用参附汤合枳实薤白桂枝汤。气阴亏损、心络瘀阻型应治以益气养阴、活血通络,方用生脉散合血府逐瘀汤。B多用于肝郁气滞证。C多用于虚阳浮越之痹证。D多用于血虚寒厥证。故198题选E,199题选A。

## 251.(B型题)214 水肿的治疗原则中,“洁净府”是指

- A.逐水
- B.降浊
- C.利尿
- D.通下
- E.发汗

答案: C

解析:内经中提到水肿的治疗原则有洁净府、开鬼门及去菀陈莝。其中“洁净府”意指利尿,“开鬼门”意指发汗,“去菀陈莝”原意为去瘀阻,现意指攻下逐水。故214题选C,215题选E。

## 252.(B型题)227 治疗糖尿病气阴两虚证,应首选

- A.消渴方合玉女煎
- B.生脉散合六味地黄丸
- C.金匮肾气丸
- D.桃红四物汤
- E.生脉散合参附汤

答案: B

解析:糖尿病阴虚热盛证治以清热生津止渴,方用消渴方合玉女煎。气阴两虚证治以补气滋阴,方用生脉散合六味地黄丸。C用于阴阳两虚证。D用于气滞血瘀证。E用于阴阳衰微证。故226题选A,227题选B。

## 253.(A1型题)5 在外科病因辨证中,漫肿喧浮,或游走不定、微热不红、疼痛轻微的,属于

- A.风
- B.火
- C.寒

## D.湿

## E.气

答案: A

解析:风邪致病的特点为其肿喧浮,患部皮色或红或不变,痛无定处,走注甚速,伴恶风、头痛等全身症状。故本题选A。火邪致病多发病迅速,来势猛烈,焮红灼痛,肿处皮薄光亮,疼痛剧烈,容易化脓腐烂或有皮下瘀斑,常伴口渴喜饮,小便短赤,大便干结等。寒邪致病多色紫青暗,不红不热,肿势散漫,痛有定处,得暖则减,化脓迟缓,常伴恶寒、四肢不温、小便清长。湿邪致病多发于身体下部,湿热相兼尤为多见,可流注于下肢或膀胱,湿侵肌肤则可郁结不散,发生湿疮、水疱等损害。因气致病攻痛无常,时感抽掣,喜缓怒甚。

## 254.(A1型题)19 外生殖器部位的皮肤消毒,应采取

- A.2.5%碘酊擦涂
- B.0.75%碘酊擦涂
- C.0.1%洗必泰酊擦涂2次
- D.0.2%洗必泰酊擦涂1次
- E.70%酒精擦涂

答案: C

解析:对婴儿、面部皮肤、口腔、肛门、外生殖器等不能用碘酊消毒处,应选用刺激性小的消毒剂,如0.75%吡咯烷酮碘、2%红汞、0.1%洗必泰或0.1%新洁尔灭溶液涂擦2次。70%酒精多用于植皮时供皮区的消毒。故本题选C。

## 255.(A1型题)28 下列哪项不是输血的适应证

- A.严重感染
- B.大面积烧伤
- C.心力衰竭
- D.凝血功能异常
- E.低蛋白血症

答案: C

解析:输血的适应证包括急性出血、贫血或低蛋白血症、凝血机制异常和出血性疾病、重症感染、器官移植。故本题选C。

## 256.(A1型题)47 急性梗阻性化脓性胆管炎常

见的证型是

- A.气郁
- B.湿热
- C.血瘀
- D.厥脱
- E.气虚

答案：B

解析：急性梗阻性化脓性胆管炎多是由细菌感染引起，表现为湿热证候，如发热恶寒，胁腹疼痛难忍，皮肤黄染，便秘尿赤，舌红苔黄，脉弦数滑等。故本题选B。

257.(A1型题)58 尿路结石气结证的治法是

- A.清热排石
- B.利湿排石
- C.行气排石
- D.祛瘀排石
- E.益肾排石

答案：C

解析：尿路结石气结证治法应为行气通淋排石，可选用金铃子散。故本题选C。

258.(A2型题)72 患者，男，24岁。左口角处肿痛3天。查体：左口角处有一个2cm×15cm的红肿结块，上有一小脓头。其中医诊断是

- A.面部痈
- B.有头疽
- C.面部发颐
- D.锁口疔
- E.痄腮

答案：D

解析：锁口疔是生在口角影响张口的疔，属颜面部疔疮的一种，是由于心脾二经火毒郁发而成，红肿而痛。

259.(A2型题)82 患者，男，45岁。脘腹胀痛，呕吐，停止排便排气60小时。检查：神情淡漠，末梢循环差，腹胀如鼓，全腹压痛、反跳痛及肌紧张，肠鸣音微弱，舌红绛苔黄腻，脉沉细数。应首先考虑的是

- A.肠梗阻瘀结证
- B.肠梗阻疽结证
- C.肠梗阻痞结征

- D.阑尾炎瘀滞证
- E.阑尾炎湿热证

答案：A

解析：肠梗阻症状主要为腹痛、呕吐、腹胀、停止排便排气，其中瘀结证表现为腹痛、腹胀、呕吐、无排气排便，舌红绛苔黄腻，脉沉细数。故本题选A。

260.(A2型题)90 患者，女，21岁。发现右侧乳腺外上象限一单个肿块3个月，呈卵圆形，约4cm×5cm大小，表面光滑，边缘清楚，质地坚韧，易推动，无压痛。应首先考虑的是

- A.急性乳腺炎
- B.乳腺囊性增生病
- C.乳腺纤维腺瘤
- D.乳房结核
- E.乳腺癌

答案：C

解析：乳腺纤维腺瘤肿块较硬，边界清楚，表面光滑，活动度好，无压痛。急性乳腺炎包块边界不清，活动不受限，有明显疼痛。乳腺囊性增生病肿块边界不清，质韧，推之可移，有压痛。乳房结核肿块质硬，边界不清，往往和皮肤有粘连。乳腺癌肿块质硬，活动性差，边界不清。故本题选C。

261.(A2型题)99 患者，男，32岁。阴囊潮红，睾丸肿痛2天，伴发热恶寒，舌红苔黄腻，脉弦数。其治法是

- A.清热利湿，解毒消肿
- B.疏肝解毒，活血散结
- C.疏肝解郁，清热消肿
- D.凉血解毒，活血散结
- E.扶正托毒，散结解毒

答案：A

解析：据患者症状可诊断为睾丸炎湿热下注证，治宜清热利湿，解毒消肿。故本题选A。

262.(A1型题)1 女性外阴发生感染时，最易形成炎症及脓肿的部位是

- A.大阴唇
- B.小阴唇
- C.前庭大腺

D.阴道前庭

E.处女膜

答案: C

解析: 前庭大腺位于阴道口的两侧, 大阴唇的后部, 腺管开口与前庭后方小阴唇与处女膜之间的沟内, 此处容易细菌滋生和存活, 所以一旦女性外阴发生感染时, 细菌容易侵犯腺体导致其形成炎症及脓肿。故本题选 C。

263.(A1型题)12 下列关于子宫内膜周期性变化的描述, 错误的是

A.增生早期

B.增生晚期

C.排卵期

D.分泌期

E.月经期

答案: C

解析: 子宫内膜周期性变化包括增生期、分泌期、月经期。不包括排卵期。故本题选 C。

264.(A1型题)19 下列关于枕前位分娩机制, 判定产程进展的重要标志是

A.衔接

B.下降

C.内旋转

D.俯屈

E.仰伸

答案: B

解析: 由于下降动作贯穿于分娩全过程。下降动作成间歇性, 宫缩时胎头下降, 间歇时胎头又稍退缩。而其他选项均未贯穿分娩全过程。故本题选 B。

265.(A1型题)26 下列各项, 属妊娠剧吐肝胃不和证主要症状的是

A.呕吐血性分泌物

B.呕吐清水

C.呕吐痰涎

D.呕吐食物残渣

E.呕吐酸水或苦水

答案: E

解析: 妊娠剧吐肝胃不和证主要呕吐酸水或苦水。A 为气阴两虚证的表现。B 为脾胃虚弱证的表现。C 为痰湿阻滞证。D 不见于妊

娠呕吐。故本题选 E。

266.(A1型题)37 治疗晚期产后出血, 出血不多时, 应选用

A.刮宫术加抗生素

B.子宫托加大补元煎

C.刮宫术加补中益气汤

D.宫缩剂加抗生素

E.子宫托加补中益气汤

答案: D

解析: 晚期产后出血, 出血不多时宫缩剂加抗生素, 同时给予支持治疗, 补充液体量。故本题选 A。

267.(A1型题)49 下列哪项不是无排卵型功能失调性子宫出血的特征

A.月经周期紊乱

B.经期长短不一, 反复不净

C.经量或多或少, 或少而淋漓

D.基础体温呈单相型

E.宫内膜呈分泌期改变

答案: E

解析: ①阴道流血, 量多或时多时少; ②月经周期紊乱、缩短或正常, 经期长短不一; ③妇检: 子宫、附件无异常, 基础体温呈单相型或黄体不健; ④阴道脱落细胞涂片无排卵的周期性变化; ⑤宫颈黏液结晶呈羊齿状或不典型; ⑥经前或以期子宫内膜检查可见不同程度的增生期变化, 无分泌期改变。故本题选 E。

268.(A1型题)58 治疗黄体萎缩不全阴虚血热证, 应首选黄体酮加

A.补中益气汤

B.两地汤合二至丸

C.当归补血汤

D.四君子汤

E.左归丸合二至丸

答案: B

解析: 黄体萎缩不全阴虚血热证的治疗宜滋阴益肾, 固冲止血。方选两地汤合二至丸。余参见 57 题。故本题选 B。

269.(A1型题)67 治疗闭经气滞血瘀证, 应首

选

- A.血府逐瘀汤
- B.温经汤《妇人良方》
- C.膈下逐瘀汤
- D.少腹逐瘀汤
- E.桂枝茯苓丸

答案：A

解析：治疗闭经气滞血瘀证宜选用血府逐瘀汤理气活血，祛瘀通经。故本题选 A。

270.(A1型题)76 治疗子宫肌瘤瘀热交阻证，

应首选

- A.桂枝茯苓丸
- B.膈下逐瘀汤
- C.参茜固经冲剂
- D.逐瘀止血汤
- E.清海丸

答案：D

解析：子宫肌瘤瘀热交阻证治宜清热利湿，化瘀消癥。方选逐瘀止血汤。故本题选 D。

271.(A2型题)98 患者，女，27岁，已婚。

G1P0。孕36周，1个月前血压正常，近1周双下肢浮肿，伴头晕，眼花，视物不清。血压160/110mmHg，尿蛋白(+)，胎心好。应首选的措施是

- A.积极治疗24~48小时，上述症状不缓解，考虑终止妊娠
- B.积极治疗1周后，考虑终止妊娠
- C.积极治疗等待自然分娩
- D.立即剖宫产
- E.人工破膜及静点催产素引产

答案：A

解析：本病总的治疗目的和原则是防止发生子痫，降低围产儿死亡率，降低母婴严重并发症的发生率。终止妊娠指征：先兆子痫孕妇经积极治疗24~48小时无明显好转，胎龄超过34周；先兆子痫孕妇，胎龄不足34周，胎盘功能减退，胎儿已成熟；子痫控制后2小时，可考虑终止妊娠。故本题选 A。

272.(A2型题)109 患者，女，32岁，已婚。

下腹疼痛反复发作2个月，午后潮热，手足心热，月经量少，舌红，苔薄黄，脉细数。

其中医证型、首选方药是

- A.湿毒壅阻，仙方活命饮
- B.阴虚血热，慢盆方
- C.气滞血瘀，血府逐瘀汤
- D.肝郁化热，丹栀逍遥散
- E.湿热壅阻，银甲丸

答案：B

解析：阴虚血热型证见下腹疼痛反复发作，午后潮热，手足心热，月经量少，舌红，苔薄黄，脉细数。治用慢盆方。故本题选 B。

273.(A2型题)117 患者，女，45岁，已婚。

近3个月月经量多，伴经期小腹胀痛，周期26天，经前乳房胀痛，心烦，舌有瘀斑，苔薄，脉细弦。妇科检查：子宫增大如孕8周大小，表面不规则突起，质硬。其诊断是

- A.月经过多
- B.癥瘕
- C.绝经前后诸证
- D.崩漏
- E.痛经

答案：B

解析：妇女胞中结块，或痛或胀或满或出血者，称为癥瘕。癥者，坚硬不移，痛有定处；瘕者，推之可移，痛无定处。大抵癥属血病，瘕属气病。但气血密切相关，癥瘕亦难分割，故统称为癥瘕。妇科检查发现盆腔有包块，或在子宫，或在附件，也可在宫旁组织间。可兼见月经异常或经期外的不正常出血。必要时借助B超检查或Crr扫描或核磁共振，以了解肿块的部位、大小及性质。故本题选 B。

274.(A2型题)126 患者，女，35岁。葡萄胎刮宫术后5个月，间断有阴道出血，量不多。

术后以工具避孕。现尿妊娠试验(+)，胸片可见两肺中下叶散在多个半透明小图形阴影。应首先考虑的是

- A.葡萄胎
- B.绒毛膜癌
- C.侵蚀性葡萄胎
- D.吸宫不全
- E.妊娠

答案：C

解析：侵蚀性葡萄胎临床表现为①葡萄胎清宫后半年内有不规则阴道出血、咯血、咳嗽、头痛、呕吐、偏瘫等。②阴道壁可见紫蓝色转移结节。③子宫增大、宫旁肿块、卵巢黄素囊肿。④血尿 HCG 水平由低转高，或一度阴性又转阳性。⑤胸部 X 线摄片可见多个棉团样阴影。故本题选 C。

275.(A1型题)2 某药半衰期为 5 小时，1 次用药后从体内基本消除(消除 95%以上)的最短时间是

- A.10 小时左右
- B.1 天左右
- C.2 天左右
- D.5 天左右
- E.10 天左右

答案：B

解析：绝大多数药物都按一级动力学消除，这些药物在体内经过 4~6 个半衰期后，体内药物可基本消除。故本题选 B。

276.(A1型题)7 糖尿病患者不宜选用的利尿药是

- A.呋塞米
- B.氢氯噻嗪
- C.氨苯蝶啶
- D.螺内酯
- E.甘露醇

答案：B

解析：氢氯噻嗪应用后可出现代谢性变化，可引起电解质紊乱、高尿酸血症、高钙血症、糖尿病、高脂血症、肾功能不全等。A 长期应用可出现水和电解质紊乱、高尿酸血症和高氮质血症及耳毒性。C、D 长期应用可出现高血钾、男子乳房女性化和性功能障碍等。E 长期应用可出现水和电解质紊乱、血栓性静脉炎、排尿困难、过敏反应等。故本题选 B。

277.(A1型题)9 可加重变异性心绞痛的药物是

- A.硝苯地平
- B.普萘洛尔
- C.硝酸甘油

- D.哌克昔林
- E.硝酸异山梨醇酯

答案：B

解析：普萘洛尔能明显降低心肌耗氧量及降低后负荷而缓解心绞痛，还能改善缺血区的血流量，可使非缺血区血管阻力增高，促使血液向缺血区低阻力血管流动，常用于稳定型及不稳定型心绞痛的治疗，药物本身可引起心率减慢，故可加重变异性心绞痛。A、D 为钙拮抗药，对冠状动脉痉挛及变异型心绞痛最为有效。C、E 可用于心绞痛急性发作时，可预防及治疗心绞痛。故本题选 B。

278.(A1型题)11 下列关于  $\beta$  受体阻滞药的禁忌证，错误的是

- A.严重左室心功能不全
- B.支气管哮喘
- C.高血压
- D.重度房室传导阻滞
- E.窦性心动过缓

答案：C

解析： $\beta$  受体阻滞药的应用：①心律失常，对过速型心律失常有效；②心绞痛和心肌梗死；③高血压，抑制肾素释放，对抗交感神经系统；④甲亢和甲状腺危象，用于治疗激动不安、心动过速和心律失常等；⑤青光眼，噻吗洛尔可降低眼内压。支气管哮喘、严重左室衰竭及重度房室传导阻滞者禁用。故本题选 C。

279.(B型题)17 连续久服地西泮突然停药出现的焦虑、激动、震颤等症状称之为

- A.耐受性
- B.成瘾性
- C.反跳现象
- D.戒断症状
- E.急性中毒

答案：D

解析：耐受性指药物连续多次应用于人体，其效应逐渐减弱，必须不断地增加用量才能达到原来的效应。成瘾性指某些药物连续多次服用后，身体逐渐对其产生精神上的依赖和病态的嗜好，此时一旦停药，即会出现主观上的严重不适症状。而这里因为停止服药

而出现的不适症状就属于戒断症状。故 16 题选 A，题 17 选 D。

280.(B 型题)21 大剂量应用可致红斑狼疮样综合征的药物是

- A. 卡托普利
- B. 可乐定
- C. 喹唑嗪
- D. 胺屈嗪
- E. 米诺地尔

答案：D

解析：A 适用于各型高血压的治疗，长期应用可出现低血压、头痛、头晕、颜面潮红、乏力、血管神经性水肿、刺激性干咳、高血钾、皮疹、脱发等。B 长期应用可出现口干、瞌睡、头晕、便秘。C 的不良反应有眩晕、疲倦、口干、头痛、恶心。D 服后可出现耐药性及头痛、心悸、恶心等不良反应，长期大剂量使用可引起类风湿性关节炎和红斑狼疮样反应。E 的不良反应有心动过速、多毛症、妇女月经次数增多，结膜充血及血小板计数减少等。故 20 题选 A，21 题选 D。

281.(B 型题)22 用于肝硬化门静脉高压致呕血的药物是

- A. 多巴胺
- B. 间羟胺
- C. 肾上腺素
- D. 去甲肾上腺素
- E. 异丙肾上腺素

答案：D

解析：去甲肾上腺素可用于上消化道出血如肝硬化门静脉高压致呕血，口服，收缩黏膜血管以止血。肾上腺素为治疗过敏性休克（心脏抑制、血压下降、呼吸困难）的首选药，激动  $\alpha$  受体，缩小小动脉和毛细血管，降低通透性；激动  $\beta_1$  受体，改善心动能；激动  $\beta_2$  受体，缓解支气管痉挛和减少过敏介质释放。A、B 主要用于治疗各种休克。E 用于治疗支气管哮喘、房室传导阻滞、心脏骤停、休克。故 22 题选 D，23 题选 C。

282.(B 型题)26 氯丙嗪是

- A. 治疗神经官能症的药物

- B. 治疗精神分裂症的药物
- C. 治疗躁狂症的药物
- D. 治疗抑郁症的药物
- E. 治疗焦虑症的药物

答案：B

解析：氯丙嗪为中枢多巴胺受体的阻断剂，精神病人服用后，在不过分抑制情况下，迅速控制精神分裂病症人的躁狂症状，减少或消除幻觉、妄想，使思维活动及行为趋于正常。丙咪嗪为三环类抗抑郁药，通过阻断脑内神经元突触前膜，抑制中枢对去甲肾上腺素或 5-羟色胺的再摄取，增强了去甲肾上腺素或(和)5-羟色胺的能神经作用，从而改善或消除抑郁状态。故 26 题选 B，27 题选 D。

283.(A1 型题)4 下列各项，不属咯血特点的是

- A. 血内混有食物残渣
- B. 血色鲜红
- C. 多无黑便
- D. 咯血前可有喉部作痒
- E. 有肺结核、肺癌等病史

答案：A

解析：咯血前咽喉痒，胸闷，咳嗽；血色鲜红；除非咽下，否则没有黑便；血中混合泡沫、痰；多有肺系疾病病史。呕血前上腹不适，恶心，呕吐；血色棕黑、暗红；有黑便；血中混有食物残渣；多有消化系疾病病史。故本题选 A。

284.(A1 型题)11 胸骨角连接的部位是

- A. 第一肋骨
- B. 第二肋骨
- C. 第三肋骨
- D. 第四肋骨
- E. 第五肋骨

答案：B

解析：胸骨角为胸骨柄与胸骨体的连接处，其两侧分别与左右第二肋软骨连接。故本题选 B。

285.(A1 型题)18 下列关于血尿素氮的改变及临床意义的叙述，正确的是

- A. 上消化道出血时，血尿素氮减少

- B.大面积烧伤时，血尿素氮减少
- C.严重的肾盂肾炎，血尿素氮减少
- D.血尿素氮对早期肾功能损害的敏感性差
- E.血尿素氮对早期肾功能损害的敏感性强

答案：D

解析：血尿素氮不是反映肾功能损害的早期指标，对早期敏感性差。A、B、C 三项均表现为血尿素氮减少。故本题选 D。

286.(B型题)22 轻度有机磷农药中毒，瞳孔呈

- A.缩小
- B.明显缩小
- C.针尖样大小
- D.显著扩大
- E.大小不等

答案：A

解析：轻度有机磷农药中毒瞳孔可略缩小。中度中毒瞳孔明显缩小。重度中毒瞳孔小于针尖。故 22 题选 A，23 题选 C。

287.(B型题)29 胸部叩诊呈实音的是

- A.肺气肿
- B.大量胸腔积液
- C.气胸
- D.支气管肺炎
- E.肺空洞

答案：B

解析：A 叩诊多呈过清音。B 叩诊呈实音或浊音。C 叩诊多呈鼓音。D 叩诊多见于浊音。E 鼓音、破壶音、空瓮音等。故 28 题选 A，29 选 B。

288.(B型题)34 急性溶血时，可出现的是

- A.淡红色尿
- B.淡黄色尿
- C.酱油色尿
- D.深黄色尿
- E.乳白色尿

答案：C

解析：红细胞在血管内被大量破坏时（即血管内溶血），原本红细胞内的血红蛋白就会游离出来，使血浆内出现大量游离血红蛋白，并从肾脏排出，称为血红蛋白尿，其颜色呈

红葡萄酒色或酱油色。这是急性溶血的证据之一。乳糜尿是丝虫病的主要症状之一，尿色白如牛奶。由于肠道吸收的乳糜液(脂肪皂化后的液体)，不能从正常的淋巴管引流到血循环中去，只能逆流至泌尿系统的淋巴管中，造成泌尿系统中淋巴管内压增高，曲张而破裂使乳糜液溢入尿液中，而出现乳糜尿。故 34 题选 C，35 题选 E。

289.(A1型题)3 诊断病毒性肝炎最可靠的根据是

- A.发病季节
- B.起病方式
- C.症状及体征
- D.接触史
- E.病原学及肝功检查

答案：E

解析：根据临床资料、流行病学资料和实验室检查结果综合判断病毒性肝炎，但以病原体检查为主要标准。故本题选 E。

290.(A1型题)11 下列与传染性非典型肺炎诊断有关的描述，错误的是

- A.疑似诊断病例
- B.临床诊断病例
- C.医学观察病例
- D.重症传染性非典型肺炎
- E.轻型传染性非典型肺炎

答案：E

解析：具有临床症状和出现肺部 X 线影像改变是诊断 SARS 的基本条件。而临床诊断病例、重症传染性非典型肺炎、疑似诊断病例、医学观察病例均与传染性非典型肺炎的诊断有关。故本题选 E。

291.(A1型题)17 霍乱的典型表现是

- A.黏液脓血便
- B.四肢抽搐，顽固性呕吐
- C.皮肤黏膜出血点
- D.发热，盗汗
- E.腹泻，呕吐

答案：E

解析：霍乱的典型表现是剧烈腹泻、继之呕吐，无腹痛和里急后重，严重者出现脱水和

周围循环衰竭。A 见于菌痢。故本题选 E。

**292.(B型题)22 诺氟沙星治疗**

- A.伤寒
- B.血吸虫病
- C.流感
- D.流脑
- E.秋季腹泻

答案：A

解析：流行性脑脊髓膜炎的治疗首选青霉素 G，大剂量， $20\sim40$  万单位/ $\text{kg} \cdot \text{d}$ ，5~7 天。伤寒的治疗以氟喹诺酮类药物为首选。故 21 题选 D，22 题选 A。

**293.(B型题)28 霍乱**

- A.洗肉水样腹泻，伴发热、腹痛，无里急后重
- B.腹泻，黏液脓血样便，伴发热，腹痛，里急后重
- C.腹泻，大便呈果酱状，伴低热，腹痛，无里急后重
- D.腹泻，米泔样大便，无发热，无腹痛及里急后重
- E.发热，脐周痛，腹泻，大便呈水样，有少量黏液

答案：D

解析：霍乱典型表现为无痛性剧烈腹泻，无发热，不伴里急后重，黄色水样、米泔样水便或洗肉水样血便，无粪臭，大便量多次频，先泻后吐，呕吐呈喷射状，次数不多，少有恶心。急性菌痢典型表现为发热、腹痛、腹泻、里急后重及黏液脓血便，左下腹明显压痛。故 27 题选 B，28 题选 D。

**294.(A1型题)41976 年美国学者提出的医患关系基本模式是**

- A.主动-被动型，互相-合作型，平等参与型
- B.主动-合作型，相互-指导型，共同参与型
- C.主动-配合型，指导-合作型，共同参与型
- D.主动-被动型，指导-合作型，共同参与型
- E.主动-被动型，共同参与型，父权主义型

答案：D

解析：1976 年美国学者提出的医患关系基本模式是主动-被动型、指导-合作型、共同

参与型。故本题选 D。

**295.(B型题)17 各级各类卫生防疫机构按照专业分工应**

- A.在必要时可以采取停工、停业、停课等措施
- B.承担本单位及负责地段的传染病预防、控制和疫情管理工作
- C.对甲类传染病疫区实施封锁管理
- D.承担责任范围内的传染病监测管理工作
- E.对违反《中华人民共和国传染病防治法》的行为给予行政处罚

答案：D

解析：各级各类卫生防疫机构应承担责任范围内的传染病监测管理工作。各级各类医疗保健机构设立的预防保健组织或人员应承担本单位及负责地段的传染病预防、控制和疫情管理工作。故 17 题选 D，18 题选 B。

**296.(A1型题)与上牙痛关系最密切的经脉是**

- A.手阳明大肠经
- B.手太阳小肠经
- C.足少阳胆经
- D.足阳明胃经
- E.手少阳三焦经

答案：D

解析：手、足阳明经分别入下齿、上齿。

**297.(A2型题)患者，男，65岁。患背部有头疽月余，局部疮形平塌，根盘散漫，疮色紫滞，溃后脓水稀少，伴有唇燥口干，便艰溲短，舌质红，脉细数。内治应首选的方剂是**

- A.仙方活命饮
- B.竹叶黄芪汤
- C.托里消毒散
- D.知柏地黄汤
- E.清骨散

答案：B

解析：患背部有头疽月余，诊断为有头疽；溃后脓水稀少，伴有唇燥口干，诊断为阴虚火炽证；治法为滋阴生津，清热托毒；方药为竹叶黄芪汤加减。

**298.(B1型题)常用于治疗耳鸣、耳聋、肩肘**

臂酸痛的腧穴是

- A.阳溪
- B.阳池
- C.照海
- D.中渚
- E.支正

答案：D

解析：中渚主治：①头痛、耳鸣、耳聋、目赤、喉痹等头面五官病证。②热病，消渴，疟疾。③肩背肘臂酸痛，手指不能屈伸。阳溪为大肠经腧穴，主治头面五官病证，不用于治疗耳鸣耳聋。阳池为三焦经原穴，常用于治疗消渴、口干等症。支正为小肠经腧穴，常用于治疗头面五官热病等症。

299.(A1型题)下列有关毫针泻法的叙述，错误的是

- A.病人吸气时进针，呼气时出针为泻法
- B.进针时徐徐刺入，少捻转，疾速出针者为泻法
- C.进针时针尖迎着经脉循行来的方向刺入为泻法
- D.出针时摇大针孔而不按为泻法

E.针下得气后，捻转角度大，用力重，频率快，操作时间长为泻法

答案：B

解析：针刺徐疾补泻中，徐而疾则实，进针时徐徐刺入，少捻转，疾速出针者为补法。疾而徐则虚，进针时疾速刺入，多捻转，徐徐出针者为泻法。

300.(A1型题)治疗近视肝肾不足证，应配用的腧穴是

- A.膈俞、气海、太冲、三阴交
- B.心俞、肾俞、太冲、足三里
- C.肝俞、脾俞、太白、三阴交
- D.心俞、脾俞、神门、足三里
- E.肝俞、肾俞、太溪、太冲

答案：E

解析：近视宜调气活血，养肝明目。以局部穴为主，佐以远部穴。心脾两虚配心俞、脾俞、足三里；肝肾不足配肝俞、肾俞、太溪、太冲。