

第一单元

A1/A2 型选择题

1. 维生素 K 缺乏时，不可能出现的实验室结果是(单选)

- A. PT 延长
- B. APTT 延长
- C. CT 延长
- D. FDP 延长
- E. INR 延长

2. 在环境温度 21℃，机体处于安静状态下的主要散热方式是(单选)

- A. 辐射散热
- B. 传导散热
- C. 对流散热
- D. 不感蒸发
- E. 可感蒸发

3. 按照甲类传染病管理的乙类传染病是(单选)

- A. 猩红热
- B. 艾滋病
- C. 登革热
- D. 脊髓灰质炎
- E. 肺炭疽

4. 形成喉结的软骨是(单选)

- A. 小角软骨
- B. 会厌软骨
- C. 甲状软骨
- D. 环状软骨
- E. 气管软骨环

5. “如芝兰之室，久闻而不知其香”说明(单选)

- A. 感觉互相作用
- B. 感觉适应
- C. 感觉过敏
- D. 感觉减退
- E. 感觉补偿

6. 下列属于补体系统缺陷导致的疾病是(单选)

- A. 急性肾小球肾炎
- B. 过敏性休克
- C. 接触性皮炎
- D. 遗传性血管神经性水肿

E. 桥本甲状腺炎

7. 合成血红素的关键酶是(单选)

- A. ALA 合酶
- B. 葡萄糖激酶
- C. 丙酮酸激酶
- D. HMG-CoA 裂解酶
- E. 异柠檬酸脱氢酶

8. 糖、脂质和氨基酸彻底氧化的共同途径是(单选)

- A. 三羧酸循环
- B. 甲硫氨酸循环
- C. 柠檬酸-丙酮酸
- D. 葡萄糖丙氨酸循环
- E. 鸟氨酸循环

9. 医护人员中特别是护理人员最常出现的安全事件是(单选)

- A. 生物伤害
- B. 化学伤害
- C. 电离辐射
- D. 锐器伤
- E. 脊柱、关节外伤

10. 为描述新型冠状病毒肺炎患者职业构成比例的情况，宜选用的统计图是(单选)

- A. 直条图
- B. 圆图
- C. 散点图
- D. 直方图
- E. 线图

11. 健康管理的首要步骤一般是(单选)

- A. 预防危害健康风险
- B. 收集健康信息
- C. 制订完善的健康计划
- D. 疾病危险度评估
- E. 健康维护计划的实施

12. 描述爆发疫情严重性的最佳指标是(单选)

- A. 死亡率
- B. 续发人数
- C. 发病人数
- D. 罹患率
- E. 患病人数

13. 医务人员在长期的医学道德实践中形成和表现出来的稳定心理状态是(单选)

- A. 医德评价
- B. 医德教育
- C. 医德品质
- D. 医德辩护
- E. 医德修养

14. 机体感染病毒由局部向全身扩散的方式不包括(单选)

- A. 血行播散
- B. 淋巴道转移
- C. 免疫系统
- D. 神经系统
- E. 经组织间隙

15. 不存在于人体蛋白质分子中的氨基酸是(单选)

- A. 鸟氨酸
- B. 半胱氨酸
- C. 亮氨酸
- D. 谷氨酸
- E. 甘氨酸

16. 属于鸟氨酸循环中间产物的氨基酸是(单选)

- A. 丙氨酸
- B. 组氨酸
- C. 谷氨酸
- D. 甲硫氨酸
- E. 精氨酸

17. 月经周期中, 促进卵泡发育成熟的主要激素是(单选)

- A. 卵泡刺激素
- B. HCG
- C. 黄体生成素
- D. 雌激素
- E. 孕激素

18. 急性缺血时不易出现下列哪些表现(单选)

- A. 冠脉扩张
- B. 肺血管收缩
- C. 脑血管收缩
- D. 皮肤毛细血管收缩
- E. 肾血管收缩

19. 穿过食管膈肌裂孔的是(单选)

- A. 内脏大神经
- B. 内脏小神经
- C. 迷走神经
- D. 交感干
- E. 膈神经

20. 不呈现 MHC1 类分子的细胞是(单选)

- A. B 细胞
- B. 树突细胞
- C. 红细胞
- D. T 细胞
- E. NK 细胞

21. 新冠肺炎密切接触者应如何处理(单选)

- A. 早治疗
- B. 居家隔离
- C. 预防性用药
- D. 留验
- E. 疫苗

22. 肾癌的典型肉眼特征是(单选)

- A. 肾组织切面呈灰白、鱼肉状
- B. 在肾上极, 有包膜
- C. 切面金黄色、彩色
- D. 在肾中央
- E. 双肾累及, 有多个癌肿块

23. 下列哪项不是腹膜内位器官(单选)

- A. 十二指肠降部
- B. 回肠
- C. 乙状结肠
- D. 阑尾
- E. 横结肠

24. 控制阴茎癌最主要的措施是以下哪项(单选)

- A. 体重控制
- B. 烟酒控制
- C. 控制血糖
- D. 注意卫生
- E. 尽早行包皮环切术

25. 正常人白天工作时的脑电波(单选)

2020 年临床执业历年真题

- A. α 波
B. β 波
C. γ 波
D. θ 波
E. δ 波
26. 临终关怀最重要的目的是(单选)
A. 提高临终患者生命质量
B. 促进患者死亡
C. 延长患者生命时间
D. 减轻患者家庭经济负担
E. 节约医疗卫生资源
27. 流行性乙型脑炎的传播途径是(单选)
A. 性接触传播
B. 眼结膜接触传播
C. 呼吸道传播
D. 虫媒传播
E. 消化道传播
28. 胰体前方的器官(单选)
A. 胃后壁
B. 腹主动脉
C. 下腔静脉
D. 肝静脉
E. 肝总管
29. 促红细胞生成素, 促进红细胞增殖和分化的主要靶细胞是(单选)
A. 造血干细胞
B. 幼红细胞
C. 早期红系祖细胞
D. 网织红细胞
E. 晚期红系祖细胞
30. 职业中毒诊断十分重要的诊断是(单选)
A. 职业史
B. 临床症状
C. 辅助检查
D. 调研
E. 社会调查
31. 医患沟通的基本信念(单选)
A. 尊重和理解
B. 共同参与
C. 信托关系
D. 同情换位
E. 主动至上
32. 预防感染和治疗局部感染使用抗菌药物首先遵循的原则(单选)
A. 使用非限制使用级抗生素
B. 使用限制使用级抗生素
C. 使用不易产生耐药性的抗生素
D. 使用特殊限制使用级抗生素
E. 使用耐药性强抗生素
33. 艾滋病患者不应承担的义务(单选)
A. 接受疾控中心的流行病学调查
B. 告知性伴侣
C. 告知经治医师
D. 应当被医疗机构当试验性研究对象
E. 采取必要防护措施
34. 以下不属于心身疾病的是(单选)
A. 心境障碍
B. 原发性高血压病
C. 神经性皮炎
D. 消化性溃疡
E. 糖尿病
35. 肾性急性肾衰竭的最常见原因是(单选)
A. 急性肾炎
B. 急性间质性肾炎
C. 急进性肾炎
D. 急性肾小管损伤
E. 肾动脉栓塞
36. 流行病学研究中, 由因到果的研究是(单选)
A. 队列研究
B. 临床试验
C. 病例对照研究
D. 社区试验研究
E. 现况研究
37. 影响血红素合成的关键酶相关维生素的是(单选)
A. 维生素 A
B. 维生素 B1
C. 维生素 B6
D. 维生素 B12
E. 维生素 C

2020 年临床执业历年真题

38. 形成 Na^+ 、 K^+ 在细胞内外不均衡分布的原因是(单选)
- A. 安静时 K^+ 比 Na^+ 更易通过细胞膜
 - B. 兴奋时 Na^+ 比 K^+ 更易通过细胞膜
 - C. K^+ 的不断外流和 Na^+ 的不断内流
 - D. 膜上载体和通道蛋白的共同作用
 - E. 膜上 Na^+-K^+ 依赖式 ATP 酶的活动
39. 富含无机盐水溶性维生素和膳食纤维的食物是(单选)
- A. 谷类
 - B. 肉
 - C. 奶制品
 - D. 蛋
 - E. 蔬菜
40. 糖尿病酮症酸中毒烂苹果味, 气味来源是什么(单选)
- A. 乙酰乙酸
 - B. β 羟丁酸
 - C. 丙酮酸
 - D. 丙酮
 - E. 乳酸
41. 不符合卫生资源分配的原则是(单选)
- A. 以公平性为核心原则
 - B. 以利益的最大化
 - C. 重点倾斜并兼顾全局原则
 - D. 效益最大化原则
 - E. 多社会发展相适应原则
42. 一位符合安乐死条件的病人, 医生使用药物结束其痛苦的生命, 称为(单选)
- A. 强迫安乐死
 - B. 医助安乐死
 - C. 自杀安乐死
 - D. 主动安乐死
 - E. 被动安乐死
43. 临床场所实施化学预防的对象是(单选)
- A. 有既往病史的患者
 - B. 已经康复的患者
 - C. 出现症状的患者
 - D. 无症状的患者
 - E. 正在治疗的患者
44. 病理表现为中性粒细胞反应的肉芽肿疾病(单选)
- A. 组织细胞性坏死性淋巴结炎
 - B. 猫抓病
 - C. 反应性淋巴结炎
 - D. 结核
 - E. 结节病
45. 下列不属于涉及人的生物医学研究伦理原则的有(单选)
- A. 有偿服务
 - B. 知情同意
 - C. 伦理审查
 - D. 医学目的
 - E. 维护受试者利益
46. 阻断神经受体与乙酰胆碱受体结合的是(单选)
- A. 新斯的明
 - B. α -银环蛇毒
 - C. 阿托品
 - D. 有机磷农药
 - E. 酚妥拉明
47. 目前我国提倡的活体供体器官获取的方式是(单选)
- A. 自由买卖
 - B. 指定同意
 - C. 自愿捐献
 - D. 家属决定
 - E. 医生强制
48. 可导致人体内生物转化能力下降的主要因素(单选)
- A. 高脂肪饮食
 - B. 高糖饮食
 - C. 肝功能减退
 - D. 心肌缺血
 - E. 轻度肥胖
49. 急性早幼粒的出血机制是(单选)
- A. 白细胞减少
 - B. 免疫缺陷
 - C. DIC
 - D. 肝脏衰竭
 - E. 红细胞破坏增多
50. 一个人面对一个人进行的调查的方法, 属于心理评估的哪种方法(单

2020 年临床执业历年真题

选)

- A. 调查法
- B. 观察法
- C. 会谈法
- D. 作品分析法
- E. 心理测量法

51. 针对职业病中毒的诊断, 前提条件(单选)

- A. 实验室检查
- B. 职业史
- C. 调研
- D. 社会调查
- E. 体格检查

52. 安乐死的伦理意义(单选)

- A. 是医学人道主义的重要发展
- B. 生命质量论
- C. 生命价值论
- D. 人类控制死亡过程的重要手段
- E. 患者有尊严、有质量的度过临终阶段

53. 人体内氨的去向(单选)

- A. 氨基酸
- B. 尿素
- C. 血液
- D. 肠道细菌分解
- E. 合成谷氨酰胺和天冬酰胺

54. 医师在执业活动中违反卫生行政规章制度未造成严重后果的, 卫生行政部门可以责令其暂停一定期限的执业活动, 该期限是(单选)

- A. 1 年以上 1 年半以下
- B. 3 个月以上 6 个月以下
- C. 1 个月以上 3 个月以下
- D. 2 年以上 3 年以下
- E. 6 个月以上 1 年以下

55. 对使用未取得第一类精神药品处方资格擅自开具该类药品处方的医师, 尚未造成严重后果的机构, 应当给予的行政处罚是(单选)

- A. 吊销医师执业证书
- B. 没收违法所得
- C. 警告、暂停其执业活动
- D. 罚款
- E. 限制其处方权

56. 取得执业助理医师执业证书后, 具有高等学校医学专科学历的, 可以在医疗、预防、保健机构中工作满一定年限后报考执业医师资格考试, 该年限是(单选)

- A. 3 年
- B. 5 年
- C. 1 年
- D. 4 年
- E. 2 年

57. 临床预防服务的特点是(单选)

- A. 重点是影响健康的因素与人群健康的关系
- B. 三级预防
- C. 目前治疗疾病、促进康复
- D. 是医学的一门基础学科
- E. 服务对象是健康人和无患者症状

58. 促进卵泡发育成熟的主要激素是什么(单选)

- A. 卵泡刺激素
- B. HCG
- C. 黄体生成素
- D. 雌激素
- E. 孕激素

59. 金黄色葡萄球菌产生凝固酶的作用不包括(单选)

- A. 抗胞内消化
- B. 可导致扩散
- C. 抗吞噬
- D. 特异识别
- E. 保护病菌不受破坏

60. 下列与死腔样通气描述不符合的是(单选)

- A. 正常肺泡通气血流比值降低
- B. 病变肺泡通气血流比值大于 0.8
- C. PaCO₂ 分压升高
- D. PaO₂ 分压降低
- E. 动脉血氧含量降低

61. 男, 26 岁, 腰痛、低热、进行性加重、体格检查:L1 棘突压痛, 叩击痛(+), X 线:骨质破坏, 抗酸染色(+), 需要进一步病原体亚基培养, 请问该亚基应是(单选)

2020 年临床执业历年真题

- A. 罗氏培养基
- B. 巧克力培养基
- C. 沙保弱培养基
- D. S·S 培养基
- E. 血平板培养基

62. 桡骨小头半脱位损伤的韧带主要是(单选)

- A. 环状韧带
- B. 桡侧副韧带
- C. 尺侧副韧带
- D. 前交叉韧带
- E. 孟肱韧带

63. 正常成年人一周中等强度的总运动时间是多少分钟(单选)

- A. 60 分钟
- B. 90 分钟
- C. 120 分钟
- D. 150 分钟
- E. 200 分钟

64. 医院获得性肺炎中,病原体进入肺组织引发肺炎最主要的感染途径是(单选)

- A. 飞沫(气溶胶)吸入
- B. 自身感染
- C. 交叉感染
- D. 医疗器械侵入性感染
- E. 胃食管反流误吸

65. 甲状腺癌最常见和预后最好的是(单选)

- A. 乳头状癌
- B. 滤泡癌
- C. 髓样癌
- D. 未分化癌
- E. 导管癌

66. 属于非特异性免疫的是(单选)

- A. 胎盘屏障
- B. 胃肠道 IgG
- C. 脑脊液 IgM
- D. T 淋巴细胞
- E. 血 IgA

67. 为防止乙肝病毒携带者在入学时受歧视,国务院废除了入学检测“乙肝五项的检查”明确规定禁止将携带

乙肝病毒作为入学的限制条件,体现的传染病防控伦理是(单选)

- A. 以公共利益为重
- B. 尊重传染病患者的人权和尊严
- C. 进行传染病防治的宣传
- D. 早发现早治疗
- E. 进行监测与上报

68. 男,14岁,一周前“上感”自服青霉素后症状消失,近两天少尿,双下肢水肿,实验室检查:血 Cr185 μ mol/L,尿蛋白++,RBC25~30/Hp,引起此病的是(单选)

- A. 遗传因素所致
- B. 药物所致
- C. 病毒感染所致
- D. 链球菌感染所致
- E. 免疫复合物沉积引起体液免疫反应

69. 女,25岁,腹泻,腹痛半个月,大便可见大量油性物质,胃镜检查发现十二指肠降部多发溃疡,基础胃酸分泌量 12mmol/h(参考值 1~5mmol/h)血清促胃液素 1145.7pg/ml(参考值 50~150pg/ml),出现脂肪泻的原因是(单选)

- A. 小肠液分泌不足
- B. 胰液分泌不足
- C. 胆盐微胶粒群聚
- D. 胆汁分泌不足
- E. 胰脂肪酶失活

70. 女,打算终身不结婚,去医疗机构做胚胎移植,医疗机构拒绝了患者的要求,符合的伦理要求是(单选)

- A. 保护后代原则
- B. 社会公益原则
- C. 知情同意原则
- D. 不伤害原则
- E. 公平公正原则

71. 医疗机构根据《药品不良反应管理办法》,对已知新的,严重的不良反应上报时限是(单选)

- A. 15 日
- B. 7 日
- C. 3 日
- D. 5 日
- E. 10 日

72. 金属冶炼厂附近幼儿园, 大班 10 名小朋友, 出现头晕、腹痛, 血红蛋白降低, 最可能的原因是(单选)

- A. 镉中毒
- B. 砷中毒
- C. 苯中毒
- D. 汞中毒
- E. 铅中毒

73. 某市为调查老年人疫苗接种率, 根据经济发达程度将区域分为发达、中等、落后, 按 1/10 比例抽样, 该抽样方式是(单选)

- A. 分层抽样
- B. 系统抽样
- C. 单纯随机抽样
- D. 整群抽样
- E. 随机抽样

74. 男, 55 岁。早期肝癌患者, 微创术后, 愈合良好, 他认为局部癌组织已切除, 不要再想着自己是癌症患者, 应坦然地面对生活, 该患者应对心理应激的方法是(单选)

- A. 提高自身应对能力
- B. 调整对事件认知
- C. 增加可控性和可预测性
- D. 接受心理治疗的帮助
- E. 采用心理防御机制

75. 因抢救危急患者, 未能及时书写病历的, 有关医务人员应当在抢救结束后据实补记, 并加以注明, 其时限是(单选)

- A. 2 小时内
- B. 4 小时内
- C. 6 小时内
- D. 8 小时内
- E. 12 小时内

76. 男, 上睑下垂, 医师精心治好后, 记者和医生联系把这个病人的诊疗情况和个人信息登载报纸上。该医生违背的原则是(单选)

- A. 社会公益
- B. 个人利益
- C. 态度严谨
- D. 保密原则

E. 公平公正

77. 女, 22 岁, 到国外读取硕士, 刚到国外半年的时候因为语言不通, 生活习惯不同等原因, 心里面不适合, 她属于哪种应激源(单选)

- A. 社会性应激源
- B. 躯体性应激源
- C. 文化性应激源
- D. 职业性应激源
- E. 心理性应激源

78. 某战士参加抗洪救灾时, 接到家里电话, 得知母亲病危, 十分焦虑, 她在电话中哭着对父亲说“自古忠孝不能两全”这位战士的动机冲突属于(单选)

- A. 趋避冲突
- B. 双避冲突
- C. 多重趋避冲突
- D. 双趋冲突
- E. 双重趋避冲突

79. 男, 17 岁, 高三考生, 因考试焦虑, 医师张某是其家属朋友, 请求治疗, 医师遂予以治疗。该医师违背了什么原则(单选)

- A. 尊重
- B. 同情
- C. 回避
- D. 不伤害
- E. 中立

80. 男, 51 岁, 烧伤半小时。体温 36.2℃, 心率 112 次/分, 血压 85/60mmHg, 呼吸 24 次/分, 痛苦貌, 神志清, 全身二度烧伤达 50%。休克的主要原因是(单选)

- A. 低血容量和疼痛
- B. 过敏和继发感染
- C. 继发感染
- D. 心输出量减少
- E. 组织坏死

81. 男, 65 岁, 胃大部切除术需备血 1200ml, 主治医师填写申请单后由上级医师签字后交血液科, 被拒。理由为缺标准程序。执行该程序的审批者是(单选)

2020 年临床执业历年真题

- A. 质量控制办公室主任
- B. 输血委员会主任
- C. 住院总医生
- D. 医务科长
- E. 科主任

82. 男, 59 岁。左肾结石 10 年, B 超右肾中下极一低回声包块, 肾穿刺病理结果回报透明细胞癌。现拟施行右肾部分切除术, 手术中缝合的结构是(单选)

- A. 纤维囊
- B. 肾前筋膜
- C. 肾后筋膜
- D. 脂肪囊
- E. 肌膜

83. 男, 55 岁。呕血 30 分钟, 晕厥 1 次, 病前 1 小时进食, 慢性乙型肝炎病史 10 年, 巩膜黄染可见肝掌, 蜘蛛痣, 心肺未见明显异常, 腹软, 无压痛, 肝肋下未触及, 脾肋下 3cm, 肠鸣音 10 次/分。肝脏穿刺进行活检的特征性病变是(单选)

- A. 肝细胞异型增生
- B. 汇管区炎细胞浸润
- C. 小胆管增生
- D. 假小叶形成
- E. 肝细胞坏死

84. 李某欲以生病为理由请假外出旅游, 给医师刘某打电话请求为自己开病假条, 刘某开具病毒性心肌炎全休一个月的诊断证明书。对于医师刘某的行为, 县级卫生行政部门给与的处罚

- A. 考核不合格
- B. 罚款
- C. 调离医师岗位
- D. 行政纪律处分
- E. 警告, 责令暂停执业 6 个月~1 年

85. 男, 70 岁。右侧肢体动作迟缓伴震颤半年, 查体右侧肢体静止性震颤, 肌张力齿轮样增高, 病变可能的部位是(单选)

- A. 黑质
- B. 苍白球内侧
- C. 外侧苍白球

- D. 大脑皮质
- E. 新纹状体

86. 女, 50 岁。呕吐鲜血 4 小时, 呕吐量 500ml, 既往乙肝病史 20 年, 血压 BP96/62mmHg, 颈部有蜘蛛痣, 腹部无压痛、反跳痛。与消化道出血最相关结构是(单选)

- A. 肠系膜上静脉
- B. 肠系膜下静脉
- C. 直肠静脉丛
- D. 食管静脉丛
- E. 脐部静脉丛

87. 男, 40 岁。平时乐于交际, 宽以待人, 友好相处, 不卑不亢, 符合心理健康的标准是

- A. 适应环境
- B. 情绪良好
- C. 智力正常
- D. 人格完美
- E. 人际和谐

88. 女, 44 岁。因和丈夫离婚后情绪低落, 失眠一周, 去看医生, 就诊后医生给她开了二类精神药。这种医患关系模式是(单选)

- A. 共同参与
- B. 主动-被动
- C. 指导-合作
- D. 主导-合作
- E. 主动-合作

89. 男, 43 岁。阵发性胸痛 1 年, 多于凌晨睡眠或刚起床时发作胸痛, 每次持续 10 分钟左右, 含硝酸甘油可缓解, 最后诊断(单选)

- A. 稳定型心绞痛
- B. 恶化型心绞痛
- C. 变异型心绞痛
- D. 不稳定型心绞痛
- E. 初发型心绞痛

90. 女, 28 岁, 头晕, 乏力 3 个月, 既往有风湿病病史, 查体贫血貌, 巩膜轻度黄染, 脾肋下 3cm, 血常规 HB80g/L, WBC $8.8 \times 10^9/L$, Rtc0.12, coombs(+), 最可能的诊断(单选)

- A. 阵发性睡眠血红蛋白尿症

2020 年临床执业历年真题

- B. 地中海贫血
- C. 自身免疫性贫血
- D. 遗传性球形红细胞增多症
- E. 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症

91. 男, 48 岁。建筑工人下午 3 时于露天工作中发现大汗、头痛、腹痛, 呕吐, 抽搐, 无尿便失禁、流涎吐白沫、当日天气闷热气温 38℃。既往体健。查体:T40℃, 血压 140/80mmHg, 浅昏迷, 多汗, 唇无发绀, 双侧瞳孔等大等圆, 对光反射灵敏, 直径约 3mm, 双肺未闻及干湿性啰音, 心率 126 次/分, 四肢无活动障碍, 急诊头颅 CT 未见异常。最可能诊断(单选)

- A. 热衰竭
- B. 热射病
- C. 热痉挛
- D. 癫痫发作
- E. 蛛网膜下腔出血

92. 女 58 岁, 呼吸困难, 胸痛。查体: 血压 120/90mmHg, 胸骨右缘第二肋间听到收缩期喷射样杂音, 其病理特点是(单选)

- A. 主动脉瓣缩窄和粘连
- B. 主动脉瓣增厚和卷曲
- C. 肺动脉瓣缩窄和粘连
- D. 肺动脉瓣增厚和卷曲
- E. 三尖瓣增厚和卷曲

93. 患者, 女, 84 岁, 慢性阻塞性肺疾病 30 年突发意识障碍入院, 有高血压、心力衰竭等并发症, 医生通过全力抢救, 但患者没有治愈希望, 医生与患者家属进行沟通。患者家属认为没有救治的可能, 不如减轻患者痛苦, 给与临终关怀。患者家属的这种心理体现了(单选)

- A. 提高临终患者生命质量
- B. 促进患者死亡
- C. 延长患者生命时间
- D. 减轻患者家庭经济负担
- E. 节约医疗卫生资源

94. 男, 45 岁, 全身不适, 发热厌食恶心半个月, 既往毒品注射史, 查体: 全身多处淋巴结肿大, 口腔毛状白斑, 血 WBC $2.5 \times 10^9/L$, 尿蛋白(+), 首先

检测的指标是(单选)

- A. 登革热病毒抗体
- B. 抗 HIV 免疫缺陷抗体
- C. 汉坦病毒
- D. 乙型肝炎病毒
- E. 埃博拉病毒

95. 男, 45 岁。发热、头痛 3 天, 于 1 月 15 日就诊, 查体:T38.8℃, P116 次/分, BP80/50mmHg, 神志清楚, 腋下皮肤散在出血点, 颈无抵抗, 克尼格征阴性, 血常规:Hb175g/L, WBC $15 \times 10^9/L$, N0.7, L0.13, 异型淋巴细胞 0.17, Plt $56 \times 10^9/L$, 尿蛋白(+++)。最可能的诊断是(单选)

- A. 流行性乙型脑炎
- B. 肾综合征出血热
- C. 流行性脑脊髓膜炎
- D. 化脓性脑膜炎
- E. 结核性脑膜炎

96. 老年, 63 岁, 排便时突发剧烈胸痛, 入院急查心电图示前壁、下壁心肌梗死, 脉搏 40 次/分, 2 小时后查心电图, P 波规律, 103 次/分, QRS 波群正常, 40 次/分, 传导系统中可能发生异常的位置为(单选)

- A. 窦房结
- B. 节间束
- C. 房室结
- D. 左束支
- E. 蒲肯野纤维

97. 男, 32 岁。运动中右前臂受伤 3 小时, 查体右前臂局部肿胀, 压痛, 活动障碍右小指不能弯曲, 浅感觉障碍, 可能损伤的神经是(单选)

- A. 腋神经
- B. 桡神经
- C. 正中神经
- D. 肌皮神经
- E. 尺神经

98. 男, 18 岁, 自服乐果, 呕吐、流涎、昏迷来院, 查瞳孔缩小, 肌肉震颤, 呼吸困难, 该病人发病机制是(单选)

- A. 抑制乙酰胆碱酯酶使乙酰胆碱堆积
- B. 抑制糖代谢引起低血糖
- C. 刺激迷走神经

- D. 呼吸抑制酸中毒
- E. 呼吸困难氧呼吸不足

99. 女, 40 岁, 接触性阴道流血, 妇科检查宫颈呈糜烂样改变, 病理活检可见异形细胞局限宫颈上皮的下 1/3 黏膜下炎细胞浸润, 最可能得(单选)

- A. 微小浸润癌
- B. 慢性弥漫性宫颈炎
- C. 宫颈高鳞状上皮病变
- D. 宫颈低鳞状上皮病变
- E. 慢性宫颈炎伴鳞状上皮化生

100. 男, 50 岁, 呼吸困难, 胸痛, 发热 5 天, 经医疗机构确诊为乙类传染病, 卫生防御部门按甲类传染病防控的是(单选)

- A. 鼠疫
- B. 肺结核
- C. 肺炭疽
- D. 流行性斑疹
- E. 流行性感冒

101. 患者男, 76 岁, 晨起右半身体麻木伴痛觉缺失 1 小时, 高血压 20 年, 查体: 右侧偏身感觉减退伴轻度自发疼痛, 四肢肌张力正常, 病变最可能累及的部位是(单选)

- A. 前庭小脑
- B. 背侧丘脑
- C. 底丘脑
- D. 大脑皮质
- E. 基底神经节

102. 男, 70 岁, 被诊断为抑郁障碍。某天得知其一位老朋友是心理治疗师, 心想熟人好办事, 遂向其求助, 但却遭到了拒绝, 该心理治疗师拒绝提供服务所依据的心理治疗原则为

- A. 回避原则
- B. 中立原则
- C. 真诚原则
- D. 耐心原则
- E. 保密原则

103. 女, 45 岁, 全身无力 2 天, 加重 1 天, 发音不出, 不能张口。呼吸困难。第二天医治无效死亡, 家中 3 人也有类似症状, 根据流行病学判断, 都吃

了家中自制的酱豆腐, 高度怀疑致病菌是(单选)

- A. 肉毒素
- B. 痉挛毒素
- C. 肠毒素
- D. 神经性毒素
- E. 溶血素 A

104. 女, 39 岁, 急性胃肠炎, 静脉输液 3 小时, 突发呼吸困难, 咳粉红色泡沫痰, 20 年的风湿热病史, 心悸气短发作 8 年, 近半年加重。查体: 端坐呼吸双肺布满中小水泡音, 以及哮鸣音, 发病机制为(单选)

- A. 肺组织间液渗透压增高
- B. 肺毛细血管流体静压增高
- C. 血浆胶体渗透压下降
- D. 肺淋巴液回流受阻
- E. 肺部微血管壁通透性增加

105. 肥胖患者为了控制血糖, 在医生的建议下准备和营养师一起制定一份饮食计划, 她虽然知道饮食控制的好处, 但总认为无法管住自己, 计划难以实施, 对于这样的患者, 干预的重点是(单选)

- A. 提高自我效能
- B. 培养行为能力
- C. 提高结果预期
- D. 提高社会支持
- E. 建立支持性环境

106. 患有躯体疾病的病人出现抑郁, 压抑, 想自杀的状况反应的角色行为是(单选)

- A. 强化
- B. 冲突
- C. 缺如
- D. 减退
- E. 异常

107. 女 40 岁, 离异后情绪低落, 失眠, 主治医师开二类精神处方进行治疗, 处方依法保存的期限, 该药品处方的保存时间至少是(单选)

- A. 1 年
- B. 2 年
- C. 3 年
- D. 5 年

E. 10 年

108. 女, 55 岁, 体检发现颈部包块 3 天, 查体: 生命体征平稳, 甲状腺左叶结节质地较硬, 活动欠佳, 降钙素轻度升高, 甲状腺功能正常, B 超引导下穿刺见增生细胞弥漫分布, 异型性明显, 间质见淀粉样物质沉淀, 病理分型(单选)

- A. 单纯性甲状腺肿
- B. 甲状腺瘤
- C. 甲状腺滤泡细胞癌
- D. 桥本甲状腺炎
- E. 甲状腺髓样癌

A3/A4 型选择题

(109~110 题共用题干)

男性, 70 岁, 尿频、尿急、尿痛, 直肠指诊, 前列腺增大, 中间沟消失, B 超大小约 5.4×4.3cm, PSA2.4ng, 尿液流速 9ml/s, 残余量 40ml。

109. 最可能的诊断是(单选)

- A. 良性前列腺增生
- B. 前列腺癌
- C. 膀胱颈挛缩
- D. 尿道狭窄
- E. 神经源性膀胱功能障碍

110. 首选的治疗方案是(单选)

- A. 膀胱造瘘
- B. 经尿道前列腺切除术
- C. 膀胱切除
- D. α 受体阻断剂治疗
- E. 前列腺切除根治术

B1 型选择题

(111~112 题共用备选答案)

- A. 共同付费
- B. 起付线
- C. 封底线
- D. 封顶线
- E. 自付线

111. 医疗保险设置了支付最高限额, 高出的由被保险人承担(单选)

112. 医疗保险设定了支付的最低标准, 低了由患者(单选)

(113~115 题共用备选答案)

- A. 神经根型颈椎病
- B. 肩关节脱位
- C. 桡骨远端骨折
- D. 儿童锁骨青枝骨折
- E. 桡骨头半脱位

113. 仅用三角巾悬吊法进行治疗的是(单选)

114. 首选悬吊牵引治疗的是(单选)

115. 首选手法复位石膏固定进行治疗的是(单选)

(116~118 题共用备选答案)

- A. 慢性失血性贫血
- B. VB12 缺乏性贫血
- C. 叶酸缺乏性贫血
- D. 骨髓增生异常综合征
- E. 再生障碍性贫血

116. 属于小细胞低色素性贫血的是(单选)

117. 属于正细胞性贫血的是(单选)

118. 骨髓异常增生病态造血是(单选)

第二单元

A1/A2 型选择题

1. 肾病综合征最常见的并发症是

- A. 低钠低钾、低钙血症
- B. 高凝状态及血栓形成
- C. 呼吸道感染
- D. 低血容量性休克
- E. 急性肾功能不全

2. 右心衰竭体循环淤血的表现是

- A. 端坐呼吸
- B. 心源性哮喘
- C. 劳力性呼吸困难
- D. 阵发性夜间呼吸困难
- E. 肝颈反流征阳性

3. 评价心功能最常见的检查方法

- A. 常规心电图
- B. 超声心动图
- C. 动态心电图
- D. 放射性核素

E. 心电图运动负荷试验

4. 对传染病病人的隔离是指将处在 () 的患者, 置于不传染人群的环境下。

- A. 潜伏期内
- B. 传染期内
- C. 恢复期内
- D. 前驱期内
- E. 临床期内

5. 血红素合成障碍所致的贫血是

- A. 缺铁性贫血
- B. 再生障碍性贫血
- C. 海洋性贫血
- D. 巨幼细胞贫血
- E. 慢性病贫血

6. 对鉴别是否肾小球源性血尿最有意义的是

- A. 全程血尿
- B. 合并尿路刺激征
- C. 尿潜血阳性
- D. 肉眼血尿
- E. 变形红细胞血尿

7. 右心衰竭患者最有诊断意义的体征是

- A. 心率明显增快
- B. 心律显著不齐
- C. 胸骨左缘 2~3 肋间闻及收缩期杂音
- D. 胸骨左缘 3~4 肋间闻及收缩期杂音
- E. 胸骨左缘 3~4 肋间闻及舒张期奔马律

8. 下列不适用于使用洋地黄类药物的情况, 哪种除外

- A. 二度 I 型房室传导阻滞
- B. 二度 II 型房室传导阻滞
- C. 三度房室传导阻滞
- D. 病态窦房结综合征
- E. 快速心房颤动

9. 骨折的专有体征是

- A. 局部疼痛
- B. 活动受限
- C. 局部瘀斑
- D. 反常活动
- E. 功能障碍

10. 属于红细胞周围环境异常所致的溶血性贫血的是

- A. 遗传性球形细胞增多症
- B. PNH
- C. 自身免疫性溶血性贫血
- D. 失血性贫血
- E. 血红蛋白病

11. 支气管哮喘与心源性哮喘一时难以鉴别, 应采用下列哪种药物治疗

- A. 西地兰
- B. 肾上腺素
- C. 氨茶碱
- D. 异丙肾上腺素
- E. 去甲肾上腺素

12. 关于淋病特点的描述, 错误的是

- A. 易侵袭黏膜
- B. 以性传播为主
- C. 是世界上发病率最高的性传播疾病
- D. 感染最早期表现为阴道炎
- E. 病原体为革兰阴性双球菌

13. 下列能直接提示红细胞破坏增多的检查是外周血

- A. 网织红细胞增多
- B. 见到晚幼红细胞
- C. 见到晚幼粒细胞
- D. 见到破碎红细胞
- E. 靶形红细胞增多

14. Killip 分级, 心功能 III 级指下列哪一项

- A. 肺部有啰音, 但啰音的范围小于 1/2 肺野
- B. 未闻及肺部啰音和第三心音
- C. 肺部有啰音, 且啰音的范围大于 1/2 肺野 (肺水肿)
- D. 肺部可闻及散在的哮鸣音
- E. 血压 < 70/40mmHg

15. 股骨颈骨折 Pauwels 角指

- A. 股骨颈长轴线与股骨干纵轴线之间形成的夹角
- B. 股骨颈长轴线与股骨颈骨折线之间的夹角
- C. 股骨颈骨折线与股骨干纵轴线之间的夹角
- D. 股骨颈骨折线与两大转子连线之间

的夹角

E. 股骨颈骨折线与两髂棘连线之间的夹角

16. 病毒性心肌炎的临床表现是

- A. 寒战，高热，呼吸困难，偶见心律失常
- B. 剧烈胸痛，发热，心电图出现 Q 波，ST 段弓背向上抬高
- C. 症状、体征无典型表现，主要依据血沉增快帮助诊断
- D. 最先有低热，倦怠，与发热程度不平行的心动过速，各种心律失常
- E. 以上均正确

17. 艾滋病的病原体是

- A. 沙眼衣原体
- B. 疱疹病毒
- C. 人免疫缺陷病毒
- D. 苍白密螺旋体
- E. HPV

18. 在骨髓涂片细胞学检查的内容中，错误的是(单选)

- A. 分数不同系列和不同发育阶段细胞
- B. 分数 200 个或 500 个有核细胞
- C. 计数粒红比例
- D. 退化或破碎细胞在分数时应计入
- E. 巨核细胞单独计数

19. 肾结核的典型症状是

- A. 血尿
- B. 脓尿
- C. 肿块
- D. 腰痛
- E. 膀胱刺激征

20. 左心室流入道和流出道的分界标志是

- A. 左房室瓣(二尖瓣)后瓣
- B. 左房室瓣(二尖瓣)前瓣
- C. 主动脉瓣
- D. 室上嵴
- E. 室间隔

21. 膀胱刺激征是指

- A. 尿急、尿痛、血尿
- B. 尿频、尿痛、排尿困难
- C. 尿频、尿急、尿痛

D. 尿急、血尿、排尿困难

E. 血尿、尿痛、尿失禁

22. 符合继发性腹膜炎腹痛特点的是

- A. 阵发性全腹绞痛
- B. 剧烈、持续性全腹痛
- C. 逐渐加重的阵发性腹痛
- D. 疼痛与进食有关
- E. 高热后全腹痛

23. 胫骨平台骨折，最容易引起的并发症是

- A. 骨筋膜室综合征
- B. 缺血性骨坏死
- C. 骨化性肌炎
- D. 骨折不愈合
- E. 创伤性关节炎

24. 支气管扩张患者，长期反复感染后，致病菌最有可能是

- A. 大肠杆菌
- B. 军团杆菌
- C. 流感嗜血杆菌
- D. 金黄色葡萄球菌
- E. 铜绿假单胞菌

25. 下列属于胫骨中下三分之一骨折早期并发症的是

- A. 脂肪栓塞
- B. 损伤性骨化
- C. 延迟愈合
- D. 缺血性肌挛缩
- E. 创伤性关节炎

26. 股骨干下三分之一骨折移位

- A. 近端向侧移位
- B. 骨折端向前移位
- C. 远端向前移位
- D. 远端向内移位
- E. 远端向后移位

27. 金黄色葡萄球菌感染引起泌尿系统感染的途径是

- A. 上行感染
- B. 直接感染
- C. 血源性感染
- D. 淋巴道感染
- E. 性接触感染

2020 年临床执业历年真题

28. 尿液检查有 β_2 微球蛋白, 反映下列哪项损伤

- A. 致密斑
- B. 肾小球
- C. 肾小管
- D. 入球小动脉
- E. 球内系膜细胞

29. 扩张型心肌病的特征性表现为

- A. X 线示心胸比例增大
- B. 左心室增大, 心肌弥漫性减弱
- C. 心电图示 ST 段压低
- D. 超声心动图弥漫性增大
- E. 冠状动脉狭窄

30. 踝关节最薄弱的韧带是

- A. 胫腓外韧带
- B. 胫腓内韧带
- C. 外侧副韧带
- D. 内侧韧带
- E. 内侧副韧带

31. 鉴别肾性和中枢性尿崩症的区别是

- A. 测量血钠渗透压和尿比重
- B. 测量血钾渗透压和尿比重
- C. 测量血浆渗透压和尿比重
- D. 加压素试验
- E. 饮水(禁饮)试验

32. 受体阻断药的特点

- A. 增加体内植物神经释放酶
- B. 对受体无亲和力, 无内在活性
- C. 对受体无亲和力, 有内在活性
- D. 对受体有亲和力, 无内在活性
- E. 对受体有亲和力, 有内在活性

33. 血尿和血红蛋白尿的区别

- A. 尿沉渣
- B. 尿蛋白
- C. 红细胞管型
- D. 白细胞管型
- E. 尿蛋白电泳

34. 下列药物中, 属于肝药酶抑制剂的是

- A. 利福平
- B. 苯妥英钠
- C. 西咪替丁

- D. 双香豆素
- E. 苯巴比妥

35. 心影呈梨型见于

- A. 肺动脉段膨出
- B. 左心室、右心室增大
- C. 右心室增大
- D. 右房右室增大
- E. 主动脉弓膨出

36. 小儿肾积水患者常见的梗阻部位

- A. 肾盂
- B. 肾盂输尿管连接处
- C. 输尿管膀胱连接处
- D. 输尿管
- E. 尿道

37. 心脏骤停的患者应首先判断哪种最突出的表现(单选)

- A. 呼吸停止
- B. 桡动脉搏动消失
- C. 心音消失
- D. 意识丧失
- E. 血压测不到

38. CO 中毒不包括哪个机制

- A. CO 与 Hb 结合成为更为稳定的 HbCO
- B. CO 与 Hb 结合氧饱和度曲线左移动
- C. CO 与 Hb 结合成高铁血红蛋白
- D. 增加血红素对 O₂ 的亲合力
- E. 极低的 PCO₂ 下, CO 即可取代 O₂

39. 洋地黄中毒时, 心脏毒性最常见的临床表现是(单选)

- A. 心律失常
- B. 胸痛
- C. 黄视或绿视
- D. 恶心
- E. 咳粉红色泡沫痰

40. 可以导致肾前性急性肾损伤的是

- A. 前列腺增生
- B. 应用庆大霉素
- C. 输尿管结石
- D. 大量丢失体液
- E. 应用马兜铃酸类中药

41. 免疫标记降钙素阳性的甲状腺肿瘤是

- A. 梭形细胞癌
- B. 滤泡腺癌
- C. 髓样癌
- D. 巨细胞癌
- E. 乳头状癌

42. Na^+ 和 K^+ 在细胞膜内外分布不均匀的原因是(单选)

- A. 膜在安静时对 K^+ 通透性大
- B. 膜在兴奋时对 Na^+ 通透性增加
- C. Na^+ 、 K^+ 易化扩散的结果
- D. 细胞膜上 Na^+-K^+ 泵的作用
- E. 细胞膜上 ATP 的作用

43. 患者，女性，48 岁，患 I 型糖尿病 30 年，长期使用皮下胰岛素注射治疗。患者主诉最近半年来，经常感到双足趾针扎样刺痛，双足有穿着袜子的异常感觉。根据病人的病史，应考虑患者出现了何种并发症

- A. 下肢动脉粥样硬化
- B. 糖尿病肾病
- C. 植物神经功能紊乱
- D. 低血糖
- E. 周围神经病变

44. 患者女性，19 岁，因甲状腺肿大就诊，查甲状腺 II 度肿大，无结节，TSH 在正常范围，甲状腺功能正常，可能的诊断是

- A. 甲亢
- B. 单纯性甲状腺肿
- C. 慢性甲状腺炎
- D. 甲减
- E. 亚急性甲状腺炎

45. 患者女，80 岁。摔伤致右肱骨外科颈粉碎骨折，伴有高血压、肺源性心脏病。其最佳治疗方法是

- A. 三角巾悬吊
- B. 切开复位髓内针固定术
- C. 切开复位钢板内固定术
- D. 肩关节融合手术
- E. 手法复位外固定术

46. 女，70 岁。蛋白尿 1 个月，尿蛋白 6g/L，尿蛋白电泳显示以小分子蛋白为主。呈单株峰，其蛋白尿的性质为

- A. 组织性蛋白尿

- B. 溢出性蛋白尿
- C. 肾小管性蛋白尿
- D. 分泌性蛋白尿
- E. 肾小球性蛋白尿

47. 患者男，30 岁。活动后心悸、气急、发绀。颈静脉怒张 2 个月。检查发现肝大，质地中等，表面平滑有压痛，腹部移动性浊音阳性，下肢凹陷性水肿。最可能的诊断是

- A. 肝硬化伴腹腔积液
- B. 肝癌伴腹腔积液
- C. 肺结核伴结核性腹膜炎
- D. 肾病综合征伴腹腔积液
- E. 右心衰竭、肝淤血伴腹腔积液

48. 患者女，40 岁。脸色苍白、乏力 1 年余，月经周期延长，临床疑有内分泌腺体功能低下。此时不需做的检查

- A. 动态功能抑制试验
- B. 动态功能兴奋试验
- C. 靶腺激素测定
- D. 影像学检查
- E. 自身抗体测定

49. 患者男，30 岁。烦渴、多饮、多尿 2 个月。尿量每天 8000ml，禁饮水 7 小时时血渗透压 305mOsm/(kg·H₂O)，尿量 110ml/h，尿渗透压 250mOsm/(kg·H₂O)，尿比重 1.006，皮下注射垂体后叶素 3mg 后，第 2 小时尿量 25ml，尿渗透压 480mOsm/(kg·H₂O)，尿比重 1.012。诊断为完全性中枢性尿崩症。首选的处理是

- A. 嘱限制饮水量
- B. 去氨加压素治疗
- C. 鞍区 MRI 检查
- D. 垂体功能检查
- E. 测定血电解质水平

50. 患者男，30 岁。近半年来出现尿频、尿不尽、尿道滴白及肛周隐痛不适，多次检查尿常规 WBC1~3/HP；前列腺液常规：WBC > 10 个/HP，卵磷脂小体(+++)/HP。前列腺液培养阴性，血常规无异常。该患者应该诊断为

- A. 慢性膀胱炎
- B. 泌尿系结核

- C. 非淋菌性尿道炎
- D. 慢性前列腺炎
- E. 膀胱结石

51. 患者女, 32 岁。劳累后心悸、气促、下肢水肿 6 个月。查体: 心界向两侧扩大, 心尖区闻及 2/6 级收缩期杂音, 两肺底有小水泡音。超声心动图示左室腔增大, 心电图提示完全性左束支传导阻滞。该患者应诊断为

- A. 心包炎
- B. 扩张型心肌病
- C. 急性病毒性心肌炎
- D. 二尖瓣狭窄
- E. 肺源性心脏病

52. 患者女, 30 岁。月经量多已 2 年, 近 3 个月来感乏力、头晕、心悸。查血红蛋白 65g/L, 白细胞 $6.0 \times 10^9/L$, 血小板 $140 \times 10^9/L$, 血片中可见红细胞体积小, 中央淡染区扩大。骨髓象: 粒红比为 1:1, 红细胞增生活跃, 中晚幼红细胞 45%。体积小, 胞质偏蓝。治疗首选

- A. 肌肉注射维生素 B12
- B. 口服铁剂
- C. 输血
- D. 脾切除
- E. 口服叶酸

53. 女, 28 岁。右下肢骨折术后 1 天, 气短伴咯血 2 小时, 最可能的诊断是

- A. 肺部感染
- B. ARDS
- C. 气胸
- D. 胸膜炎
- E. 肺血栓栓塞症

54. 14 岁男性, 骨折拍片发现基底端的骨性凸起, 应考虑什么病

- A. 骨巨细胞瘤
- B. 骨肉瘤
- C. 骨软骨瘤
- D. 转移性骨肿瘤
- E. 尤因肉瘤

55. 男, 35 岁。被倒塌的房屋压伤左下肢 6 小时入院。查体: $T37^\circ C$, P108 次/分, R28 次/分, 左小腿大片肌肉撕脱,

伤口处留有大量污物。急诊行清创处理, 术后 3 天, 患者体温逐步上升, 烦躁不安, 大量出汗, 尿量明显减少, 观察伤口, 左下肢明显肿胀, 见大量恶臭浆液血性渗出物, 皮下可触及捻发音。下列处理措施不正确的是

- A. 整块切除受累肌肉
- B. 术后勤换敷料
- C. 应用高压氧治疗
- D. 首选氨基糖苷类抗生素
- E. 病变区多处切开

56. 患者, 男性, 35 岁。参加马拉松比赛长跑突然晕倒, 首要抢救措施是

- A. 连接呼吸机
- B. 保呼吸道通畅
- C. 看有无呼吸及动脉搏动
- D. 心脏按压
- E. 电除颤

57. 患者, 低热、盗汗, 体重减轻。肠梗阻手术中发现腹腔内有淋巴结, 诊断为非霍奇金淋巴瘤, 有骨髓浸润, 临床分期为

- A. IVB
- B. IVA
- C. IIIB
- D. IIIA
- E. II

58. 患者, 女, 21 岁, 右前臂肱骨干下骨折, X 线片示: 右前臂肱骨干下骨折, 易损伤的神经是

- A. 正中神经浅支损伤
- B. 肌皮神经
- C. 桡神经损伤
- D. 正中神经深支损伤
- E. 尺神经损伤

59. 男, 83 岁, 劳累时胸痛, 慢性阻塞性肺疾病 30 年, 慢性肾脏疾病 20 年, 查体: R25 次/分, 血压 100/70mmHg, 双肺呼吸音减弱。可闻及湿啰音、哮鸣音。心率 90 次/分, 律齐, 主动脉听诊区可闻及收缩期粗糙杂音, 心脏超声显示 LVEF45%, 主动脉瓣重度狭窄, 冠状动脉造影显示右冠远端 50% 狭窄。下列治疗正确的是

- A. 冠脉支架术

- B. 开胸主动脉修补术
- C. 冠脉搭桥术
- D. 经皮主动脉瓣置换术
- E. 心衰治疗

60. 女, 48 岁, 感胸闷不适, 说不清楚部位、程度, 持续时间为 10 分钟到半小时缓解, 活动不受限, 心电图正常, 问患者接下来应该作何检查

- A. 超声心动图
- B. 复查心电图
- C. 心电图运动负荷试验
- D. 静态心肌检查
- E. 24 小时动态心电图

61. 患者女, 37 岁。头晕、胸痛 1 年, 晕厥, 胸骨右缘第 2 肋间 4/6 收缩期杂音, 无腹痛, 无下肢水肿, 应诊断为

- A. 冠状动脉粥样硬化性心脏病
- B. 二尖瓣狭窄
- C. 主动脉瓣狭窄
- D. 肥厚梗阻性心肌病
- E. 肺动脉栓塞

62. 患者男, 腹部被撞伤 24 小时内, 心率加快的原因是

- A. 伤口感染
- B. 呼吸道感染
- C. 脓血症
- D. 心内膜感染
- E. 自主神经紊乱

63. 患者女, 35 岁, 乏力 1 月, 平素月经量多, 既往有子宫肌瘤 5 年病史, 查体: Hb98g/L, RBC $3.8 \times 10^{12}/L$, WBC $5.6 \times 10^9/L$, RET0.014, P1t $436 \times 10^9/L$, 给予铁剂口服治疗后, 下面是哪项指标先上升

- A. RBC 上升
- B. WBC 上升
- C. Hb 上升
- D. 血小板上升
- E. 网织红细胞上升

64. 女性 30 岁, 不慎摔伤左脚踝部, 疼痛, 肿胀。查体: 踝部压痛, 反常活动。下列处理不正确的是(单选)

- A. 冰敷

- B. 局部制动
- C. 患肢抬高
- D. 夹板固定
- E. 立即按摩

65. 患者外伤, 左手指拇指, 食指, 中指可屈曲, 不能对掌, 桡侧伴 3 个手指感觉障碍, 请问损伤了哪个神经

- A. 正中神经损伤(肘部)
- B. 正中神经损伤(腕部以下)
- C. 正中神经合并尺神经
- D. 桡神经损伤
- E. 尺神经损伤

66. 男, 40 岁, 间断发作头痛伴苍白、出汗心悸, 发作时血压 200/130mmHg, 平时血压正常, 诊断考虑

- A. 原发性醛固酮增多症
- B. 肾动脉狭窄
- C. 嗜铬细胞瘤
- D. 库欣综合征
- E. 原发性高血压

67. 男 64 岁, 突发心梗 10 小时入院观察后, 排尿时, 突发呼吸困难, 咳粉红色泡沫痰, 查血压 110/60mmHg, 心率 102 次/分, 下列处理措施不恰当的是

- A. 静脉注射毛花苷丙
- B. 静脉注射硝普钠
- C. 皮下注射吗啡
- D. 静脉注射呋塞米
- E. 静脉注射硝酸甘油

68. 女性, 69 岁, 三年前快步行走出现胸骨后压迫感, 向咽部放射, 休息后缓解, 既往高血压病史 10 年, 查体无特殊。问发作时的心电图为

- A. 束支传导阻滞
- B. ST 段抬高, T 波倒置
- C. 易发室性早搏
- D. T 波高尖
- E. ST 段压低, T 波低平、倒置

69. 患者肾绞痛 3 年, 排小结石, X 线片不显影, 结石的性质是

- A. 磷酸镁铵结石
- B. 尿酸结石
- C. 磷酸钙结石

- D. 混合结石
- E. 草酸钙结石

70. 缺铁性贫血患者，口服铁剂一周后复查，可见

- A. 血小板升高
- B. 白细胞升高
- C. 血红蛋白升高
- D. 网织红细胞升高
- E. 红细胞升高

71. 女，28 岁，右手环指僵硬伴晨僵一周，单簧管训练者，右手环指掌侧伸肌障碍伴黄豆大小结节，应考虑为

- A. 狭窄性腱鞘炎
- B. 关节炎
- C. 类风湿性关节炎
- D. 腱鞘囊肿
- E. 滑囊炎

72. 男，40 岁，血压升高 4 年，半年前出现双下肢无力，夜尿增多，食欲较前无变化，查体，血压 170/100mmHg，神志清，心率 80 次/分，双下肢无水肿。可能的诊断是

- A. 低血钙
- B. 碱中毒
- C. 低血磷
- D. 低血钾
- E. 低血糖

73. 女性，35 岁，自觉乏力，毛发脱落，经期延长，颜面水肿，实验室检查 FT4 < 3.5nmol/L，TSH>150mU/L，PRL 56ug/L。可能的诊断是

- A. 原发性甲减
- B. 继发性甲减
- C. 泌乳素瘤
- D. 低 T3 综合征
- E. 希恩综合征

74. 男，54 岁，头晕头痛 1 年，总胆固醇 5.1mmol/L，甘油三酯 3.0mmol/L，首选降血脂药

- A. 非诺贝特
- B. 辛伐他汀
- C. 硝酸甘油
- D. 阿司匹林
- E. 环磷酰胺

75. 男性，45 岁。右下腹隐痛 4 个月，近 2 个月来乏力、消瘦，常有低热，查体：结膜苍白，右侧腹部 5cm×3cm 肿块。化验：血红蛋白 95g/L。若检查诊断为升结肠癌，最佳手术方式是

- A. 升结肠切除术
- B. 右半结肠切除术
- C. 全结肠切除术
- D. 升结肠及部分横结肠切除术
- E. 升结肠及未段回肠切除术

76. 女，38 岁，发热，两天发作一次，寒战、头痛 10 天，热退后伴乏力，半月前去广州出差，血常规：血红蛋白 85g/L，最可能的诊断是

- A. 血吸虫病
- B. 伤寒
- C. 流行性乙型脑炎
- D. 疟疾
- E. 钩端螺旋体病

77. 患者确诊结核，进行抗结核治疗后，四肢末端感觉异常的原因

- A. 缺乏维生素 B6
- B. 缺乏维生素 B12
- C. 缺乏维生素 K
- D. 缺乏维生素 B1
- E. 缺乏维生素 A

78. 女性，5 岁，因发热、头痛、呕吐 2 天，于 2 月 3 日入院。体检：神志恍惚，口唇单纯疱疹，皮肤上有大小不等的瘀斑，少数融合成片，本病例的诊断应首先考虑

- A. 钩端螺旋体病脑膜脑炎型
- B. 脑型疟疾
- C. 肾综合征出血热
- D. 流行性脑脊髓膜炎
- E. 流行性乙型脑炎

79. 男，55 岁，间歇性跛行伴右小腿腓肠肌疼痛一年余，查体右小腿以下皮肤粗糙，萎缩，变薄发亮，右足背动脉搏动消失，为明确治疗方案，最有意义的检查是

- A. 多普勒超声
- B. 阶段性电阻抗和光电容积描述
- C. MRI 血管成像

- D. 动脉造影
- E. 阶段性动脉压测定

80. 男, 40 岁, 腰部扭伤后疼痛伴右下肢麻木 1 周, 咳嗽时加剧, 查体:L4~L5 棘突间压痛, 右侧直腿抬高试验 30° (+), 右小腿外侧感觉迟钝, 踝趾背伸 5 级, 腱反射正常, 首选治疗

- A. 微创手术
- B. 开放手术
- C. 封闭针
- D. 加强腰肌锻炼
- E. 严格卧床休息, 非甾体抗炎药物治疗

81. 男, 62 岁。近 1 年来劳累时胸痛, 休息或含服硝酸甘油后数分钟即可缓解。既往高血压病史 10 余年, 药物控制满意。实验室检查: 血 LDL-C2.16mmol/L。改善患者预后的药物不包括

- A. 硝酸异山梨酯
- B. 辛伐他汀
- C. 福辛普利
- D. 美托洛尔
- E. 阿司匹林

82. 女, 48 岁。2 天前餐后突然出现右上腹阵发性绞痛, 恶心、尿色浓茶样, 以往有类似发作。查体: 急性病容, 巩膜黄染, 腹部无肌紧张, 右上腹深压痛, 可能的诊断是

- A. 胆总管结石
- B. 胆道蛔虫病
- C. 胆总管囊肿
- D. 急性胰腺炎
- E. 急性胆囊炎

83. 男, 60 岁。左上肢摔伤, 急诊来院。X 线摄片显示肱骨干横行骨折, 并有移位, 经手法复位不理想, 后改为牵引治疗, 又经 X 线影像见骨折端有分离。其最可能的后果是

- A. 桡神经损伤
- B. 肩关节强直
- C. 肘关节僵直
- D. 损伤性骨化
- E. 骨折不愈合

84. 男, 32 岁。多次于饮酒后关节红肿疼痛发作, 累及的关节包括第一跖趾关节、踝或膝关节。该患者最可能出现的结果是

- A. 血 HLA-B27 (+)
- B. 血尿酸水平升高
- C. X 线片示骶骨关节炎
- D. 尿渗透压降低
- E. 关节腔穿刺液呈脓性

85. 正常婴儿, 体重 7.5kg, 身长 68cm。前囟 1.0cm, 头围 44cm。出牙 4 个。能独坐并能以拇、示指拿取小球。该儿最可能的月龄是

- A. 10 个月
- B. 8 个月
- C. 24 个月
- D. 12 个月
- E. 18 个月

86. 患者体查血压持续在 160/95mmHg 以上, 眼底动脉普遍狭窄, 属于

- A. 高血压病 1 级
- B. 高血压病 2 级
- C. 高血压病 3 级
- D. 高血压危象
- E. 高血压脑病

87. 男, 68 岁。排便时诉胸闷, 随即跌倒, 呼之不应, 皮肤发绀。最有助于确诊心脏骤停的临床表现是

- A. 意识丧失
- B. 呼吸停止
- C. 皮肤发绀
- D. 心音消失
- E. 桡动脉搏动消失

88. 女, 20 岁。2 年来月经期间发作性双颞剧烈头痛, 发作后常有疲劳、倦怠、无力, 食欲差, 家族“头痛”史。为防止再发, 应选择的药物是

- A. 苯妥英钠
- B. 卡马西平
- C. 丙戊酸钠
- D. 苯巴比妥
- E. 托吡酯

89. 女, 46 岁, 右侧乳房外上象限触及 5cm 肿块, 质硬, 边界不清。右腋窝淋

巴结触及肿大。检查:有毛刺,有小钙化灶。应选择的手术方式是

- A. 右乳腺切除术
- B. 乳腺癌改良根治术
- C. 右乳腺切除术加腋窝淋巴结清扫
- D. 单纯肿块切除
- E. 乳房切除术

90. 女, 75 岁。摔倒时右手撑地, 腕部疼痛、肿胀。查体:右腕部呈“枪刺刀畸形”。最可能的诊断是

- A. Galeazzi 骨折
- B. Colles 骨折
- C. Monteggia 骨折
- D. Chance 骨折
- E. Smith 骨折

91. 女, 50 岁, 1 小时前跌倒右手掌着地受伤, 右肩疼痛, 肿胀, 功能障碍。查体:将患肘紧贴胸壁时, 手掌不能搭到健侧肩部, 此体征为

- A. Dugas 征
- B. Mills 征
- C. Finkelstein 征
- D. Thomas 征
- E. Froment 征

92. 某蓄电池厂男工, 工龄 8 年, 主诉头昏, 头痛、乏力、记忆减退、睡眠障碍、食欲减退、脐周隐痛, 经检验尿中 δ -ALA 为 $28.6\mu\text{mol/L}$ 。最可能诊断为

- A. 慢性铅中毒
- B. 慢性苯中毒
- C. 慢性汞中毒
- D. 慢性氯化物中毒
- E. 慢性氯化氢中毒

93. 男孩, 4 岁, 妈妈在给穿衣服时牵拉左腕, 患儿突然大哭, 左肘功能障碍, 左手不肯拿取玩物。检查:肘关节略屈曲, 桡骨头外有压痛, 其可能的诊断是

- A. 左肘关节脱位
- B. 左肱骨髁上骨折
- C. 左肱骨内髁撕脱骨折
- D. 左肱骨外上髁撕脱骨折
- E. 左桡骨头半脱位

94. 男, 20 岁, 神志不清 2 小时入院, 既往患 1 型糖尿病 5 年, 长期皮下注射胰岛素, 近 3 天因腹泻而停用。体检:血压 $70/50\text{mmHg}$, 皮肤中度失水征, 呼吸深大, 有烂苹果味, 心率 130 次/分。实验室检查尿糖、尿酮体均为阳性, 血糖明显升高, $\text{pH} < 7.35$, 最可能诊断为

- A. 高渗性非酮症酸中毒
- B. 糖尿病酮症酸中毒
- C. 感染性休克
- D. 低血糖昏迷
- E. 糖尿病乳酸性酸中毒

A3/A4 型选择题

(95~96 题共用题干)

男, 55 岁。有饮酒史 20 年, 每日半斤白酒, 2 年来间断上腹痛, 腹胀乏力, 大便不成形, 双下肢水肿。B 超:肝脏回声不均匀增强, 脾大, 少量腹水。

95. 该患者可能的诊断为

- A. 慢性胰腺炎
- B. 胰腺癌
- C. 酒精性肝硬化
- D. 慢性胆囊炎
- E. 胃癌

96. 为明确诊断, 最有价值的检查方法是

- A. 腹部 CT
- B. ERCP 造影
- C. 肝脏穿刺
- D. 腹部磁共振成像(MRI)
- E. 静脉胆囊造影

(97~99 题共用题干)

患者, 女, 30 岁。1 周来发热、尿频、尿急、尿痛伴腰痛, 既往无类似病史, 检查: $T38.3^{\circ}\text{C}$, 心肺检查未见异常, 腹软、肝脾肋下未触及, 双侧肾区叩击痛阳性, 化验:尿蛋白(+), 白细胞 $30\sim 50$ 个/HP, 可见白细胞管型。

97. 此病人最可能是(单选)

- A. 急性膀胱炎
- B. 尿路结石
- C. 急性肾盂肾炎
- D. 急性肾小球肾炎
- E. 尿路综合征

2020 年临床执业历年真题

98. 不宜作为首选的治疗药物是

- A. 喹诺酮类
- B. 头孢菌素类
- C. 红霉素
- D. 半合成广谱青霉素
- E. 克林霉素

99. 一般用药的疗程为

- A. 3 天
- B. 7 天
- C. 14 天
- D. 20 天
- E. 6 个月

(100~101 题共用题干)

女 33 岁,无乳,闭经 4 年,昏迷, T41℃, 心率 90 次/分, 血压 80/40mmHg, 钾 4.5mmol/L, 钠 126.4mmol/L, 血糖 3.1mmol/L。

100. 应诊断为

- A. 低血糖昏迷
- B. 低血压
- C. 垂体肿瘤
- D. 粘液性水肿
- E. 垂体危象

101. 最适合该患者的药物是

- A. 糖皮质激素
- B. 高渗性糖
- C. 甲状腺素
- D. 肾上腺素
- E. 肾上腺皮质激素

(102~103 题共用题干)

患者女性, 46 岁, 间断左腰痛伴血尿 5 个月, 红细胞 20~30/高倍镜, 白细胞 5~10/高倍镜, 右肾结石, 1.8×0.8cm, 左肾上尿路结石, 0.8×0.6cm, 左肾分离 1.4cm。

102. 该患者的治疗方式应为

- A. 右肾体外碎石
- B. 药物排石
- C. 左肾镜下碎石
- D. 左肾体外碎石
- E. 左肾切开取石

103. 为明确肾结石对肾功能的影响, 首选

- A. 静脉尿路造影

B. 检测血尿素氮和血肌酐

C. 核素肾显像

D. 双肾 CT

E. 双肾超声

(104~106 题共用题干)

男, 65 岁, 间歇黑朦伴活动后胸闷、乏力 4 年, 近 1 个月黑朦次数明显增多。查体: 颈静脉无怒张, 双肺未闻及干湿性啰音, 心界不大, 心率 61 次/分, 心律不齐, 下肢无水肿, 心电图出现长短不一的长 PP 间期, 且与短 PP 间期不呈倍数关系, 最长 PP 间期 3.6 秒, 未见室性逸搏。

104. 最可能的诊断

- A. 一度窦房传导阻滞
- B. 二度窦房传导阻滞
- C. 窦性心动过缓
- D. 窦性停搏
- E. 窦性心律不齐

105. 进一步检查

- A. 阿托品试验
- B. 心脏电生理
- C. 24 小时心电图
- D. 心脏运动负荷试验
- E. 超声心动图

106. 首选治疗方式

- A. 起搏器
- B. 食管调搏
- C. 介入治疗
- D. 导管射频消融
- E. 植入型心律转复除颤器

(107~108 题共用题干)

男, 73 岁, 尿频, 进行性排尿困难并伴前列腺增生 2 年。夜尿增多。直肠指诊前列腺增大, 中间沟消失、质地韧, 光滑。前列腺抗原 PSA1.87ng/ml。彩超双肾无积水, 输尿管无扩张, 膀胱壁粗糙, 前列腺大小 5.2×4.6×4.5cm, 尿流率 9ml/s。

107. 最可能的诊断是

- A. 前列腺癌
- B. 前列腺增生症
- C. 尿道狭窄
- D. 神经源性膀胱增生
- E. 膀胱颈挛缩

108. 应采取的处理方式是

- A. 根治性前列腺切除术
- B. 膀胱造瘘
- C. 经尿道前列腺切除术
- D. 口服 α 受体阻滞剂
- E. 观察

(109~111 题共用题干)

男, 发热, 咽痛, $T38^{\circ}\text{C}$, 皮肤黏膜出血点, 咽部充血, 扁桃体 II 度肿大, 骨髓象增生活跃, PAS 呈块状阳性。

109. 诊断

- A. 急粒
- B. 急巨
- C. 急单
- D. 急淋
- E. 急早粒

110. 检查时应注意的体征

- A. 眼球突出
- B. 淋巴结肿大
- C. 眼结膜苍白
- D. 皮肤黏膜瘀斑
- E. 皮肤蓝灰色斑丘疹

111. 治疗方式是

- A. DA
- B. VDLP
- C. COAP
- D. 全反式维甲酸
- E. PAD

(112~113 题共用题干)

男, 49 岁。湖北农民, 发热、头痛 1 天。查体: $T39^{\circ}\text{C}$, 皮肤黄染, 双下肢可见少许出血点, 结膜充血, 肝肋下 2cm, 压痛阳性, 脾肋下未触及, 腓肠肌压痛明显。血常规: $\text{WBC}5.0 \times 10^9/\text{L}$, $\text{NO}0.88$, $\text{Hb}100\text{g/L}$ 。 $\text{ALT}215\text{U/L}$, $\text{AST}120\text{U/L}$ 。

112. 可能的诊断是

- A. 肾综合征出血热
- B. 钩端螺旋体病
- C. 病毒性脑膜脑炎
- D. 伤寒
- E. 化脓性脑膜炎

113. 传播途径是

A. 疫水接触史

- B. 蚊虫叮咬
- C. 跳蚤叮咬
- D. 尾蚴叮咬
- E. 蜱虫叮咬

(114~115 题共用题干)

患者骑车与汽车撞伤, 四肢感觉障碍与排尿困难。

114. 不应该的处理方式

- A. 迅速背离
- B. 保持颈部稳定性
- C. 建立静脉通道
- D. 胸外按压
- E. 保持呼吸道通畅

115. 突发高热 41°C , 发热原因为

- A. 周围神经系统功能受损
- B. 呼吸系统感染
- C. 伤口感染
- D. 体温调节中枢受损
- E. 散热障碍

B1 型选择题

(116~117 题共用备选答案)

- A. P 波与 QRS 波群无关
- B. PR 间期固定, 时有 QRS 波群脱落
- C. PR 间期逐渐延长, 继之 QRS 波群脱落, 呈周期性变化
- D. PR 间期延长, 间距大于等于 200ms
- E. QRS 波群增宽

116. 二度 I 型房室传导阻滞的心电图表现

117. 一度房室传导阻滞的心电图表现

(118~119 题共用备选答案)

- A. 前列腺部
- B. 膜部
- C. 球部
- D. 阴茎部
- E. 尿道全部

118. 骑跨伤致尿道损伤的部位是

119. 男性骨盆骨折

(120~121 题共用备选答案)

- A. 肾静脉血栓
- B. 心力衰竭

2020 年临床执业历年真题

- C. 高血压脑病
- D. 肾周围脓肿
- E. 肾型贫血

120. 肾病综合征易出现的并发症是

121. 急性肾盂肾炎易出现的并发症是

(122~123 题共用备选答案)

- A. 血常规
- B. 血培养
- C. 肥达反应
- D. 骨髓培养
- E. 粪便涂片

122. 有助于较早确诊伤寒的为

123. 有助于确诊霍乱的为

(124~125 题共用备选答案)

- A. 卡托普利
- B. 心得安
- C. 硝苯地平
- D. 氢氯噻嗪
- E. 利血平

124. 高血压合并甲亢首选的降压药是

125. 高血压合并糖尿病首选的降压药是

(126~127 题共用备选答案)

- A. 慢性失血性贫血
- B. 急性失血性贫血
- C. 缺铁性贫血
- D. 地中海贫血
- E. 营养性巨幼红细胞性贫血

126. 属于正细胞正色素性贫血的疾病是

127. 属于小细胞低色素性贫血可见于

第三单元

A1/A2 型选择题

1. 在我国引起肝硬化的主要病因是

- A. 病毒性肝炎
- B. 酒精中毒
- C. 胆汁淤积

- D. 遗传和代谢性疾病
- E. 化学毒物或药物

2. 下列属于绞窄性肠梗阻的是

- A. 肠腔堵塞
- B. 肠管扭转
- C. 肠管痉挛
- D. 肠管血运障碍
- E. 肠管压迫

3. 引起继发性腹膜炎最常见的致病菌是

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 肺炎链球菌和厌氧菌
- C. 铜绿假单胞菌和肠球菌
- D. 绿脓杆菌
- E. 大肠杆菌

4. 支气管扩张症患者，长期反复感染后，致病菌最有可能的是什么菌

- A. 军团菌
- B. 金黄色葡萄球菌
- C. 肺炎球菌
- D. 白色念珠菌
- E. 铜绿假单胞菌

5. 不能作为判断幽门螺杆菌根除的检验方法是

- A. 活组织幽门螺杆菌培养
- B. 组织学检查找幽门螺杆菌
- C. ¹³C 尿素酶呼气试验
- D. 快速尿素酶试验
- E. 血清抗幽门螺杆菌抗体检测

6. 幽门螺杆菌 Hp 阳性的十二指肠溃疡患者首选的治疗是

- A. 抑酸剂+抗 Hp 治疗
- B. 胃黏膜保护剂+抗 Hp 治疗
- C. 抑酸剂+胃黏膜保护剂
- D. 抗 Hp 治疗+碱性药
- E. 胃黏膜保护剂+碱性药

7. 儿童期出现的甲状腺结节恶性率为

- A. 10%
- B. 30%
- C. 50%
- D. 70%
- E. 80%

2020 年临床执业历年真题

8. 改变病情抗风湿药, 下列哪项是错误的

- A. 甲氨蝶呤
- B. 硫唑嘌呤
- C. 环磷酰胺
- D. 氯喹或羟氯喹
- E. 双氯芬酸(扶他林)

9. 瘢痕性幽门梗阻临床表现错误的是

- A. 呕吐量大, 一次可达 1000~2000ml
- B. 呕吐物多为宿食, 有酸臭味, 含有胆汁
- C. 上腹隆起, 可有蠕动波
- D. 可有振水音
- E. 可有低钾低氯性碱中毒

10. 凡咳痰喘每年犯病至少几个月, 持续几年以上, 并排除其他慢性胸肺疾病患者, 即可诊断为慢性支气管炎

- A. 至少 6 个月, 持续 10 年以上
- B. 至少 1 个月, 持续 3 年以上
- C. 至少 2 个月, 持续 5 年以上
- D. 至少 6 个月, 持续 5 年以上
- E. 至少 3 个月, 持续 2 年以上

11. 诊断甲亢(Graves 病)最有价值的体征是

- A. 皮肤湿润多汗, 手颤
- B. 阵发性心房颤动
- C. 窦性心动过速
- D. 收缩压升高, 舒张压降低, 脉压增大
- E. 甲状腺肿大伴震颤和血管杂音

12. 早期慢性支气管炎肺部 X 线表现是

- A. 两肺纹理增粗, 紊乱
- B. 肺野透亮度增加
- C. 胸廓扩张, 肋间增宽
- D. 无特殊征象
- E. 双肺轻度渗出性改变

13. 下列不属于特殊型胃癌的是

- A. 未分化癌
- B. 鳞状细胞癌
- C. 腺鳞癌
- D. 类癌
- E. 印戒细胞癌

14. 属于类风湿关节炎治疗的改变病

情抗风湿药联合治疗方案是

- A. 甲氨蝶呤+来氟米特
- B. 双氯芬酸钠+来氟米特
- C. 甲氨蝶呤+硫酸氨基葡萄糖
- D. 对乙酰氨基酚+硫酸氨基葡萄糖
- E. 双氯芬酸钠+泼尼松

15. 门静脉高压患者并发食管胃底静脉曲张破裂出血的主要死亡原因是

- A. 窒息
- B. 失血性休克
- C. 感染性休克
- D. 肝功能衰竭
- E. 肾衰竭

16. 下列哪一项不是肝硬化腹水治疗必须遵循的原则

- A. 快速利尿消退腹水可促使病情缓解
- B. 留钾利尿剂和排钠利尿剂并用
- C. 服用呋塞米利尿时应补充氯化钾
- D. 腹水减退后, 仍需限制钠的摄入
- E. 体重减轻不超过 0.5 公斤/天

17. 大叶性肺炎实变期不应出现的是

- A. 可听到湿啰音
- B. 肺部叩诊浊音
- C. 气管向健侧移位
- D. 胸膜摩擦音
- E. 可听到支气管呼吸音

18. 提示系统性红斑狼疮病情活动的免疫指标是

- A. 抗 SSA 抗体阳性
- B. 补体增高
- C. 抗双链 DNA 抗体阳性
- D. 抗核抗体阳性
- E. 抗 Sm 抗体阳性

19. 下列有关急性胰腺炎的各项检查中, 最早出现异常的是

- A. 血清脂肪酶
- B. 血清乳酸脱氢酶
- C. 血清淀粉酶
- D. 尿淀粉酶
- E. 血清正铁血白蛋白

20. 食管胸部前面邻接的结构是

- A. 半奇静脉
- B. 奇静脉

- C. 胸主动脉
- D. 胸骨
- E. 左心房

21. 下列关于可能引起类风湿关节炎的感染因子中，通过活化 B 淋巴细胞而致病的感染因子是

- A. 支原体
- B. EB 病毒
- C. 大肠埃希菌
- D. 链球菌
- E. 柯萨奇病毒

22. 肺炎链球菌肺炎治疗的首选抗生素是

- A. 红霉素
- B. 庆大霉素
- C. 氧氟沙星
- D. 青霉素 G
- E. 林可霉素

23. 在多数情况下，继发性腹膜炎最主要的治疗方案是

- A. 静脉注射抗生素
- B. 胃肠减压
- C. 营养支持
- D. 手术治疗
- E. 观察

24. 对结核性腹膜炎最有诊断价值的检查是

- A. PPD 试验
- B. 结肠镜检查
- C. CT
- D. 腹腔积液常规
- E. 腹腔镜检查+腹膜活检

25. 对反流性食管炎治疗作用最强的药物是

- A. 法莫替丁
- B. 奥美拉唑
- C. 硫糖铝
- D. 米索前列醇
- E. 枸橼酸铋钾

26. 内痔的截石位的时候是在几点钟

- A. 3、7、11 点
- B. 5、8、12 点
- C. 3、6、8 点

- D. 6、8、12 点
- E. 1、3、7 点

27. 漏出液见于

- A. 结核性胸膜炎
- B. 胸膜肿瘤
- C. 肺栓塞
- D. 心力衰竭
- E. 恶性胸腔积液

28. 急性化脓性梗阻性胆管炎典型临床表现不包括

- A. 寒战高热
- B. 精神神经症状
- C. 低血压
- D. 黄疸
- E. 呕吐

29. 胃镜无异常的反流病叫

- A. 胃食管反流病
- B. 非糜烂性反流病
- C. 贲门失弛缓症
- D. 腐蚀性食管灼伤
- E. 反流性食管炎

30. 肠外营养最严重的技术性并发症

- A. 低钾血症
- B. 血栓性静脉炎
- C. 胸腔积液
- D. 气胸
- E. 空气栓塞

31. 右侧睾丸肿物，与睾丸相连，质韧，考虑

- A. 睾丸鞘膜积液
- B. 腹股沟斜疝
- C. 睾丸肿瘤
- D. 阴囊 Paget 病
- E. 附睾炎

32. 多见于毕 II 式术后的并发症的是

- A. 倾倒综合征
- B. 碱性反流性胃炎
- C. 营养性并发症
- D. 溃疡复发
- E. 残胃癌

33. 我国急性胰腺炎的主要病因是

- A. 慢性酒精中毒

- B. 胆石症
C. 内分泌与代谢障碍
D. 胰管阻塞
E. 手术与创伤
34. 以下哪项符合绝对禁食
A. 急性胰腺炎早期
B. 急性糜烂出血性胃炎
C. 慢性透壁性溃疡
D. 持续潜血阳性
E. 肝性脑病昏迷前期
35. 腹膜返折上直肠癌淋巴转移途径
A. 经腹股沟淋巴结转移
B. 经直肠下动脉旁淋巴结转移
C. 经髂内淋巴结转移
D. 经侧旁淋巴结转移
E. 经直肠上动脉旁淋巴结转移
36. 下列措施中, 对防止结核性胸膜炎患者发生胸膜肥厚最重要的是
A. 口服糖皮质激素
B. 胸腔内注射糖皮质激素
C. 胸腔内注射抗结核药物
D. 胸腔内注射溶栓药物
E. 反复穿刺抽液
37. 不会诱发肝性脑病的是
A. 上消化道出血
B. 感染
C. 口服抗生素
D. 高蛋白饮食
E. 大量排钾利尿
38. 原发性下肢静脉曲张与营养障碍密切相关的并发症是
A. 足靴区皮肤溃疡
B. 血栓性静脉炎
C. 下肢水肿
D. 小腿皮下淤血
E. 局部血管破裂出血
39. 类风湿关节炎糖皮质激素长期应用疗法
A. 甲泼尼龙效用最强, 冲击疗法首选
B. 糖皮质激素最强长期口服首选
C. 小剂量泼尼松长期口服
D. 倍氯米松
E. 地塞米松
40. 非侵入性 Hp 检测方法是
A. 快速尿素酶
B. PCR
C. Hp 培养
D. ¹³C-尿素呼气试验
E. 切片
41. 止血带法止血, 总使用时间一般不超过
A. 4 小时
B. 1 小时
C. 2 小时
D. 6 小时
E. 8 小时
42. 下列哪种方式不能预防术后下肢深静脉血栓形成
A. 口服阿司匹林
B. 口服华法林
C. 皮下注射低分子肝素
D. 静脉滴注普通肝素
E. 术后及早下床活动
43. 支气管哮喘属于下列哪型过敏反应
A. 1 型
B. 2 型
C. 3 型
D. 4 型
E. 迟发型
44. 腹股沟直疝最有意义的临床表现是
A. 容易发生嵌顿
B. 按压深环仍复出
C. 疝囊颈位于腹壁下动脉外侧
D. 中年人最常见
E. 疝包块呈梨形
45. 反应长期血糖控制最佳指标
A. 糖化血红蛋白
B. 血糖
C. 血浆白蛋白
D. 血红蛋白
E. 血清 C-肽
46. 下列哪项是甲亢病人的手术禁忌症

- A. 妊娠早期重度甲亢
- B. 高功能腺瘤
- C. 中高度 Graves 甲亢
- D. 青少年患者
- E. 胸骨后甲状腺肿伴甲亢

47. 女, 65 岁, 乏力, 胸痛 1 个月, 既往体健, 查体: 轻度贫血貌, 双侧肋骨有局部压痛, Hb80g/L, WBC $5.6 \times 10^9/L$, plt $120 \times 10^9/L$, 血清总蛋白 100g/L, 白蛋白 27g/L, 骨髓细胞学检查示有核细胞占 45%, 为明确诊断最重要的检查

- A. 血尿免疫固定电泳
- B. 血清 β -微球蛋白
- C. 血沉
- D. 尿本周蛋白
- E. 尿常规

48. 男, 34 岁, 发作喘息四年, 每年发作, 查体: 端坐呼吸, 口唇发绀, 双肺布满哮鸣音, 治疗方案为

- A. 吸入性糖皮质激素
- B. 白三烯
- C. β 受体激动剂
- D. 氨茶碱
- E. 抗胆碱药

49. 男, 27 岁, 突发头痛伴剧烈呕吐 1 天, 尿少, 口渴不明显, 心律齐, 腹软, $T36.5^\circ C$, P90 次/分, 血压 100/90mmHg, 皮肤干, 呼吸音清, 无干湿啰音, 钠 135mmol/L, 其水钠代谢为

- A. 中度高渗性脱水
- B. 轻度高渗性脱水
- C. 中度低渗性脱水
- D. 等渗性脱水
- E. 轻度低渗性脱水

50. 女, 47 岁, 从 3 米高处坠落, 致左胸壁伤 3 小时, 查体: $T36.5^\circ C$, P120 次/分, R25 次/分, BP 100/60mmHg, 神志清楚, 气管居中, 胸壁反常呼吸, 左胸多处肋骨断裂, 并有外段端露出, 左肺呼吸音减弱, 最适宜的处理方法

- A. 胸外加压包扎
- B. 镇静止痛及氧气吸入
- C. 胸壁内固定术
- D. 胸壁排气

E. 胸壁闭式引流

51. 女, 65 岁, 慢性阻塞性肺疾病患者, 近年来轻微活动后即感气急, 咳嗽轻, 咳痰少, 动脉血气分析: pH7.34, PaO₂68mmHg, PaCO₂68mmHg, 对该患者的血气分析结果判读最为准确的是

- A. 正常
- B. 低氧血症
- C. I 型呼吸衰竭
- D. II 型呼吸衰竭
- E. 高碳酸血症

52. 女, 14 岁, 咳嗽, 乏力, 有胸腔积液, 胸水为草绿色, 有核细胞 $540 \times 10^9/L$, 单核细胞 0.86, 诊断为

- A. 结核性胸膜炎
- B. 慢性肺心病
- C. 乳糜胸
- D. 脓胸
- E. 类肺炎性胸腔积液

53. 患者毕 II 式术后 5 天, 上腹部剧烈疼痛, 刀割样, 压痛反跳痛, 肌紧张, 肠鸣音消失, 考虑为

- A. 术后应激性穿孔
- B. 急性出血坏死性胰腺炎
- C. 急性化脓性胆管炎
- D. 十二指肠残端破裂
- E. 胃肠吻合瘘

54. 男性, 29 岁, 左大腿挤压伤 3 天, 查体: 痛苦面容, $T38.2^\circ C$, P96 次/分, R25 次/分, 血压 130/84mmHg, 左大腿皮肤红肿严重, 界限不清, 皮下有捻发感, 急诊治疗下列哪项不正确

- A. 受累肌肉整块切除
- B. 高压氧气治疗
- C. 病变处多个切口开口
- D. 术后勤换敷料
- E. 应用氨基苷类抗生素

55. 男, 50 岁, 右腹股沟斜疝嵌顿 6 小时, 查体: 腹胀明显, 肌紧张, 肠鸣音消失, 右腹股沟隆起肿块, 有压痛, 术中发现疝囊内的小肠坏死, 行坏死小肠切除吻合后合适的处理方法是

- A. McVay 法疝修补术
- B. Ferguson 法修补术

- C. Halsted 法修补术
- D. Bassinni 法修补术
- E. 单纯疝囊高位结扎术

56. 女, 59 岁, 背部红肿 7 天, 疼痛, 恶寒, 发热 1 天, 糖尿病 10 年, 查体: T39°C, P100 次/分, 背面红肿皮肤有多个脓点, 范围 6×5cm, Hb120g/L, WBC18.6×10⁹/L, plt200×10⁹/L, 引流方法不正确的是

- A. 每日换敷料一次
- B. 清除脓点
- C. 做“++”切口
- D. 切口边缘在病灶范围之内
- E. 切口深度到筋膜

57. 老年男性, 运动后腹痛, 腹膜刺激征阳性, 腹穿抽出血性液体, X 线见马蹄形, 双腔固定肠袢, 可考虑为

- A. 乙状结肠扭转
- B. 小肠扭转
- C. 乙状结肠套叠
- D. 粘连性肠梗阻
- E. 绞窄性肠梗阻

58. 成年女性, 烧伤臀, 会阴, 双大腿, 创面疼痛钝痛, 有水疱, 红白相间, 求面积与类型

- A. I 度烧伤, 26%
- B. 浅 II 度烧伤, 24%
- C. 浅 II 度烧伤, 21%
- D. 深 II 度烧伤, 27%
- E. 深 II 度烧伤, 26%

59. 患者, 男, 30 岁, 肛周疼痛, 伴畏寒发热 3 天。查体: 左侧肛周皮肤稍红, 深压痛, 截石位直肠指诊两点处可及波动。应考虑是

- A. 骨盆间隙直肠脓肿
- B. 直肠壁内脓肿
- C. 肛门周围脓肿
- D. 坐骨肛管间隙脓肿
- E. 括约肌间脓肿

60. 患者, 男, 74 岁, 反复咳嗽, 咳痰 30 年, 近五年来长期夜间家庭氧疗, 1 周前因受凉后出现喘息, 不能入睡, 家属给予舒乐安定口服, 并提高吸氧浓度, 延长吸氧时间, 但昨日出现昏

睡, 昏睡的主要原因可能是

- A. 舒乐安定中毒
- B. 脑梗死
- C. 严重低氧
- D. 低钠血症
- E. 二氧化碳潴留

61. 患者, 女, 50 岁, 反复低热 1 年, 伴四肢大小关节肿痛。WBC 8×10⁹/L, Hb 100g/L, ANA(-), RF(+), 经多种抗生素正规治疗无效, 可能的诊断是

- A. 风湿性关节炎
- B. 系统性红斑狼疮
- C. 骨关节炎
- D. 类风湿关节炎
- E. 结核菌感染引起的关节炎

62. 男, 70 岁, 吞咽困难半个月, 查体无明显阳性体征, 上消化道钡餐造影示食管中段黏膜紊乱, 管壁僵硬, 管腔狭窄, 该患者最可能的初步诊断是(单选)

- A. 食管炎
- B. 食管憩室
- C. 贲门失弛缓症
- D. 食管癌
- E. 食管平滑肌瘤

63. 男, 55 岁, 8 年前始有咳嗽和咳痰, 逐年加重, 常持续数月, 多次胸摄片两肺纹理增粗, 诊断为

- A. 肺结节病
- B. 支气管肺癌
- C. 慢性支气管炎
- D. 肺结核
- E. 气胸

64. 女, 50 岁, 20 年前曾患肝炎, 近几天劳累, 今晚进食后突然大量咯血, 有暗红色血块, 体检: 脉搏 100 次/分, 血压 84/64mmHg, 腹部稍膨隆, 肝未触及, 脾在肋下两指移动性浊音(+). 诊断首先考虑

- A. 胃十二指肠溃疡大出血
- B. 应激性溃疡
- C. 胃癌出血
- D. 食管胃底静脉曲张破裂出血
- E. 肝脏出血

65. 男, 55 岁。乙型肝炎病史 30 余年, 3 小时前进食烧饼后突然出现呕血, 量约 1000ml, 查体: 未发现全身皮肤、黏膜黄染和腹水, 如果该患者需要接受急诊手术, 最佳手术方式是

- A. 经颈静脉肝内分流术
- B. 非选择性门体分流术
- C. 选择性门体分流术
- D. 贲门周围血管断流术
- E. 脾切除术

66. 女, 37 岁, 发热, 气短 10 天, 伴明显刺激性咳嗽、咽痛、头痛。白细胞增高。胸片呈双下肺点片状浸润影, 最有可能的诊断是

- A. 肺炎链球菌肺炎
- B. 葡萄球菌肺炎
- C. 肺结核
- D. 支原体肺炎
- E. 肺孢子菌肺炎

67. 女, 50 岁, 反复上腹疼痛 6 年余, 平卧时加重, 弯腰可减轻, 查体: 上腹部轻压痛, X 线腹部摄片左上腹部钙化, 可能的诊断为

- A. 慢性胃炎
- B. 慢性胆囊炎
- C. 慢性胰腺炎
- D. 慢性十二指肠球炎
- E. 胃溃疡

68. 男, 52 岁, 3 年前诊断为原发性慢性肾上腺皮质功能减退症, 长期口服氢化可的松 (30mg/d) 替代治疗, 近两天发热 38°C, 咽痛, 目前氢化可的松应

- A. 改用等效量的地塞米松
- B. 增加 10 倍
- C. 剂量减少 1/2
- D. 维持剂量不变
- E. 剂量增加为 2~3 倍

69. 女, 40 岁, 进食后上腹饱胀 4 年, 每次进食正常餐量就感腹胀, 无发热, 无呕血、黑便, 无乏力, 纳差, 精神可, 查体: 腹软, 无压痛, 反跳痛, 肌紧张, 肝脾未触及, 血常规, 肝肾功能未见异常, 该患者的诊断是

- A. 功能性消化不良

- B. 肠易激综合征
- C. 溃疡性结肠炎
- D. 胃癌
- E. 胃食管反流病

70. 男, 76 岁, 有慢性阻塞性肺气肿病, 发热一周, B 超可见肝右叶液性暗区回声区, 内见多个小分区, 血 WBC $11 \times 10^9/L$, N60%, 考虑为

- A. 肝囊肿
- B. 肝血管瘤
- C. 阿米巴肝脓肿
- D. 细菌性肝脓肿
- E. 原发性肝癌

71. 男, 30 岁, 转移性右下腹痛 5 天, 发热伴恶心呕吐 4 天, 查体: T38.5°C, 腹胀, 右下腹扪及 5×3cm 肿块, 质中, 边界不清, 有压痛反跳痛, 最可能诊断

- A. 盲肠肿瘤
- B. 肠套叠
- C. 阑尾周围脓肿
- D. 髂窝脓肿
- E. 肠结核

72. 男, 47 岁, 排便后肛周疼痛, 检查见截石位 3 点有一小孔, 按压有脓液流出, 条索状结构, 最有可能诊断

- A. 肛瘘
- B. 肛周脓肿
- C. 血栓性外痔
- D. 肛裂
- E. 内痔

73. 男性, 35 岁, 间断上腹痛 2 年, 查体: 无贫血貌, 皮肤巩膜无黄染, 心肺无异常, 腹软, 无压痛, 肝脾无肿大, 13C 尿素酶阳性, 主要治疗药物不包括

- A. 阿米卡星
- B. 阿莫西林
- C. 克拉霉素
- D. 枸橼酸铋钾
- E. 奥美拉唑

74. 女, 25 岁。右乳房肿块 3 月余, 右乳外上象限触及 3cm 结节, 无压痛、淋巴结无肿大, 超声检查, 低回声结节边界清楚, 内部见钙化灶, 该患者

的诊断

- A. 乳房肉瘤
- B. 乳管内乳头状瘤
- C. 乳腺囊性增生
- D. 乳腺癌
- E. 乳房纤维腺瘤

75. 男, 40 岁, 高处坠落伤 2 小时, 查体 T36.8°C, P130 次/分, R18 次/分, BP75/57mmHg, 神志尚清, 口渴, 面色苍白, 估计该患者出血量

- A. 2000ml 以上
- B. 600~800ml
- C. 800~1600ml
- D. 1600~2000ml
- E. 300~500ml

76. 男, 22 岁, 暴饮暴食后腹痛, 既往有胆囊结石, 经治疗后 2 周腹部囊性肿块, 无发热, 考虑为

- A. 胰腺脓肿
- B. 胰腺假性囊肿
- C. 消化性溃疡
- D. 胰腺坏死
- E. 门静脉高压

77. 患者男, 55 岁, 背部红肿, 有波动感, 中间有脓点, 糖尿病 10 年, 诊断为

- A. 疔
- B. 痈
- C. 丹毒
- D. 急性蜂窝织炎
- E. 管状淋巴管炎

78. 男, 40 岁, 间断上腹痛 3 年, 加重 1 周, 1 周前上腹胀痛明显, 进食后加重, 伴恶心, 呕吐, 呕吐物量大, 有酸臭味, 呕吐后症状有所缓解, 排气排便较前减少, 最可能的体征是

- A. 振水音
- B. 液波震颤
- C. 移动性浊音
- D. 肠蠕动减少
- E. 腹肌紧张

79. 男, 37 岁, 排便后肛周疼痛一个月, 加重两周, T37.6°C, 压痛红肿, 截石位 2 点钟位置, 指检有波动感, 可能

为

- A. 肛周脓肿
- B. 直肠壁脓肿
- C. 直肠间脓肿
- D. 肛门肌间隙脓肿
- E. 肛管括约肌间脓肿

80. 女, 34 岁, 咳嗽咳脓痰 3 天, 幼时曾患过百日咳, 目前可诊断为

- A. 肺炎
- B. 肺脓肿
- C. 百日咳
- D. 肺结核
- E. 支气管扩张症

81. 男, 63 岁, 里急后重伴便血 3 个月, 肠镜检查见直肠内菜花状肿物, 浅表小溃疡, 决定手术治疗是否保肛主要因素是

- A. 肿物直径
- B. 肿物浸润肠壁深度
- C. 肿物病理类型
- D. 肿物下缘距肛门距离
- E. 肿物环绕肠壁生长情况

82. 男, 65 岁, 胸骨疼痛半年, 半年来反复发作胸骨后烧灼样疼痛, 反酸, 凌晨发作明显, 咳嗽, 心电图、肌电图、胸片均未见异常, 发病机制为

- A. 冠状动脉痉挛
- B. 胃痉挛
- C. 一过性食管下括约肌松弛
- D. 气道高反应性
- E. Oddi 括约肌痉挛

83. 患者女, 进食油腻食物后出现右上腹绞痛, 向右肩反射, 伴恶心, 呕吐, 墨菲氏征(+), 考虑诊断

- A. 急性阑尾炎
- B. 急性胰腺炎
- C. 急性胃肠炎
- D. 急性肠梗阻
- E. 急性胆囊炎

84. 患者, 女, 45 岁, 反复发作右上腹绞痛伴黄疸 3 年, MRCP 检查有胆结石, 上段扩张, 胆总管远端狭窄, 最合适的手术方法

- A. 胆囊切除, 胆总管空肠吻合术

- B. 腹腔镜胆囊切除术
- C. Oddis 括约肌切开术+引流
- D. 开腹胆囊切除术
- E. 胆总管切开取石术 T 管引流

85. 男性 26 岁, 发热咳脓痰 2 天, 查体: 右肺湿啰音, 体温 39.2℃, 抗感染 2 天后突发右侧胸痛, 呼吸时症状加重, 呼吸音低, CT 右侧胸腔积液, 考虑为

- A. 肺炎合并肺脓肿
- B. 肺炎合并急性胸膜炎
- C. 肺炎合并肺水肿
- D. 肺炎合并气胸
- E. 肺癌合并胸腔积液

86. 男, 22 岁, 腰痛 1 年, 伴晨僵, 晨起活动后可减轻, 查体: 双侧 4 字试验阳性, 实验室检查, UA 500umol/L, ESR 100mm/h, CRP 28mg/L, 血尿常规正常, 考虑为

- A. 腰椎间盘突出
- B. 腰肌劳损
- C. 痛风
- D. 肾结石
- E. 脊柱关节炎

87. 女, 45 岁, 反复肾结石 5 年, 全身骨痛 1 年, 实验室检查: 血钙 2.76mmol/L, 血磷 0.8mmol/L, ALP 350U/L, 最有助于明确诊断的实验室检查是

- A. ACTH
- B. TSH
- C. PTH
- D. LH
- E. GH

88. 女, 35 岁。发热 10 天, 体温 37.9℃, 周身不适, 乏力。2 天后体温恢复正常, 但乏力加重, 尿色变黄, 伴食欲不振, 腹胀。既往无肝炎病史。实验室检查: ALT 1008U/L, TBil 87umol/L, HBsAg(+), HBeAg(+), 抗 HBcIgM(+), 抗 HAVIgG(+), 抗 HAVIgM(-)。最可能的诊断是

- A. 病毒性肝炎, 甲乙型病毒混合感染, 急性黄疸型
- B. 病毒性肝炎, 乙型, 急性黄疸型, HAV 既往感染

C. 病毒性肝炎, 乙型, 急性黄疸型, HAV 携带者

D. 病毒性肝炎, 甲型, 急性黄疸型, HBV 携带者

E. 病毒性肝炎, 甲型, 急性黄疸型, HBV 既往感染

89. 女, 35 岁, 进行性四肢乏力 1 年, 早晨较轻, 下午较重。既往有胸腺瘤病史, 否认甲状腺功能亢进症病史, 运动疲劳试验阳性, 目前临床考虑为重症肌无力, 给予胆碱酯酶抑制剂后症状缓解, 但随之最可能出现的新症状是

- A. 腹泻
- B. 心动过速
- C. 瞳孔扩大
- D. 口干
- E. 呼吸困难

90. 女, 18 岁。发热、咽痛伴阵发性刺激性咳嗽 1 周, 咳少量粘痰, 查体: T39℃, 左肺可闻及少量湿啰音。胸部 X 线片示左上肺淡薄片状阴影。血白细胞总数及中心粒细胞计数正常。经阿奇霉素治疗 7 天后复查胸部 X 线片示病灶大部分吸收, 最可能感染的病原体是

- A. 肺炎链球菌
- B. 结核分枝杆菌
- C. 腺病毒
- D. 肺炎支原体
- E. 大肠杆菌

91. 男, 50 岁, 乏力、腹胀伴尿黄 1 月余, 15 年前检查 HBsAg(+), 肝功能反复异常, 但未诊治。既往有食管胃底静脉曲张破裂史。查体: 皮肤巩膜重度黄染, 肝掌及蜘蛛痣(+), 腹水征(+). 实验室检查: ALT250U/L, TBil320umol/L, HBsAg(+), PTA18%。最可能的诊断是

- A. 慢性肝炎急性发作
- B. HBsAg 携带者
- C. 慢性肝衰竭
- D. 急性肝衰竭
- E. 亚急性肝衰竭

A3/A4 型选择题

(92~93 题共用题干)

女, 58 岁, 上腹部疼痛 5 天, 3 天前转移至右下腹, 5 小时前突然出现右下腹剧烈疼痛, 伴全腹压痛, 右下腹较重, 有反跳痛, 腹肌紧张, WBC $13.8 \times 10^9/L$, N80%。

92. 该患者宜采用何种手术切口

- A. 麦氏切口
- B. 上腹正中切口
- C. 下腹正中切口
- D. 右腹直肌旁切口
- E. 横切口

93. 手术后 4 天, 患者切口处出现跳痛, 检查发现切口红肿、化脓, 患者术后的并发症为

- A. 切口感染
- B. 残株炎
- C. 腹腔内出血
- D. 外瘻形成
- E. 门静脉炎

(94~96 题共用题干)

男, 27 岁, 规律空腹痛 4 年, 黑便 1 天, 呕血 2 小时, 痛前有饮酒史, 有肝病 2 年, 无腹水, 无蜘蛛痣, 脉搏 106 次/分, 血压 80/60mmHg。

94. 诊断为

- A. 贲门撕裂
- B. 胃底静脉曲张破裂
- C. 消化性溃疡
- D. 急性胃粘膜病变出血
- E. 卓-艾综合征

95. 首选药物是

- A. 奥美拉唑
- B. 生长抑素
- C. 阿司匹林
- D. 多潘立酮
- E. 硫酸镁

96. 做完毕 II 手术后 5 天, 突发腹痛, 呈刀割样, 最可能的原因是

- A. 十二指肠残端破裂
- B. 胃肠吻合口瘘
- C. 切口感染
- D. 急性出血性坏死性胰腺炎
- E. 急性化脓性胆管炎

(97~98 题共用题干)

男, 65 岁, 咳嗽, 痰中带血伴喘息 3 日, 头面部及双上肢肿胀 2 周, 吸烟 30 支/天, 胸部 X 线见右上肺门肿大影, 右上纵隔明显增宽。

97. 诊断为

- A. 淋巴瘤
- B. 肺癌
- C. 肺结核
- D. 肺心病
- E. 纵隔肿瘤

98. 患者出现面部及双上肢水肿的原因

- A. 头臂干动脉梗阻
- B. 上腔静脉梗阻
- C. 无名静脉梗阻
- D. 淋巴回流梗阻
- E. 下腔静脉梗阻

(99~100 题共用题干)

男, 38 岁, 暴饮暴食后持续左腹胀痛, 恶心, 呕吐 3 小时, 呕吐后症状无缓解, 体温 37.5℃, 心率 112 次/分, 呼吸 30 次/分, 血压 90/65mmHg, 神志清, 皮肤巩膜无黄染, 腹平坦, 上腹压痛, 无反跳痛, 轻度肌紧张, 肝脾肋下未触及, 肠鸣音 3 次/分, 血淀粉酶 400U/L。

99. 为明确诊断首选

- A. 腹部立卧位 X 线平片
- B. MRCP
- C. 上消化道 X 线钡剂造影
- D. 胃镜
- E. 腹部增强 CT

100. 2 月后复查, 上腹饱胀感, 进食后恶心, 无腹痛、呕吐、腹泻、发热, 体重下降 3kg, 巩膜无黄染, 心肺正常, 腹平坦, 左上腹包块, 质韧, 无压痛, B 超示左上腹囊性占位, 诊断为

- A. 胰腺脓肿
- B. 胃癌
- C. 胰腺假性囊肿
- D. 胰腺癌
- E. 慢性胰腺炎

(101~103 题共用题干)

女孩跟同学发生争执, 走在街上觉得人们都在议论她, 感觉听到别人骂她,

2020 年临床执业历年真题

站在马路上想让汽车撞死。

101. 考虑诊断为

- A. 精神分裂
- B. 抑郁症
- C. 创伤后应激综合征
- D. 焦虑障碍
- E. 应激相关障碍

102. 最适宜的治疗为

- A. 利培酮
- B. 氯米帕明
- C. 氯丙嗪
- D. 阿普唑仑
- E. 阿立派唑

103. 服药后出现肌肉震颤，手抖等锥体束征，此时的处理为

- A. 立即停药
- B. 苯海索
- C. 多巴胺激动剂
- D. 溴隐亭
- E. 抗胆碱药

B1 型选择题

(104~105 题共用备选答案)

- A. CA199
- B. AFP
- C. CA125
- D. CA153
- E. CEA

104. 常用于胰腺癌诊断和术后随访的肿瘤标志物为

105. 对于诊断肝细胞性肝癌有较高特异性标志物

A1/A2 型选择题

106. 成人急性呼吸窘迫综合征最早常见什么

- A. 呼吸浅慢
- B. 呼吸浅快
- C. 呼吸深慢
- D. 呼吸不规则
- E. 呼吸深快

B1 型选择题

(107~108 题共用备选答案)

- A. 纵行溃疡、黏膜呈鹅卵石样病变
- B. 回盲部黏膜充血、水肿、溃疡形成、

炎性息肉、肠腔狭窄

- C. 浅表溃疡、黏膜充血水肿、颗粒状
- D. 圆形溃疡，溃疡长径与长轴平行
- E. 地图状溃疡

107. 克罗恩溃疡的特点

108. 溃疡性结肠炎的溃疡特点

第四单元

A1/A2 型选择题

1. 治疗哺乳期妇女滴虫性阴道炎，最适宜的方法是

- A. 甲硝唑口服
- B. 甲硝唑栓置入阴道
- C. 甲硝唑口服及置入阴道
- D. 1%龙胆紫涂阴道黏膜
- E. 局部用克林霉素软膏

2. 滴虫性阴道炎的主要感染方式是

- A. 性生活直接传播
- B. 经血液传播
- C. 医源性传播
- D. 经消化道传播
- E. 经呼吸道传播

3. 胎儿在子宫内急性缺氧初期表现为胎动

- A. 减弱
- B. 增强
- C. 次数减少
- D. 频繁
- E. 次数稍增多

4. 产后出血是指阴道流血量在胎儿娩出后 24 小时内超过

- A. 300ml
- B. 400ml
- C. 500ml
- D. 600ml
- E. 700ml

5. 婴儿每日需热量与营养素较成人相对高，主要是由于小儿

- A. 基础代谢所需较高
- B. 生长发育所需较高
- C. 食物特殊动力作用

2020 年临床执业历年真题

- D. 活动量大所需较高
- E. 消化吸收功能差, 丢失较多

6. 子宫脱垂的主要原因是

- A. 营养不良
- B. 手术损伤
- C. 分娩损伤
- D. 慢性疾病
- E. 过度负重

7. 下列提示胎盘功能正常的情况是

- A. 血清胎盘生乳素突然降低 50%
- B. 胎动 <10 次/12 小时
- C. OCT 试验阳性
- D. 尿雌激素/肌酐比值 >15
- E. NST 试验无反应型

8. 百白破疫苗初种的时间是

- A. 2 个月
- B. 3 个月
- C. 8 个月
- D. 1 个月
- E. 生后 2~3 天

9. 成分输血的优点不包括

- A. 容易制备
- B. 疗效好
- C. 纯度高
- D. 便于保存
- E. 保护血液资源

10. 有关足月新生儿病理性黄疸的特点, 错误的是

- A. 血清总胆红素 >221 $\mu\text{mol/L}$
- B. 生后 24 小时内出现黄疸
- C. 黄疸持续时间 >2 周
- D. 黄疸退而复现
- E. 血清结合胆红素 <34 $\mu\text{mol/L}$

11. 极低出生体重儿的标准是指婴儿出生后 1 小时内的体重低于

- A. 2000g
- B. 800g
- C. 1500g
- D. 1000g
- E. 2500g

12. 下列提示颅后窝骨折的临床表现是

- A. 脑脊液鼻漏
- B. Battle 征
- C. 视神经损伤
- D. 眼镜征
- E. 嗅神经损伤

13. 结核性心包炎初期最关键的治疗是

- A. 口服泼尼松
- B. 抗结核治疗
- C. 营养支持治疗
- D. 心包穿刺引流
- E. 口服利尿药

14. 下列关于羊水的叙述, 正确的是

- A. 妊娠中期主要来源于胎盘
- B. 母体与羊水的交换主要通过脐带
- C. 胎儿吞咽可以使羊水量趋于平衡
- D. 早期羊水主要来自胎儿尿液
- E. 妊娠晚期胎儿的肝脏参与羊水的生成

15. 新生儿 Apgar 评分指标不包括

- A. 体温
- B. 肌张力
- C. 皮肤颜色
- D. 呼吸
- E. 心率

16. 对先天性巨结肠, 既简单又具有诊断价值的检查是

- A. 钡剂灌肠
- B. 直肠黏膜活组织检查
- C. 肌电图检查
- D. 腹部立位 X 线平片
- E. 直肠肛门测压

17. 子宫颈癌的始发部位通常是

- A. 子宫颈组织学内口区
- B. 子宫颈管柱状上皮区
- C. 子宫颈移行带区
- D. 子宫颈解剖学内口区
- E. 子宫颈鳞状上皮区

18. 左向右分流型先天性心脏病, 出现显著肺动脉高压时的主要改变为

- A. 左心室增大
- B. 右心室增大
- C. 左心房增大

2020 年临床执业历年真题

- D. 右心房增大
- E. 左心房左心室增大

19. 下列属于选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂的是

- A. 文拉法辛
- B. 托莫西汀
- C. 氟西汀
- D. 米氮平
- E. 利培酮

20. 产后出血最常见的病因是

- A. 子宫收缩乏力
- B. 胎盘滞留
- C. 急性肝炎
- D. 软产道损伤
- E. 血液系统疾病

21. 关于左侧小脑幕切迹疝最确切的解释是

- A. 左侧基底节受压左移
- B. 脑干受压左移
- C. 左侧颞叶沟回通过小脑幕切迹被推挤至幕下
- D. 左侧小脑幕的移位
- E. 左侧小脑幕挤压脑干

22. 脑干胶质瘤最早出现的临床表现常为

- A. 颅神经麻痹
- B. 脑积水
- C. 头痛
- D. 癫痫
- E. 视神经盘水肿

23. 属于盆腔炎性疾病诊断特异性标准的是

- A. 宫颈举痛或子宫压痛或附件区压痛
- B. 实验室证实的宫颈淋病奈瑟菌或衣原体阳性
- C. 宫颈或阴道异常黏液脓性分泌物
- D. 阴道分泌物生理盐水涂片见大量白细胞
- E. 经阴道超声或磁共振检查显示输卵管增粗，输卵管积液

24. 不符合小儿先天性肥厚型幽门狭窄临床特点的是

- A. 呕吐物常含胆汁

- B. 多于出生后 2~4 周发病
- C. 右季肋区下可触及橄榄样肿块
- D. 少数患者有黄疸
- E. 常见左向右的胃蠕动波

25. 颅内肿瘤若表现为精神症状，常考虑的肿瘤部位为

- A. 小脑
- B. 顶叶
- C. 额叶
- D. 枕叶
- E. 岛叶

26. 心境障碍临床类型不包括

- A. 躁狂发作
- B. 恶劣心境障碍
- C. 惊恐发作
- D. 抑郁发作
- E. 环性心境障碍

27. 按计划免疫接种程序，半岁以内需接种的疫苗不包括

- A. 百白破三联混合疫苗
- B. 乙肝疫苗
- C. 麻疹疫苗
- D. 卡介苗
- E. 脊髓灰质炎减毒活疫苗

28. 吉兰-巴雷综合症的脑脊液蛋白-细胞分离是指

- A. 蛋白质正常，细胞数正常
- B. 蛋白质增高，细胞数正常
- C. 蛋白质增高，细胞数降低
- D. 蛋白质降低，细胞数增高
- E. 蛋白质正常，细胞数增高

29. 外阴阴道假丝酵母菌病最主要的传染途径是

- A. 性交传染
- B. 血行传染
- C. 间接传染
- D. 直接传染
- E. 内源性传染

30. 苯丙酮尿症患儿主要的神经系统异常表现是

- A. 肌张力增高
- B. 行为异常
- C. 智能发育落后

- D. 惊厥
- E. 腱反射亢进

31. 健康育龄妇女出现恶心、食欲减退等消化道症状，问诊时不应忽视的是

- A. 胃炎病史
- B. 肝炎病史
- C. 传染病史
- D. 不洁饮食史
- E. 月经史

32. 属于盆底内层(即盆膈)肌肉的是

- A. 球海绵体肌
- B. 会阴深横肌
- C. 肛提肌
- D. 坐骨海绵体肌
- E. 肛门外括约肌

33. 早产的常见病因是

- A. 遗传因素
- B. 下生殖道感染
- C. 头盆不称
- D. 孕激素水平升高
- E. 胎儿畸形

34. 躯体疾病所致精神障碍的处理原则，错误的是

- A. 对精神症状的控制应遵从大剂量，足疗程的原则
- B. 维持水电解质平衡，充足的营养供应等支持治疗
- C. 要考虑治疗药物对患者的不良反应
- D. 安静安全的环境和防止意外发生等护理措施
- E. 首先必须治疗引起精神障碍的原发躯体疾病

35. 抑郁症睡眠特点

- A. 睡眠浅而多梦
- B. 入睡困难
- C. 睡眠过多
- D. 早醒
- E. 唤醒困难

36. 正常情况下，提供儿童总量 50%~60% 营养素的是

- A. 脂肪
- B. 碳水化合物
- C. 矿物质

- D. 蛋白质
- E. 维生素

37. 下列不属于感知综合障碍的是

- A. 感觉 10 米外的桌子距离自己很近，一放杯子时掉在地上
- B. 看到自己母亲的眼睛一时很大，一时又变小了
- C. 感觉身上有蚂蚁在爬
- D. 感觉自己的手一会变细，一会变大
- E. 感觉周围的房子一会变大，一会又变小

38. 下列最易出现脑膜刺激征的是

- A. 硬膜外出血
- B. 脑出血
- C. 脑梗死
- D. 蛛网膜下腔出血
- E. 高血压脑病

39. 前凶凹陷常见于

- A. 甲状腺功能减退
- B. 维生素 A 中毒
- C. 脱水
- D. 脑发育不良
- E. 头小畸形

40. 儿童中性粒细胞和淋巴细胞比例相当的时期是

- A. 4~6 天和 4~6 岁
- B. 4~6 天和 4~6 月
- C. 4~6 月和 4~6 岁
- D. 1~2 天与 1~2 岁
- E. 2~4 天与 2~4 岁

41. 下列结构损伤可以导致双眼颞侧偏盲的是

- A. 视神经
- B. 视觉中枢
- C. 视交叉中部
- D. 视束
- E. 视乳头

42. 下列哪种疾病可以在体内发现 AQP-4 抗体

- A. 急性脊髓炎
- B. 视神经脊髓炎
- C. 脊髓震荡
- D. 脊髓肿痛

E. 吉兰巴雷综合征

43. 患者知觉体验中表现为错觉的是

- A. 看见面前的高楼变化
- B. 将输液管看成一条蛇
- C. 感觉周围的事物变化
- D. 听见汽车喇叭里有骂她的声音
- E. 感觉皮肤上有蚂蚁

44. 关于子宫破裂描述正确的是

- A. 先兆子宫破裂应经阴道分娩
- B. 子宫破裂胎儿死亡应经阴道分娩
- C. 有病理缩复环应考虑先兆子宫破裂
- D. 有古典式剖宫产史的子宫不易破裂
- E. 有血尿即可诊断子宫破裂

45. 川崎病急性期的最佳治疗药物是

- A. 维生素 B 治疗
- B. 糖皮质激素
- C. 丙种球蛋白
- D. 糖皮质激素+阿司匹林
- E. 丙种球蛋白+阿司匹林

46. 高危滋养细胞肿瘤患者首选的化学方案是

- A. PVB
- B. TP
- C. BEP
- D. EMA-CO
- E. EP-EMA

47. 正常脐带内含有

- A. 一条脐动脉，一条脐静脉
- B. 两条脐动脉，一条脐静脉
- C. 两条脐动脉，两条脐静脉
- D. 一条脐动脉，两条脐静脉
- E. 两条脐动脉

48. 六个月婴儿，应该接种什么疫苗

- A. 麻风
- B. 卡介苗
- C. 乙肝
- D. 百白破
- E. 脊髓灰质炎

49. 下列乳腺癌类型中常表现为粉刺癌的是

- A. 浸润性小叶癌
- B. 浸润性导管癌

C. 导管内原位癌

D. 小叶原位癌

E. 髓样癌

50. 男，28 岁。因头疼 3 个月，加重伴呕吐、间断抽搐、视物模糊 1 个月就诊。近 2 年来，喜食生肉，眼底检查发现视神经乳头水肿。最可能的诊断是

- A. 脑囊尾蚴病
- B. 结核性脑膜炎
- C. 隐球菌性脑膜炎
- D. 脑肿瘤
- E. 病毒性脑炎

51. 女，19 岁，大一学生，3 月前至省城求学，1 月来开始睡眠差，成绩下降，心烦、发愁，整日唉声叹气，觉得自己不如班里其他同学，诊断为

- A. 创伤后障碍
- B. 应激障碍
- C. 适应障碍
- D. 焦虑障碍
- E. 重度抑郁障碍

52. 初产妇，28 岁。妊娠 39 周，临产后宫缩强，产程进展较快，6 小时后宫口开大 9cm，自然破膜后不久出现寒战、呛咳、气急、呼吸困难、血压下降，血涂片见羊水有形物质。此时首选的应急措施是

- A. 立即气管切开正压给氧
- B. 静脉缓注氨茶碱 250mg
- C. 静脉推注地塞米松 20mg
- D. 静脉滴注多巴胺 20mg
- E. 静脉滴注低分子右旋糖苷 500ml

53. 调查发现某高原地区居民结肠癌的发病率高于全国平均水平，研究者注意到该地区人们的饮食习惯具有高脂肪摄入，低蔬菜、水果摄入的特点，拟开展一项课题研究，分析饮食习惯与结肠癌的关系，考虑到因果现象发生的时间顺序，最佳研究方法应为

- A. 生态学研究
- B. 横断面研究
- C. 队列研究
- D. 病例对照研究
- E. 临床试验

54. 男孩, 5 岁。持续高热 1 周。查体: T39°, P128 次/分, R36 次/分。热病容, 双眼结合膜充血, 口唇干裂, 可见草莓舌。皮肤呈弥漫性红斑, 颈部浅表淋巴结肿大。心音有力, 手足硬性水肿。最可能的诊断是

- A. 川崎病
- B. 手足口病
- C. 败血症
- D. 风湿热
- E. 猩红热

55. 女, 35 岁, G6P1, 月经量增多 3 年, 经期及周期正常。妇科检查: 子宫前位饱满, 活动差, 无压痛。推荐该患者最佳的避孕方法是

- A. 惰性宫内节育器
- B. 避孕套
- C. 体外排精
- D. 紧急避孕药
- E. 短效口服避孕药

56. 女, 13 岁, 月经初潮后 1 年, 月经周期 1~4 个月, 经量多伴血块, 此次行经已 8 日, 量仍多, 主要的止血措施是

- A. 大剂量雄激素
- B. 大剂量雌激素
- C. 小剂量孕激素
- D. 抗纤溶及促凝药物
- E. 诊断性刮宫术

57. 10 个月幼儿, 高热 3 天后热退疹出。最可能的诊断是

- A. 麻疹
- B. 风疹
- C. 水痘
- D. 猩红热
- E. 幼儿急疹

58. 女, 48 岁。外阴瘙痒伴灼热感 3 天。妇科检查见外阴红肿、小阴唇内侧及阴道黏膜表面有白色凝乳状物覆盖。该患者首先考虑为

- A. 前庭大腺炎
- B. 淋菌性阴道炎
- C. 外阴阴道假丝酵母菌病
- D. 滴虫性阴道炎

E. 细菌性阴道炎

59. 女, 30 岁, 初产妇, 未临产。妊娠 35 周, 恶心、呕吐、乏力伴皮肤黄染、瘙痒 1 周。结合化验检查诊断为妊娠合并乙型病毒性肝炎(重型), 除保肝治疗外, 应采取的措施

- A. 尽快使用子宫动脉栓塞术
- B. 尽快行剖宫产术
- C. 尽快催产素促进宫颈成熟
- D. 继续妊娠至 37 周
- E. 尽快利凡诺尔腔内引产

60. 早产儿, 胎龄 31 周, 出生后人工喂养, 生后 2 周出现精神萎靡, 纳差, 腹胀, 呕吐 2 次, 大便略稀, 粪隐血试验阳性。腹部 B 超肠蠕动和肠壁血流减少, 腹部 X 线片最具特征性是

- A. 肠壁间隙增厚
- B. 选择性肠袢扩张固定
- C. 气腹
- D. 腹壁积液
- E. 门静脉充气征

61. 男婴, 2 个月, 生后 20 天开始出现呕吐, 进行性加重, 有时呈喷射性, 多发生于喂奶后半小时内, 呕吐物多为奶凝块, 不含胆汁, 吐后食欲极好, 但体重明显下降, 最可能的诊断是

- A. 先天性肠旋转不良
- B. 先天性肥厚性幽门狭窄
- C. 胃食管反流病
- D. 肠套叠
- E. 十二指肠溃疡

62. 男婴, 胎龄 38 周出生, 宫内窘迫, 出生 Apgar 评分 1 分钟 3 分, 经抢救评分 9 分, 6 小时后出现抽搐, 首选药物为

- A. 苯妥英钠
- B. 咪塞米
- C. 地塞米松
- D. 甘露醇
- E. 苯巴比妥

63. 女婴, 八个月, 间断腹泻两个月。一直母乳喂养, 添加辅食少。皮肤苍白, 表情淡漠。舌有震颤。体形虚胖。

肝肋下 1.5cm，脾脏未触及。查体:Hb85g/L，MCV98fl，MCH33pg，MCHC34%，RBC $2.8 \times 10^{12}/L$ ，WBC $5.6 \times 10^9/L$ ，血小板 $170 \times 10^9/L$ ，该婴儿贫血的原因是

- A. 慢性感染性疾病
- B. 缺铁
- C. 中枢神经系统病变
- D. 叶酸缺乏
- E. 维生素 B12 缺乏

64. 男婴，10 个月，发热 3 天，抽搐 2 次，查体:T $39.1^{\circ}C$ ，嗜睡，前囟膨隆，张力较高，颈抵抗(+)，双肺呼吸音清，心率 140 次/分，腹软，无压痛、反跳痛，首选检查

- A. 脑脊液检查
- B. 血气分析
- C. 电解质
- D. 头颅超声
- E. PPD 试验

65. 女，59 岁，全麻下行腹腔后血肿清除术，术中出血，输注 AB 型血 2 个单位，输注 50ml 时，患者出现发热，腰痛，导尿浓茶色，该患者的诊断是

- A. 急性溶血性反应
- B. 过敏性反应
- C. 非溶血性发热反应
- D. 细菌污染性输血反应
- E. 非胆红素尿性黄疸

66. 男，71 岁，近 2 年记忆力下降，在家附近 2 次迷路，经常说有人偷自己东西，容易发脾气，夜间睡眠少，白天嗜睡，既往体健，无心血管疾病。

最可能的诊断是

- A. 假性痴呆
- B. 双相障碍
- C. 阿尔茨海默症
- D. 精神分裂症
- E. 妄想障碍

67. 男孩，5 岁反复咳嗽，喘息 2 年，1 周发作 2 次，查体:神志清楚，呼吸急促，双肺闻及呼气相哮鸣音，心肺查体未见异常，给予“沙丁胺醇溶液”雾化后，喘息缓解，需长期应用的首选治疗是

- A. 全型糖皮质激素
- B. 长效 β_2 受体激动剂
- C. 速效 β_2 受体激动剂
- D. 茶碱
- E. 吸入型糖皮质激素

68. 女，36 岁。妊娠 8 周，心悸、气短 2 天，3 年前确诊为“风湿性心脏病二尖瓣狭窄”，2 年前因心力衰竭住院治疗，应进行处理是

- A. 应用洋地黄
- B. 二尖瓣扩张术
- C. 负压吸引引流术
- D. 继续妊娠
- E. 药物流产

69. 新生儿，出生 1 分钟，全身苍白，四肢可屈曲，弹足底皱眉反应，心率 80 次/分，无呼吸，Apgar 评分多少

- A. 1
- B. 4
- C. 5
- D. 3
- E. 2

70. 女，21 岁，心情压抑，烦闷，兴趣下降 3 年，3 年前高考发挥不好，父母决定让其读二本，自己觉得学校不理想，抱怨都是父母让自己没有好的前途，渐渐做事情没有动力，很少参加社团活动，诉近 3 年来虽然能完成学业，但一直感觉疲惫，生活没有色彩，最可能的诊断是

- A. 急性抑郁障碍
- B. 社交恐惧症
- C. 精神分裂症
- D. 恶劣心境
- E. 双相障碍

71. 初产妇，25 岁，妊娠 39 周。规律宫缩 10 小时，宫口开全 2 小时，宫缩良好，阴道检查 LOT 位，S+3，骨盆正常，胎心 150，正确处理方式

- A. 静脉滴注缩宫素
- B. 徒手旋转胎头后自然分娩
- C. 剖宫产
- D. 立即产钳助产
- E. 立即胎吸助产

72. 男, 58 岁, 突发性头颈项剧烈疼痛, 伴有大汗、恶心、呕吐 1 小时。查体: 急性病容, 四肢活动自如, 脑膜刺激征阳性, 诊断

- A. 脑栓塞
- B. 脑血栓形成
- C. 高血压脑病
- D. 蛛网膜下腔出血
- E. 脑干出血

73. 初产妇, 妊娠 38 周, 骨盆外测量骶耻外径 19.5cm, 髂棘间径 25cm。髂嵴间径 28cm, 坐骨棘间径 9cm, 坐骨结节间径 7.5cm, 该孕妇的骨盆应诊断为

- A. 女性骨盆
- B. 漏斗骨盆
- C. 猿人骨盆
- D. 扁平骨盆
- E. 均小骨盆

74. 男, 35 岁, 四肢无力、手套袜套样感觉。最可能的诊断是

- A. 吉兰巴雷综合征
- B. 重症肌无力
- C. 多发性肌炎
- D. 急性脊髓炎
- E. 周期性麻痹

75. 女, 28 岁, 初产妇。双胎妊娠, 妊娠 39 周临产。查体: P90 次/分, BP140/80mmHg。规律宫缩 10 小时后宫口开全, 第一胎儿头位娩出, 新生儿体重 2600g。第二胎儿为单臀先露, 已衔接, 胎心正常。本例恰当的处理措施是

- A. 行内转胎
- B. 产钳助产
- C. 行外转胎
- D. 剖宫产
- E. 臀位助产

76. 女, 23 岁初产妇, 孕 36 周, NST 无反应型, 宫颈 Bishop 评分 4 分问胎儿宫内的情况

- A. 宫内发育
- B. 宫内窘迫
- C. 胎死宫内
- D. 胎盘剥离

E. 前置胎盘

77. 女, 35 岁, 妊娠 17 周, 2 年前曾因“无脑儿”行引产术, 其妊娠期进行产前诊断的方式不包括

- A. 染色体核型分析
- B. 基因检测
- C. 脐流血
- D. 影像学检查胎儿结构
- E. 基因产物检测

78. 男婴, 7 个月, 4 天前出现发热, 体温高达 38.2℃, 伴流涕咳嗽, 1 天前出现热峰达 39.5℃, 咳嗽加剧且耳后及面部逐渐出现皮疹, 查体: 神志清楚, 精神欠佳, 耳后及颜面部散在红色充血性斑丘疹, 睑结膜充血, 颊黏膜可见较多灰白色小点, 外有红晕, 咽部充血, 呼吸急促, 双肺呼吸音粗可闻及细湿啰音, 该患儿至少隔离

- A. 出疹后 10 天
- B. 出疹后 14 天
- C. 出疹后 5 天
- D. 所有皮疹结痂
- E. 出疹后 7 天

79. 女孩, 1 岁, 生后两月口周发绀, 今晨哭闹后发绀加重, 意识丧失, 四肢颤动, 持续 1 分钟缓解, 胸骨左缘第 2~4 肋间 3/6 级收缩期杂音, 双下肢无水肿, 神经系统正常, X 线示心尖上翘, 肺动脉凹陷, 问意识丧失可为

- A. 法洛氏四联症并肺脓肿
- B. 法洛氏四联症并缺氧发作
- C. 室缺并肺脓肿
- D. 室缺并心衰
- E. 室缺并急性肺炎

80. 男孩, 2 岁, 咳嗽, 发烧, 腹泻 2 天, 1 天前抽搐 1 次。查体: 颈项强直(+), 克尼格征(+), 脑脊液: WBC14×10⁹/L, NO. 8。该患者最可能诊断

- A. 脑出血
- B. 硬膜下积液
- C. 化脓性脑膜炎
- D. 病毒性脑膜炎
- E. 结核性脑膜炎

81. 女, 23 岁, 发热腹痛 1 周, 半月前

流产并清宫，T38.8℃，下腹压痛反跳痛，宫口脓性分泌物，子宫增大，压痛(+)，双附件压痛，WBC14×10⁹/L，NO.8，诊断为

- A. 异位妊娠
- B. 盆腔炎性疾病
- C. 不全流产
- D. 溃疡性结肠炎
- E. 急性阑尾炎

82. 患者，女性，阴道瘙痒，有豆腐渣样分泌物

- A. 细菌性阴道炎
- B. 滴虫性阴道炎
- C. 老年性阴道炎
- D. 白色念珠菌阴道炎
- E. 假丝酵母菌性阴道炎

83. 女婴，11 个月，2 个月前因“睡眠不安，头部多汗，方颅”就诊，用维生素 D 及钙剂正规治疗 2 个月，症状好转，此时腕骨 X 线表现是

- A. 临时钙化带模糊
- B. 长骨弯曲畸形，骨骺线正常
- C. 临时钙化带致密增厚
- D. 长骨短粗和弯曲，干骺端变宽呈杯口状
- E. 临时钙化带消失

84. 医生拿着记录本和安排好顺序的问题，与患者面对面，一问一答的心理评估方法属于

- A. 晤谈法
- B. 调查法
- C. 观察法
- D. 作品分析法
- E. 心理测量法

85. 婴儿顽固性便秘，腹胀，呕吐，营养不良，首先考虑的诊断是

- A. 幽门痉挛
- B. 先天性肥厚性幽门狭窄
- C. 胃食管反流病
- D. 胃扭转
- E. 先天性巨结肠

86. 男孩，13 岁，近 1 个月自觉体力进行性下降，查体：心前区未触及震颤胸骨左缘第 2~3 肋间闻及 3/6 级收缩期

喷射性杂音，P2 增强，固定分裂，最可能的诊断

- A. 小型室间隔缺损
- B. 房间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 中型室间隔缺损
- E. 肺动脉瓣狭窄

A3/A4 型选择题

(87~88 题共用题干)

女性患者突然气促，心慌，濒死感，15 分钟后自行缓解。头颅 CT、心电图未见异常。

87. 可能的诊断是

- A. 惊恐发作
- B. 恐惧焦虑障碍
- C. 广泛焦虑障碍
- D. 甲亢
- E. 精神分裂症

88. 长期治疗服用的药物是

- A. 普萘洛尔
- B. 帕罗西汀
- C. 他巴唑
- D. 劳拉西泮
- E. 阿立派唑

(89~91 题共用题干)

患者，男性，16 岁，因右下肢肌肉血肿，关节腔出血两天入院，以往有多次发作史，家族中其舅舅有类似病史。

89. 该患者可能诊断是

- A. 过敏性紫癜
- B. 特发性血小板减少性紫癜
- C. 血小板无力症
- D. 血友病 A
- E. 血友病 C

90. 该患者血液中哪种凝血因子减少或缺乏

- A. 纤维蛋白原
- B. 凝血酶原
- C. VII 因子
- D. XII 因子
- E. VIII 因子

91. 血液输注，应选择哪种成分为好

- A. 红细胞悬液
- B. 普通冰冻血浆

- C. 新鲜冰冻血浆
- D. 库存全血
- E. 浓缩血小板

(92~93 题共用题干)

女孩, 17 岁, 阴道流血 16 天, 量多, 无性生活史, 13 岁初潮, 月经不规则, 查体: 下腹部压痛明显, 血红蛋白 54g/L。

92. 不包括的治疗方式是

- A. 减少月经量
- B. 纠正贫血
- C. 调理月经周期
- D. 止血
- E. 诊断性刮宫

93. 该患者止血首选方式为

- A. 大量雌激素
- B. 大量孕激素
- C. 大量雄激素
- D. 口服避孕药
- E. 刮宫术

(94~96 题共用题干)

34 周早产儿, 2100g, 母亲胎膜早破, 体温升高 1 小时剖宫产, 生后评分 5 分, 复苏后入住 ICU, 呼吸困难, 青紫, 逐渐加重, 氧饱和度 80%, CO₂ 分压 55mmHg, X 线片双肺通透度减低, 肺肝界肺心界消失。

94. 诊断是

- A. 胎粪吸入综合征
- B. 肺出血
- C. 新生儿肺炎
- D. 新生儿呼吸窘迫综合征
- E. 先天性膈疝

95. 治疗方案为

- A. 机械通气, 应用止血药
- B. 机械通气, 应用肺表面活性物质
- C. 手术修补膈疝
- D. 保温, 保证营养供应
- E. 手术结扎

96. 经过治疗后可能出现的并发症为

- A. 气胸
- B. 肺出血
- C. 胸腔积液
- D. 肺水肿

E. 肺脓肿

(97~99 题共用题干)

23 岁, 女性, 妊娠 32 周, 腹部受撞击后, 持续性腹痛, 少量出血, 既往产检健康, 脉搏 100 次/分, 呼吸 22 次/分, 血压 90/60mmHg, 痛苦表情, 宫底在剑突下 3 横指, 子宫轮廓清楚, 胎心 102 次/分, 宫口未开。

97. 确诊首选检查

- A. 缩宫素试验
- B. 胎心电子监护
- C. 超声
- D. MRI
- E. 腹部穿刺

98. 最可能的诊断是

- A. 早产临产
- B. 巨大胎儿
- C. 胎盘早剥
- D. 子宫破裂
- E. 前置胎盘

99. 此时不易并发的并发症为

- A. 急性肾衰竭
- B. DIC
- C. 产后出血
- D. 胎盘残留
- E. 胎儿宫内死亡

(100~101 题共用题干)

女性, 37 岁, 坠落后受伤, 神志不清 3 小时, 查体: 昏迷, 双侧瞳孔左: 右 = 5: 2 (mm), 左侧对光反射消失, 左颞枕部头皮血肿。

100. 最简易有效的进一步检查是

- A. 头颅 CT
- B. 头颅超声
- C. 头颅核磁
- D. 脑电图
- E. 脑血管造影

101. 患者未及时做检查, 最有效的治疗为

- A. 左侧颞枕部下减压
- B. 后颅窝开瓣减压术
- C. 左侧颞枕开颅探查+血肿清除+去骨瓣减压术
- D. 左颞枕部血肿清除术

2020 年临床执业历年真题

E. 左颞枕部钻孔减压术

B1 型选择题

(102~103 题共用备选答案)

- A. 活跃期停滞
- B. 第二产程延长
- C. 潜伏期延长
- D. 正常产程
- E. 活跃期延长

102. 初产妇, 26 岁, 妊娠 39 周, 临产 10 小时, 宫缩正常, 羊水清, 宫口开大 6cm, 头先露, S=+1, 4 小时后宫口仍是 6cm, 最可能的诊断

103. 初产妇, 26 岁, 妊娠 38 周, 临产 22 小时, 胎心 136 次/分, 宫口开大 2cm, 枕先露, S=-2, 最可能的诊断是

(104~105 题共用备选答案)

- A. 尿糖定量测定
- B. 糖化血红蛋白测定
- C. 胰岛细胞抗体测定
- D. C 肽
- E. 葡萄糖胰岛素释放试验

104. 能反映糖尿病近期血糖总水平, 作为近期病情监测指标的是

105. 用胰岛素治疗糖尿病的患者, 能反应胰岛功能的指标是

(106~107 题共用备选答案)

- A. 卵黄囊瘤
- B. 卵巢粘液性囊腺瘤
- C. 卵巢黄素囊肿
- D. 卵巢颗粒细胞瘤
- E. 畸胎瘤

106. 属于卵巢性索间质肿瘤的是

107. 最常见的女性生殖细胞肿瘤是

(108~109 题共用备选答案)

- A. 直接扩散
- B. 上行性感染
- C. 透壁性感染
- D. 血型播散
- E. 淋巴感染

108. 女性淋菌性腹膜炎的常见感染途径

109. 肝硬化自发性细菌性腹膜炎的常见感染途径

(110~111 题共用备选答案)

- A. 一期
- B. 二期
- C. 三期
- D. 潜伏期
- E. 梅毒晚期

110. 硬下疳见于梅毒几期

111. 肛周疣状物见于梅毒几期

(112~113 题共用备选答案)

- A. 46, XX(XY), -14, +t(14q21q)
- B. 46, XX(XY), -21, +t(21q21q)
- C. 46, XX(XY) 或 47, XX(XY), +21
- D. 47, XX(XY), +21
- E. 46, XX(XY), -22, +t(21q22q)

112. 21-三体综合征标准核型是

113. 21-三体综合征的嵌合型为

答案

第一单元

1. 答案:D

解析:FII、FVII、FIX、FX 的生成需要维生素 K 的参与, 维生素 K 缺乏时, 会造成维生素 K 依赖性凝血因子(II、VII、IX、X)的活化生成, 从而影响凝血途径, 导致 PT(凝血酶原时间)、APTT(激活部分凝血活酶时间)、CT(凝血时间)、INR(凝血酶原时间国际正常化比值)均延长(ABCE 对)。FDPs 阳性或增高见于原发性纤溶和继发性纤溶, 后者如 DIC、恶性肿瘤、急性早幼粒细胞白血病、肺血栓栓塞等(D 错, 为本题正确答案)。

2. 答案:A

解析:在环境温度 21℃, 机体处于安静状态下的主要散热方式是辐射散热(A 对)。传导散热(B 错)是指机体的热量直接传给与之接触的温度较低物体的一种散热方式。对流散热(C 错)是指通过气体流动而实现热量交换的一种散热方式。不感蒸发(D 错)是指体内的水分从皮肤和黏膜(主要是呼吸道黏膜)表面不断渗出而被汽化的过程。可感蒸发(E 错)又称出汗, 是指汗腺主动分泌汗液, 通过汗液蒸发可有效带走大量体热。

3. 答案:E

解析:新的《传染病法》规定对乙类传染病中的非典、肺炭疽和人感染高致病性禽流感患者取甲类传染病的预防控制措施。

4. 答案:C

解析:甲状软骨左、右软骨板的前缘互相融合处称前角, 前角上端向前突出, 称为喉结(C 对)

5. 答案:B

解析:感觉的分类里包括视觉、听觉、嗅觉、味觉和皮肤觉, “如芝兰之室, 久闻而不知其香” 是嗅觉发生适应的现象, 即感觉适应(B 对)。

6. 答案:D

解析:补体系统缺陷导致的疾病, 由 C1INH 基因缺陷所致的遗传性血管神经性水肿(D 对), 以及 DAF 和 MIRL 缺陷引起的阵发性夜间血红蛋白尿。

7. 答案:A

解析:ALA 合酶(A 对)是合成血红素的关键酶, 受多种因素的调节。在线粒体内, 来自柠檬酸循环的琥珀酰 CoA 与甘氨酸在 ALA 合酶催化下缩合呈 ALA。葡萄糖激酶(B 错)是肝细胞内存在的己糖激酶的 IV 型同工酶, 催化葡萄糖磷酸化生成葡糖-6-磷酸, 此反应不可逆, 葡萄糖激酶是此反应的关键酶。丙酮酸激酶(C 错)催化磷酸烯醇式丙酮酸将高能磷酸基转移给 ADP 生成 ATP 和丙酮酸, 此反应不可逆, 丙酮酸激酶是此反应的关键酶。HMG-CoA 裂解酶(D 错)催化 HMG-CoA 裂解产生乙酰乙酸。异柠檬酸脱氢酶(E 错)催化异柠檬酸氧化脱氢转变为 α -酮戊二酸, 此反应不可逆, 异柠檬酸脱氢酶是此反应的关键酶。

8. 答案:A

解析:三大营养物质糖、脂肪、氨基酸彻底氧化分解产能的共同通路是三羧酸循环(A 对)

9. 答案:D

解析:医务人员职业暴露环境中的危险因素包括物理因素、化学因素、生物因素、社会心理因素, 物理因素中的锐器伤(D 对 ABCE 错)是医务人员、特别是护理人员最常见的, 电离辐射是造成医务人员特别是放射专业人员职业危害的重要物理因素, 因消毒剂所致的化学伤害轻者引起皮炎、鼻炎、哮喘, 重者引起中毒或致癌。

10. 答案:B

解析:欲描述该疾病患者的职业构成情况, 宜绘制的统计图是圆图(B 对), 把圆的总面积作为 100%, 表示事物的全部, 而圆内各扇形面积用来表示全体中各部分所占的比例, 常用于描述构成比。条图(A 错)适用于表示相互独立的统计指标数值大小和它们之间的对比关系。散点图(C 错)用点的密集程度和变化趋势表示两指标之间的直线或曲线关系。直方图(D 错)用于表示连续变量频数分布情况。线图(E 错)适用于描述一个变量随另一个变量变化的趋势和波动情况。

11. 答案:B

解析:健康管理的首要步骤一般为收集健康信息(B 对), 健康信息一般通过

问卷调查,健康体检和筛查等获得;第二步为健康危险度评估,即健康和疾病危险度评估(D错);第三步为个体化健康维护计划的制定(C错);第四步为个体化健康维护计划的实施(E错)。

12. 答案:D

解析:罹患率常用于疾病暴发或流行时的调查,如传染病、食物中毒及职业中毒等暴发的调查(D对)。死亡率是测量人群死亡危险最常用的指标(A错)。

13. 答案:E

解析:医务人员在长期的医学道德实践中形成和表现出来的稳定心理状态是医德修养(E对)。

14. 答案:C

解析:病毒感染后,激活免疫防疫系统控制感染,所以免疫系统是清除病毒的,病毒不能沿着免疫系统扩散(C错,为本题正确答案)。病毒感染机体后,在体内由局部向远处扩散的方式包括沿神经播散、经血行播散、经淋巴播散、经组织间隙播散(ABDE对)。

15. 答案:A

解析:鸟氨酸(A对)在体内主要参与鸟氨酸循环,不参与天然蛋白质合成。人体内所有蛋白质都是由下面这20种氨基酸组成的:甘氨酸(E错)、丙氨酸、缬氨酸、亮氨酸(C错)、异亮氨酸、脯氨酸、丝氨酸、半胱氨酸(B错)、蛋氨酸、天冬酰胺、谷氨酰胺、苏氨酸、苯丙氨酸、色氨酸、酪氨酸、天冬氨酸、谷氨酸(D错)、赖氨酸、精氨酸、组氨酸。

16. 答案:E

解析:鸟氨酸循环又称尿素循环,鸟氨酸催化 NH_3 、 CO_2 合成尿素的过程中,精氨酸是重要的中间化合物(E对)。

17. 答案:A

解析:促进卵泡发育成熟的主要激素是卵泡刺激素(A对)。人绒毛膜促性腺激素(HCG)维持月经黄体的寿命,使月经黄体增大成为妊娠黄体(B错)。人绒毛膜促性腺激素促进排卵的直接因素是黄体生成素(C错)。雌激素促进生殖器官的发育和成熟,并维持其正常功能(D错)。孕激素主要作用于子宫内膜和子宫平滑肌,为受精卵着床做准备,维持妊娠(E错)。

18. 答案:C

解析:在急性缺血的情况下,机体血量重新分配,优先保证心、脑等重要器官仍能获得相对较多的血液供应,因此,急性缺血是,不易出现脑血管收缩(C错,为本题正确答案)的表现。

19. 答案:C

解析:食管膈肌裂孔位于主动脉裂孔左前上方,有食管和迷走神经通过(C对)。

20. 答案:C

解析:MHC1类分子分布于几乎所有有核细胞表面,成熟红细胞呈现双凹圆盘状,无细胞核,因此不呈现MHC1类的细胞是红细胞(C对)。

21. 答案:D

解析:新冠肺炎密切接触者未确诊,暂不需预防性用药(C错)及治疗(A错);新冠肺炎是乙类传染病,按甲类管理,其密切接触者需要集中隔离(B错)并进行留验(D对)及诊察;疫苗尚未进入临床推广(E错)。

22. 答案:C

解析:肾癌的典型肉眼特征是切面金黄色、彩色(C对A错);多见于肾脏上、下两极,上极更为常见,肿瘤界限清楚,可有假包膜形成(BD错);多发生于一侧肾脏(E错)。

23. 答案:A

解析:脏器表面几乎全部被腹膜所覆盖的为腹膜内位器官,如胃、十二指肠上部(A错,为本题正确答案)、空肠、回肠(B对)、盲肠、阑尾(D对)、横结肠(E对)、乙状结肠(C对)、脾、卵巢和输卵管等

24. 答案:E

解析:包皮环切(E对)可保持生殖器局部的卫生,减少含有HPV和其他致癌物质的包皮垢,降低HPV的感染几率,有效地防止阴茎癌的发生。

25. 答案:B

解析:正常人白天工作时的脑电波是 β 波(B对); α 波是成人安静、闭眼、清醒时的主要脑电波(A错); γ 波在觉醒并专注于某一事时常见(C错); θ 波是少年正常时、成人困倦时的主要脑电波(D错); δ 波是婴幼儿正常时、成人熟睡时的主要脑电波(E错)。

26. 答案:A

解析:加强临终病人的医疗服务已成为普遍客观的社会需求,临终关怀开始逐步兴起。临终关怀是针对垂危病人进行的一种特殊医疗照护,其目的在于减轻其临终心理负担,解除其对疼痛及死亡的恐惧和不安,满足其生理、心理和社会的需求,已达到提高临终病人的生存质量(A对)的根本目的,让病人在人生的最后岁月中,能够安详、宁静、无痛苦、舒适且有尊严地离开人世,并同时使其家属的身心健康得到维护和增强。

27. 答案:D

解析:流行性乙型脑炎主要通过蚊叮咬而传播,库蚊、伊蚊和按蚊的某些种都能传播流行性乙型脑炎(D对 ABCE错)。

28. 答案:A

解析:胰的前面隔网膜囊与胃后壁相邻(A对);腹主动脉(B错)、下腔静脉(C错)在胰的后方。

29. 答案:E

解析:EPO作用的主要靶细胞是晚期红系祖细胞(E对)。早期红系祖细胞(C错)因EPO受体稀疏较少受EPO影响。

30. 答案:A

解析:职业中毒的诊断即职业病的诊断原则包括:1. 职业史,职业史是职业病诊断的重要前提(A对)。应详细询问患者现职工种、工龄、接触有害因素的种类、程度和时间、生产劳动方式、防护措施:既往工作经历,包括部队服役史、再就业史、打工史及兼职史等,以便判断患者接触毒物的机会和程度:2. 职业卫生现场调查与危害评价(DE错)3. 临床表现及实验室检查(BC错)。

31. 答案:A

解析:医患沟通的基本信念是尊重和理解(A对)。共同参与(B错)是一种以生物-心理-社会医学模式为指导思想,以健康为中心而建立的医患关系这种模式适用于慢性疾病患者,同时,这种模式要求医师和患者在智力、知识、教育程度等方面接近。医患关系的性质应当是以诚信为基础的具有契约性质的信托关系(C错)。医患双方在交往时,要换位思考,相互理解,首先,需要医务人员同情并理解患者的痛苦

(D错)。医师要主动与患者进行沟通,保持信息传递畅通,但并非主动至上(E错)。

32. 答案:A

解析:预防感染和治疗局部感染使用抗菌药物首选非限制使用级抗菌药物(A对),仅严重感染、免疫功能低下合并感染或者病原菌只对限制使用级抗菌药物敏感时,方可选用限制使用级抗菌药物(B错)。临床上严格控制特殊使用级抗菌药物使用,特殊使用级抗菌药物不得在门诊使用(D错)。

33. 答案:D

解析:艾滋病患者应当履行的义务有:①接受疾病预防控制机构或者出入境检验检疫机构的流行病学调查和指导(A对);②将感染或者发病的事实及时告知与其有性关系者(B对);③就医时,将感染或者发病的事实如实告知接诊医生(C对);④采取必要的防护措施,防止感染他人(E对)。不包括应当被医疗机构当试验性研究对象(D错,为本题正确答案)。

34. 答案:A

解析:心身疾病指心理社会因素在疾病的发生、发展过程中起重要作用的躯体器质性疾病和躯体功能性障碍,心身疾病是并列于躯体疾病和精神疾病的第三类疾病。心境障碍属于情感性精神障碍疾病(A错,为本题正确答案)。原发性高血压病(B对)、神经性皮炎(C对)、消化性溃疡(D对)、糖尿病(E对)这些疾病均可在心理应激后起病,因情绪影响而恶化,属于心身疾病范畴。

35. 答案:D

解析:急性肾小管坏死(ATN)是引起肾性急性肾衰竭的最常见、最重要原因(D对)。

36. 答案:A

解析:在流行病学研究中,队列研究(A对)是由因到果的研究方式。队列研究的优点:①属于直接观察法;②一次调查可观察多种结局;③由因到果;④有对照组,能确证暴露与疾病的因果联系。临床试验(B错)是在医院或其他医疗照顾环境下进行的试验。病例对照研究(C错)可追溯研究对象既往可疑危险因素暴露史,其研究方向是回

顾性的，是由“果”至“因”的。现状研究(E 错)只能将收集到的数据加以直观的描述，并不一定是由因到果的研究。

37. 答案:C

解析:血红素合成的关键酶是 8-氨基- γ -酮戊酸(ALA)合酶,影响该酶合成的辅酶是磷酸吡哆醛,磷酸吡哆醛是维生素 B6 的活化形式。因此,影响血红素合成的关键酶相关维生素的是维生素 B6(C 对)。

38. 答案:E

解析:细胞膜内外 Na^+ 和 K^+ 浓度差是细胞发生兴奋性的基础,形成 Na^+ 、 K^+ 在细胞内外不均衡分布的原因是膜上 Na^+ - K^+ 依赖式 ATP 酶的活动(E 对)。 Na^+ - K^+ 依赖式 ATP 酶(钠泵)每分解一分子 ATP 可逆浓度差将 3 个 Na^+ 移出胞外,将 2 个 K^+ 移入胞内,使细胞外液中的 Na^+ 浓度达到胞质内的 10 倍左右,细胞内的 K^+ 浓度达到细胞外液的 30 倍左右。安静时 K^+ 比 Na^+ 更易穿透细胞膜(A 错)是静息电位产生的机制。兴奋时 Na^+ 比 K^+ 更易穿透细胞膜(B 错)是动作电位产生的机制。 K^+ 的不断外流和 Na^+ 的不断内流(C 错)可减小 Na^+ 、 K^+ 在细胞内外的不均衡分布。膜上载体和通道蛋白的共同作用(D 错)与易化扩散有关。

39. 答案:E

解析:富含无机盐水溶性维生素和膳食纤维的食物是蔬菜(E 对)。

40. 答案:D

解析:糖尿病病人血中酮体含量高出正常人数十倍,可导致酮症酸中毒,血酮体超过肾阈值,便可随尿排出,引起酮尿,血丙酮含量也大大增加,通过呼吸道排出,产生特殊的烂苹果气味(D 对)。

41. 答案:B

解析:卫生资源配置是指政府或市场如何使卫生资源公平且有效率地在不同的领域、地区、部门、项目、人群中分配,从而实现卫生资源的社会和经济效益最大化,即合理公正地分配卫生资源,从而实现卫生资源的社会和经济效益最大化,因此,以公平性为核心原则(A 对)、重点倾斜并兼顾全局原则(C 对)、效益最大化原则(D 对)、

多社会发展相适应原则(E 对)符合卫生资源分配原则。效率是指以尽可能少的投入获得尽可能多的产出,而卫生事业是政府行一定福利政策的社会公益事业,因此,利益最大化原则不符合卫生资源分配原则(B 错,为本题正确答案)。

42. 答案:D

解析:根据安乐死的实施方式,可分为主动安乐死和被动安乐死(ABC 错)。主动安乐死(D 对)是指在无法挽救病人生命的情况下,医务人员等采取药物等方式主动结束病人的生命或加速病人死亡的过程,又称仁慈助死。被动安乐死(E 错)是指对需要依赖生命维持技术生存的病人不给予或撤除生命支持,任其死亡,又称为听任死亡。

43. 答案:D

解析:化学预防是指对无症状者(D 对)使用药物、营养素(包括矿物质)、生物制剂或其他天然物质作为第一级预防措施,提高人群抵抗疾病的能力,防止某些疾病的发生。

44. 答案:B

解析:猫抓病是由汉赛巴通体属立克次体感染引起的自限性淋巴结炎,病理表现为组织细胞演变的上皮样细胞形成肉芽肿,肉芽肿中央可见中性粒细胞浸润形成化脓性肉芽肿(B 对)。组织细胞性坏死性淋巴结炎(A 错)组织学表现为淋巴结被膜下和副皮质区不规则的片状或灶性坏死,可见明显的核碎片,中性粒细胞稀少或缺如。反应性淋巴结炎(C 错)是淋巴结最常见的良性病变,微生物感染或炎症刺激可导致白细胞增多和淋巴结肿大。结核(D 错)病变早期局部有中性粒细胞浸润,但很快被巨噬细胞所取代。

45. 答案:A

解析:对涉及人的生物医学研究需要进行伦理审查(C 对),目的是为保护人的生命和健康,维护人的尊严,尊重和保护受试者的合法权益(E 对),是医学科学发展的必然要求。目前涉及人的生物医学研究以药物和医疗器械临床试验为主(D 对),需要公平选择受试者,合理的风险与受益比例,知情同意书规范(B 对),尊重受试者权利,遵守科研诚信规范。有偿服务不是涉及

人的生物医学研究伦理原则(A 错, 为本题的正确答案)。

46. 答案:B

解析: α -银环蛇毒(B 对)可阻断胆碱能突触后膜的 N2 型乙酰胆碱(ACh)受体通道。新斯的明(A 错)及有机磷农药(D 错)可抑制突触后膜上的乙酰胆碱酯酶, 阻碍乙酰胆碱水解使其持续发挥作用。阿托品(C 错)是 M 受体阻断剂, 不能阻断神经受体与乙酰胆碱受体结合。酚妥拉明(E 错)是竞争性、非选择性 α_1 和 α_2 受体阻滞药, 其作用持续时间较短。

47. 答案:C

解析: 目前我国提倡的活体供体器官获取的方式是自愿捐献(C 对)。

48. 答案:C

解析: 肝是机体内生物转化最重要的器官, 肝的生物转化作用是机体重要的保护机制, 疾病尤其严重肝病可明显影响生物转化作用。肝功能减退(C 对)是导致人体内生物转化能力下降的主要因素。

49. 答案:C

解析: 弥散性血管内凝血(DIC)是在许多疾病基础上, 致病因素损伤微血管体系, 导致凝血活化, 全身微血管血栓形成, 凝血因子大量消耗并继发纤溶亢进, 引起以出血及微循环衰竭为特征的临床综合征。急性早幼粒(AML)易并发凝血异常而出现全身广泛性出血(C 对)。

50. 答案:C

解析: 面对面的语言交流进行调查的方法, 属于心理评估的会谈法(C 对)。调查法是指从相关的人或材料那里得到相关资料的评估方法(A 错)。观察法是通过对被评估者的行为表现直接或间接(通过摄录像设备等)的观察或观测而进行心理评估的一种方法(B 错)。心理测量就是依据一定法则, 用数量化手段对心理现象或行为加以确定和测定(E 错)。

51. 答案:B

解析: 法定职业病的诊断需要到疾病预防控制中心等职业病诊断的专门管理机构和组织进行, 详细询问、仔细核对职业史是诊断职业病的先决条件(B 对)。

52. 答案:E

解析: 安乐死关乎生命的终止, 自愿被动安乐死虽存有争议, 但争议最小, 且在临床实践中成为一种默认的常态, 常常以病患一方自愿放弃无望的抢救或治疗的方式呈现。赞成方认为当生命的痛苦使生命失去了积极的意义和价值, 而使病人丧失了尊严之时, 实施安乐死是使人摆脱痛苦的折磨、保持人的尊严的合理选择, 符合人道主义原则, 应该得到伦理支持(E 对)。

53. 答案:B

解析: 氨是一种有毒的代谢产物, 它可在肝内被合成尿素, 随尿排出体外。氨的主要代谢去路是在肝合成尿素, 因此, 人体内氨的去向是尿素(B 对)。

54. 答案:E

解析: 医师在执业活动中违反卫生行政规章制度未造成严重后果的, 卫生行政部门可以责令其暂停一定期限的执业活动, 该期限是 6 个月以上 1 年以下(E 对)。

55. 答案:D

解析: 对使用未取得第一类精神药品处方资格擅自开具该类药品处方的医师, 尚未造成严重后果的机构, 应当给予的行政处罚是责令限期改正, 并可处以 5000 元以下的罚款(D 对)。

56. 答案:E

解析: 取得执业助理医师资格证书后, 具有高等学校医学专科学历的, 可以在医疗、预防、保健机构中工作满一定年限后报考执业医师资格考试, 该年限是 2 年(E 对)。

57. 答案:E

解析: 临床预防服务的服务对象是健康人和无症状患者(E 对), 主要提供第一级和第二级预防服务(B 错), 实施个性化的预防干预措施来预防疾病和促进健康(C 错)。

58. 答案:A

解析: 促进卵泡发育成熟的主要激素是卵泡刺激素(A 对), 可直接促进窦前卵泡及窦卵泡颗粒细胞增殖与分化, 分泌卵泡液, 使卵泡生长发育。

59. 答案:B

解析: 金黄色葡萄球菌产生的血浆凝固酶, 能使血浆中的可溶性纤维蛋白原转变为固态的纤维蛋白包绕在菌体

表面,有利于细菌抵抗宿主吞噬细胞的吞噬(ACE对),感染部位与周围组织的界限相对清楚、浓汁粘稠;葡萄球菌繁殖引起的周围纤维蛋白沉积和凝固使感染易于局限化和形成血栓(B错,为本题正确答案)。凝固酶具有免疫原性,能刺激机体产生抗体,具有一定的保护作用(D对)。

60. 答案:A

解析:死腔样的通气是在临床上主要针对于呼吸系统所描述的病理性名词,由于部分肺的肺泡血流出现减少,但是通气是正常的,这部分肺泡内的血液和气体没有进行血气交换。肺泡通气血流比值(每分钟肺泡通气量和每分钟肺血流量的比值)增高(A错B对), $PaCO_2$ 分压升高(C对), PaO_2 分压降低(D对),动脉血氧含量降低(E对)。

61. 答案:A

解析:结核分枝杆菌为专性需氧菌,培养时有较高的营养要求,在改良罗氏培养基(A对)上生长良好。

62. 答案:A

解析:桡骨小头半脱位损伤的韧带主要是环状韧带(A对)。

63. 答案:D

解析:正常成年人一周中等强度的总运动时间是150分钟(D对)。

64. 答案:E

解析:医院获得性肺炎中,病原体进入肺组织引发肺炎最主要的感染途径是误吸胃肠道的定植菌(胃食管反流)和(或)通过人工气道吸入环境中的致病菌引起。社区获得性肺炎的感染途径主要包括:①空气吸入;②血行播散;③邻近感染部位蔓延;④上呼吸道定植菌的误吸。

65. 答案:A

解析:甲状腺癌是最常见的甲状腺恶性肿瘤,病理可分为四型:乳头状癌、滤泡状腺癌、髓样癌、未分化癌。其中,乳头状癌(A对)是成人甲状腺癌的最主要类型和儿童甲状腺癌的全部,分化好,恶性程度较低,虽常有多中心病灶,约1/3累及双侧甲状腺,且较早便出现颈淋巴结转移,但预后较好。

66. 答案:A

解析:固有免疫(非特异性免疫)系统

包括:组织屏障(皮肤和黏膜系统、血脑屏障、胎盘屏障等)(A对);固有免疫细胞(吞噬细胞、杀伤细胞、树突状细胞等);固有免疫分子(补体、细胞因子、酶类物质等)。体内的T淋巴细胞接受适宜的刺激活化成致敏T淋巴细胞(D错)属于特异性免疫。体内的B淋巴细胞接受抗原的刺激活化后释放出抗体参与特异性免疫过程,主要的抗体包括IgA抗体(E错)、IgG抗体(B错)、IgM抗体(C错)、IgE抗体等。

67. 答案:B

解析:在世俗观念中,传染病患者,往往受到不应有的歧视、排挤,应该认识到传染病患者是传染性疾病的受害者,并不能为疾病、疾病传染负责,指责、歧视、排挤是错误的做法,应尊重传染性疾​​病及疑似患者的各项正当权益。禁止将携带乙肝病毒作为入学的限制条件,体现的传染病防控伦理是尊重传染病患者的人格和权利。

68. 答案:E

解析:患者有“上感”史。一周后有血尿,蛋白尿,水肿等临床表现,血肌酐增高,考虑为急性肾小球肾炎,本病为免疫复合物沉积引起体液免疫反应所致(E对)。

69. 答案:E

解析:患者青年女性,腹泻,腹痛半个月,大便可见大量油性物质,胃镜检查发现十二指肠降部多发溃疡,诊断为脂肪泻。胰液由于含有水解糖、脂肪和蛋白质三类营养物质的消化酶,因而是最重要的消化液。其中,胰脂肪酶可分解甘油三酯为脂肪酸、一酰甘油和甘油,是体内分解脂肪的主要酶类。当胰脂肪酶失活时,食物中的脂肪仍不能完全消化和吸收,常可引起脂肪泻。

70. 答案:B

解析:我国辅助生殖技术应用伦理准则包括:1.有利于患者;2.知情同意;3.保护后代;4.社会公益;5.保守医密;6.严防商业化;7.伦理监督。其中社会公益准则包括不得对单身妇女实施人类辅助生殖技术(B对)。

71. 答案:A

解析:医疗机构根据《药品不良反应管理办法》,对已知新的,严重的不良反

应上报时限是 15 日内报告，其中死亡病例须立即报告；其他药品不良反应应当在 30 日内报告；有随访信息的，应当及时报告(A 对)。

72. 答案:E

解析:铅中毒主要损害神经系统、造血系统和消化系统等，出现类神经症、外周神经炎、低色素性正常细胞性贫血(E 对)。汞中毒主要损害神经系统和消化系统，并出现口腔炎、震颤和易兴奋等表现(D 错)。镉中毒主要损害肾脏和骨骼，比如发生在日本神通川的痛痛病(A 错)。苯中毒主要表现为神经系统、呼吸系统的症状，可致白血病(C 错)。砷中毒。有明显急性胃肠炎症状，如剧烈的恶心与呕吐等，有中枢神经系统症状如头痛、烦躁等，最后可因呼吸中枢麻痹而死亡，可并发急性肾功能衰竭、多发性神经炎、中毒性肝炎和心肌炎(B 错)。

73. 答案:A

解析:为调查老年人疫苗接种率，根据经济发达程度情况将区域分为发达、中等、落后三层，然后在每层中按 1/10 比例抽样，为分层抽样方法(A 对)。系统抽样又称机械抽样，是按照一定顺序，机械地每隔若干单位抽取一个单位的抽样方法(B 错)。单纯随机抽样也称简单随机抽样，指从总体 N 个对象中，利用抽签、随机数字表等方法抽取 n 个对象组成一个样本(C 错)。整群抽样指将总体分成若干群组，以群组为抽样单位进行随机抽样，被抽到群组中的全部个体均作为调查对象(D 错)。

74. 答案:B

解析:当个体经历应激源刺激后，常自觉或不自觉在行为上发生改变，以摆脱烦恼，减轻内在不安，恢复与环境的稳定性。本患者认为局部癌组织已切除，不要再想着自己是癌症患者，应坦然地面对生活，此做法为调整对疾病的认知，是积极的行为应对反应(B 对)。

75. 答案:C

解析:《医疗事故处理条例》规定，因抢救危急患者，未能及时书写病历的，有关医务人员应当在抢救结束后 6 个小时内据实补记，并加以注明(C 对)。

76. 答案:D

解析:医务人员的职业特点决定其有权了解患者与病症诊治有关的一些隐私，但是患者也有权维护自己的隐私不受侵害，对于医务人员已经了解的患者隐私，患者享有不被擅自公开的权利。本题患者的隐私未涉及到社会公益，医生违背了保密原则(D 对)。

77. 答案:C

解析:患者因到国外读取硕士，语言不通，生活习惯不同等原因引起的应激，此应激源为文化性应激源(C 对)。在这种情况下，个体将面临一种生疏的生活方式、习惯与风俗，从而不得不改变自己原来的生活方式与习惯，以顺应新的情况。

78. 答案:D

解析:某战士参加抢险救灾时，接到家里电话，得知母亲病危，属于两个目标具有相同的吸引力，引起同样强度的动机，但由于受条件等因素的限制，无法同时实现，只能选在其一，为双趋冲突(D 对)。趋避冲突指一个人对同一事物同时产生两种动机，即向往得到它，同时又想拒绝和避开它(A 错)。双避冲突指一个人同时受到两种事物的威胁，产生同等强度的逃避动机，但迫于情势，必须接受其中一个，才能避开另一个，处于左右为难，进退维谷的紧张状态(B 错)。双重趋避式冲突指人们常常会遇到多个目标，每个目标对自己都有利也都有弊，反复权衡拿不定主意所产生的冲突(E 错)。

79. 答案:C

解析:回避原则是指由于心理治疗交谈十分深入，难免涉及隐私，因此心理治疗不宜在熟人之间进行，亲人与熟人均应在治疗中回避(C 对)。尊重原则指尊重患者的生命、人格尊严，呵护患者的隐私，尊重患者的自主权(A 错)。不伤害原则要求医务人员在诊治过程中，应尽量避免对患者造成生理上和心理上的伤害，更不能人为有意地制造伤害(D 错)。中立原则要求治疗者在心理治疗过程中保持中立的态度和立场(E 错)。

80. 答案:A

解析:患者老年男性，烧伤半小时，痛苦貌，神志清，全身二度烧伤达 50%。

血压下降，心率增快。严重的大面积烧伤常伴有血浆的大量渗出而丢失，可造成有效循环血量减少，使组织灌流量不足引起烧伤性休克。其早期与低血容量和疼痛有关，晚期则常因继发感染而发展为中毒性休克。

81. 答案:E

解析:同一患者一天申请备血量在 800ml~1600ml 的,由具有中级以上专业技术职务任职资格的医师提出申请,经上级医师审核,科室主任核准签发后,方可备血(E 对)。同一患者一天申请备血量 <800ml 的,由具有中级以上专业技术职务任职资格的医师提出申请,上级医师核准签发后,方可备血。同一患者一天申请备血量 $\geq 1600\text{ml}$ 的,由具有中级以上专业技术职务任职资格的医师提出申请,科室主任核准签发后,报医务部门批准,方可备血(D 错)。

82. 答案:A

解析:肾的被膜有三层,由浅向深依次为肾筋膜、脂肪囊和纤维囊。纤维囊为肾的固有膜,由丰富的胶原纤维、弹性纤维及平滑肌构成,质薄而坚韧,被覆于肾表面,有保护肾的作用,肾部分切除或肾外伤时,应缝合纤维膜,以防肾实质撕裂(A 对)。

83. 答案:D

解析:男性 55 岁患者,慢性乙型肝炎病史 10 年,巩膜黄染可见肝掌,蜘蛛痣,脾肋下 3cm,病前 1 小时进食,呕血 30 分钟,晕厥 1 次,提示为肝硬化食管胃底静脉曲张破裂出血。肝硬化典型的组织病理特点是假小叶形成(D 对)。

84. 答案:E

解析:医师刘某未经诊治擅自给李某开具诊断证明书,违反了执业医师法的相关规定,由县级以上人民政府卫生行政部门给予警告或者责令暂停 6 个月以上 1 年以下执业活动(E 对)。情节严重的,吊销其执业证书;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

85. 答案:A

解析:老年患者,右侧肢体动作迟缓伴震颤半年,右侧肢体静止性震颤,肌张力齿轮样增高,考虑为帕金森病。病变部位可为黑质(A 对)。新纹状体病

变可出现肌张力减低-运动过多综合征,主要产生舞蹈样动作、手足徐动症和偏身投掷运动等(E 错)。苍白球内侧,苍白球外侧(BC 错)均为苍白球部分,苍白球出现较早,称为旧纹状体,旧纹状体病变可出现与黑质病变相同的体征。

86. 答案:D

解析:患者乙肝病史 20 年,呕吐鲜血 4 小时,呕吐量 500ml(考虑有消化道出血),血压低,颈部有蜘蛛痣(雌激素增多),考虑为肝硬化并发食管胃底静脉曲张。与消化道出血相关的结构包括胃冠状静脉,食管静脉(D 对),奇静脉。

87. 答案:A

解析:男性 40 岁,处于人生中年阶段,中年人不论在社会、家庭,都处于一个承上启下的中坚地位。他们经历了半生奋斗,闯过了人生的风风雨雨,在事业上已有一定成绩,但肩上仍继续承担着事业的重担。中年人成为心理负荷最大的人群,往往心力憔悴,容易产生心理健康问题。所以此阶段适应环境,积极的处世态度,与社会广泛接触,具有顺应社会改革变化的能力,勇于改造现实环境,达到自我实现与社会奉献的协调统一最符合心理健康的标准(A 对)。

88. 答案:C

解析:指导-合作模式中患者被看作有意识、有思想的人,具有一定的主动性,能够主动述说病情,反映诊治情况,配合检查和治疗,有助于发挥患者的积极性,提高诊治效果,也是目前较普遍采用的一种模式(C 对)。共同参与模式中医患双方共同参与医疗方案的讨论、制订与分享,适用于具有一定医学知识背景或长期的慢性病患者(A 错)。主动-被动模式适用于昏迷、休克、精神病患者发作期、严重智力低下者以及婴幼儿等一些难以表达主观意志的患者(B 错)。

89. 答案:C

解析:患者阵发性胸痛 1 年,多在凌晨睡眠或刚起床时发作胸痛,每次持续 10 分钟左右,含硝酸甘油可缓解,考虑为变异型心绞痛(C 对)。变异型心绞痛特征为静息心绞痛,表现为一过性

ST 段动态改变，发作于休息时。稳定型心绞痛也称劳力性心绞痛。其特点为阵发性的前胸压榨性疼痛或憋闷感觉，主要位于胸骨后部，可放射至心前区和左上肢尺侧，常发生于劳力负荷增加时，持续数分钟，休息或用硝酸酯制剂后疼痛消失(A 错)。不稳定型心绞痛包括静息型心绞痛，初发型心绞痛，恶化型心绞痛。初发型心绞痛通常在首发症状 1~2 个月内，很轻的体力活动可诱发(程度至少达 CCSIII 级)。恶化型心绞痛在相对稳定的劳力性心绞痛基础上心绞痛逐渐增强(疼痛更剧烈、时间更长或更频繁，按 CCS 分级至少增加 1 级水平，程度至少 CCS III 级)(BDE 错)。

90. 答案:C

解析:患者即往有风湿病病史(自身免疫性疾病)，贫血貌，巩膜轻度黄染，脾肿大，血红蛋白减少，白细胞增多，网织红细胞增多，coombs(+)(抗人球蛋白试验)，可诊断为自身免疫性贫血(C 对)。阵发性睡眠血红蛋白尿症有贫血，晨起血红蛋白尿等临床表现，血象检查白细胞，血小板减少(A 错)。地中海贫血又称珠蛋白生成障碍性贫血，为遗传性疾病，轻症患者临床可无症状或轻度贫血，偶有轻度脾大，重症患者在刚出生时即有贫血，脾大，黄疸等症状(B 错)。遗传性球形红细胞增多症，为遗传性疾病，临床特点为自幼发生的贫血、间歇性黄疸和脾大，外周血小球形红细胞增多，红细胞渗透脆性增加(D 错)。葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症为遗传性疾病，在服食药物或蚕豆后出现溶血特征，应考虑本病，红细胞 G-6-PD 活性定量测定是确定 G-6-PD 缺乏最可靠的方法，具有确诊价值(E 错)。

91. 答案:B

解析:患者为建筑工人，在高温露天环境下进行体力劳动，多汗，出现头痛、腹痛，呕吐，抽搐，体温 40 度，脉压增高，浅昏迷，心率加快，可诊断为热射病(B 对)。热痉挛无明显的体温升高，无神志障碍(C 错)。热衰竭多见于老年人、儿童和慢性病病人，中心体温不超过 40 度，无意识障碍(A 错)。癫痫发作突然，有意识障碍，抽搐等

临床表现，不会出现体温升高(D 错)。突然发生的持续性剧烈头痛、呕吐、脑膜刺激征阳性，伴或不伴意识障碍，检查无局灶性神经系统体征，应高度怀疑蛛网膜下腔出血。同时 CT 证实脑池和蛛网膜下腔高密度征象或腰穿检查示压力增高和血性脑脊液等可临床确诊(E 错)。

92. 答案:A

解析:患者呼吸困难，胸痛，胸骨右缘第二肋间听到收缩期喷射样杂音，为主动脉瓣狭窄，主要原因为主动脉瓣缩窄和粘连(A 对)。因主动脉瓣叶增厚形成瘢痕，收缩跟卷曲使瓣叶不能向中间靠拢，导致主动脉瓣关闭不全(B 错)。肺动脉病变为胸骨左缘第二肋间闻及心脏杂音(CD 错)。三尖瓣病变为胸骨左下缘可闻及心脏杂音(E 错)。

93. 答案:A

解析:加强临终病人的医疗服务已成为普遍客观的社会需求，临终关怀开始逐步兴起。临终关怀是针对垂危病人进行的一种特殊医疗照护，其目的在于减轻其临终心理负担，解除其对疼痛及死亡的恐惧和不安，满足其生理、心理和社会的需求，已达到提高临终病人的生存质量(B 对)的根本目的，让病人在人生的最后岁月中，能够安详、宁静、无痛苦、舒适且有尊严地离开人世，并同时使其家属的身心健康得到维护和增强。

94. 答案:B

解析:患者既往有注射毒品史(流行病学史)，全身不适，发热厌食恶心半个月，全身多处淋巴结肿大(艾滋病急性期临床表现)，口腔毛状白斑(机会性感染)，血白细胞减少，尿蛋白阳性，可考虑为艾滋病，抗 HIV 免疫缺陷抗体检查(B 对)。应进行检查登革热病毒抗体用于确诊登革热，登革热的传播途径为伊蚊，凡是具有发热、皮疹、白细胞和血小板减少等表现的病例均应考虑此病的可能(A 错)。汉坦病毒主要引起肾综合征出血热，本病的主要病理变化是全身小血管和毛细血管广泛性损害，临床上以发热、低血压休克、充血出血和肾损害为主要表现，主要为鼠类传播(C 错)。乙型肝炎病毒标志检测为乙型肝炎确诊依据，乙型

肝炎根据其病程分为慢性和急性肝炎，可有不同临床表现(D 错)。

95. 答案:B

解析:患者发热,头痛(全身中毒症状),腋下皮肤散在出血点(毛细血管损伤),血压下降,白细胞增多,主要为中性粒细胞和淋巴细胞,出现异型淋巴细胞,血小板减少,蛋白尿强阳性,脑膜刺激征阴性,可诊断为肾综合征出血热(B 对)。流行性乙型脑炎(A 错)起病急,有高热、头痛、呕吐、嗜睡等表现。重症患者有昏迷、抽搐、吞咽困难、咳嗽和呼吸衰竭等症状。体征有脑膜刺激征、浅反射消失、深反射亢进、强直性瘫痪和阳性病反射等。流行性脑脊髓膜炎(C 错)前驱期一般有上呼吸道感染,其主要临床表现是突发高热、剧烈头痛、频繁呕吐,皮肤黏膜淤点、瘀斑及脑膜刺激征,严重者可有败血症休克和脑实质损害,常可危及生命。化脓性脑膜炎(D 错)的中枢神经系统表现与乙脑相似,但多以脑膜炎的表现为主,脑实质病变的表现不突出,脑脊液呈细菌性脑膜炎改变,涂片和培养可找到细菌。结核性脑膜炎(E 错)常有结核病史,起病较缓,病程长,脑膜刺激征较明显,而脑实质病变表现较轻。脑脊液蛋白明显增高,氯化物明显下降,糖降低,其薄膜涂片或培养可检出结核分枝杆菌。

96. 答案:C

解析:患者前壁,下壁心肌梗死,心电图显示 P 波与 QRS 波各自成节律,心房率快于心室率,为三度(完全性)房室阻滞,心室率 40 次/分,考虑位于希氏束及其近邻(C 对)。

97. 答案:E

解析:患者活动障碍右小指不能弯曲,浅感觉障碍,可能损伤的神经是尺神经(E 对)。尺神经损伤主要表现为环、小指爪形手畸形及手指内收、外展障碍和 Froment 征以及手部尺侧半和尺侧一个半手指感觉障碍,特别是小指感觉消失。桡神经损伤表现为伸腕、伸拇、伸指、前臂旋后障碍及手背挠侧(虎口区)感觉异常。典型的畸形是垂腕(B 错)。正中神经损伤常由儿童肱骨髁上骨折和腕部切割伤引起。腕部

损伤时所支配的鱼际肌和蚓状肌麻痹表现为拇指对掌功能障碍和手的桡侧半感觉障碍,特别是示、中指远节感觉消失。而肘上损伤则所支配的前臂肌亦麻痹,除上述表现外,另有拇指和示、中指屈曲功能障碍(C 错)。

98. 答案:A

解析:患者自服乐果(有机磷农药),有机磷农药进入体内抑制乙酰胆碱酯酶活性,引起体内生理效应部位乙酰胆碱大量蓄积,出现毒蕈碱样、烟碱样和中枢神经系统等中毒症状和体征,病人常死于呼吸衰竭(A 对)。

99. 答案:D

解析:患者接触性阴道出血(考虑宫颈鳞状上皮病变或宫颈癌)(BE 错),宫颈呈糜烂样改变,病理活检可见异形细胞局限宫颈上皮的 1/3 黏膜下炎细胞浸润,属于宫颈低鳞状上皮病变(D 对)。宫颈高鳞状上皮病变异型细胞扩展到上皮 2/3 层甚至全层(C 错)。微小浸润性鳞状细胞癌:指在宫颈高鳞状上皮病变基础上镜检发现小滴状、锯齿状癌细胞团突破基底膜,浸润间质(A 错)。

100. 答案:C

解析:在乙类传染病中按照甲类传染病防控的包括传染性非典型肺炎、炭疽中的肺炭疽(C 对)、人感染高致病性禽流感。鼠疫(A 错)属于甲类传染病。肺结核(B 错)属于乙类传染病。流行性斑疹(D 错)和流行性感冒(E 错)属于丙类传染病。

101. 答案:B

解析:患者晨起右半身体麻木伴痛觉缺失 1 小时,右侧偏身感觉减退伴轻度自发疼痛,四肢肌张力正常,考虑为丘脑型感觉障碍,背侧丘脑又称为丘脑(B 对)。底丘脑核损害时可出现对侧以上肢为重的舞蹈运动,表现为连续的不能控制的投掷运动,称偏身投掷运动(C 错)。前庭小脑(A 错)受损临床表现为站立不稳,改变头位可使症状加重,行走时向患侧倾倒,伴有明显的眩晕、恶心、呕吐、眼球震颤。大脑皮质(D 错)中央后回和旁中央小叶后部为皮质感觉中枢,受损时有两个特点:①出现病灶对侧的复合感觉(精细感觉)障碍,如实体觉、图形觉、

两点辨别觉、定位觉和对各种感觉强度的比较障碍，而痛、温觉障碍轻；②皮质感觉区范围广，如部分区域损害，可出现对侧一个上肢或一个下肢分布的感觉缺失或减退，称为单肢感觉减退或缺失。如为刺激性病灶，则出现局限性感觉性癫痫(发作性感觉异常)。基底神经节(E 错)病变主要产生运动异常(动作增多或减少)和肌张力改变(增高或降低)。

102. 答案:A

解析:心理治疗中往往涉及个人隐私，交谈十分深入，同时要保持中立，这些在亲友和熟人中都难以做到。因此，一般情况下要回避亲友和熟人进行心理治疗(A 对)。

103. 答案:A

解析:患者与家人均吃了自制的酱豆腐(流行病学史)，多人出现全身无力，发音不出，不能张口，呼吸困难等临床表现，考虑为肉毒素中毒，肉毒素中毒主要造成迟缓性瘫痪，最终导致膈肌麻痹、呼吸困难，直至呼吸停止导致死亡，主要由罐头，腊肠，香肠和发酵豆制品等所引起(A 对)。痉挛毒素(B 错)由破伤风梭菌产生，早期典型的症状是咀嚼肌痉挛所造成的苦笑面容和牙关紧闭，逐步出现持续性背部肌肉痉挛、角弓反张。肠毒素(C 错)是一类作用于肠上皮细胞、引起肠道功能紊乱的毒素。大肠埃希菌产生溶血素 A(E 错)可导致泌尿道感染。神经性毒素(D 错)是毒素的一种，可分为哺乳动物神经毒素，昆虫神经毒素，甲壳动物神经毒素，主要是指作用于离子通道的毒素，此种毒素可以作用于运动神经与肌肉接合处，而造成横纹肌不收缩，迅速导致呼吸麻痹，窒息死亡。

104. 答案:B

解析:患者风湿热病史 20 年，心悸气短发作 8 年，考虑患者风湿热累及心脏，因急性胃肠炎静脉输液 3 小时，静脉回心血量增多，突发呼吸困难，咳粉红色泡沫痰，端坐呼吸，双肺布满中小水泡音考虑患者有左心衰竭，造成肺淤血水肿，肺毛细血管流体静压增高(B 对)，肺泡壁毛细血管扩张充血，肺泡壁变厚，可伴肺泡间隔水

肿，部分肺泡腔内充满水肿液。

105. 答案:A

解析:自我效能指一个人对自己实施或放弃某一行为的能力的自信，相信自己一定能通过努力成功地采取一个导致期望结果的行动。题干中患者存在的主要问题为在没有采取行动前，认为无法管住自己，害怕计划难以实施，需要提高自我效能(A 对)来增加对行动和计划实施的自信。

106. 答案:E

解析:患者患有躯体疾病，出现抑郁，想通过自杀解除病痛之苦，为角色行为异常(E 对)。随着躯体的康复，病人角色行为也应转化为正常的社会角色行为。如果这种转化发生阻碍，个体安于病人角色的现状，角色的行为与其疾病症状程度不吻合，对自我过度表示怀疑和忧虑，行为上表现出较强的退缩和依赖性，这就是病人角色行为强化(A 错)。角色行为冲突(B 错)为当多种社会地位和多种角色集于一人时，在其自身内部产生的冲突，个体在适应病人角色过程中，与其病前的各种角色发生心理冲突而引起行为的不协调。角色行为缺如为病人未能进入病人角色，没有配合医疗活动恢复健康的想法与行为(C 错)。角色行为减退为个体进入病人角色后，由于某种原因又重新承担起本应免除的社会角色的责任，放弃了病人角色去承担其他角色的活动(D 错)。

107. 答案:B

解析:二类精神药品处方应至少保存 2 年备查(B 对)。

108. 答案:E

解析:患者甲状腺包块，质硬，降钙素升高，间质见淀粉样物质沉淀，可考虑为甲状腺髓样癌(E 对)。单纯性甲状腺肿，甲状腺瘤，甲状腺滤泡细胞癌，桥本甲状腺炎降钙素均为阴性(ABCD 错)。

109. 答案:A

解析:患者尿频，尿急，尿痛，直肠指检前列腺增大，PSA 正常，尿流速 9ml/s < 10ml/s，梗阻严重，残尿量增多，考虑为良性前列腺增生(A 对)。前列腺癌多有血清 PSA 升高(B 错)。膀胱颈挛缩前列腺体积多不增大(C 错)。尿道狭窄

(D 错)多有尿道损伤及感染病史。神经源性膀胱功能障碍(E 错)前列腺体积不增大,病人常有中枢或周围神经系统损害的病史和体征。

110. 答案:B

解析:患者尿频,尿急,尿痛,直肠指检前列腺增大,PSA 正常,尿流速 9ml/s <10ml/s,梗阻严重,残尿量增多,考虑为良性前列腺增生。症状严重、存在明显梗阻或有并发症者应选择手术治疗。经尿道前列腺切除术(TURP)适用于大多数良性前列腺增生病人,是目前最常用的手术方式(B 对)。

111. 答案:D

解析:对医疗服务需方的控制措施主要是通过费用分担的方式,促使需方增加费用意识,主动控制医疗费用的不合理利用。主要的共付措施包括起付线、共付比例以及封顶线。封顶线也叫最高支付限额,低于封顶线的医疗费用由医疗保险按比例支付,超出封顶线的医疗费用由被保险人自己负担(D 对)。医疗保险机构按照合同或政府的规定对被保险人的医疗费用按一定的比例进行补偿,剩余比例的费用由个人自己负担,称为共同付费方式,又称按比例分担(A 错)。起付线是指医疗保险开始支付医疗费用的最低标准,低于起付线的医疗费用由被保险人自付,超过起付线以上的医疗费用由医疗保险按规定支付(B 错)。

112. 答案:B

解析:对医疗服务需方的控制措施主要是通过费用分担的方式,促使需方增加费用意识,主动控制医疗费用的不合理利用。主要的共付措施包括起付线、共付比例以及封顶线。起付线是指医疗保险开始支付医疗费用的最低标准,低于起付线的医疗费用由被保险人自付,超过起付线以上的医疗费用由医疗保险按规定支付(B 对)。医疗保险机构按照合同或政府的规定对被保险人的医疗费用按一定的比例进行补偿,剩余比例的费用由个人自己负担,称为共同付费方式,又称按比例分担(A 错)。封顶线也叫最高支付限额,低于封顶线的医疗费用由医疗保险按比例支付,超出封顶线的医疗费用由被保险人自己负担(D 错)。

113. 答案:D

解析:儿童锁骨骨折多为青枝骨折,儿童的青枝骨折及成人的无移位骨折可不作特殊治疗。仅用三角巾悬吊患肢 3~6 周即可开始活动(D 对)。神经根型颈椎病首选颈椎牵引治疗(A 错)。肩关节前脱位应首选手法复位加外固定治疗,肩关节后脱位往往需行切开复位加外固定方法治疗(B 错)。桡骨远端骨折首选手法复位石膏固定(C 错)。桡骨头半脱位首选手法复位,无需固定(E 错)。

114. 答案:A

解析:神经根型颈椎病由于突出的椎间盘、增生的钩椎关节压迫相应的神经根,引起神经根性刺激症状。临床上开始多为颈肩痛,短期内加重,并向上肢放射。首选非手术治疗,包括颈椎牵引(A 对)、颈部制动、颈部理疗、改善不良工作体位和睡眠姿势、调整枕头高度等方法。神经根性疼痛剧烈,保守治疗无效的可手术治疗。肩关节前脱位应首选手法复位加外固定治疗,肩关节后脱位往往需行切开复位加外固定方法治疗(B 错)。桡骨远端骨折首选手法复位石膏固定(C 错)。儿童锁骨青枝骨折仅用三角巾悬吊法进行治疗(D 错)。桡骨头半脱位首选手法复位,无需固定(E 错)。

115. 答案:C

解析:桡骨远端骨折根据受伤的机制不同,可发生伸直型骨折、屈曲型骨折、桡骨远端关节面骨折伴腕关节脱位,均首先采用手法复位、夹板或石膏外固定方法治疗,部分需手术治疗(C 对)。神经根型颈椎病首选颈椎牵引治疗(A 错)。肩关节前脱位应首选手法复位加外固定治疗,肩关节后脱位往往需行切开复位加外固定方法治疗(B 错)。儿童锁骨青枝骨折仅用三角巾悬吊法进行治疗(D 错)。桡骨头半脱位首选手法复位,无需固定(E 错)。

116. 答案:A

解析:慢性失血性贫血往往合并缺铁性贫血,属于小细胞低色素性贫血,MCV <80fl, MCHC <32%(A 对)。VB12 缺乏性贫血、叶酸缺乏性贫血为巨幼细胞性贫血,属于大细胞性贫血(BC 错)。骨髓增生异常综合征以血细胞病

态造血为特征(D 错)。再生障碍性贫血为正细胞性贫血(E 错)。

117. 答案:E

解析:正细胞性贫血常见疾病包括:再生障碍性贫血、纯红细胞再生障碍性贫血、溶血性贫血、骨髓病性贫血、急性失血性贫血(E 对)。大细胞性贫血常见疾病包括:巨幼细胞贫血、伴网织红细胞大量增生的溶血性贫血、骨髓增生异常综合征、肝疾病。小细胞性贫血常见疾病包括:缺铁性贫血、铁粒幼细胞贫血、珠蛋白生成障碍性贫血。慢性失血性贫血为小细胞低色素性贫血(A 错)。VB12 缺乏性贫血、叶酸缺乏性贫血为巨幼细胞性贫血,属于大细胞性贫血(BC 错)。骨髓增生异常综合征以血细胞病态造血为特征(D 错)。

118. 答案:D

解析:骨髓增生异常综合征(MDS)是一组起源于造血干细胞,以血细胞病态造血,高风险向急性髓系白血病(AML)转化为特征的异质性髓系肿瘤性疾病。实验室检查表现为持续一系或多系血细胞减少,骨髓增生度多在活跃以上,少部分呈增生减低(D 对)。慢性失血性贫血为小细胞低色素性贫血(A 错)。VB12 缺乏性贫血、叶酸缺乏性贫血为巨幼细胞性贫血,属于大细胞性贫血(BC 错)。再生障碍性贫血为正细胞性贫血(E 错)。

第二单元

1. 答案:C

解析:感染是肾病综合征病人最常见的并发症,常见感染部位为呼吸道,泌尿道和皮肤等(C 对)。肾病综合征也会出现血液高凝及血栓形成,急性肾损伤导致肾功能不全和蛋白质、脂肪代谢紊乱等并发症,但以感染最常见(BE 错)。低血容量性休克是继发于体内外急性大量失血或体液丢失,多见于创伤大出血,消化道出血,烧伤等(D 错)。

2. 答案:E

解析:右心衰竭时颈静脉搏动增强,充盈、怒张,肝颈静脉反流征阳性为特征性体征(E 对)。右心衰竭有凹陷性水肿,肝大,及右心增大而出现三尖瓣

关闭不全导致的反流性杂音。端坐呼吸,劳力性呼吸困难,阵发性夜间呼吸困难为左心衰竭的症状(ACD 错),心源性哮喘是由于左心衰竭和急性肺水肿等引起的发作性气喘(B 错)。

3. 答案:B

解析:超声心动图是评价心功能最常见的检查方法,为无创性(B 对)。放射性核素心血池显影能相对准确地评价心脏大小和 LVEF,计算左心室最大充盈速率以及反映心脏舒张功能,但在测量心室容积或更精细的心功能指标方面价值有限(D 错)。动态心电图可以获得受检者日常生活状态下连续 24 小时甚至更长时间的心电图资料,因此常可检测到常规心电图检查不易发现的一过性异常心电图改变(C 错)。心电图运动负荷试验是判断是否存在心肌缺血及发现早期冠心病的一种检测方法(E 错)。

4. 答案:B

解析:传染期指传染源排出传染性病原体的整个时期。传染期是决定隔离病人期限的依据,它因传染病不同而异(B 对)。从病原体侵入人体起,至开始出现临床症状为止的时期,称为潜伏期,有些传染病在潜伏期末已具传染性。当机体的免疫力增长至一定程度,体内病理生理过程基本终止,患者的症状及体征基本消失,临床上称为恢复期,恢复期多无传染性。从起病至症状明显开始为止的时期称为前驱期,前驱期已具有传染性。临床期传染病所特有的症状和体征都通常获得充分的表现。传染期包括了潜伏期,恢复期,前驱期,症状明显期患者有传染性的时期(ACDE 错)。

5. 答案:A

解析:红细胞内缺铁,血红素合成障碍,大量原卟啉不能与铁结合成为血红素,血红蛋白生成减少,红细胞胞质少、体积小,发生小细胞低色素性贫血(A 对)。再生障碍性贫血是一种由不同病因和机制引起的骨髓造血功能衰竭症。主要表现为骨髓造血功能低下、全血细胞减少及所致的贫血、出血、感染综合征(B 错)。巨幼细胞贫血为叶酸或维生素 B12 缺乏所引起的大红细胞性贫血(D 错)。海洋性贫血为珠蛋白生成

障碍所导致的贫血，是遗传性溶血性贫血疾病(C 错)。慢性病贫血多伴有其他慢性疾病的症状(E 错)。

6. 答案:E

解析:红细胞从肾小球基底膜漏出,通过具有不同渗透梯度的肾小管时,化学和物理作用使红细胞膜受损,血红蛋白溢出而变形,因此肾小球性血尿红细胞大小不一、形态多样(E 对)。肉眼血尿指尿呈洗肉水色或血色,肉眼即可见的血尿,见于多种泌尿系统疾病(D 错)。尿液镜检每高倍视野有红细胞 3 个以上,尿色正常,为尿潜血阳性(C 错)。全程血尿提示血尿来自肾脏或输尿管(A 错)。合并尿路刺激征提示膀胱和尿道病变(B 错)。

7. 答案:E

解析:右心衰竭,心室舒张期负荷过重,心肌张力减低,顺应性减退,以致心室舒张时,血液充盈引起室壁振动,可出现舒张早期奔马律,右室奔马律在剑突下或胸骨左缘第 5 肋间,吸气时较清楚,综合各选项, E 对。胸骨左缘 2~3 肋间闻及收缩期杂音见于肺动脉瓣狭窄(E 错)。胸骨左缘 3~4 肋间闻及收缩期杂音见于室间隔缺损(D 错)。右心衰也可有心率增快和心律不齐,但不具有诊断意义(A 错)。

8. 答案:E

解析:不宜应用的情况有:血钾低于 3.5mmol/L,心率低于 60 次/分,预激综合征合并心房颤动:二度或高度房室传导阻滞:病态窦房结综合征,特别是老年人:单纯性舒张性心力衰竭如肥厚型心肌病:单纯性重度二尖瓣狭窄伴窦性心律而无右心衰竭的患者:急性心肌梗死,尤其在最初 24 小时内。除非合并心房颤动和(或)心腔扩大。

9. 答案:D

解析:局部疼痛,活动受限,功能障碍,局部瘀斑均为骨折的一般表现(ABCE 错),骨折的特有体征为畸形,异常活动,骨擦音或骨擦感(D 对)。

10. 答案:C

解析:遗传性球形细胞增多症和 PNH(阵发性睡眠性血红蛋白尿症)属于红细胞膜异常性溶血性贫血(AB 错)。自身免疫性溶血性贫血属于红细胞周

围环境异常所致的溶血性贫血(C 对)。血红蛋白病属于珠蛋白肽链结构异常所致的贫血(E 错)。失血性贫血不属于溶血性贫血(D 错)。

11. 答案:C

解析:氨茶碱在支气管哮喘与心源性哮喘中均可应用,并有较好疗效(C 对)。西地兰用于急性和慢性心力衰竭、心房颤动和阵发性室上性心动过速(A 错)。肾上腺素临床主要用于心脏骤停、支气管哮喘、过敏性休克,也可治疗荨麻疹、枯草热及鼻粘膜或齿龈出血(B 错)。异丙肾上腺素用于支气管哮喘及心脏房室传导阻滞(D 错)。去甲肾上腺素为缩血管药物,主要用于抢救急性低血压和周围血管扩张所引起的休克(E 错)。

12. 答案:D

解析:淋病以性传播为主,间接传播比例很小(B 对),病原菌为淋病奈瑟菌,为革兰阴性双球菌(E 对),对柱状上皮及移行上皮黏膜有亲和力,易侵袭黏膜(A 对),是世界上发病率最高的性传播疾病(C 对),感染主要表现为子宫颈炎,也可有尿道炎、前庭大腺炎、输卵管炎和子宫内膜炎等表现(D 错,为本题正确答案)。

13. 答案:D

解析:红细胞破坏增多的检查主要包括:血中游离胆红素增多、尿胆原升高、血清结合珠蛋白降低、血浆游离血红蛋白升高、尿血红蛋白阳性、乳酸脱氢酶升高、破碎和畸形红细胞升高、红细胞寿命缩短(D 对)。靶形红细胞增多见于珠蛋白生成障碍性贫血、异常血红蛋白病(E 错)。网织红细胞增多表示骨髓红细胞系增生旺盛,常见于溶血性贫血、急性失血、缺铁性贫血、巨幼细胞贫血(A 错)。晚幼红、晚幼粒均是骨髓造血功能的检测(CD 错)。

14. 答案:C

解析:心功能 III 级:严重的心力衰竭临床症状与体征。严重肺水肿,肺部 50% 以上肺野湿性啰音(C 对)。肺部有啰音,但啰音的范围小于 1/2 肺野为心功能 II 级(A 错)。肺部可闻及散在的哮鸣音多见于支气管哮喘(D 错)。血压 <70/40mmHg 为低血压。

15. 答案:E

解析:股骨颈长轴线与股骨干纵轴线之间形成的夹角为颈干角,为 $110^{\circ}\sim 140^{\circ}$,平均 127° ,为正常解剖学夹角(A错)。股骨颈骨折线与两髂棘连线之间的夹角为股骨颈骨折 Pauwels 角,大于 50° 为内收骨折,小于 30° 为外展骨折(E对)。

16. 答案:D

解析:病毒性心肌炎患者多数有病毒感染前驱症状,如发热、全身倦怠感和肌肉酸痛,或恶心、呕吐等消化道症状,绝大部分是以心律失常为主诉或首见症状,其中少数可因此发生晕厥或阿-斯综合征。查体常有心律失常,以房性与室性期前收缩及房室传导阻滞最为多见。心率可增快且与体温不相称(D对A错)。血沉增快可见于风湿性心内膜炎,多发性骨髓瘤等,血沉测定是非特异性的,不能用作所有疾病的诊断,只能有助于某些疾病的鉴别诊断或了解病程发展(C错)。剧烈胸痛,发热,心电图出现Q波,ST段弓背向上抬高见于急性心肌梗死(B错)。

17. 答案:C

解析:艾滋病的病原体是人免疫缺陷病毒(C对),沙眼的病原体是沙眼衣原体(A错),苍白密螺旋体是梅毒的病原体(D错),HPV为人乳头瘤病毒,是尖锐湿疣和乳腺癌的病原体(E错)。疱疹病毒是疱疹的病原体(B错)。

18. 答案:D

解析:骨髓涂片细胞学检查包括分数不同系列和不同发育阶段的细胞,分数有核细胞,计数粒红比例,计数巨核细胞,不包括计数退化或破碎细胞(ABCE对,D错,为本题正确答案)。

19. 答案:E

解析:肾结核可有血尿,脓尿,肿块,腰痛,膀胱刺激征等临床表现,膀胱刺激症状是肾结核的最重要、最主要也是最早出现的症状(E对)。当结核杆菌对膀胱黏膜造成结核性炎症时,患者开始先有尿频,排尿次数在白天和晚上都逐渐增加,直至可出现类似尿失禁现象,在尿频的同时,可出现尿急、尿痛、排尿不能等待,必须立即排出,难以忍耐。排尿终末时在尿道或耻骨上膀胱区有灼痛感觉。膀胱病变日趋严重,这些病状也越显著。

20. 答案:B

解析:主动脉瓣是左心室的出口(C错),室上嵴不是左心室结构(D错),左心室以二尖瓣前瓣分为窦部(流入道)和主动脉前庭(流出道)(B对A错),室间隔构成流出道的前内侧壁(E错)。

21. 答案:C

解析:膀胱刺激征是指尿频、尿急、尿痛(C对)。

22. 答案:B

解析:继发性腹膜炎是腹腔内脏器的炎症、穿孔、外伤血运障碍,以及医源性创伤等所引致的腹膜急性化脓性炎症。是严重的腹腔腔感染。腹痛为主要症状,呈全腹持续性痛、较剧烈,有腹胀、腹肌紧张、压痛和反跳痛(B对)。结直肠癌并发肠梗阻,胆石症或泌尿系统结石可表现为阵发性绞痛(A错)。疼痛与进食有关可见于胃溃疡(D错)。高热后全腹痛可见于急性的炎症感染(E错)。

23. 答案:E

解析:胫骨上端与股骨下端形成膝关节,与股骨下端接触的面为胫骨平台。胫骨平台骨折为典型的关节内骨折,而关节内骨折必须进行解剖复位,若关节面遭到破坏不能准确复位,骨愈合后使关节面不平整,由于膝关节活动量大,长期活动磨损引起创伤性关节炎(E对)。骨筋膜室综合征(A错)常见于有双骨并行结构的前臂和小腿。缺血性骨坏死(B错)好发于股骨颈头下型骨折。骨化性肌炎(C错)又称损伤性骨化,多见于关节扭伤、脱位或关节附近骨折,特别多见于肘关节。骨折不愈合(D错)多由于骨折端间嵌夹较多的软组织或开放性骨折清创时去除的骨片较多以及内固定失败等因素所致。

24. 答案:E

解析:支气管扩张引起感染,最常见致病菌是铜绿假单胞菌(E对),其次为流感嗜血杆菌,卡他莫拉菌,肺炎克雷伯杆菌,金黄色葡萄球菌,百日咳杆菌(CD错),大肠杆菌可引起胃肠道感染,肠道外感染多见于泌尿系统感染(A错)。军团杆菌引起军团菌肺炎(B错)。

25. 答案:A

解析:骨折的早期并发症包括休克,脂肪栓塞(A对),肝脾重要内脏器官损伤,血管,神经等重要周围组织损伤,骨筋膜室综合征。损伤性骨化,多见于关节扭伤、脱位或关节附近骨折,特别多见于肘关节,为骨折晚期并发症(B错)。延迟愈合多由于骨折端间嵌夹较多的软组织或开放性骨折清创时去除的骨片较多以及内固定失败等因素所致(C错)。缺血性肌挛缩是严重的骨折晚期并发症,是骨筋膜室综合征的严重后果,由于上、下肢的血液供应不足或包扎过紧超过一定时限,肢体肌群缺血而坏死,终致机化,形成疤痕组织,逐渐挛缩而形成特有畸形(D错)。

26. 答案:E

解析:股骨干下三分之一骨折,远折端向后移位(E对)。

27. 答案:C

解析:金黄色葡萄球菌感染引起泌尿系统感染的途径多为血行感染(C对)。性生活、尿路梗阻、医源性操作、生殖器感染等可导致尿路上行感染的发生(A错)。盆腔和下腹部的器官感染时,病原菌可从淋巴道感染泌尿系统,但罕见(D错)。性接触感染多见于性疾病的传播(E错)。

28. 答案:C

解析:β₂-MG是体内除成熟红细胞和胎盘滋养层细胞外的所有细胞,特别是淋巴细胞和肿瘤细胞膜上组织相容性抗原(HLA)的轻链蛋白组分,尿液检查有β₂微球蛋白,较灵敏地反映近端肾小管重吸收功能受损(C对),如肾小管-间质性疾、药物或毒物所致早期肾小管损伤,以及肾移植后急性排斥反应早期。

29. 答案:D

解析:扩张型心肌病超声心动图显示各心腔均增大,以左心室扩大为著(D对B错),心电图缺乏诊断特异性(C错)。胸部X线检查心影通常增大,心胸比>50%(A对)。AD均为正确答案。

30. 答案:C

解析:踝关节关节囊纤维层增厚形成韧带,主要有三组:①内侧副韧带,主要功能是防止踝关节外翻。②外侧副韧带,是踝部最薄弱的韧带(C对)。③

下胫腓韧带,加深踝穴的前、后方,稳定踝关节。

31. 答案:D

解析:下丘脑AVP(精氨酸加压素)分泌不足者表现为中枢性尿崩症,肾脏对AVP不敏感,致肾小管重吸收水的功能障碍,为肾性尿崩症,两者可用加压素试验区别,中枢性尿崩症注射加压素后尿渗透压进一步升高,肾性尿崩症注射加压素后仍无反应,以此来区别(D对)。中枢性尿崩症和肾性尿崩症禁水后尿量都并不减少(E错)。

32. 答案:D

解析:受体阻断药,指的是能够阻止受体和一些特异配体结合的药物。受体是人体细胞膜上的一种特异蛋白,可以和特异的一些小分子或者是蛋白质,酶类特异性结合而起到其相应的作用。受体阻断药物就是能够特异性识别某些受体,与其结合,阻止其相应配体与其结合的药物。阻断剂要想与受体结合,必定要有亲和力,受体阻断药本身无内在活性,与受体结合后不会发生激动或抑制反应(D对)。

33. 答案:A

解析:血尿通常是指的是尿液当中含有大量的红细胞,它提示的是尿路有出血,血液的来源,可以是肾小球,也可以是肾小球以下部位的,可以表现出肉眼血尿,也可以表现为镜下血尿。而血红蛋白尿通常是指的是尿液当中没有红细胞,或者只有少量的红细胞,但是含有大量的血红蛋白,就是因为血管内有溶血。或者是尿路有溶血,还有就是因为体内的溶血。尿沉渣镜检可以做出区别(A对)。

34. 答案:C

解析:西咪替丁为肝药酶抑制剂(C对),利福平为广谱抗生素,对结核杆菌有较强抗菌作用(A错),苯妥英钠为乙内酰胺类抗癫痫药(B错),双香豆素为香豆素类药物,为口服抗凝药(D错),苯巴比妥为长效巴比妥类药物,为镇静催眠抗癫痫抗惊厥药物(E错)。

35. 答案:A

解析:心影呈梨形见于左心房增大或合并肺动脉段扩大(A对),左、右心室增大称普大型,见于扩张型心肌病(B错)。右心室轻度增大:绝对浊音界增

大, 相对浊音界无明显改变, 显著增大: 心界向左右两侧增大(C 错)。主动脉弓膨出胸骨右缘第 1, 2 肋间浊音界增宽, 常伴收缩期搏动(E 错)。

36. 答案: B

解析: 肾盂输尿管连接处梗阻可为先天性缺陷或由于外在因素如迷走血管、纤维束带对肾盂输尿管连接处的压迫造成梗阻, 使肾盂蠕动波无法通过, 逐渐引起肾盂积水。肾盂输尿管连接处梗阻是儿童腹部肿块或肾积水常见的病因, 左侧多见(B 对)

37. 答案: C

解析: 心脏骤停是指心脏射血功能突然终止。导致心脏骤停的机制最常见的是心室颤动, 其次为心室停顿、缓慢心律失常、室性心动过速或电-机械分离。突发意识丧失, 伴大动脉(颈动脉和股动脉)搏动消失, 心音消失, 是心脏骤停的主要诊断标准。最简便的方法是触摸颈动脉或股动脉搏动存在与否, 而测量血压、作心电图检查等均费时间。

38. 答案: C

解析: CO 与 Hb 的结合力要强于 O₂(E 对), 与 Hb 结合能成为更稳定的 HbCO(A 对), 当 CO 与 Hb 分子中一个血红素结合后, 可增加其余 3 个血红素对 O₂ 的亲合力, 结果使氧解离曲线左移, 妨碍 Hb 与 O₂ 的解离(BD 对), 高铁血红蛋白是血红蛋白二价铁被氧化成为三价铁引起的, 多见于亚硝酸盐中毒(C 错)。

39. 答案: A

解析: 洋地黄中毒最重要的反应是各类心律失常(A 对), 最常见者为室性期前收缩, 多表现为二联律, 非阵发性交界区心动过速, 房性期前收缩, 心房颤动及房室传导阻滞。快速房性心律失常又伴有传导阻滞是洋地黄中毒的特征性表现。咳粉红色泡沫痰见于左心衰, 肺水肿(E 错)。黄视或绿视也可见于洋地黄中毒, 但非最常见(C 错)。

40. 答案: D

解析: 导致肾前性急性肾损伤的原因包括: 1. 血管内容量减少: 细胞外液丢失(烧伤, 腹泻, 呕吐, 利尿剂, 消化道出血)(D 对), 细胞外液滞留(胰腺炎, 烧伤, 挤压综合征, 创伤, 肾病综合

征, 营养不良, 肝功能衰竭)。2. 心输出量减少: 心功能不全(心肌梗死, 心律失常, 缺血性心脏病, 心肌病, 瓣膜病, 高血压, 严重肺心病)。3. 外周血管扩张: 药物(降压药), 脓毒症, 其他(肾上腺皮质功能不全, 高镁血症, 高碳酸血症, 低氧血症)。4. 肾血管严重收缩: 脓毒症, 药物(NSAIDs, β -阻滞剂), 肝肾综合征。5. 肾动脉机械闭锁: 血栓, 其他(栓塞, 创伤[如血管成形术])。前列腺增生, 输尿管结石可导致肾后性急性肾损伤(AC 错)。

41. 答案: C

解析: 髓样癌可以分泌降钙素, 免疫标记降钙素阳性(C 对), TG 阴性, 滤泡癌、乳头状癌和未分化癌 TG(甲状腺球蛋白)均为阳性, 而 CT(降钙素)均阴性(BE 错)。

42. 答案: D

解析: 细胞膜两侧离子的浓度差是由细胞膜中的离子泵, 主要是钠泵的活动所形成和维持的, 钠泵每分解一分子 ATP, 可使 3 个 Na⁺移出胞外, 同时 2 个 K⁺移入胞内(D 对)。

43. 答案: E

解析: 患者糖尿病病史 30 年, 长期使用皮下胰岛素注射治疗, 患者双足趾针扎样刺痛, 双足有穿着袜子的异常感觉, 排除其他病因引起的神经病变, 可考虑为糖尿病伴发周围神经病变(E 对)。ABCD 选项均可在糖尿病患者中并发出现, 动脉粥样硬化的易患因素如肥胖、高血压、血脂异常等在糖尿病人群中的发生率均明显增高, 致糖尿病人群动脉粥样硬化的患病率较高(A 错)。糖尿病肾病临床表现可分为五期, 肾小球高滤过和肾脏肥大期; 正常白蛋白尿期; 早期糖尿病肾病期, 肾脏病理出现肾小球结节样病变和小动脉玻璃样变; 临床糖尿病肾病期; 终末期肾衰竭(B 错)。植物神经功能紊乱多影响胃肠、心血管、泌尿生殖系统等。临床表现为胃排空延迟(胃轻瘫)、腹泻(饭后或午夜)、便秘等; 休息时心动过速、直立性低血压等; 残尿量增加、尿失禁、尿潴留等(C 错)。糖尿病合并低血糖可因为治疗不当而致的血糖持续性过低的现象, 可出现出汗、饥饿、心慌、颤抖、面色苍白等低血

糖的症状(D 错)。

44. 答案:B

解析:患者甲状腺肿大,无结节,TSH正常,甲状腺功能正常,考虑为单纯性甲状腺肿(B对)。甲状腺功能亢进症患者甲状腺激素过多,甲状腺功能亢进,甲状腺肿大,伴或不伴结节,TSH水平减低(A错)。原发性甲减TSH增高,中枢性甲减TSH减低,甲状腺无肿大(D错)。亚急性甲状腺炎甲状腺区疼痛明显,甲状腺可有肿大,呈结节样,在甲状腺毒症期,TSH水平降低,T4、T3增高,131I摄取率降低,出现特征性的血清甲状腺激素水平和甲状腺摄碘能力的“分离现象”(E错)。慢性甲状腺炎又称为桥本甲状腺炎,甲状腺中度肿大,质地坚硬,血清TPOAb和TgAb显著增高(C错)。

45. 答案:A

解析:肱骨近端包括肱骨大结节、小结节和肱骨外科颈三个重要的解剖部位,对于无移位的肱骨近端骨折,可用上肢三角巾悬吊3~4周,复查X光片示有骨愈合迹象后,行肩部功能锻炼。多数移位的肱骨近端骨折的特点是两部分以上的骨折,应及时行切开复位钢板内固定进行治疗,大部分病人可得到良好的功能恢复。对于Neer三部分、四部分骨折,也可行切开复位钢板内固定术,但对于特别复杂的老年人四部分骨折也可选择人工肱骨头置换术。本患者为右肱骨外科颈粉碎骨折,属于不稳定性骨折,并且有错位,但考虑患者年纪较大,并有高血压和肺源性心脏病,无法耐受手术治疗,考虑三角巾悬吊治疗(A对CE错)。肩关节融合术适用于中、青年晚期全肩关节结核患者(D错)。

46. 答案:B

解析:溢出性尿蛋白是指肾小球滤过、肾小管重吸收均正常,因血浆中相对分子质量较小或阳性电荷蛋白异常增多,经肾小球滤过,超过肾小球重吸收能力所形成的尿蛋白。异常增多的蛋白有游离血红蛋白、肌红蛋白、本周蛋白等。M蛋白是浆细胞或B淋巴细胞单克隆恶性增殖所产生的一种大量的异常免疫球蛋白,呈单株峰。根据患者年龄、临床表现可诊断为多发性

骨髓瘤,故其蛋白尿为本周蛋白增多所致的溢出性蛋白尿(B对)。在尿液形成过程中,肾小管代谢产生的蛋白质和组织破坏分解的蛋白质,以及由于炎症或药物刺激泌尿系统分泌的蛋白质所致的蛋白尿,称组织性蛋白尿(A错)。肾小管性蛋白尿是由于肾小管对滤出蛋白的回吸收障碍所致,此类蛋白尿的特点为尿蛋白总量通常较少,一般<1g/d,且仅含少量白蛋白(C错)。分泌性蛋白尿较少见,患者分泌黏液蛋白增多(D错)。肾小球性蛋白尿是由于肾小球滤过膜对血浆蛋白通透性增高所致,可分为选择性蛋白尿和非选择性蛋白尿,选择性蛋白尿主要为相对分子质量较小的清蛋白,非选择性蛋白尿以大和中相对分子质量蛋白质同时存在为主(E错)。

47. 答案:E

解析:患者活动后呼吸困难,颈静脉怒张,肝肿大,有压痛,有腹水,下肢凹陷性水肿,可诊断为右心衰竭、肝淤血伴腹腔积液(E对)。右心衰竭以体静脉淤血的表现为主,症状有消化道症状。体征为:①水肿,特征为首先出现于身体最低垂的部位,常为对称性可压陷性;②颈静脉征:颈静脉搏动增强、充盈、怒张,肝颈静脉反流征阳性更具特征性;③肝大常伴压痛;④心脏体征:可有三尖瓣关闭不全的反流性杂音。非心源性肝硬化,肝癌,肺结核伴结核性腹膜炎,肾病综合征不会出现颈静脉怒张等上腔静脉回流受阻的体征(ABCD错)。

48. 答案:A

解析:患者脸色苍白,乏力,月经周期延长,怀疑内分泌腺体功能低下,兴奋试验的目的是检测内分泌腺的激素储备量,一般用于①怀疑内分泌功能减退(B对),但激素水平在正常低值,或难以定量时;②鉴别原发性或继发性内分泌功能减退;③白日的激素测定难以说明情况时,如青春早期血浆促性腺激素仅在夜间升高;④帮助诊断一些内分泌功能亢进型疾病;⑤诊断潜在的激素受体疾病。动态功能抑制试验用于临床疑有内分泌功能亢进性疾病,但需除外空腹或基础血激素水平的升高是由于应激等其它因素所

致时,患者疑有内分泌腺体功能低下,不需要做抑制试验(A错,为本题正确答案)。影像学检查可进行定位诊断,自身抗体测定可进行病因诊断(DE对)。血液激素浓度是内分泌腺体功能的直接证据(C对)。

49. 答案:B

解析:患者表现为烦渴、多饮、多尿(中枢性尿崩症的常见临床表现),尿量每天8L(中枢性尿崩症24小时尿量可多达4~10L,一般不超过18L),尿比重1.006,尿渗透压250mOsm/(kg·H₂O),低渗尿,尿渗透压,血浆渗透压,可诊断为完全性中枢性尿崩症,皮下注射垂体后叶素,维持时间较短,首选处理为去氨加压素治疗,其抗利尿作用强,而无加压作用,不良反应少,为目前治疗中枢性尿崩症的首选药物(B对)。

50. 答案:D

解析:患者有尿频,尿不尽,排尿后尿道口滴白(慢性前列腺炎典型临床表现),前列腺液检查前列腺液白细胞>10个/高倍视野,卵磷脂小体阳性,前列腺液培养阴性,可考虑为慢性前列腺炎(D对)。慢性膀胱炎反复发作或持续存在尿频、尿急、尿痛(膀胱刺激征),尿细菌培养阳性,并有耻骨上膀胱区不适,膀胱充盈时疼痛较明显,尿液混浊,前列腺液检查一般无异常(A错)。泌尿系结核有尿频、尿急、尿痛的膀胱刺激征,有血尿,常为终末血尿,有脓尿,尿结核杆菌培养阳性(B错),非淋菌性尿道炎临床表现一般在感染后1~5周发病。表现为尿道刺痒、尿痛和分泌少量白色稀薄液体,有时仅为痂膜封口或裤裆污秽,常见于晨间,尿道分泌物涂片每高倍镜视野下见到10~15个多核白细胞,尿道分泌物支原体培养阳性(C错)。膀胱结石的典型症状为排尿突然中断,疼痛放射至远端尿道及阴茎头部,伴排尿困难和膀胱刺激症状(E错)。

51. 答案:B

解析:患者中青年女性,劳累后心悸、气促、下肢水肿等心衰症状,心尖区可闻及收缩期杂音,两肺底有小水泡音(湿啰音),超声心动图示左室腔增大。根据患者病史、临床表现和影像

学检查,考虑诊断为扩张型心肌病(B对)。扩张型心肌病临床症状主要为心功能不全症状:劳力性呼吸困难,心慌、气短,重时端坐呼吸、咳嗽,可由左心功能不全发展至全心功能不全。主要体征是心脏扩大,常伴有S₃与S₄及房性奔马律与室性奔马律,合并心功能不全时有其相关的体征。超声心动图检查房室腔扩大,室壁变薄,心室呈弥漫性运动减弱,射血分数降低。心包炎(A错)可有心界扩大但一般不会出现心室腔增大。急性病毒性心肌炎(C错)患者发病前多有病毒感染前驱症状,如发热、全身倦怠感和肌肉酸痛等。二尖瓣狭窄(D错)特征性杂音为心尖区舒张中晚期低调的隆隆样杂音,而不是收缩期杂音。肺心病(E错)患者多先有慢阻肺或慢性支气管炎、肺气肿等肺部疾病,然后出现右心衰征象。

52. 答案:B

解析:患者月经量多考虑有慢性失血史,且白细胞和血小板正常,血红蛋白减少,红细胞体积小,中央淡染区扩大,胞质偏蓝,粒红比为1:1[正常(2~4):1],红系增生,以中、晚幼红细胞为主,为小细胞低色素性贫血,初步诊断为缺铁性贫血,治疗上应首选口服铁剂(B对)。肌肉注射维生素B₁₂,口服叶酸用于巨幼细胞性贫血的治疗(AE错)。脾切除术广泛应用于脾外伤、脾局部感染、良性的(如血管瘤)或恶性的(如淋巴瘤)肿瘤、囊肿、胃体部癌、肝内型门静脉高压症合并脾功能亢进等疾病(D错)。

53. 答案:E

解析:病人下肢骨折术后出现气短、咯血症状,可能是由于下肢手术时形成血栓或脂肪栓子,经血液循环到达肺后,堵塞肺动脉主干或分支引起的肺血栓栓塞(E对)。肺血栓栓塞症的临床表现为:突发性呼吸困难、胸痛、咯血、晕厥等。肺部感染多表现为咳嗽、咳痰、发热等表现;ARDS即急性呼吸窘迫综合征,主要表现为进行性加重的呼吸困难、发绀,常伴有烦躁、焦虑、出汗等;气胸主要表现为呼吸困难、鼻翼扇动、口唇发绀、患侧呼吸音消失;胸膜炎主要表现为胸痛、胸闷、

咳嗽、呼吸困难；这些疾病不会短时间内出现咯血(ABCD 错)。

54. 答案:C

解析:骨软骨瘤(C对)X线在干骺端可见从皮质突向软组织的骨性突起。骨巨细胞瘤(A错)典型的X线特征为骨端偏心位、溶骨性、囊性破坏而无骨膜反应,病灶膨胀生长、骨皮质变薄,呈肥皂泡样改变。骨肉瘤(B错)X线可表现为不同形态,密质骨和髓腔有成骨性、溶骨性和混合性骨质破坏,骨膜反应明显,呈侵袭性发展,可见Codman三角或呈“日光射线”形态。尤因肉瘤(E错)X线表现常见的特征是长骨骨干或扁骨发生较广泛的浸润性骨破坏,表现为虫蛙样溶骨改变,界限不清;外有骨膜反应,呈板层状或“葱皮状”表现。转移性骨肿瘤(D错)X线可表现为溶骨性(如甲状腺癌和肾癌)、成骨性(如前列腺癌)和混合型的骨质破坏,以溶骨性为多见,病理性骨折多见。

55. 答案:D

解析:男性患者35岁,左下肢外伤史(气性坏疽有外伤史)。清创处理后3天病情急剧恶化,患者体温逐步上升,烦躁不安,大量出汗,尿量明显减少(气性坏疽典型表现)。观察伤口,左下肢明显肿胀,见大量恶臭浆液血性渗出物,皮下可触及捻发音(气性坏疽体征)。根据患者外伤史,临床表现及体征诊断该患者为气性坏疽。气性坏疽首要措施是立即在病变区多处切开,切除受累组织及术后氧化剂清洗、湿敷,勤换敷料(ABE对)。应用高压氧治疗可以提高组织间含氧量,提高治愈率,减低轻残率(C对)。应用抗生素,气性坏疽首选青霉素,氨基糖苷类抗生素对此类细菌已证实无效(D错,为本题正确答案)。

56. 答案:C

解析:患者参加马拉松比赛长跑突然晕倒,可能原因有低血糖,贫血,心脏骤停等原因,心脏骤停如不能进行及时抢救,可造成心脏性猝死。首先要做的是看有无呼吸及动脉搏动,确定是否为心脏骤停,再进行相应的抢救措施(C对)。如确定为心脏骤停,应立即进行初级心肺复苏,包括人工胸

外按压和早期除颤,开通气道和人工呼吸(ABDE错)。

57. 答案:A

解析:患者,低热、盗汗,体重减轻(非霍奇金淋巴瘤可出现的全身表现)。肠梗阻手术中发现腹腔内有淋巴结(胃肠受累),诊断为非霍奇金淋巴瘤,有骨髓浸润,属于IV期,且伴有全身症状,为IVB期(A对)。IVA期无全身症状(B错)。

58. 答案:C

解析:患者右前臂桡骨干下骨折,在桡骨干中下1/3段后外侧有桡神经沟,有由臂丛神经后束发出的桡神经自内后方紧贴骨面斜向外前方进入前臂,此处骨折容易发生桡神经损伤(C对)。

59. 答案:D

解析:老年患者,慢性阻塞性肺疾病史30年,慢性肾脏疾病史20年,呼吸加快(正常12~20次/分),血压正常,主动脉听诊区可闻及收缩期粗糙杂音,心脏超声显示LVEF45%(正常50%~70%),主动脉瓣重度狭窄,冠状动脉II级狭窄,当冠状动脉狭窄>50%时,安静时能代偿,运动、心动过速、情绪激动造成心肌需氧量增加时,可导致短暂的心肌供氧和需氧间的不平衡。当冠状动脉狭窄<50%,活动多不受限,且患者年龄较大,不考虑做冠脉手术(AC错)。患者主动脉重度狭窄,且患者年龄较大,并有慢性阻塞性肺疾病,慢性肾脏疾病等疾病,应选择经皮主动脉瓣置换术(D对B错)。

60. 答案:E

解析:患者感胸闷不适,说不清楚部位、程度,持续一段时间后可缓解,活动不受限,心电图正常,怀疑有心脏疾病,应做24小时动态心电图,获得连续24小时甚至更长时间的心电图资料,因此常可检测到常规心电图检查不易发现的一过性异常心电图改变(E对)。

61. 答案:C

解析:患者头晕,胸痛,晕厥,胸骨右缘第2肋间4/6级收缩期杂音,考虑主动脉瓣狭窄(C对)。呼吸困难、心绞痛和晕厥是典型主动脉瓣狭窄的常见三联征。冠状动脉粥样硬化性心脏病(A错)可引起心肌缺血,心绞痛,平时一般无异常体征,心绞痛发作时常见

心率增快、血压升高、表情焦虑、皮肤冷或出汗，有时出现第四或第三心音奔马律。可有暂时性心尖部收缩期杂音，是乳头肌缺血以致功能失调引起二尖瓣关闭不全所致。二尖瓣狭窄(B 错)出现咳嗽，咯血，呼吸困难，心尖区舒张中晚期可闻及低调的隆隆样杂音，呈递增型。肥厚梗阻性心肌病(D 错)可于胸骨左缘第 3~4 肋间闻及较粗糙的喷射性收缩期杂音。心尖部也常可听到收缩期杂音，这是因为二尖瓣前叶移向室间隔导致二尖瓣关闭不全。肺动脉栓塞有呼吸急促，另有发绀，肺部哮鸣音和(或)细湿啰音，或胸腔积液的相应体征(E 错)。

62. 答案:E

解析:患者腹部被撞伤 24 小时内，心率加快，考虑为外伤引起的腹壁或内脏破裂，引起急性弥漫性腹膜炎。空腔脏器流出内容物和细菌进入腹膜，在血容量降低和毒血症的共同作用下，刺激腹膜脏层交感神经，肾上腺髓质分泌大量儿茶酚胺，导致心率加快、血管收缩(E 对)。

63. 答案:E

解析:患者子宫肌瘤病史 5 年(铁丢失过多)，Hb98g/L，血红蛋白减少，红细胞正常(女性正常 $3.5\sim 5.0 \times 10^{12}/L$)，白细胞正常，RET(网织红细胞)0.014(正常 0.008~0.020)，Plt436 $\times 10^9/L$ ，血小板升高，考虑为缺铁性贫血。网织红细胞缺铁性贫血患者在口服铁剂一周后，外周血网织红细胞增多，其高峰在开始服药后 5~10 天(E 对)，在服用铁剂 2 周后血红蛋白开始升高(C 错)。

64. 答案:E

解析:患者左踝扭伤，应立即冷敷，以减少局部出血及肿胀，限制踝部的运动，避免加重伤势(AB 对)，踝扭伤治疗用夹板，或绷带固定(D 对)，抬高患肢(C 对)，减轻水肿。按摩会加重伤势，不宜采取(E 错，为正确本题答案)。

65. 答案:B

解析:患者左手拇指，食指，中指可屈曲，不能对掌，桡侧伴 3 个手指感觉障碍，诊断为正中神经损伤(腕部以下)(B 对)。腕部损伤时所支配的鱼际肌和蚓状肌麻痹表现为拇指对掌功能

障碍和手的桡侧伴感觉障碍，特别是示、中指远节感觉消失。正中神经损伤(肘部)则所支配的前臂肌亦麻痹，除腕部损伤表现外，另有拇指和示、中指屈曲功能障碍(A 错)。尺神经易在腕部和肘部损伤，腕部损伤主要表现为骨间肌、3、4 蚓状肌、拇收肌麻痹所致环、小指爪形手畸形及手指内收、外展障碍和 Froment 征以及手部尺侧半和尺侧一个半手指感觉障碍，特别是小指感觉消失。肘上损伤除以上表现外另有环、小指末节屈曲功能障碍，一般仅表现为屈曲无力(CE 错)。桡神经在肱骨中段后方至肱骨中、下 1/3 交界处外侧紧贴骨面，该处骨折时容易引起桡神经损伤，表现为伸腕、伸拇、伸指、前臂旋后障碍及手背桡侧(虎口区)感觉异常。典型的畸形是垂腕(D 错)。

66. 答案:C

解析:患者间断发作头痛伴苍白、出汗心悸，发作时血压 200/130mmHg(高血压发作时所伴随的头痛、心悸、多汗三联症对于嗜铬细胞瘤的诊断有重要意义)，考虑为嗜铬细胞瘤(C 对)。嗜铬细胞瘤的临床表现主要是由于大量儿茶酚胺作用于肾上腺素能受体所致，以心血管症状为主，兼有其他系统的表现。高血压是最主要症状，伴剧烈头痛，面色苍白，大汗淋漓，心动过速(以释放肾上腺素为主者更明显)，心前区及上腹部紧迫感，可有心前区疼痛、心律失常、焦虑、恐惧感、恶心、呕吐、视物模糊、复视，其中头痛、心悸、多汗三联征对诊断有重要意义。原发性醛固酮增多症(A 错)是由肾上腺皮质病变引起醛固酮分泌增多，导致涨钠排钾、体液容量扩增、肾素-血管紧张素系统受抑制，表现为高血压和低血钾的临床综合征，血压逐渐升高，肌无力及周期性瘫痪等。肾动脉狭窄(B 错)有肾功能减退伴高血压。库欣综合征(D 错)糖皮质激素分泌过多，典型表现有向心性肥胖、满月脸、多血质外貌等。原发性高血压原多见于中老年，起病隐匿，进展缓慢，病程长达十多年至数十年，不会出现突发的血压增高(D 错)。

67. 答案:A

解析:患者突发心梗,排尿时,突发呼吸困难,咳粉红色泡沫痰,考虑患者为急性左心衰。皮下注射吗啡可以使病人镇静,减少躁动所带来的额外的心脏负担,同时也具有舒张小血管的功能而减轻心脏负荷(C对)。静脉注射呋塞米除利尿作用外,还有静脉扩张作用,有利于肺水肿缓解(D对)。静脉注射硝酸甘油扩张小静脉,降低回心血量,使左室舒张末压及肺血管压降低(E对)。硝普钠为动静脉扩张剂(B对)。患者有急性心梗,急性心肌梗死,尤其是头 24h 内尽量不用洋地黄。此时心衰主要由心肌坏死和缺血引起,洋地黄仅增加正常心肌收缩力,对坏死心肌并无作用;洋地黄还会增加心脏收缩的不协调性及心肌耗氧量;加之此时交感神经过度兴奋及缺血心肌对洋地黄的敏感性增加,又会诱发心律失常(A错,为本题正确答案)

68. 答案:E

解析:老年患者,高血压病史 10 年(长期高血压可引起左心室肥厚,动脉病变则主要是壁/腔比值增加和管腔内径缩小,导致重要靶器官如心、脑、肾组织缺血),劳动后胸骨后压迫感,向咽部放射,休息后缓解(由于左心后负荷增加、耗氧量增多及冠状动脉供血减少等引起心肌缺血,造成胸痛,常于活动或情绪激动时发生,休息后可以缓解),考虑患者为心肌缺血导致的稳定型心绞痛,ST 段压低, T 波低平或倒置为心肌缺血的典型心电图表现(E对)。束支传导阻滞不引起自觉症状,主要以原发病的临床表现为,但严重的三分支阻滞和双侧束支阻滞可因心室停搏而出现头晕,甚至晕厥。ST 段抬高, T 波倒置见于急性心肌梗死(B错)。正常人和心脏病病人都可发室性早搏,病人一般表现为心悸、心跳或“停跳”感,类似电梯快速升降的失重感或代偿间歇后有力的心脏搏动,可伴有头晕、乏力、胸闷等症状(C错)。T 波高尖常见于心肌梗死、脑血管疾患、高钾血症等疾病(D错)。

69. 答案:B

解析:患者排小结石, X 线片不显影,考虑为尿酸结石(B对)或胱氨酸结石。磷酸镁铵结石,磷酸钙结石,混合结

石,草酸钙结石 X 线均可显影(ACDE 错)。

70. 答案:D

解析:缺铁性贫血患者在口服铁剂一周后,外周血网织红细胞增多,其高峰在开始服药后 5~10 天(D对),在服用铁剂 2 周后血红蛋白开始升高(C错)。

71. 答案:A

解析:患者单簧管演奏者(狭窄性腱鞘炎好发人群),右手环指僵硬伴晨僵一周(狭窄性腱鞘炎的好发位置)右手环指掌侧伸肌障碍伴黄豆大小结节(狭窄性腱鞘炎体检体征),综合诊断考虑为狭窄性腱鞘炎(A对)。狭窄性腱鞘炎手指弹响伴明显疼痛,严重者患指屈曲不敢活动。疼痛常在掌指关节掌侧,体检时可在远侧掌横纹处扪及痛性结节,活动时随屈肌上下移动,并可发生弹响。桡骨茎突狭窄性腱鞘炎表现在桡骨茎突处疼痛,局部压痛,有时可扪及痛性结节。握拳尺偏腕关节时,疼痛加剧。关节炎泛指发生在人体关节及其周围组织,由炎症、感染、退化、创伤或其他因素引起的炎性疾病,临床表现有红,肿,热,痛,关节功能障碍,不同类型的关节炎其临床表现也不尽相同(B错)。类风湿性关节炎多关节受累呈对称性多关节炎(C错)。

72. 答案:D

解析:患者血压增高,双下肢无力(低钾,导致肌肉兴奋性减低,受累肌肉多见于四肢)夜尿增多,心率正常,考虑为低钾血症(D对),低钙血症表现的主要症状是神经、肌肉兴奋性增高,常常会出现惊跳、手足抽动或震颤、惊厥等现象,并且在抽搐发作的同时还会出现不同程度的呼吸改变、心跳加快、面色发绀、严重呕吐、便血的症状,最严重的还可能导致喉肌痉挛、呼吸暂停(A错)。碱中毒呼吸浅而慢,躁动、兴奋、谵语、嗜睡、严重时昏迷,有手足搐溺,腱反射亢进等,尿少,呈碱性(B错)。低磷血症可引起代谢性脑病,表现为易激动、神志障碍、重症者可有木僵、昏迷。神经肌肉症状表现为肌无力,甚至可因呼吸肌无力出现呼吸困难,呼吸衰竭。胃肠道症状为食欲下降、恶心、呕吐、腹泻、便秘等(C错)。低血糖发作时临床表现

为出汗、饥饿、心慌、颤抖、面色苍白，精神不集中、思维和语言迟钝、头晕、嗜睡、躁动、易怒、行为怪异等症状(E 错)。

73. 答案:A

解析:患者自觉乏力,毛发脱落,经期延长,颜面水肿(原发性甲减的体征),实验室检查 FT4 < 3.5nmol/L(正常 65~155nmol/L), TSH>150mU/L(2~10mU/L), PRL 56ug/L(成人血浆中的 PRL 浓度 < 20ug/L),患者 FT4 降低, TSH 升高, PRL 升高,考虑为原发性甲状腺功能减退(A 对),继发性甲减是由于下丘脑或垂体的病变引起的甲减,继发性甲减血清 TSH 水平低(B 错)。泌乳素瘤是由垂体泌乳素细胞瘤分泌过量泌乳素(PRL)引起的下丘脑-垂体疾病中常见的一种疾病。其典型的临床表现有闭经、溢乳、不孕(育)、高泌乳素血症及垂体占位性病变,APRL 值多高于 200ug/L,患者 PRL 56ug/L,不能轻易诊断为泌乳素瘤(C 错)。希恩综合征多见于产后(E 错)。

74. 答案:A

解析:患者胆固醇 5.1mmol/L(大于 6.2mmol/L,属于总胆固醇升高),甘油三酯 3.0mmol/L(≥2.26mmol/L 为升高),胆固醇含量正常,甘油三酯明显升高,可选贝特类降脂药,如非诺贝特(A 对)。他汀类药物—辛伐他汀,主要调脂作用是降低低密度脂蛋白,升高高密度脂蛋白,而降低甘油三酯作用不明显(B 错)。贝特类降脂药,此类物包括非诺贝特、吉非贝齐、苯扎贝特,降甘油三酯的作用及升高高密度脂蛋白的作用比他汀类强,而降胆固醇的作用不如他汀类。硝酸甘油适用于治疗或预防心绞痛,亦可作为血管扩张药治疗充血性心力衰竭(C 错)。阿司匹林对血小板的聚集有抑制作用,且有解热镇痛作用(D 错)。

75. 答案:B

解析:患者检查诊断为升结肠癌,应选择右半结肠切除术(B 对),切除范围包括右半横结肠以近及回肠末段和相应系膜、胃第 6 组淋巴结,回肠与横结肠端端或端侧吻合。升结肠切除术,全结肠切除术,升结肠及部分横结肠

切除术,升结肠及末段回肠切除术名词属杜撰,无此等说法(ACDE 错)。

76. 答案:D

解析:患者发热,两天发作一次(疟疾的两次发作之间都有一定的间歇期),寒战、头痛 10 天,热退后伴乏力,血红蛋白减少,曾去广州出差(疟疾流行区域),考虑为疟疾(D 对)。血吸虫病(A 错):(1)发热为本期主要的症状,发热的高低,期限和热型视感染轻重而异。(2)胃肠道症状常呈痢疾样大便,可带血和黏液。(3)肝脾大(4)肺部症状咳嗽相当多见,可有胸痛,血痰等症状。在伤寒(B 错)流行季节和地区患者有持续性高热(40~41℃)为时 1~2 周以上,并出现特殊中毒面容,相对缓脉,皮肤玫瑰疹,肝脾肿大,周围血象白细胞总数低下,嗜酸性粒细胞消失,骨髓象中有伤寒细胞(介质细胞)。流行性乙型脑炎临床上急起发病,有高热、意识障碍、惊厥、强直性痉挛和脑膜刺激征等(C 错)。

77. 答案:A

解析:抗结核药包括异烟肼,利福平,吡嗪酰胺,乙胺丁醇,链霉素等,异烟肼常见不良反应为周围神经炎,表现为手脚麻木、肌肉震颤和步态不稳等。此作用是由于异烟肼的结构与维生素 B6 相似,使维生素 B6 排泄增加而致体内缺乏所致。维生素 B6 缺乏会使中枢 V-氨基丁酸(GABA)减少,引起中枢过度兴奋,因此使用异烟肼时应注意及时补充维生素 B6,预防不良反应的产生(A 对)。

78. 答案:D

解析:患者 5 岁儿童,冬季发病(流行性脑脊髓膜炎冬、春季高发),口唇出现单纯疱疹(为细菌感染表现),皮肤有瘀斑(细菌引起小血管栓塞导致),有头痛、呕吐、神志恍惚(细菌侵犯中枢神经系统),根据患儿的临床症状等表现,本病例的诊断应首先考虑流行性脑脊髓膜炎(流脑)(D 对)。流行性乙型脑炎(E 错)由乙脑病毒引起,在温带地区主要以夏秋季流行为主,主要侵犯中枢神经系统,表现为高热、头痛、意识障碍、抽搐和脑膜刺激征等,严重者可进一步发展为昏迷、中枢性呼吸衰竭或脑瘫。钩端螺旋体病脑膜炎

型(A 错)由钩端螺旋体引起,为钩端螺旋体感染后中期器官损伤期,在起病后 3~10 天出现严重头痛、烦躁、颈抵抗、布氏征、克氏征阳性等脑膜炎表现,以及嗜睡、神志不清、谵妄、抽搐、瘫痪、昏迷等脑炎表现,严重者可发生脑水肿、脑瘫及呼吸衰竭,早期钩端螺旋体主要表现为全身感染中毒症状。流行性出血热(肾综合征出血热)(C 错)由汉坦病毒引起,其发生和流行具有明显的地区性和季节性,与宿主动物的分布和活动相关,典型病例具有三大主症:发热、出血、肾脏损害。脑型疟疾(B 错)是由疟原虫引起的,是恶性疟疾的严重临床类型,主要的临床表现为剧烈头痛、发热,常出现不同程度的意识障碍,同时伴有典型的突发性寒战、高热和大量出汗等症状。

79. 答案:D

解析:患者中老年男性,有间歇性跛行,小腿腓肠肌群疼痛,右小腿以下皮肤粗糙,萎缩,变薄发亮,有慢性营养性改变,右足背动脉搏动消失,考虑为动脉硬化性闭塞症,动脉造影能显示动脉狭窄或闭塞的部位、范围、侧支及阻塞远侧动脉主干的情况,以确定诊断,鉴别动脉硬化性闭塞症和血栓闭塞性脉管炎等疾病,指导治疗(D 对)。

80. 答案:E

解析:患者有腰部扭伤史, L4~L5 棘突间压痛,直腿抬高试验阳性,右下肢麻木,右小腿外侧感觉迟钝,踝趾背伸 5 级(腰 5 神经根受累的神系统表现),考虑为腰椎间盘突出,患者初次发病,且症状较轻,考虑进行非手术治疗,卧床休息,一般严格卧床三周,使用非甾体抗炎药物,不宜过早下床活动(E 对 D 错),手术治疗适用于腰腿痛症状严重,反复发作,经半年以上非手术治疗无效,且病情逐渐加重,影响工作和生活者(AB 错)。封闭针即封闭疗法。封闭疗法是用不同剂量不同浓度的局部麻醉药物注射在局部组织内,以治疗一些疼痛的方法。当人体某部组织或器官发生炎症,损伤或疼痛时,会激起局部的神经冲动,并向人体的中枢神经传导,影响中枢神

经的机能活动。为了阻断神经冲动的传入通路,维护中枢神经的正常功能,改善局部组织的营养,利于局部炎症的消退,损伤的修复及疼痛的缓解,可施行封闭疗法,腰椎间盘突出可以用封闭治疗进行止痛治疗。但他只能在短期内缓解疼痛。并不能根治(C 错)。

81. 答案:A

解析:老年男性(冠心病好发人群)。近 1 年来劳累时胸痛,休息或含服硝酸甘油后数分钟即可缓解(稳定型心绞痛典型表现),既往高血压病史 10 余年。结合患者病史和临床表现诊断考虑稳定型心绞痛,其预防心肌梗死,改善预后的药物包括:阿司匹林(E 对)、氯吡格雷、及受体拮抗剂(如美托洛尔)(D 对)、他汀类药物如辛伐他汀(B 对)、ACEI 或 ARB,福辛普利(C 对)属于 ACEI。硝酸异山梨酯(A 错,为本题正确答案)是硝酸酯类药物,用于发作时控制症状。

82. 答案:A

解析:患者中年女性,餐后右上腹绞痛(胆结石典型症状)、深压痛,尿呈浓茶样、巩膜黄染(黄疸),根据表现及查体,可能的诊断是胆总管结石(A 对)。胆道蛔虫病(B 错)常表现为突发剑突下阵发性钻顶样剧烈疼痛和较轻的腹部体征,突发突止,间歇期宛如常人,且一般无黄疸。胆总管囊肿(C 错)为先天性疾病,常幼年发病,典型临床表现为腹痛、腹部肿块、黄疸。急性胰腺炎常表现为左上腹及腰背部持续性疼痛,呕吐后腹痛不缓解为其特征,阻塞性黄疸少见(D 错)。急性胆囊炎一般不出现黄疸(E 错)。

83. 答案:A

解析:在肱骨干下 1/3 段后外侧有桡神经沟,其内有桡神经走行。当发生肱骨干横骨折时,有移位且经手法复位及牵引治疗,出现骨折端分离,紧贴肱骨骨面走行的桡神经容易造成损伤。故选 A。

84. 答案:B

解析:男,32 岁。多次于饮酒后关节红肿疼痛发作(饮酒为痛风发作的明确诱因之一),累及的关节包括第一跖趾关节、踝或膝关节(表现为痛风关节炎

典型的受累部位)。故该患者可诊断为痛风,痛风的特征性检查为尿酸水平升高(B对),血 HLA-B27(+)(A错)及X线片示骶骨关节炎(C错)多见与强直性脊柱炎。尿渗透压降低(D错)见于水利尿患者的实验室检查。关节腔穿刺液呈脓性(E错)为化脓性关节炎的明确诊断手段。

85. 答案:B

解析:1岁儿童头围约为46cm,体重约为10kg,身高约为75cm。该儿童头围44cm,体重7.5kg,说明肯定在1岁以内(CE错)。根据身高体重计算公式,计算儿童约为8个月。且8个月儿童会自己坐起来,故该儿童8个月左右(A对)。

86. 答案:B

解析:高血压1级(轻度):收缩压140~159mmHg和(或)舒张压90~99mmHg。高血压2级(中度):收缩压160~179mmHg和(或)舒张压100~109mmHg(B对)。高血压3级(重度):收缩压 \geq 180mmHg和(或)舒张压 \geq 110mmHg。当收缩压和舒张压分属于不同分级时,以较高的级别作为标准。眼底动脉普遍狭窄,说明已经到高血压动脉病变期。高血压危象包括高血压急症及亚急症。高血压急症是指原发性或继发性高血压患者疾病发展过程中,在一些诱因的作用下血压突然和显著升高,病情急剧恶化,同时伴有进行性心、脑、肾、视网膜等重要的靶器官功能不全的表现。收缩压或舒张压急剧升高,无靶器官急性损伤者定义为高血压亚急症(D错)。高血压脑病是指当血压突然升高超过脑血流自动调节的阈值(中心动脉压大于140mmHg)时,脑血流出现高灌注,毛细血管压力过高,渗透性增强,导致脑水肿和颅内压增高,甚至脑瘫的形成,引起的一系列暂时性脑循环功能障碍的临床表现(E错)。

87. 答案:D

解析:心脏骤停的主要临床表现为:①意识丧失(A错)或伴短阵抽搐;②心音、大动脉搏动消失,血压测不出;③呼吸断续或停止(B错);④瞳孔散大;⑤皮肤苍白或发绀(C错)。其中早而可靠的临床表现为意识突然丧失伴大动脉

搏动消失;最有助于确诊的临床表现是心音消失(D对E错)。

88. 答案:E

解析:患者为年轻女性,有头痛家族史,发病时间(月经期)及疼痛部位(双颞部)发作后有偏头痛后期表现(疲劳,倦怠,无力,食欲差),符合偏头痛的特征,首先考虑诊断偏头痛。其疼痛呈发作性,已持续2年,应按慢性偏头痛诊疗。预防再发使用的药物包括:肾上腺素能受体阻滞剂、钙离子拮抗剂、抗癫痫药(如托吡酯及丙戊酸钠)、抗抑郁药、5-HT受体拮抗剂。托吡酯及丙戊酸钠均可用于预防头痛发作,丙戊酸钠(C错)也可以用于预防头痛发作,但由于用药量较大,每日使用次数较多,不作为首选药物,故本题最佳答案为托吡酯(E对)。苯妥英钠(A错)、卡马西平(B错)、苯巴比妥(D错)均有镇静催眠的作用,可用于治疗癫痫,由于反应强烈,较少作为预防用药。

89. 答案:C

解析:患者右侧乳房外上象限触及5cm肿块,质硬,边界不清,右腋窝淋巴结触及肿大,考虑为乳腺癌III期,患者有淋巴结转移,需行淋巴结清扫术(C对A错),单纯肿块切除手术目的是完整切除肿块。适合于临床I期II期的乳腺癌病人,且乳房有适当体积,术后能保持外观效果者(D错)。乳腺癌改良根治术包括两种术式,一是保留胸大肌,切除胸小肌;一是保留胸大、小肌,适用于I期II期(B错)。全乳房切除术范围必须切除整个乳房,包括腋尾部及胸大肌筋膜。该术式适宜于原位癌、微小癌及年迈体弱不宜作根治术者(E错)。

90. 答案:B

解析:老年女性患者,摔倒时右手撑地,腕部疼痛、肿胀(伸直型骨折典型临床表现),查体:右腕部呈“枪刺刀畸形”(伸直型骨折典型畸形姿势,正面看呈“刺刀样”畸形),综上所述,结合患者典型临床表现及查体体征,最可能的诊断为Colles骨折(B对)。

91. 答案:A

解析:中年女性患者,跌倒后右手掌着地受伤,右肩疼痛,肿胀,功能障碍(肩

关节脱位的典型病因及临床表现), 查体: 将患肘紧贴胸壁时, 手掌不能搭到健侧肩部, 此体征为肩关节脱位典型临床表现及体征, Dugas 征阳性(A 对)。Dugas 征阳性: 即将病侧肘部紧贴胸壁时, 手掌搭不到健侧肩部, 或手掌搭在健侧肩部时, 肘部无法贴近胸壁。

92. 答案:A

解析: 某蓄电池厂男工, 工龄 8 年(铅等有害物质暴露史), 主诉头昏, 头痛、乏力、记忆减退、睡眠障碍(铅中毒神经系统影响因素)、食欲减退、脐周隐痛(铅中毒胃肠道影响因素), 经检验尿中 δ -ALA 为 $28.6\mu\text{mol/L}$ 。 δ -氨基乙酰丙酸又称为 δ -氨基酮戊酸, 英文简称为 δ -ALA。是血红素合成过程中的中间产物。血红素合成的抑制是铅中毒的重要体征。综上所述, 结合患者职业史、临床表现及症状考虑诊断为慢性铅中毒(A 对)。

93. 答案:E

解析: 4 岁男孩(桡骨头半脱位多发生在 5 岁以下的儿童), 在穿衣服时被牵拉左腕(桡骨头半脱位手、腕被动向上牵拉受伤史), 患儿突然大哭, 左肘功能障碍, 左手不肯拿取玩物。检查: 肘关节略屈曲, 桡骨头外有压痛(桡骨头半脱位典型临床表现及症状), 综上所述, 考虑诊断为左桡骨头半脱位(E 对)。

94. 答案:B

解析: 青年男性患者, 神志不清 2 小时入院(糖尿病酮症酸中毒中枢神经功能障碍表现), 既往患 1 型糖尿病 5 年(糖尿病酮症酸中毒诱因), 长期皮下注射胰岛素, 近 3 天因腹泻而停用(糖尿病酮症酸中毒失代偿后出现消化道症状)。体检: 血压 $70/50\text{mmHg}$, 皮肤中度失水征(糖尿病酮症酸中毒失代偿后期可出现血压下降、严重失水), 呼吸深大, 有烂苹果味(糖尿病酮症酸中毒典型表现), 心率 130 次/分。实验室检查尿糖、尿酮体均为阳性, 血糖明显升高, $\text{pH} < 7.35$ (糖尿病酮症酸中毒以高血糖、酮症和酸中毒为主要表现), 综上所述, 最可能诊断为糖尿病酮症酸中毒(B 对)。

95. 答案:C

解析: 患者有 20 年饮酒史, 每日半斤白酒, 双下肢水肿, B 超示肝脏回声不

均匀增强, 脾大, 有腹水, 考虑为酒精性肝硬化(C 对)。慢性胰腺炎、胰腺癌、慢性胆囊炎、胃癌均可出现上腹痛。进展期胃癌最常见的症状是体重减轻(约 60%)和上腹痛(50%), 另有贫血、食欲缺乏、厌食、乏力, 除晚期转移外, 一般不会出现肝脏的症状(E 错)。慢性胆囊炎是由急性或亚急性胆囊炎反复发作, 或长期存在的胆囊结石所致胆囊功能异常, 临床表现多不典型(D 错)。慢性胰腺炎血清脂肪酶和血清淀粉酶明显升高, 胰腺癌出现顽固性上腹痛, 疼痛放射至腰背部, 夜间明显, 仰卧时加重, 可出现不能解释的糖尿病或糖尿病突然加重(AB 错)。

96. 答案:C

解析: 该中年男性病人有 20 年大量饮酒史, 2 年来腹胀乏力, 双下肢水肿, B 超见脾大和腹水, 为肝硬化失代偿期表现, 结合多年大量饮酒史, 该患者最可能的诊断是酒精性肝硬化。为明确诊断, 最有价值的检查方法是肝脏穿刺, 病理检查可以确定诊断, 而其它检查均无确诊意义(C 对, ABDE 错)。

97. 答案:C

解析: 患者发热、尿频、尿急、尿痛伴腰痛(有全身症状和泌尿系统症状), 双侧肾区叩击痛阳性, 蛋白尿, 考虑为急性肾盂肾炎(C 对)。急性膀胱炎主要表现为尿频、尿急、尿痛(尿路刺激征)。可有耻骨上方疼痛或压痛, 部分病人出现排尿困难。尿液常浑浊, 一般无全身感染症状(A 错)。尿路结石包括上尿路结石和下尿路结石, 上尿路结石主要症状为疼痛和血尿, 下尿路结石包括膀胱结石和尿道结石, 膀胱结石的典型症状为排尿突然中断, 疼痛放射至远端尿道及阴茎头部, 伴排尿困难和膀胱刺激症状。尿道结石典型症状为排尿困难, 点滴状排尿, 伴尿痛, 重者可发生急性尿潴留及会阴部剧痛(B 错)。急性肾小球肾炎临床特点为急性起病, 表现为血尿、蛋白尿、水肿和高血压, 可伴有一过性肾功能不全。多见于链球菌感染后(D 错)。尿路综合征指的是各种辅助检查正常但却有尿频或尿急等症状的一组临床表现, 因为没有明确可查的原因暂时命名为尿路综合征(E 错)。

98. 答案:C

解析:患者发热、尿频、尿急、尿痛伴腰痛(有全身症状和泌尿系统症状),双侧肾区叩击痛阳性,蛋白尿,考虑为急性肾盂肾炎。喹诺酮类、头孢菌素类、半合成广谱青霉素、克林霉素均可用于急性肾盂肾炎的治疗,克林霉素可用于对青霉素过敏者(ABDE 对),红霉素,临床主要应用于链球菌引起的扁桃体炎、猩红热、白喉及带菌者、淋病、李斯特菌病、肺炎链球菌下呼吸道感染(C 错)。

99. 答案:C

解析:患者发热、尿频、尿急、尿痛伴腰痛(有全身症状和泌尿系统症状),双侧肾区叩击痛阳性,蛋白尿,考虑为急性肾盂肾炎。用药疗程一般为 10~14 天(C 对)。

100. 答案:E

解析:患者无乳,闭经 4 年,考虑黄体生成素或卵泡刺激素缺乏,患者出现高热,昏迷,心率加快,低血压,血钾浓度正常,血钠浓度低于正常值,血糖低,综合患者病史考虑为垂体危象(E 对),垂体危象可出现高热,低血糖昏迷,低血压等症状。低血糖昏迷是指静脉血浆葡萄糖浓度低于 2.8mmol/L,单纯低血糖昏迷患者不会出现高热(A 错)。垂体肿瘤有头痛、视力障碍,有时可出现颅内压增高的症状、体征。病变累及下丘脑者可出现神经性厌食、体温调节障碍等下丘脑综合征相关临床表现(C 错)。粘液性水肿多见于甲减(D 错)。

101. 答案:B

解析:患者无乳,闭经 4 年,考虑黄体生成素或卵泡刺激素缺乏,患者出现高热,昏迷,心率加快,低血压,血钾浓度正常,血钠浓度低于正常值,血糖低,综合患者病史考虑为垂体危象。患者低血糖较严重,应先纠正低血糖,立即以 50%葡萄糖溶液 40~80ml 静脉注射,继以 5%葡萄糖氯化钠溶液持续静脉滴注,纠正低血糖同时纠正失水(B 对)。腺垂体功能减退症危象时低血压、休克很常见,血容量不足、低血糖等是重要原因。经过以上治疗,多数病人血压逐渐回升,休克纠正而不需要用升压药。在一些严重病人,

经上述治疗后血压恢复不满意者,仍需要使用升压药和综合抗休克治疗。对低温型者,可给予小剂量甲状腺激素(C 错)。肾上腺皮质激素多用于垂体危象水中毒型者,如氢化可的松(E 错)。肾上腺素用于心脏骤停的抢救和过敏性休克的抢救(D 错)。

102. 答案:D

解析:患者腰痛伴血尿,右肾结石,左肾上尿路结石,左肾分离 1.4cm,左肾分离在 0.7cm 以上,甚至超过了 1.0cm,多数是病理性因素导致,考虑为左侧上尿路结石梗阻导致肾积水,并右肾结石。左肾上尿路结石 0.8×0.6cm。一侧肾结石,另一侧输尿管结石时,先处理输尿管结石(A 错)。体外冲击波碎石适应证:适用于直径 <2cm 的肾结石及输尿管上段结石。输尿管中下段结石治疗的成功率比输尿管镜取石低(D 对)。结石 <0.6cm、表面光滑、结石以下尿路无梗阻时可采用药物排石治疗(B 错),经皮肾镜碎石取石术适用于所有需手术干预的肾结石,包括完全性和不完全性鹿角结石、直径 ≥ 2.0cm 的肾结石、有症状的肾盏或憩室内结石、体外冲击波难以粉碎及治疗失败的结石,以及部分 L4 以上较大的输尿管上段结石(C 错)。输尿管镜碎石取石术适用于中、下段输尿管结石,体外冲击波碎石失败的输尿管上段结石,X 线阴性的输尿管结石,停留时间长的嵌顿性结石,亦用于体外冲击波碎石治疗所致的“石街”。腹腔镜输尿管切开取石适用于直径 >2cm 输尿管结石;或经体外冲击波碎石,输尿管镜手术治疗失败者,一般不作为首选方案(E 错)。

103. 答案:A

解析:患者腰痛伴血尿,右肾结石,左肾上尿路结石,左肾分离 1.4cm,左肾分离在 0.7cm 以上,甚至超过了 1.0cm,多数是病理性因素导致,考虑为左侧上尿路结石梗阻导致肾积水,并右肾结石。为明确肾结石对肾功能的影响,首选静脉尿路造影(A 对),静脉尿路造影可以评价结石所致的肾结构和功能改变,有无引起结石的尿路异常如先天性畸形等,若有充盈缺损,则提示有 X 线阴性结石或合并息肉、肾盂癌

等可能。超声(E 错)能显示结石的高回声及其后方的声影,亦能显示结石梗阻引起的肾积水及肾实质萎缩等,可发现尿路平片不能显示的小结石和 X 线阴性结石。放射性核素检查(C 错)不能直接显示泌尿系结石,主要用于确定分侧肾功能,评价治疗前肾功能情况和治疗后肾功能恢复状况。检测血尿素氮和血肌酐(B 错)可用于评价肾损伤性疾病。

104. 答案:D

解析:患者有间歇性黑朦,心电图出现长短不一的长 PP 间期,且与短 PP 间期不呈倍数关系,最长 PP 间期超过 3s,未见室性逸搏,考虑诊断为窦性停搏(D 对)。窦房传导阻滞指窦房结冲动传导至心房时发生延缓或阻滞,由于体表心电图不能显示窦房结电活动,因而无法确立一度窦房阻滞的诊断。二度 I 型表现为 pp 间期进行性缩短,直至出现一次长 pp 间期,该长 pp 间期短于基本 pp 间期的两倍,二度 II 型长 pp 间期为基本 pp 间期的整倍数。窦房阻滞后可出现逸搏心律(B 错)。成人窦性心律的频率低于 60 次/分称为窦性心动过缓,患者心率正常(C 错),窦性心律不齐为窦性心律的起源病变,但节律不整,在同一导联上 P-P 间期差异 >0.12s。窦性心律不齐常与窦性心动过缓同时存在,较常见的一类心律不齐与呼吸周期有关(E 错)。

105. 答案:A

解析:患者有间歇性黑朦,心电图出现长短不一的长 PP 间期,且与短 PP 间期不呈倍数关系,最长 PP 间期超过 3s,未见室性逸搏,考虑诊断为窦性停搏。窦性停搏和三度窦房传导阻滞,较难鉴别,静脉注射阿托品后,窦房传导功能无改善为窦性停搏;有改善为三度窦房阻滞。由此来鉴别窦性停搏和三度窦房传导阻滞(A 对)。

106. 答案:A

解析:患者有间歇性黑朦,心电图出现长短不一的长 PP 间期,且与短 PP 间期不呈倍数关系,最长 PP 间期超过 3s,未见室性逸搏,考虑诊断为窦性停搏,患者有黑朦,胸闷等症状,考虑安装起搏器治疗(A 对)。经食管导联心电图能很好地显示 P 波,对区别房性与室

性心动过速,极为有用(B 错)。介入治疗多为治疗血管和肿瘤性方面的疾病(C 错)。

107. 答案:B

解析:老年患者,尿频,夜尿增多,进行性排尿困难伴前列腺增生(前列腺增生导致的膀胱刺激症状和梗阻症状),尿频和夜尿次数增多为排尿的刺激症状,也是前列腺增生的早期症状。膀胱梗阻症状为进行性排尿困难、尿潴留、充盈性尿失禁。直肠指诊前列腺增大,中间沟消失、质地韧,光滑(前列腺增生),PSA 正常(正常值 <4ng/ml),尿流率 9ml/s <10ml/s,梗阻严重。综合患者临床表现,查体,辅助诊断可考虑为前列腺增生症(B 对),前列腺癌 PSA 增高(A 错),膀胱颈挛缩多为慢性炎症、结核或手术后瘢痕形成所致,发病年龄较轻,可有排尿不畅症状,但前列腺体积不增大(E 错)。尿道狭窄多有尿道损伤及感染病史,行尿道膀胱造影与尿道镜检查可确诊(C 错)。神经源性膀胱增生临床表现与前列腺增生症相似,可有排尿困难、残余尿量较多、肾积水和肾功能不全,但前列腺不增大,为动力性梗阻(D 错)。

108. 答案:C

解析:老年患者,尿频,夜尿增多,进行性排尿困难伴前列腺增生(前列腺增生导致的膀胱刺激症状和梗阻症状),尿频和夜尿次数增多为排尿的刺激症状,也是前列腺增生的早期症状。膀胱梗阻症状为进行性排尿困难、尿潴留、充盈性尿失禁。直肠指诊前列腺增大,中间沟消失、质地韧,光滑(前列腺增生),PSA 正常(正常值 <4ng/ml),尿流率 9ml/s <10ml/s,梗阻严重。综合患者临床表现,体查,辅助诊断可考虑为前列腺增生症。患者存在严重梗阻,应考虑经尿道前列腺切除术,对症状严重、存在明显梗阻或有并发症者应选择手术治疗。经尿道前列腺切除术(TURP)适用于大多数良性前列腺增生病人,是目前最常用的手术方式(C 对)。口服 α 受体阻滞剂和观察适用于症状较轻,前列腺增生体积较小的患者(DE 错),有尿路感染残余尿量较多或有肾积水、肾功能不全时,可用膀胱造瘘引流尿液,并抗感染治疗,

待上述情况明显改善后再择期手术。患者双肾无积水，且未明确说明患者有感染情况，膀胱造瘘不为积极处理方式(B 错)，根治性前列腺切除术为前列腺癌的手术治疗方式(A 错)。

109. 答案:D

解析:患者发热,咽痛,皮肤点状出血,骨髓增生活跃,PSA(糖原染色)阳性呈块状,可考虑为急淋白血病(D对),急粒白血病和急单白血病的PSA均为阴性或弥漫性淡红色或细颗粒状(AC错),急巨白血病PSA呈阳性,骨髓中可见到增多的原巨核细胞(B错),急早粒白血病PSA呈阴性或弱阳性,外周血可见幼稚细胞,骨髓象以异常的颗粒增多的早幼粒细胞增生为主(E错)。

110. 答案:B

解析:患者发热,咽痛,皮肤点状出血,骨髓增生活跃,PSA(糖原染色)阳性呈块状,可考虑为急淋白血病。急淋白血病:①淋巴结、肝、脾肿大见于70%~80%ALL患者(B对)。②骨及关节痛患者超过1/4,以肢体长骨及关节痛多见。特别是儿童ALL更多见,常以疼痛起病,甚至出现跛行步态。30%~50%表现出胸骨中下段压痛,此表现具有较强的特异性。③中枢神经系统白血病在ALL明显多于其他类型白血病。儿童多于成人。轻者可无症状,需在常规脑脊液检查中被发现。部分患者表现头痛、呕吐、颅神经损害、视物模糊、精神失常、嗜睡、癫痫发作等等,甚至可危及生命。眼球突出多见于急性髓细胞白血病(A错)。眼结膜苍白和皮肤黏膜瘀斑为急性白血病造血功能受抑制的临床表现,急性淋巴细胞白血病和急性髓细胞白血病均可出现(CD错)。

111. 答案:B

解析:患者发热,咽痛,皮肤点状出血,骨髓增生活跃,PSA(糖原染色)阳性呈块状,可考虑为急淋白血病,VDLP为治疗急性淋巴细胞白血病常采用的方案(B对),DA为治疗急性髓细胞白血病的方案(A错),COAP为慢性粒细胞白血病治疗方案(C错),全反式维甲酸用于急性早幼粒细胞白血病治疗(D错),PAD为多发性骨髓瘤治疗方案(E错)。

112. 答案:B

解析:患者为湖北农民,发热,头痛1天,眼结膜充血,双下肢可见少许出血点,腓肠肌压痛明显(为钩端螺旋体早期表现,急性起病,表现为发热和全身感染中毒症状,腓肠肌压痛对诊断钩端螺旋体有一定特异性),皮肤黄染(出现黄疸),肝肿大,ALT 215U/L,AST 120U/L(AST,ALT正常值均小于40U/L),考虑患者出现肝损害,综合患者病史,查体,实验室检查诊断为钩端螺旋体病(B对)。

113. 答案:A

解析:患者为湖北农民,发热,头痛1天,眼结膜充血,双下肢可见少许出血点,腓肠肌压痛明显(为钩端螺旋体早期表现,急性起病,表现为发热和全身感染中毒症状,腓肠肌压痛对诊断钩端螺旋体有一定特异性),皮肤黄染(出现黄疸),肝肿大,ALT 215U/L,AST 120U/L(AST,ALT正常值均小于40U/L),考虑患者出现肝损害,综合患者病史,查体,实验室检查诊断为钩端螺旋体病,钩端螺旋体病的主要传播途径为疫水接触传播(A对)。

114. 答案:A

解析:患者骑车与汽车撞伤(有外伤史),四肢感觉障碍与排尿困难。考虑为脊柱骨折,在急救搬运过程中应采用担架、木板或门板运送,保持伤员颈部的稳定性,以免加重颈脊髓损伤(B对)。不应直接抱离(A错),会增加脊柱的弯曲,或将碎骨片向后挤入椎管内,加重脊髓的损伤。建立静脉通道,胸外按压,保持呼吸道通畅均为可采用的急救措施(CDE对)。

115. 答案:A

解析:患者骑车与汽车撞伤(有外伤史),四肢感觉障碍与排尿困难。考虑为脊柱骨折,体温失调,颈脊髓损伤后,自主神经系统功能紊乱,受伤平面以下皮肤不能出汗,对气温的变化丧失了调节和适应能力,常易产生高热,可达40℃以上。

116. 答案:C

解析:二度I型房室传导阻滞P波规律出现,PR间期逐渐延长,继之QRS波群脱落,呈周期性变化(C对)。一度房室传导阻滞PR间期超过0.2s,QRS波

群形态与时限多正常(D 错)。二度 II 型房室传导阻滞 PR 间期恒定,部分 P 波后无 QRS 波群(B 错)。三度房室传导阻滞 P 波与 QRS 波群各自成节律、互不相关(A 错)。二度 II 型房室传导阻滞和三度房室传导阻滞均可见到 QRS 波群增宽(E 错)。

117. 答案:D

解析:一度房室传导阻滞 PR 间期超过 0.2S, QRS 波群形态与时限多正常(D 对)。二度 I 型房室传导阻滞 P 波规律出现, PR 间期逐渐延长,继之 QRS 波群脱落,呈周期性变化(C 错)。二度 II 型房室传导阻滞 PR 间期恒定,部分 P 波后无 QRS 波群(B 错)。三度房室传导阻滞 P 波与 QRS 波群各自成节律、互不相关(A 错)。二度 II 型房室传导阻滞和三度房室传导阻滞均可见到 QRS 波群增宽(E 错)。

118. 答案:C

解析:会阴部骑跨伤时,将尿道挤向耻骨联合下方,引起尿道球部外伤(C 对)。

119. 答案:B

解析:膜部尿道穿过尿生殖膈,当骨盆骨折时,附着于耻骨下支的尿生殖膈突然移位,产生剪切样暴力,使薄弱的膜部尿道撕裂,甚至在前列腺尖处撕断(B 对)。

120. 答案:A

解析:肾病综合征的并发症有感染,血栓和栓塞(A 对),急性肾损伤,蛋白质及脂肪代谢紊乱。

121. 答案:D

解析:急性肾盂肾炎的并发症有肾乳头坏死,肾盂积脓,肾周脓肿(D 对)。

122. 答案:B

解析:伤寒诊断及确诊的依据是检出伤寒杆菌。早期以血培养为主(B 对),后期则可考虑作骨髓培养(D 错)。血常规外周血白细胞数减少、淋巴细胞比例相对增多,嗜酸性粒细胞减少或消失,肥达反应阳性有辅助诊断意义(AC 错)。粪便培养也可用于伤寒的确诊,但出现阳性的时间晚于血培养(E 错)。

123. 答案:E

解析:粪便涂片染色显微镜下可见革兰染色阴性的弧菌,呈“鱼群样”排列,可确诊霍乱(E 对),血常规红细胞和白细胞升高为辅助检查(A 错),霍乱

弧菌通过污染的水或食物传染,多定植于胃肠道,不入血,因此不用血培养和骨髓培养诊断霍乱(BD 错),肥达反应阳性对伤寒,副伤寒有诊断意义(C 错)。

124. 答案:B

解析:卡托普利为血管紧张素转化酶抑制剂(ACEI),ACEI 对肥胖、糖尿病和心脏、肾脏靶器官受损的高血压病人具有较好的疗效,特别适用于伴有心力衰竭、心肌梗死、房颤、蛋白尿、糖耐量减退或糖尿病肾病的高血压病人,高血压合并糖尿病首选的降压药为 ACEI(A 错)。氢氯噻嗪为利尿剂,适用于轻、中度高血压,对单纯收缩期高血压、盐敏感性高血压、合并肥胖或糖尿病、更年期女性、合并心力衰竭和老年人高血压有较强降压效应,但一般不为合并糖尿病首选(D 错)。心得安为及受体拮抗剂,为高血压合并甲亢首选的降压药(B 对)。硝苯地平为钙离子拮抗剂,可用于高血压合并冠心病病人(C 错)。利血平有降压作用,但一般不推荐为一线用药(E 错)。

125. 答案:A

解析:卡托普利为血管紧张素转化酶抑制剂(ACEI),ACEI 对肥胖、糖尿病和心脏、肾脏靶器官受损的高血压病人具有较好的疗效,特别适用于伴有心力衰竭、心肌梗死、房颤、蛋白尿、糖耐量减退或糖尿病肾病的高血压病人,高血压合并糖尿病首选的降压药为 ACEI(A 对)。氢氯噻嗪为利尿剂,适用于轻、中度高血压,对单纯收缩期高血压、盐敏感性高血压、合并肥胖或糖尿病、更年期女性、合并心力衰竭和老年人高血压有较强降压效应,但一般不为合并糖尿病首选(D 错)。心得安为及受体拮抗剂,为高血压合并甲亢首选的降压药(B 错)。硝苯地平为钙离子拮抗剂,可用于高血压合并冠心病病人(C 错)。利血平有降压作用,但一般不推荐为一线用药(E 错)。

126. 答案:B

解析:正细胞正色素性贫血是贫血根据细胞体积分类的一种类型,是指红细胞平均体积,红细胞平均血红蛋白正常范围的贫血。临床上包括溶血性贫血、再生障碍性贫血、纯红细胞再

生障碍性贫血、骨髓病性贫血、白血病所致的贫血和急性失血性贫血等。

127. 答案:C

解析:作为常见的小细胞低色素性贫血是缺铁性贫血,这是由于各种原因导致的铁元素缺乏,从而影响血红蛋白的合成所表现的一种贫血。除了血常规表现为小细胞低色素性贫血外,最主要的是实验室检查,发现血清铁蛋白的降低,这种贫血可以通过补充铁元素来得到纠正。故选 C。

第三单元

1. 答案:A

解析:导致肝硬化的病因有十余种,但我国目前仍以病毒性肝炎为主(A对);酒精性中毒(B错)是欧美国家肝硬化常见病因;导致肝硬化的其余原因有:胆汁淤积(C错)、遗传和代谢性疾病(D错)、化学毒物或药物(E错)。这些原因并非主要原因。

2. 答案:D

解析:任何原因引起的肠内容物通过障碍统称肠梗阻,按肠壁血运有无障碍分类,可分为单纯性肠梗阻和绞窄性肠梗阻,绞窄性肠梗阻系因肠系膜血管或肠壁小血管受压、血管腔栓塞或血栓形成而使相应肠段血运障碍(D对),继而可引起肠坏死、穿孔。单纯性肠梗阻仅有肠内容物通过受阻(A错),而无肠管血运障碍。肠袢两端完全阻塞如肠扭转(B错),属闭袢性梗阻。动力性肠梗阻又分为麻痹性与痉挛性两类,是由于神经抑制或毒素刺激以致肠壁肌运动紊乱,使肠蠕动丧失或肠管痉挛(C错),以致肠内容物不能正常运行,但无器质性肠腔狭小。

3. 答案:E

解析:急性化脓性腹膜炎是由细菌感染、化学性刺激或物理性损伤等引起的腹膜和腹膜腔的炎症,临床上分为原发性腹膜炎和继发性腹膜炎。腹腔内脏器炎症扩散是急性继发性腹膜炎的常见原因,引起继发性腹膜炎的细菌主要是胃肠道内的常驻菌群,以大肠埃希菌(E对)最为多见,其次为厌氧拟杆菌、链球菌、变形杆菌等。一般

都是混合性感染,故毒性较强(ABCD错)。

4. 答案:E

解析:支气管扩张症主要是指急、慢性呼吸道感染和支气管阻塞后,反复发生支气管化脓性炎症,致使支气管壁结构破坏,管壁增厚,引起支气管异常和持久性扩张的一类异质性疾病总称,临床表现主要为慢性咳嗽、咯大量脓痰和(或)反复咯血,长期反复感染后,致病菌最有可能是铜绿假单胞菌(E对)。

5. 答案:E

解析:检测幽门螺杆菌常用¹³C-或¹⁴C-尿素呼气试验(C对),该检查不依赖内镜,病人依从性好,准确性较高,为Hp检测的重要方法之一,目前被广泛用于各医院。采用单克隆抗体酶联免疫分析(ELISA)检测大便中的Hp抗原,方法简单、方便,敏感性和准确性堪比Hp-UBT(B对)。另外,还有胃黏膜组织切片染色镜检(如银染、Warthin-Starry染色等)及细菌培养等(A对)、快速尿素酶试验(D对)等侵入性方法。不能作为判断幽门螺杆菌根除的检验方法是血清抗幽门螺杆菌抗体检测(E错,为本题正确答案)。

6. 答案:A

解析:消化性溃疡(PU)指胃肠黏膜发生的炎性缺损,通常与胃液的胃酸和消化作用有关,病变穿透黏膜肌层或达更深层次。十二指肠溃疡(DU)多于胃溃疡(GU),见于青壮年。PU治疗目标为:去除病因,控制症状,促进溃疡愈合、预防复发和避免并发症。十二指肠溃疡患者首选抗酸剂, Hp阳性病人均应根除Hp,因此,幽门螺杆菌Hp阳性的十二指肠溃疡患者首选的治疗是抑酸剂+抗Hp治疗(A对)。

7. 答案:C

解析:儿童期出现甲状腺结节有50%(C对)是恶性的。

8. 答案:E

解析:改善病情的抗风湿药(DMARDs)包括甲氨蝶呤(A对)、硫唑嘌呤(B对)、环磷酰胺(C对)以及氯喹或羟氯喹(D对)。双氯芬酸(E错,为本题正确答案)为邻氨基苯甲酸(灭酸)类衍生物,是环氧化酶抑制药,并非改善病情的抗

风湿药。

9. 答案:B

解析:癍痕性幽门梗阻临床表现主要为腹痛和反复呕吐,出现腹痛和呕吐,呕吐物为宿食,有腐败酸臭味,但不含胆汁(B错,为本题正确答案)。

10. 答案:E

解析:慢性支气管炎简称慢支,是气管、支气管黏膜及其周围组织的慢性非特异性炎症。临床上以咳嗽、咳痰为主要症状,或有喘息,每年发病持续3个月或更长时间,连续2年或2年以上,并排除具有咳嗽、咳痰、喘息症状的其他疾病(E对)。

11. 答案:E

解析:我国临床甲亢的患病率为0.8%,其中80%以上是由Graves病引起的。甲状腺功能亢进症(简称甲亢)是指甲状腺腺体本身产生甲状腺激素过多而引起的甲状腺毒症。Graves病(简称GD)是器官特异性自身免疫病之一,GD病人的甲状腺呈不同程度的弥漫性肿大,甲状腺上、下极可以触及震颤,闻及血管杂音(E对)。

12. 答案:D

解析:慢性支气管炎简称慢支,是气管、支气管黏膜及其周围组织的慢性非特异性炎症。临床上以咳嗽、咳痰为主要症状,实验室和其他辅助检查,X线检查早期可无异常(D对),反复发作者表现为肺纹理增粗、紊乱,呈网状或条索状、斑点状阴影,以双下肺明显。

13. 答案:E

解析:WHO近年将胃癌分为:腺癌(包括乳头状腺癌、管状腺癌、黏液腺癌、印戒细胞癌(E)和混合型腺癌)、腺鳞癌(C)、鳞状细胞癌(B)、类癌(D)、未分化癌(A)以及未分类癌。其中腺癌为最常见的组织学类型,其余均为特殊型胃癌。由于印戒细胞癌(E对)属于胃腺癌,故不属于特殊型胃癌。

14. 答案:A

解析:类风湿关节炎(RA)是一种以侵蚀性、对称性多关节炎为主要临床表现的慢性、全身性自身免疫性疾病。治疗措施包括:一般性治疗、药物治疗、外科手术治疗等,其中以药物治疗最为重要。RA一经确诊,都应早期使用DMARDs药物,本类药物中常用甲氨蝶

呤十来氟米特(A对)。

15. 答案:B

解析:肝硬化通常起病隐匿,病程发展缓慢,失代偿期症状较明显,主要有肝功能减退和门静脉高压两类临床表现。门静脉高压多属肝内型,常导致食管胃底静脉曲张出血,是继病因之后推动肝功能减退的重要病理生理环节,是肝硬化的主要死因之一。胃底曲张静脉破裂出血,大量血液丢失,导致有效循环血量的不足。通常在迅速失血超过全身总血量的20%时,即发生失血性休克(B对)。

16. 答案:A

解析:门静脉高压治疗,利尿治疗时,利尿速度不宜过快,以免诱发肝性脑病、肝肾综合征等(A错,为本题正确答案)。

17. 答案:C

解析:大叶性(肺泡性)肺炎典型者表现为肺实质炎症,通常并不累及支气管,不会出现气管向健侧移位(C错,为本题正确答案)。大叶性肺炎致病菌多为肺炎链球菌,早期肺部体征无明显异常,仅有胸廓呼吸运动幅度减小,叩诊稍浊,听诊可有呼吸音减低及胸膜摩擦音(D对)。肺实变时叩诊浊音(B对),触觉语颤增强并可闻及支气管呼吸音(E对)。消散期可闻及湿啰音(A对)。

18. 答案:C

解析:提示系统性红斑狼疮病情活动的免疫指标是抗双链DNA抗体阳性(C对)。

19. 答案:C

解析:诊断急性胰腺炎的重要标志物有血清淀粉酶、尿淀粉酶及血清脂肪酶。其中,血清淀粉酶(C对)是急性胰腺炎的各项检查中最早出现异常的指标,于起病后2~12个小时开始升高。血清脂肪酶(A错)于起病后24~72小时开始升高;血清乳酸脱氢酶(B错)于发病后8~18小时开始升高,缺乏特异性,现已少用;尿淀粉酶(D错)于起病后24小时开始升高;腹腔内出血时红细胞破坏释放出血红蛋白,经脂肪酸和弹力蛋白酶作用转变为正铁血黄素,后者与白蛋白结合成正铁血白蛋白,血清正铁血白蛋白(E错)在重症胰腺炎

起病 72 小时内常为阳性，是判断急性胰腺炎病情和预后的指标。

20. 答案:E

解析:食管胸部位于上纵隔后部和后纵隔,其毗邻结构有:(1)前方:气管、气管杈、左主支气管、左喉返神经、心包、左心房(E对);(2)后方:胸主动脉、胸导管、奇静脉(B错)、半奇静脉(A错);(3)左侧:左颈总动脉、主动脉弓、胸主动脉(C错)、胸导管上段;(4)右侧:奇静脉弓。

21. 答案:B

解析:EB病毒(B对)是B细胞的多克隆刺激剂,可刺激免疫系统产生抗T细胞抗体、抗B细胞抗体、抗核抗体和类风湿因子等自身抗体。一些病原微生物成分或超抗原可多克隆激活淋巴细胞。如果自身反应性B细胞被多克隆活化,即可产生自身抗体,引发自身免疫病如类风湿关节炎等。

22. 答案:D

解析:青霉素G即青霉素,为 β -内酰胺类抗生素,通过抑制细菌细胞壁四肽侧链和五肽交连桥的结合而阻碍细胞壁的合成而发挥杀菌作用,对革兰阳性菌如溶血性链球菌、肺炎链球菌和不产青霉素酶的葡萄球菌等具有良好抗菌作用。由于绝大多数肺炎链球菌菌株仍对青霉素很敏感,所以肺炎链球菌肺炎治疗的首选为青霉素G(D对)。红霉素(A错)为大环内酯类抗菌药,肺炎支原体、衣原体感染和军团菌肺炎首选此类药物。庆大霉素(B错)为氨基糖苷类抗菌药,肺炎克雷伯杆菌肺炎首选此类药物。氧氟沙星(C错)为喹诺酮类抗菌药,主要用于革兰阴性杆菌的感染。林可霉素(E错)也可以用来治疗肺炎链球菌肺炎,但并不是首选。

23. 答案:D

解析:继发性腹膜炎大多数是腹腔内脏器穿孔或外伤导致内脏破裂所致,需要手术清除病灶,彻底清洁腹腔,因此手术治疗(D对)是其最主要的治疗方法。静脉注射抗生素(A错)、胃肠减压(B错)、营养支持(C错)均为非手术治疗措施,适用于轻度腹膜炎或病程超过24小时,且腹部体征已经得到缓解或不能耐受手术的患者。观察(E

错)

24. 答案:E

解析:结核性腹膜炎是结核分枝杆菌引起的腹膜特异性感染,多继发于肺结核或其他部位的结核。腹腔镜下可见腹膜、网膜、内脏表面散在或集聚的灰白色结节,浆膜失去正常光泽;腹膜活组织检查见干酪样坏死灶或结核肉芽肿可以确诊。因此,对结核性腹膜炎最有价值的检查是腹腔镜检查+腹膜活检(E对)。PPD试验(结核菌素试验)(A错)阳性提示曾感染过结核或接种过卡介苗,强阳性提示活动性结核病的可能;CT(C错)可见增厚的腹膜、腹腔积液、腹腔内包块及瘘管,但两者均不能确诊结核性腹膜炎。腹腔积液常规(D错)只能确定腹水的性质,即腹水为漏出液还是渗出液,而不能确定是否为结核性腹膜炎。

25. 答案:B

解析:反流性食管炎伴溃疡形成,患者宜以PPI治疗,以求迅速控制症状、治愈食管炎,奥美拉唑属于PPI(B对)。法莫替丁(A错)属于H₂受体阻滞剂。硫糖铝(C错)、米索前列醇(D错)、枸橼酸铋钾(E错)属于胃黏膜保护剂。

26. 答案:A

解析:内痔的主要临床表现是出血和脱出,间歇性便后出鲜血是内痔的常见症状。未发生血栓、嵌顿、感染时内痔无疼痛,部分病人可伴发排便困难。内痔的好发部位为截石位3、7、11钟点位。

27. 答案:D

解析:漏出液是非炎性积液,主要形成原因是血浆胶体渗透压降低、毛细血管流体静压升高、淋巴管阻塞。充血性心衰时,心脏射血功能减退,静脉大量液体积聚,导致毛细血管流体静压升高,产生漏出液(D对)。结核性胸膜炎(A错)、胸膜肿瘤(B错)、肺栓塞(C错)、恶性胸腔积液(E错)常见渗出液。

28. 答案:E

解析:急性化脓性梗阻性胆管炎典型临床表现Reynolds五联征,即除有急性胆管炎的Charcot三联征:腹痛、寒战高热(A对)和黄疸(D对)外,还有休克、神经中枢系统受抑制表现(BC对)。急性化脓性梗阻性胆管炎患者可伴有

恶心、呕吐等消化道症状，但这并非其典型临床表现，其他消化道等疾病也可引起呕吐(E 错，为本题正确答案)。

29. 答案:B

解析:胃食管反流病(GERD)是一种由胃十二指肠内容物反流入食管引起不适症状和(或)并发症的疾病。根据是否导致食管黏膜糜烂、溃疡,分为反流性食管炎(RE)和非糜烂性反流病(NERD)。NERD有反流和(或)烧心症状,胃镜检查阴性(B对),24小时食管pH监测表明食管存在过度酸、碱反流。

30. 答案:E

解析:肠外营养的技术性并发症最严重的是空气栓塞(E对),最常见的是气胸(D错)。肠内营养最常见并发症的是误吸。

31. 答案:C

解析:右侧睾丸肿物,与睾丸相连,质韧(睾丸肿瘤特点),考虑睾丸肿瘤可能性大(C对)。睾丸鞘膜积液(A错)肿块局限在阴囊内,无压痛,透光试验阳性。腹股沟斜疝(B错)多见于儿童及青壮年,肿块经腹股沟管突出,可进入阴囊,回纳疝块后压住深环疝块不再突出。阴囊Paget病(D错)是一种皮肤恶性肿瘤,又称阴囊湿疹样癌、阴囊炎性癌,易被误诊为阴囊湿疹或皮炎。附睾炎(E错)可有附睾睾丸及精索增大或增粗,肿大以附睾头、尾部为甚,平卧后不会消失。

32. 答案:A

解析:胃大部切除术后,由于失去了幽门的节制功能,导致胃内容物排空过快,产生一系列临床症状,称为倾倒综合征(A对),多见于毕II式吻合术。其余胃大部切除术后远期并发症有碱性反流性胃炎(B错)、溃疡复发(D错)、营养性并发症(C错)、残胃癌(E错)。

33. 答案:B

解析:我国急性胰腺炎的主要病因是胆道系统疾病(B对)。其他常见病因有酒精(A错)、胰管阻塞(D错)、十二指肠降段疾病、手术与创伤(E错)、代谢障碍(C错)、药物、感染及全身炎症反应等。

34. 答案:A

解析:食物是胰腺液分泌的天然刺激

物,为减少胰酶对胰腺的自身消化,急性胰腺炎早期(A对)应绝对禁食,有助于缓解腹胀和腹痛。

35. 答案:E

解析:腹膜返折以上的直肠癌属于上段直肠癌,上段直肠癌早期淋巴转移的主要途径是向直肠上动脉旁淋巴结转移(E对)。腹股沟淋巴结转移(A错)多见于齿状线附近的癌灶。经直肠下动脉旁淋巴结(B错)向髂内淋巴结转移(C错)是下段直肠癌侧方淋巴结转移(D错)的主要途径。

36. 答案:E

解析:结核性胸膜炎胸腔积液蛋白含量高,容易引起胸膜肥厚粘连,因此,原则上应尽快抽尽胸腔内积液或肋间插细管引流(E对)。

37. 答案:C

解析:氨是肝性脑病最主要的神经毒素,消化道是产氨的主要部位。游离的NH₃有毒性,且能透过血脑屏障,而离子型氨(NH₄⁺)无毒性,不易透过血脑屏障。NH₃和NH₄⁺在体内可受pH梯度的影响而相互转化(NH₃+H⁺→NH₄⁺):NH₃在酸性环境中,可与H⁺结合形成NH₄⁺,随粪便排出体外;在碱性环境中,NH₄⁺解离为NH₃和H⁺,NH₃大量弥散入血,导致肝性脑病。高钾性酸中毒(C错,为本题正确答案)时,NH₃转为NH₄⁺,可降低血NH₃的浓度,减轻肝性脑病。消化道出血(A对)时,肠道细菌对含氮物质(100ml血液约含20g蛋白质)的分解增加,产氨增多,诱发肝性脑病。

38. 答案:A

解析:下肢慢性静脉功能不全(CV I)是一组由静脉逆流引起的病征,常见症状为下肢沉重、疲劳、胀痛。可出现踝部轻度肿胀和足靴区皮肤营养性变化:皮肤色素沉着、皮炎、湿疹、皮下脂质硬化和溃疡形成(A对)。曲张静脉易引起血栓形成及静脉周围炎,常遗有局部硬结与皮肤粘连,形成血栓性静脉炎(B错);曲张静脉破裂出血可以表现为皮下淤血(DE错)。

39. 答案:C

解析:类风湿关节炎(RA)是一种以侵蚀性、对称性多关节炎为主要临床表现的慢性、全身性自身免疫性疾病。

糖皮质激素(GC)有强大的抗炎作用,能迅速缓解关节肿痛症状和全身炎症,GC治疗RA的原则是小剂量、短疗程(C对)。

40. 答案:D

解析:幽门螺杆菌(Hp)检测对于胃癌前疾病及病变、消化性溃疡、胃肠黏膜相关淋巴瘤等疾病的诊疗具有重要作用。分为非侵入性方法和侵入性方法,非侵入性方法常用¹³C-或¹⁴C-尿素呼气试验(D对),该检查不依赖内镜,病人依从性好,准确性较高,为Hp检测的重要方法之一。

41. 答案:A

解析:止血带法一般用于四肢伤大出血,且加压包扎无法止血的情况,使用止血带应每隔1小时放松1~2分钟,且使用时间一般不应超过4小时(A对)。

42. 答案:A

解析:深静脉血栓形成(DVT)是血液在深静脉内不正常凝结引起的病症,多发生于下肢,主要症状为患肢肿胀、疼痛,活动后加重,抬高患肢可好转。在接受超过1小时的手术前大多采用小剂量肝素预防(CD对)。华法林(B对)和其他同类药物也可选用。但阿司匹林(A错,为本题正确答案)等抗血小板药物无预防作用。

43. 答案:A

解析:I型超敏反应是由IgE介导,肥大细胞、嗜碱性粒细胞、嗜酸性粒细胞等释放生物活性介质引起的局部或全身反应;支气管哮喘简称哮喘,是一种以慢性气道炎症和气道高反应性为特征的异质性疾病,气道慢性炎症作为哮喘的基本特征,存在于所有的哮喘病人,表现为气道上皮下肥大细胞、嗜酸性粒细胞、巨噬细胞、淋巴细胞及中性粒细胞等的浸润。支气管哮喘属于I型超敏反应(A对)。

44. 答案:B

解析:腹股沟直疝最有诊断意义的临床表现是按压深环疝仍复出(A对)。容易发生嵌顿、疝囊颈位于腹壁下动脉外侧、疝包块呈梨形均为腹股沟斜疝的特点(BCD错),中年人(E错)多发生斜疝,直疝多见于老年人。

45. 答案:A

解析:红细胞的寿命约为120天,因此

检测GHb的相对数量可反映近期血糖控制的平均水平,这比实时检测葡萄糖氧化酶活性的血糖绝对定量方法更为稳定、准确。GHb又分为HbA1a(与磷酸葡萄糖结合)、HbA1b(与果糖结合)、HbA1c(与葡萄糖结合)。HbA1a检测的指征:糖尿病碳水化合物代谢的长期回顾性监测(A对)。

46. 答案:D

解析:甲状腺功能亢进(甲亢)是由各种原因引起循环中甲状腺素异常增多而出现以全身代谢亢进为主要特征的疾病总称,手术禁忌证包括:①青少年病人(D对);②症状较轻者;③老年病人或有严重器质性疾病不能耐受手术者。

47. 答案:A

解析:女,65岁(中老年女性为MM的好发人群),乏力,胸痛1个月(骨痛为多发性骨髓瘤常见临床表现),既往体健,查体:轻度贫血貌,双侧肋骨有局部压痛,实验室检查:血常规Hb80g/L, WBC $5.6 \times 10^9/L$, plt $120 \times 10^9/L$,血清总蛋白100g/L,白蛋白27g/L,Scr $190 \mu\text{mol/L}$ (贫血,白细胞减少及肾功能损害Scr $>176.8 \mu\text{mol/L}$ 均支持多发性骨髓瘤的实验室检查结果),骨髓细胞学检查是骨髓中幼浆细胞占0.45(骨髓中幼浆细胞 $>30\%$)。综上所述,该病人最可能的诊断是多发性骨髓瘤,最重要的检查应是血、尿免疫固定电泳查是否满足标准:血清中M蛋白lgG $>35\text{g/L}$,lgA $>20\text{g/L}$ 或尿本周蛋白 $>1\text{g}/24\text{h}$ (A对)。血清 β_2 微球蛋白测定、尿常规无法检测血中的免疫轻链(BC错),尿本周蛋白测定可用于辅助检查,但无法确诊多发性骨髓瘤(D错),检测一般用于炎症性疾病活动期血沉(E错)。

48. 答案:D

解析:男,34岁,发作喘息四年,每年发作,查体:端坐呼吸(支气管哮喘的临床症状),口唇发绀,双肺布满哮鸣音(支气管哮喘的体征),应诊断为支气管哮喘。

49. 答案:D

解析:男性患者27岁,突发头痛伴剧烈呕吐1天,尿少,口渴不明显,短时间内的就是急性失水大多为等渗性

脱水，且符合等渗性脱水的临床表现(D对)。长时间(几周、几个月的)的慢性失水大多为低渗性脱水(CE错)。高渗性脱水有明显的口渴表现(AB错)。

50. 答案:B

解析:中年女性患者，高空跌落伤及左胸后，出现反常呼吸运动，左胸壁可触及多根多处肋骨断端，左肺呼吸音明显减弱，应诊断为闭合性多根多处肋骨骨折。查体见生命体征尚平稳，一般情况良好，故该患者当前最主要的治疗原则是有效镇痛和呼吸管理，即最佳治疗方案首选镇静止痛及氧气吸入(B对)，以改善肺功能，降低肺部并发症，促进患者早日康复。胸壁加压包扎(A错)多用于闭合性单处肋骨骨折的治疗。胸壁内固定术(C错)多用于进行性血胸并多根多处肋骨骨折的治疗。胸腔穿刺排气排液(D错)、胸腔闭式引流(E错)主要用于有明显血气胸的患者，该患者气管居中，血压正常，无提示有气胸或血胸的临床表现，故不选。

51. 答案:C

解析:患者女，65岁，慢性阻塞性肺疾病患者，近年来轻微活动后即感气急，咳嗽轻，咳痰少，动脉血气分析:pH7.34, PaO₂68mmHg, PaCO₂68mmHg。老年慢阻肺患者 PaCO₂68mmHg (PaCO₂>50mmHg)，应诊断为 I 型呼吸衰竭(C对)，

52. 答案:A

解析:患者青少年女，14岁(结核性胸膜炎好发人群)，咳嗽、乏力，有胸腔积液，胸水为草绿色(结核性胸膜炎胸腔积液典型表现)，应诊断为结核性胸膜炎(A对)。类肺炎性胸腔积液(E错)系指肺炎、肺脓肿和支气管扩张感染引起的胸腔积液，一般积液量少。

53. 答案:D

解析:根据患者行胃大部切除，毕 II 式吻合术治疗突发右上腹剧痛，查体心肺未见明显异常，手术切口无明显渗出，全腹肌紧张、压痛阳性，以右上腹为著，考虑为十二指肠残端破裂，需及时手术治疗(A对)。

54. 答案:E

解析:男性患者 29 岁，左大腿挤压伤 3 天(气性坏疽气性坏疽有外伤史)。查

体:痛苦面容，T38.2℃(体温升高)，P96 次/分，R25 次/分，血压 130/84mmHg(气性坏疽典型表现)。左大腿皮肤红肿严重，界限不清，皮下有捻发感(气性坏疽典型体征)。根据患者外伤史，临床表现及体征诊断该患者为气性坏疽。气性坏疽首要措施是立即在病变区多处切开，切除受累组织及术后氧化剂清洗、湿敷，勤换敷料(ACD对)。应用高压氧治疗(B对)可以提高组织间含氧量，提高治愈率，减低轻残率。应用抗生素，气性坏疽首选青霉素，氨基糖苷类抗生素对此类细菌已证实无效(E错，为本题正确答案)。

55. 答案:E

解析:中年男性患者，右侧斜疝嵌顿 6 小时，急诊手术中见嵌顿的回肠约有 50%坏死(提示已进展为绞窄性疝)，行坏死回肠切除肠吻合术后，疝处理应首选单纯疝囊高位结扎术(E对)。该患者因肠管绞窄坏死而有局部严重感染，一般仅行单纯疝囊高位结扎术，以避免因感染而致疝修补失败。McVay 法疝修补术(A错)、Ferguson 法疝修补术(B错)、Halsted 法疝修补术(C错)和 Bassini 法疝修补术(D错)适用于无绞窄的腹股沟疝。

56. 答案:D

解析:患者中老年女性(痈多发年龄)，背部红肿 7 天(痈好发部位)，疼痛逐渐加重，伴畏寒、发热(提示可能为感染性疾病)，既往糖尿病病史 10 年(感染多发因素)，T39℃(发烧，正常值 36~37℃)，背面红肿皮肤有多个脓点(痈的典型体征)，综合患者病史、症状及体征，诊断考虑为痈。患者已出现多个脓点，需要及时切开引流，在静脉麻醉下“++”形切口切开引流(C对)，切口要深达筋膜(E对)，切口线应超出病变边缘皮肤(D错，为本题正确答案)；然后在脓腔内填塞生理盐水或凡士林纱条压迫止血，外加干纱布绷带包扎(AB对)。

57. 答案:A

解析:老年男性患者(乙状结肠扭转好发人群)，运动后腹痛，腹膜刺激征阳性，腹穿抽出血性液体，X线见马蹄形，双腔固定肠袢(乙状结肠扭转典型影

像学表现), 考虑诊断为乙状结肠扭转 (A 对)。小肠扭转 (B 错) 表现为突然发作剧烈腹部绞痛, 常为持续性疼痛阵发性加剧, 腹部 X 线检查符合绞窄性肠梗阻的表现, 有时可见空肠和回肠换位, 或排列成多种形态的小跨度蜷曲肠袢等特有的征象。乙状结肠套叠 (C 错) 多见于幼儿, 成人肠套叠较为少见, 肠套叠的三大典型症状是腹痛、血便和腹部肿块。

58. 答案:D

解析:成年女性患者, 烧伤臀、会阴面积=5%+1%=6%, 双大腿面积=21%, 故患者烧伤的总面积=6%+21%=27%。创面红白相间、疼痛钝痛、有水泡, 故为深 II 度烧伤, 27% (D 对)。

59. 答案:D

解析:患者中年男性, 肛周疼痛, 伴畏寒发热 3 天 (坐骨肛管间隙脓肿, 脓肿范围较大时全身感染症状明显, 如头痛、乏力、发热), 查体:左侧肛周皮肤稍红, 深压痛, 截石位直肠指诊两点处可及波动 (坐骨肛管间隙脓肿后期出现肛门病侧红肿, 局部触诊或直肠指检时病侧有深压痛, 甚至波动感), 考虑诊断为坐骨肛管间隙脓肿 (D 对)。

60. 答案:E

解析:COPD 患者因呼吸困难急性加重增加氧流量, 致使患者吸入氧浓度过高引起二氧化碳潴留 (E 对), 出现意识障碍, 导致患者无法被唤醒, 昏睡 (二氧化碳潴留时可出现昏睡乃至昏迷的症状)。舒乐安定 (A 错) (规格为 1mg) 成人常催眠用量:1~2mg, 睡前服, 不至于导致中毒。脑梗死 (B 错) 多见于 2~10 岁儿童, 表现为高热、严重头痛、呕吐、烦躁不安和谵妄乃至昏迷, 常有惊厥发作, 与该患者表现不符。

61. 答案:D

解析:中年女性患者, 四肢大小关节肿痛 (类风湿性关节炎典型表现), 结合患者症状、体征和实验室检查, 该患者最可能的诊断是类风湿性关节炎 (D 对)。风湿性关节炎 (A 错) 是溶血性链球菌感染所引起的全身变态反应性疾病, 常有咽峡炎、丹毒等感染病史。起病较急, 且多见于青少年。有两个特点:一是关节红、肿、热、痛明显, 不能活动, 小关节少见;二是多关节

游走性疼痛, 但疼痛持续时间不长。ANA 见于几乎所有的 SLE 病人, 患者 WBC $8 \times 10^9/L$, Hb 100g/L, ANA (-), 排除系统性红斑狼疮 (B 错)。骨关节炎 (C 错) 好发于膝、髋等负重较大的关节。患者经多种抗生素正规治疗无效, 因此排除结核菌感染引起的关节炎 (E 错)。

62. 答案:D

解析:老年男性患者, 吞咽困难, 钡餐造影示食管中段黏膜紊乱, 管壁僵硬, 管腔狭窄, 结合患者临床表现和相关检查, 该患者最可能的初步诊断是食管癌 (D 对)。食管炎 (A 错) 主要表现为“烧心”、吞咽疼痛, 钡剂造影一般无阳性表现。食管憩室 (B 错) 多无症状, 若憩室内有食物残留, 可引起颈部压迫感。贲门失弛缓症 (C 错) 主要表现为间断性咽下困难, 钡剂造影典型表现为食管下端及贲门部呈鸟嘴状。食管平滑肌瘤 (E 错) 为良性肿瘤, 可有进食梗咽感, 钡剂造影典型表现为“半月状”压迹。

63. 答案:C

解析:患者中老年男性, 8 年前始有咳嗽和咳痰, 逐年加重, 常持续数月 (符合慢性支气管炎的临床症状), 多次胸摄片两肺纹理增粗 (慢性支气管炎反复发作者表现为肺纹理增粗、紊乱, 呈网状或条索状、斑点状阴影, 以双下肺明显), 考虑诊断为慢性支气管炎 (C 对)。肺结节病 (A 错) 双侧肺门淋巴结肿大 (BHL) (伴或不伴右侧气管旁淋巴结肿大) 是最常见的 X 线征象。支气管肺癌 (B 错) 多数有数年吸烟史, 顽固性刺激性咳嗽或过去有咳嗽史, 近期咳嗽性质发生改变, 常有痰中带血。肺结核 (D 错) 常有发热、乏力、盗汗及消瘦等症状, 影像特点是病变多发生在上叶的尖后段、下叶的背段和后基底段, 呈多态性, 即浸润、增殖、干酪、纤维钙化病变可同时存在, 密度不均匀、边缘较清楚和病变变化较慢, 易形成空洞和播散病灶。气胸 (E 错) X 线影像学典型表现为外凸弧形的细线条形阴影, 称为气胸线, 线外透亮度增高, 无肺纹理, 线内为压缩的肺组织。

64. 答案:D

解析:患者中年女性,既往乙型肝炎病史 20 年(肝硬化的高危因素),今晚进食后(食管胃底静脉曲张出血的常见诱因)突然大量咯血,有暗红色血块(上消化道出血的表现)。查体:脉搏 100 次/分,血压 84/64mmHg(血压下降,休克表现),腹部稍膨隆,肝未触及,脾在肋下两指(脾肿大、脾功能亢进表现),移动性浊音。综合患者的病史、临床表现、查体和实验室检查,可初步诊断为肝炎后肝硬化伴食管胃底静脉曲张破裂(D 对)。溃疡(AB 错)多表现为有一定周期性、节律性的上腹痛,一般很少发生上消化道大出血。胃癌(C 错)常有多年胃溃疡病史,有发热、乏力、消瘦等全身症状;且以上疾病均不会出现脾大、脾功能亢进表现。

65. 答案:D

解析:患者中老年男性,乙肝病史 30 余年(可发展为肝炎后肝硬化),3 小时前进食烧饼后突然出现呕血,量约 1000ml。根据病史及临床表现,诊断为门脉高压症、胃底食管下段静脉曲张破裂出血。患者无黄疸、腹水,提示肝功能良好,可行急诊手术贲门周围血管离断术(D 对),该术式可即刻止血,对病人打击小,能维持入肝血流,对肝功能影响小,术后生存质量高,是患者的最佳手术方式。患者肝功能好,可施行手术治疗,经颈静脉肝内门体分流术(A 错)适用于肝功能差不能手术者。非选择性门体分流术(B 错)肝性脑病发生率高,易引起肝衰竭。选择性门体分流术(C 错)操作复杂,出血量较多,不适合急诊止血。脾切除术(E 错)主要用于脾大、脾功能亢进而无食管胃底静脉曲张的病人。

66. 答案:D

解析:患者为中年女性,发热,气短 10 天,伴明显刺激性咳嗽,咽痛、头痛(支原体肺炎的典型症状),白细胞增高,胸片双下肺点片状浸润影,根据其临床表现和辅助检查,考虑诊断为支原体肺炎(D 对)。肺炎链球菌肺炎(A 错)患者常有受凉、淋雨、疲劳、醉酒、病毒感染史,多有上呼吸道感染的前驱症状,起病急骤,高热、寒战,全身肌肉酸痛,可有口角及鼻周单纯疱疹,X 线表现为大片炎症浸润阴影或实

变影,可见支气管充气征。葡萄球菌肺炎(B 错)主要表现为寒战、高热、胸痛痰脓性、量多、带血丝或呈脓血状,X 线表现为肺段或肺叶实变,可早期形成空洞。肺结核(C 错)患者有结核毒血症症状,如低热盗汗,体重减轻等,X 线表现为大叶性,密度均匀,磨玻璃状阴影,逐渐出现溶解区,呈虫蚀样空洞。肺孢子菌肺炎(E 错)多见于早产儿、营养不良儿和免疫缺陷者,主要表现为食欲下降、腹泻等,X 线表现早期为弥漫性肺泡和间质浸润影,迅速进展为双侧肺门蝴蝶状影可见支气管充气征。

67. 答案:C

解析:患者中年女性,有反复发作上腹痛病史、平卧加重、弯腰减轻(慢性胰腺炎的典型症状)。X 线腹部摄片左上腹钙化(慢性胰腺炎典型的影像学表现)。综合患者的病史、临床表现、影像学检查,可能的诊断是慢性胰腺炎(C 对)。慢性胃炎(A 错)、慢性肝炎(E 错)一般表现为上腹痛、消化不良等症状,但 X 线腹部摄片一般无钙化。慢性胆囊炎(B 错)主要表现为进食油腻食物后右上腹阵发性绞痛,常放射至右肩背部。慢性十二指肠球炎(D 错)多表现为中上腹的疼痛,伴有反酸、嗝气等,X 线腹部摄片常表现为激惹现象。

68. 答案:E

解析:患者诊断为原发性慢性肾上腺皮质功能减退症,长期口服氢化可的松(30mg/日)替代治疗,出现发热、咽痛(考虑伴发感染),此时机体会出现应激反应,肾上腺皮质激素需求增加,因此代替治疗剂量应增加,可增加为原剂量的 2~3 倍(E 对 BCD 错)。地塞米松(A 错)对水盐代谢的调节作用弱,一般不用于原发性慢性肾上腺皮质功能减退症。

69. 答案:A

解析:患者中年女性,进食后上腹饱胀 4 年,每次进食正常餐量就感腹胀(功能性消化不良典型临床症状与表现),无发热,无呕血、黑便,无乏力、纳差,精神可,查体:腹软,无压痛,反跳痛,肌紧张,肝脾未触及,血常规,肝肾功能未见异常(功能性消化不良

无可解释症状的器质性疾病)。功能性消化不良(FD)是指由胃和十二指肠功能紊乱引起的餐后饱胀感、早饱、中上腹痛及中上腹烧灼感等症状,而无器质性疾病的一组临床综合征。餐后饱胀是指正常餐量即出现饱胀感,该患者的临床症状及体征符合功能性消化不良的临床表现,因此,考虑诊断为功能性消化不良(A对)。

70. 答案:D

解析:肝囊肿体查可触及右上腹肿块或多个结节,可随呼吸上下移动(A错)。肝血管瘤(B错)不会出现白细胞增高等感染中毒症状。肝癌(E错)患者肝脏质地坚硬,边缘不规则,表面凹凸不平呈大小不等的结节或肿块,且B超检查非液性暗区。

71. 答案:C

解析:青年男性患者,转移性右下腹痛5天,发热伴恶心呕吐4天(提示急性阑尾炎),腹胀,右下腹扪及5×3cm肿块,质中,边界不清,有压痛反跳痛(提示腹腔脓肿),结合患者病史,查体,应考虑为阑尾周围脓肿(C对)。肠套叠(B错)三大典型症状是腹痛、血便和腹部肿块,但多见于幼儿,成人肠套叠较为少见。肠结核(E错)常继发于肺结核,临床以慢性腹部隐痛、腹泻、腹部包块及低热、盗汗等结核中毒症状为主要表现。

72. 答案:A

解析:肛瘘是指肛管直肠周围的肉芽肿性管道,由内口、瘘管、外口三部分组成。肛瘘外口持续或间断流出少量脓性、血性、黏液性分泌物为主要症状,若瘘管位置较低,自外口向肛门方向可触及条索样瘘管(A对)。内痔主要临床表现是出血和脱出,间歇性便后出鲜血是内痔的常见症状(E错)。外痔主要临床表现是肛门不适、潮湿不洁,有时有瘙痒(C错)。直肠癌多能在直肠指诊时触及肿物,癌肿影响排便会有直肠刺激征,表现为便意频繁,排便习惯改变,排便不尽感,肿瘤破溃出血症状。直肠息肉为圆形、实质性、有蒂、可活动,这种情况多见于儿童。

73. 答案:A

解析:患者中年男性,间断上腹痛2年,

13C尿素酶阳性(提示幽门螺杆菌阳性),根据患者临床症状和体征以及实验室检查,可诊断患者为幽门螺杆菌感染性慢性胃炎。具有杀灭和抑制Hp作用的药物有克拉霉素(C对)、阿莫西林(B对)、奥美拉唑(E对)、枸橼酸铋钾(D对)。不包括阿米卡星(A错,为本题正确答案)。

74. 答案:E

解析:青年女性患者,右乳房肿块3月余,右乳外上象限触及3cm结节,无压痛、淋巴结无肿大,应考虑乳腺纤维腺瘤(E对)。乳房肉瘤(A错)好发于50岁以上的妇女,表现为乳房肿块,体积可较大,表皮因肿瘤迅速增大而呈现紧张发亮、微红色,且有静脉怒张,但有明显境界但一般不发生粘连与“桔皮样变”。乳管内乳头状瘤(B错)多见于经产妇,表现为反复乳头溢血,可于乳晕区扪及直径数mm的小结节,质软可推动,轻压肿块可有乳头血性溢液。乳腺囊性增生症(C错)常见于中年妇女,主要表现为乳房胀痛与肿块,肿块可呈颗粒状、结节状、片状,大小不一,坚韧不硬,边界不清。乳腺癌(D错)常见于绝经期妇女,表现为乳房肿块,边界不清,易侵犯肌肉,皮肤表面可见扩张的静脉。

75. 答案:C

解析:患者中年男性,伤后脉率130次/分,BP75/57mmHg,神志尚清,口渴,面色苍白,根据临床表现和程度,估计患者出血量800~1600ml(C对)。

76. 答案:B

解析:患者青年男性,暴饮暴食后腹痛(胰腺炎常见诱因),既往有胆囊结石,经治疗后2周腹部囊性肿块,考虑诊断为胰腺假性囊肿(B对),胰腺假性囊肿常为胰内瘘的渗出液积聚后,因难以积聚纤维组织增生形成囊壁,包裹而成胰腺假性囊肿。胰腺脓肿(A错)常由胰周积液、胰腺假性囊肿或胰腺坏死感染发展而来,患者无发热感染症状,因此不考虑胰腺脓肿。胰腺坏死早期急性坏死物集聚含有实性及液体成分,通常边界不清。1个月左右,随着病变周围网膜包裹、纤维组织增生,这些实性及液性坏死物被包裹、局限(D错)。门静脉高压有脾大,胃食

管静脉曲张等表现(E 错)。消化性溃疡常见胃溃疡和十二指肠溃疡。胃溃疡表现为餐后痛,十二指肠溃疡表现为饥饿痛,及餐后缓解(C 错)。

77. 答案:B

解析:患者中老年男性(痈多发年龄),背部红肿(痈好发部位),有波动感,中间有脓点(为痈的典型体征),既往糖尿病病史 10 年(感染多发因素),综合患者病史、症状及体征,诊断考虑为痈(B 对)。疖(A 错)是单个毛囊及其周围组织的急性细菌性化脓性炎症,病变范围小,多个疖可融合成痈。丹毒(C 错)起病急,开始即可有畏寒、发热、头痛、全身不适等,病变多见于下肢,表现为片状皮肤红疹、微隆起、色鲜红、中间稍淡、境界较清楚。

78. 答案:A

解析:患者中年男性,间断上腹痛 3 年,加重 1 周,1 周前上腹胀痛明显,进食后加重,伴恶心,呕吐,呕吐物量大,有酸臭味(幽门梗阻典型症状及临床表现),根据患者临床表现及症状,可诊断为幽门梗阻。因此,该患者最可能的体征是振水声(A 对)。

79. 答案:A

解析:患者中年男性,排便后肛周疼痛一个月,加重两周,压痛红肿(肛周脓肿典型临床表现),T37.6℃(肛周脓肿全身感染性症状不明显),截石位 2 点钟位置,指检有波动感(肛周脓肿形成可有波动感),根据患者的症状、临床表现及指检症状,可考虑诊断为肛周脓肿(A 对)。

80. 答案:E

解析:患者中年女性,咳嗽咳脓痰 3 天(支气管扩张症典型临床表现),幼时曾患过百日咳(支气管扩张症多继发于百日咳后的支气管肺炎及肺结核病等),因此可诊断为支气管扩张症(E 对)。

81. 答案:D

解析:患者老年男性,里急后重伴便血 3 个月,肠镜检查见直肠内菜花状肿物,浅表小溃疡(直肠癌典型临床症状及肠镜结果),考虑诊断为直肠癌。直肠癌常用保肛手术,治疗原则要求肿瘤远端距切缘至少 2cm;低位直肠癌至少 1cm,因此,决定手术治疗是否保肛主

要因素是肿物下缘距肛门距离(D 对)。

82. 答案:C

解析:患者老年男性,胸骨疼痛半年,半年来反复发作胸骨后烧灼样疼痛,反酸,凌晨发作明显,咳嗽(胃食管反流病典型临床症状及表现),心电图、肌电图、胸片均未见异常(排除其他疾病所致胸骨后疼痛症状),因此,考虑诊断为胃食管反流病,GERD 是以 LES 功能障碍为主的胃食管动力障碍性疾病,若 LES 功能障碍或一过性松弛延长(C 对),反流物损伤食管黏膜,则导致胃食管反流病。

83. 答案:E

解析:患者进食油腻食物后出现右上腹绞痛(急性胆囊炎的常见诱因),向右肩反射,伴恶心,呕吐,墨菲氏征(+)(急性胆囊炎常见临床表现及体征),综上所述,考虑诊断为急性胆囊炎(E 对)。

84. 答案:A

解析:患者中年女性,反复发作右上腹绞痛伴黄疸 3 年,MRCP 检查有胆结石(确诊胆结石并已出现症状),此时,首选胆囊切除术治疗。上段扩张,胆总管远端狭窄,应行胆管空肠 Roux-en-Y 吻合术,因此,综上所述,最合适的手术方法为胆囊切除,胆总管空肠吻合术(A 对)。

85. 答案:B

解析:患者青年男性,发热咳脓痰 2 天,右肺湿啰音,体温 39.2℃,可考虑诊断为肺炎。抗感染 2 天后突发右侧胸痛,呼吸时症状加重,呼吸音低,CT 右侧胸腔积液考虑为肺炎合并急性胸膜炎(B 对)。肿瘤渗出性胸膜腔积液(E 错)好发于中老年,一般无寒战、高热、咳脓痰,胸片可看到肿瘤的阴影,无肺大片状致密影。

86. 答案:E

解析:青年男性患者,既往腰痛 1 年,伴晨僵,晨起活动后可减轻(脊柱关节炎典型表现),双侧 4 字试验(+) (提示髓关节病变),实验室检查:ESR 100mm/h(高于男性正常值 0~15mm/h),提示患者可能处于炎症病情活动期,结合患者症状、体征和实验室检查,最可能的诊断是脊柱关节炎(E 对)。

87. 答案:C

解析:患者中年女性,反复肾结石 5 年,全身骨痛 1 年(甲状旁腺功能亢进症病人有反复发作尿路结石、骨痛),实验室检查:血钙 2.76mmol/L(血钙升高,正常值 2.25~2.75mmol/L,甲状旁腺功能亢进症患者实验室检查有高血钙),血磷 0.8mmol/L(正常值 0.74~1.39mmol/L),ALP350U/L,综上所述,该患者最可能的诊断是甲状旁腺功能亢进症,最有助于明确诊断的实验室检查是 PTH(C 对),甲状旁腺功能亢进症明确诊断需做血清 PTH 测定,并结合血清钙测定。

88. 答案:B

解析:HBsAg 阳性反映现症 HBV 感染,阴性不能排除 HBV 感染。HBeAg 的存在表示病毒复制活跃且有较强的传染性。抗 HBcIgM 是 HBV 感染后较早出现的抗体,在发病 1 周即可出现。该患者 HBsAg(+),HBeAg(+),抗 HBcIgM(+)诊断为病毒性肝炎,乙型。该患 TBil187umol/L,有尿色加深的黄疸症状,则为急性黄疸型。抗 HAVIgG(+)说明既往感染过甲肝。所以诊断为病毒性肝炎,乙型,急性黄疸型,HAV 既往感染(B 对)。

89. 答案:A

解析:胆碱酯酶抑制剂通过抑制胆碱酯酶(新斯的明),减少 ACh 的水解而减轻肌无力症状,同时可促进胃平滑肌收缩及增加胃酸分泌,可能出现腹泻的症状(A 对)。胆碱酯酶抑制剂对心脏的主要作用表现为心率减慢(B 错)、心输出量下降,还有可能出现瞳孔缩小(C 错)、唾液腺分泌增加出现口水过多的症状(D 错)。重症肌无力危象是指呼吸肌受累时出现咳嗽无力甚至呼吸困难,该患者给予胆碱酯酶抑制剂后症状缓解,即随之呼吸困难症状得到缓解(E 错)。

90. 答案:D

解析:青少年女性患者,发热、咽痛伴阵发性刺激性咳嗽 1 周,X 线片示左上肺淡薄片状阴影,血白细胞总数及中性粒细胞计数正常,阿奇霉素治疗 7 天后病灶大部分吸收,考虑最可能的诊断为肺炎支原体感染(D 对)。肺炎链球菌(A 错)肺炎发病有受凉、淋雨、疲劳等,多有上呼吸道感染的前驱症状,

起病急骤,有高热、寒战,全身肌肉酸痛等表现。结核分枝杆菌(B 错)感染表现为咳嗽、咳痰两周以上或痰中带血,发热为最常见症状,多为长期午后潮热,肺结核病影像特点是病变多发生在上叶的尖后段、下叶的背段和后基底段,呈多态性。

91. 答案:E

解析:中年男性患者,乏力、腹胀伴尿黄 1 月余,15 年前检查 HBsAg(+),肝功能反复异常,但未诊治。既往有食管胃底静脉曲张破裂史。查体:皮肤巩膜重度黄染,肝掌及蜘蛛痣(+),腹水征(+)。实验室检查:ALT 250U/L, TBil320umol/L, HBsAg(+),PTA18%。根据患者病史及临床表现,最可能的诊断是亚急性肝衰竭(E 对 ACD 错)。患者 HBsAg(+)表示患者 HBV 感染(B 错)。

92. 答案:D

解析:患者中老年女性,上腹部疼痛 5 天,3 天前转移至右下腹(急性阑尾炎典型临床症状),5 小时前突然出现右下腹剧烈疼痛,伴全腹压痛,右下腹较重,有反跳痛,腹肌紧张(考虑阑尾穿孔),结合该患者临床症状、体征及实验室诊断,考虑该患者急性阑尾炎穿孔,手术治疗宜采用右下腹经腹直肌切口(D 对)。

93. 答案:A

解析:患者中老年男性,上腹部疼痛 5 天,3 天前转移至右下腹(急性阑尾炎典型临床症状),5 小时前突然出现右下腹剧烈疼痛,伴全腹压痛,右下腹较重,有反跳痛,腹肌紧张(考虑阑尾穿孔),结合该患者临床症状、体征及实验室诊断,考虑该患者急性阑尾炎穿孔。手术后 4 天,患者切口处出现跳痛,检查发现切口红肿、化脓(切口感染常见临床表现),综上所述,该患者术后并发症为切口感染(A 对)。

94. 答案:C

解析:患者青年男性,规律空腹痛 4 年,黑便 1 天,呕血 2 小时,(消化性溃疡并发出血的典型症状及临床表现),痛前有饮酒史,有肝病 2 年,无腹水,无蜘蛛痣(说明尚未出现门静脉高压症状),脉搏 106 次/分,血压 80/60mmHg(血压下降,考虑该患者系由呕血引起),综上所述,该患者考虑

诊断为消化性溃疡(C对)。

95. 答案:A

解析:患者青年男性,规律空腹痛4年,黑便1天,呕血2小时,(消化性溃疡并发出血的典型症状及临床表现),痛前有饮酒史,有肝病2年,无腹水,无蜘蛛痣(说明尚未出现门静脉高压症状),脉搏106次/分,血压80/60mmHg(血压下降,考虑该患者系由呕血引起),综上所述,该患者考虑诊断为消化性溃疡。PPI(奥美拉唑)是治疗消化性溃疡的首选药物(A对)。

96. 答案:A

解析:患者青年男性,规律空腹痛4年,黑便1天,呕血2小时,(消化性溃疡并发出血的典型症状及临床表现),痛前有饮酒史,有肝病2年,无腹水,无蜘蛛痣(说明尚未出现门静脉高压症状),脉搏106次/分,血压80/60mmHg(血压下降,考虑该患者系由呕血引起),综上所述,该患者考虑诊断为消化性溃疡。根据患者做完毕Ⅱ手术后5天,突发腹痛,呈刀割样,考虑为十二指肠残端破裂(A对),需及时手术治疗。

97. 答案:B

解析:患者有30支/天吸烟史(肺癌危险因素),咳嗽,痰中带血伴喘息3日(肺癌常见临床表现)。胸部X线见右上肺门肿大影,右上纵隔明显增宽,头面部及双上肢肿胀2周(肿瘤局部扩展引起的上腔静脉阻塞综合征)。结合病史和临床表现以及X线检查可诊断为肺癌(B对E错)。淋巴瘤(A错)患者可见淋巴结肿大,多有发热、消瘦、贫血、胸腔积液等。肺结核(C错)多发生在青年人,多有午后潮热、乏力、盗汗等临床表现。X线检查可见上叶的尖后段、下叶的背段后基底段呈多态性,即浸润、增殖、干酪、纤维钙化病变同时存在。肺心病(D错)患者多先有慢阻肺或慢性支气管炎、肺气肿等肺部疾病,然后出现右心衰征象。典型症状为咳嗽、咳痰、气促,活动后可有心悸、呼吸困难、乏力和劳动耐力下降。但少有胸痛或咯血。

98. 答案:B

解析:患者有30支/天吸烟史(肺癌危险因素),咳嗽,痰中带血伴喘息3日

(肺癌常见临床表现)。胸部X线见右上肺门肿大影,右上纵隔明显增宽,结合病史和临床表现以及X线检查可诊断为肺癌。患者出现面部及双上肢水肿的原因主要是因为肿瘤局部扩展引起的上腔静脉梗阻(B对)。上腔静脉阻塞综合征主要是由于肿瘤直接侵犯纵隔,或转移的肿大淋巴结压迫上腔静脉,或腔静脉内癌栓阻塞,均可引起静脉回流受阻。表现上肢、颈面部水肿和胸壁静脉曲张。

99. 答案:E

解析:中年男性患者,暴饮暴食(急性胰腺炎常见诱因)后持续左腹胀痛,恶心,呕吐3小时,呕吐后症状无缓解(急性胰腺炎的常见临床表现)。实验室检查:血清淀粉酶400U/L(正常值800~1800U/L)。综合该患者的病史、查体及实验室检查,诊断考虑急性胰腺炎。增强CT有助于确定胰腺坏死程度,一般宜在起病1周左右进行(E对)。

100. 答案:C

解析:中年男性患者,暴饮暴食(急性胰腺炎常见诱因)后持续左腹胀痛,恶心,呕吐3小时,呕吐后症状无缓解(急性胰腺炎的常见临床表现)。实验室检查:血清淀粉酶400U/L(正常值800~1800U/L)。综合该患者的病史、查体及实验室检查,诊断考虑急性胰腺炎。2月后复查,上腹饱胀感,进食后恶心,腹平坦,左上腹包块,质韧,无压痛(胰腺假性囊肿典型临床表现及体征),B超示左上腹囊性占位,考虑诊断为胰腺假性囊肿(C对)。

101. 答案:A

解析:青年女性患者,跟同学发生争执,走在街上觉得人们都在议论她,感觉听到别人骂她,站在马路上想让汽车撞死(幻听妄想),站在马路上想让汽车撞死(妄想),诊断依据该患者青年起病,以幻觉、妄想为主要表现,故诊断为精神分裂症(A对)。抑郁发作以显著而持久的情感低落为主要表现,伴有兴趣缺乏、快感缺失等,本例无此症状,故不考虑(B错)。

102. 答案:A

解析:青年女性患者,跟同学发生争执,走在街上觉得人们都在议论她,感觉听到别人骂她,站在马路上想让汽车

撞死(幻听妄想), 站在马路上想让汽车撞死(妄想), 诊断依据该患者青年起病, 以幻觉、妄想为主要表现, 故诊断为精神分裂症, 作为群体, 在阳性症状的总体控制方面, 奥氮平、氨磺必利以及利培酮(A 对)可能优于其他第一、第二代抗精神病药物。

103. 答案:B

解析:青年女性患者, 跟同学发生争执, 走在街上觉得人们都在议论她, 感觉到别人骂她, 站在马路上想让汽车撞死(幻听妄想), 站在马路上想让汽车撞死(妄想), 诊断依据该患者青年起病, 以幻觉、妄想为主要表现, 故诊断为精神分裂症, 服用抗精神病药物后出现肌肉震颤, 手抖等锥体束征, 应采取的处理措施是服用抗胆碱能药物盐酸苯海索(B 对)。

104. 答案:A

解析:CA199(A 对)即糖链抗原 199, 在胰腺癌、肝胆和胃肠道疾病时可明显升高, 目前临床上主要作为胰腺癌的首选肿瘤标志物。AFP(甲胎蛋白)是在胎儿早期由肝脏和卵黄囊合成的一种血清糖蛋白, 出生后, AFP 的合成很快受到抑制。当肝细胞或生殖腺胚胎组织发生恶性病变时, 有关基因重新被激活, 使原来丧失合成 AFP 的细胞又重新开始合成, 以致血中 AFP 含量明显升高。因此原发性肝细胞性肝癌最理想的肿瘤标记物是 AFP(B 错)。CA125(C 错)即癌抗原 125, 对诊断卵巢癌有较大临床价值, 尤其对观察治疗效果和判断复发较为灵敏。CEA(E 错)即癌胚抗原, 是一种广谱性肿瘤标志物, 可在多种肿瘤中表达, 脏器特异性低, 在临床上主要用于结直肠癌的复发监测。

105. 答案:B

解析:AFP(甲胎蛋白)是在胎儿早期由肝脏和卵黄囊合成的一种血清糖蛋白, 出生后, AFP 的合成很快受到抑制。当肝细胞或生殖腺胚胎组织发生恶性病变时, 有关基因重新被激活, 使原来丧失合成 AFP 的细胞又重新开始合成, 以致血中 AFP 含量明显升高。因此原发性肝细胞性肝癌最理想的肿瘤标记物是 AFP(B 对)。CA199(A 错)即糖链抗原 199, 在胰腺癌、肝胆和胃肠道疾病

时可明显升高, 目前临床上主要作为胰腺癌的首选肿瘤标志物。CA125(C 错)即癌抗原 125, 对诊断卵巢癌有较大临床价值, 尤其对观察治疗效果和判断复发较为灵敏。CEA(E 错)即癌胚抗原, 是一种广谱性肿瘤标志物, 可在多种肿瘤中表达, 脏器特异性低, 在临床上主要用于结直肠癌的复发监测。

106. 答案:E

解析:成人急性呼吸窘迫综合征最早常见呼吸深快(E 对)。

107. 答案:A

解析:克罗恩溃疡的特点为纵行溃疡、黏膜呈鹅卵石样病变(A 对)。

108. 答案:C

解析:溃疡性结肠炎的溃疡特点为浅表溃疡、黏膜充血水肿、颗粒状(C 对)。

第四单元

1. 答案:B

解析:滴虫性阴道炎的首选治疗药物为硝基咪唑类药物(如甲硝唑或替硝唑)(DE 错), 哺乳期妇女口服甲硝唑或替硝唑会影响到哺乳, 不宜选用(AC 错)。可局部用药, 甲硝唑栓置入阴道(B 对)。

2. 答案:A

解析:滴虫性阴道炎的主要感染方式为性交传播(A 对)。也可经公共浴池、浴盆、浴巾、游泳池、坐式便器、衣物、污染的器械及敷料等间接传播。

3. 答案:D

解析:胎儿在子宫内急性缺氧初期表现为胎动频繁(D 对)。继而减弱及次数减少, 进而消失。

4. 答案:C

解析:产后出血指胎儿娩出后 24 小时内, 阴道分娩者出血量 $\geq 500\text{ml}$ 时(C 对), 剖宫产者 $\geq 1000\text{ml}$ 。

5. 答案:B

解析:营养素是指食物中经过消化、吸收和代谢能够维持生命活动的物质。组织生长合成消耗能量为儿童特有, 生长所需能量与儿童生长的速度成正比, 因此婴儿每日需热量与营养素较成人相对高, 主要是由于小儿生长发育所需较高(B 对)。

6. 答案:C

解析:造成子宫脱垂的原因有分娩损伤,腹压增加,先天发育异常,营养不良,衰老等,其中分娩损伤是造成子宫脱垂的主要原因(C对)。

7. 答案:D

解析:孕妇尿雌三醇值的监测,用于评估胎儿胎盘单位功能。24小时尿 $>15\text{mg}$ 为正常值, $10\sim 15$ 为警戒值, <10 为危险值。也可测定尿雌激素/肌酐比值, >15 为正常值(D对)。孕妇血清人胎盘生乳素(hPL)测定,足月妊娠hPL值为 $4\sim 11\text{mg/L}$ 。若该值于足月妊娠时 $<4\text{mg/L}$,或突然降低50%,提示胎盘功能低下(A错)。胎动计数 ≥ 6 次/2小时为正常, <6 次/2小时或减少50%者提示胎儿缺氧可能(B错)。OCT试验阳性及NST试验无反应型提示胎盘功能低下(CE错)。

8. 答案:B

解析:百白破疫苗初种的时间是出生后3个月(B对)。

9. 答案:A

解析:成分输血针对不同的血液病人有侧重的输入不同的成分,疗效好(B对),治疗确切。制备的不同的血液成分有着纯度高(C对)、浓度高等优点,更有利于疾病的治疗。血液成分相较于全血更加便于保存(D对)。成分输血也能节约血资源,保护血液资源(E对)。血液成分的提取和加工处理是一个相对复杂的过程,故容易制备不是成分输血的优点(A错,为本题正确答案)。

10. 答案:E

解析:足月新生儿病理性黄疸的特点包括生后24小时内出现黄疸(B对)血清总胆红素 $>221\mu\text{mol/L}$ (A对),黄疸持续时间长,足月儿 >2 周(C对),黄疸退而复现(D对)与血清结合胆红素 $>34\mu\text{mol/L}$ (E错,为本题正确答案)。

11. 答案:C

解析:极低出生体重儿的标准是指婴儿出生后1小时内的体重低于 1500g (C对)。婴儿出生后1小时内体重低于 2500g 称为低出生体重儿(E错)。婴儿出生后1小时内体重低于 1000g 称为超低出生体重儿(D错)。

12. 答案:B

解析:颅后窝骨折常累及岩骨和枕骨

基底部。在乳突和枕下部可见皮下淤血(Battle征),或在咽后壁发现黏膜下淤血(B对)。颅中窝骨折可见脑脊液鼻漏(A错),骨折线居内侧可累及视神经、动眼神经等(C错)。颅前窝骨折可见眼镜征或熊猫眼(D错),常出现嗅神经损伤(E错)。

13. 答案:B

解析:结核性心包炎初期最关键的治疗是抗结核治疗(B对)。

14. 答案:C

解析:妊娠早期,羊水主要来自母体血清经胎膜进入羊膜腔的透析液(D错),妊娠中期,羊水主要来源于胎儿尿液(A错)。妊娠晚期胎肺参与羊水的生成(E错)。母体与羊水的交换主要通过胎盘(B错),胎儿吞咽是羊水吸收的主要方式,可以维持羊水的稳定(C对)。

15. 答案:A

解析:Apgar评分指标包括心率、呼吸、肌张力、喉反射及皮肤颜色(BCDE对,A错)。

16. 答案:D

解析:腹部立位X线平片(D对)可通过扩张充气的结肠影或结肠梗阻判断先天性巨结肠,方法简单快捷,具有诊断价值。少量钡剂灌肠(A错)可以了解痉挛段的长度和排便功能,钡剂24小时后仍有残留是巨结肠的佐证。直肠粘膜活组织检查(B错)可以诊断先天性巨结肠,但方法复杂。肌电图检查(C错)对于先天性巨结肠诊断没有意义。直肠肛门测压(E错)是检查先天性巨结肠有效的方法。

17. 答案:C

解析:子宫颈鳞状细胞癌好发于子宫颈移行带(C对),即柱状上皮区(B错)和鳞状上皮区(E错)的交界处。子宫颈组织学内口区(A错)、子宫颈解剖学内口区(D错)无癌症好发。

18. 答案:B

解析:左向右分流的先天性心血管病包括房间隔缺损、室间隔缺损、动脉导管未闭,以上三者随着病情的发展都可出现明显的肺动脉高压。而在出现明显的肺动脉高压,首先房间隔缺损的主要改变为右心房、右心室增大(B对),其次室间隔缺损的主要改变以右心室增大为主,最后动脉导管未闭

的主要改变为心尖左移上翘，实为右心室增大的表现。总的来说左向右分流型先天性心脏病出现显著肺动脉高压时共有的主要改变就是右心室增大。左心室增大(A 错)多见高血压等疾病。左心房(C 错)增大，多见于心脏瓣膜病，尤以二尖瓣狭窄最多。右心房(D 错)在通常情况下少见增大，左心房，左心室(E 错)多见于二尖瓣关闭不全。

19. 答案:C

解析:5-羟色胺再摄取抑制剂包括临床常用的氟西汀(C 对)、帕罗西汀、舍曲林等。文拉法辛(A 错)为5-HT 和去甲肾上腺素再摄取抑制药，适用于各种抑郁症和广泛性焦虑症。托莫西汀(B 错)为神经系统药物，临床上主要用于注意缺陷障碍的治疗。米氮平(D 错)通过阻断突触前 α_2 肾上腺素受体而增加去甲肾上腺素的释放，间接提高5-HT 的更新率而发挥抗抑郁作用。利培酮(E 错)是第二代非典型抗精神分裂症药物。

20. 答案:A

解析:产后出血的原因包括子宫收缩乏力、胎盘因素、软产道裂伤及凝血功能障碍。其中子宫收缩乏力是产后出血最常见的原因(A 对)。

21. 答案:C

解析:脑疝为颅内某分腔有占位性病变时，脑组织从高压区向低压区移位，导致脑组织、血管及脑神经等重要结构受压和移位，被挤入小脑幕裂孔、枕骨大孔、大脑镰下间隙等生理性或病理性间隙或孔道中，从而出现一系列严重临床症状。左侧小脑幕切迹疝是指左侧颞叶沟回通过小脑幕切迹被推挤至幕下(C 对)。

22. 答案:A

解析:脑干胶质瘤主要为神经胶质瘤，其中以星形细胞瘤和极性成胶质细胞瘤较多，最早出现的症状为脑组织受肿瘤的压迫、浸润、破坏所产生的局部症状，如颅神经麻痹(A 对)，病变逐渐发展后出现颅内压增高等表现，如脑积水(B 错)、头痛(C 错)、癫痫(D 错)、视神经盘水肿(E 错)等。

23. 答案:E

解析:盆腔炎性疾病诊断的特异标准:经阴道超声或磁共振检查显示输卵管

积液(E 对)，伴或不伴盆腔积液、输卵管或卵巢肿块；子宫内膜活检组织学证实子宫内膜炎。盆腔炎性疾病最低标准:宫颈举痛或子宫压痛或附件区压痛(A 错)。盆腔炎性疾病附加标准:实验室证实的宫颈淋病奈瑟菌或衣原体阳性(B 错)、宫颈或阴道异常粘液脓性分泌物(C 错)、阴道分泌物生理盐水涂片见大量白细胞(D 错)、红细胞沉降率升高、血C-反应蛋白升高、体温超过 38.3°C (口表)。

24. 答案:A

解析:小儿先天性肥厚型幽门狭窄中呕吐物不含胆汁(A 错，为本题正确选项)。多数在出生后2~4周发病(B 对)，少数在出生后一周发病。此病可在右季肋区下可触及橄榄样肿块(C 对)。约1%~2%的患儿伴有黄疸(D 对)，非结合胆红素增高。常见左向右的胃蠕动波(E 对)，但为非特有体征。

25. 答案:C

解析:颅内肿瘤的临床表现为颅内压增高、定位症状。在定位症状中，当为额叶(C 对)肿瘤时常为精神障碍。枕叶(D 错)肿瘤时常引起视野障碍。顶叶(B 错)的肿瘤可导致失算、失读、失用及命名性失语，小脑(A 错)肿瘤多引起肌张力减退及躯干和下肢共济运动失调。

26. 答案:C

解析:心境障碍临床类型包括抑郁发作，躁狂发作，混合发作，环性心境障碍和恶劣心境障碍(ABDE 对，C 错，为本题正确答案)。

27. 答案:C

解析:百白破三联混合疫苗在出生3个月接种，乙肝疫苗在出生时接种，卡介苗在出生时接种，脊髓灰质炎减毒活疫苗在出生3个月接种(ABDE 对)。麻疹疫苗是出生8个月接种的疫苗(C 错，为本题正确答案)。

28. 答案:B

解析:吉兰-巴雷综合症的脑脊液蛋白-细胞分离是指蛋白质增高，细胞数正常(B 对)。

29. 答案:E

解析:外阴阴道假丝酵母菌病最主要的传染途径是内源性传染(E 对)。也可通过性交直接传染。少部分患者通过

接触感染的衣物间接传染。

30. 答案:C

解析:苯丙酮尿症(PKU)是一种常染色体隐性遗传疾病,因苯丙氨酸羟化酶基因突变导致酶活性降低,苯丙氨酸及其代谢产物在体内蓄积导致疾病。临床有智力发育落后,皮肤、毛发色素浅淡和鼠尿臭味。神经系统异常表现智力发育落后最为突出,智商常低于正常(C对)。有行为异常,如兴奋不安、忧郁、多动、孤僻等。可有癫痫小发作,少数呈现肌张力增高和腱反射亢进(ABDE错)。

31. 答案:E

解析:早期妊娠时会出现恶心呕吐、食欲减退等早孕反应,所以若是育龄期健康妇女出现了相应的消化道症状,除了考虑常见的内科疾病胃炎病史、肝炎病史、传染病史、不洁饮食史之外,不应忽视早孕的可能,这时应该问诊月经史,若出现停经则应行进一步检查以确诊(E对)。

32. 答案:C

解析:属于盆底内层(即盆膈)肌肉的是肛提肌(C对)。球海绵体肌(A错)、坐骨海绵体肌(D错)、肛门外括约肌(E错)属于盆底外层肌肉。会阴深横肌属于盆底中层肌肉(B错)。

33. 答案:B

解析:下生殖道感染易引起未足月胎膜早破,是导致早产的常见病因(B对)。遗传因素是早期流产的主要病因而非早产的病因(A错)。头盆不称常导致难产而非早产(C错)。早产的常见病因是孕激素水平下降(D错)。子宫畸形是导致早产的因素而非胎儿畸形(E错)。

34. 答案:A

解析:对于躯体疾病所致精神障碍的患者,使用精神药物要慎重,起始剂量应更低,剂量应逐渐增加,当症状稳定时,应考虑逐渐减少剂量(A错,为本题正确答案)。维持水电解质的平衡,充足的营养供应等支持治疗(B对)、要考虑治疗药物对病人的不良反应(C对)、安静安全的环境和防止意外发生等护理措施(D对)、首先必须治疗引起精神障碍的原发性疾病(E对)都是治疗躯体疾病所致精神障碍的处理的一般原则。

35. 答案:D

解析:抑郁症睡眠特点为早段失眠(入睡困难)、中段失眠(睡眠轻浅、多梦)和末段失眠(早醒)(ABD对,CE错)。

36. 答案:B

解析:主要提供儿童营养素的为碳水化合物(包括蛋白质,脂肪,糖类)(B对,AD错)。矿物质和维生素提供微量营养素(CE错)。

37. 答案:C

解析:感觉10米外的桌子距离自己很近,一放杯子时掉在地上,属于空间感知综合障碍(A对)。看到自己母亲的眼睛一时很大,一时又变小了,属于视物变形症(B对)。感觉自己的手一会变细,一会变大,属于自身感知综合障碍(D对)。感觉周围的房子一会变大,一会又变小,属于视物变形症(E对)。感觉身上有蚂蚁在爬属于幻触(C错,为本题正确答案)。

38. 答案:D

解析:脑膜刺激征见于脑膜炎,蛛网膜下腔出血(D对)和颅内压增高。

39. 答案:C

解析:前囟闭合过早见于头小畸形(E错),闭合过迟见于佝偻病、克汀病,脑积水和甲状腺功能减退(A错)等。前囟饱满、紧张、隆起,表示颅内压增高,是婴儿脑炎、脑膜炎或脑积水等重要体征之一;前囟凹陷常见于脱水或极度消瘦患儿(C对)。维生素A中毒可见前囟隆起(B错)。

40. 答案:A

解析:出生时中性粒细胞约占65%,淋巴细胞占30%,出生后4~6天两者相等,形成第一次交叉。随后淋巴细胞上升占60%,中性粒细胞占35%,至4~6岁时两者又相等,形成第二次交叉。7岁以后白细胞数分类与成人相似。

41. 答案:C

解析:视交叉正中部病变,可出现双眼颞侧偏盲(C对)。视神经损害产生同侧视力下降或全盲(A错)。视束病变多引起两眼对侧视野的偏盲(同向性偏盲)(D错)。一侧枕叶视皮质中枢局限性病变,可出现对侧象限盲;一侧枕叶视中枢完全损害,可引起对侧偏盲,但偏盲侧对光反射存在,有黄斑回避现象;枕叶视中枢刺激性损害,可使

对侧视野出现闪光型幻视(B 错)。高颅压所致视乳头水肿多引起周边部视野缺损及生理盲点扩大(E 错)。

42. 答案:B

解析:AQP-4 抗体可见于视神经脊髓炎(B 对)。

43. 答案:B

解析:将输液管看成一条蛇属于错觉(B 对)。看见面前的高楼变化,感觉周围的事物变化属于感知综合障碍(AC 错)。听见汽车喇叭里有骂她的声音属于幻听(D 错)。感觉皮肤上有蚂蚁属于幻触(E 错)。

44. 答案:C

解析:先兆子宫破裂应立即抑制子宫收缩,尽快行剖宫产手术(A 错),术中注意检查子宫是否已有破裂。子宫破裂胎儿未娩出者,即使死胎也不应经阴道先娩出胎儿(B 错),这会使裂口扩大,增加出血,促使感染扩散,应迅速剖腹取出死胎。血尿也可见于泌尿系统疾病(E 错)。古典式剖宫产切口部肌肉组织厚,缝合常不理想,出血多,再孕时子宫破裂率高(D 错)。先兆子宫破裂因胎先露部下降受阻,子宫收缩过强,子宫体部肌肉增厚变短,子宫下段肌肉变薄拉长,在两者间形成环状凹陷,称为病理缩复环(C 对)。

45. 答案:E

解析:川崎病急性期的最佳治疗药物为免疫球蛋白合并应用阿司匹林(E 对)。针对免疫球蛋白治疗无效,或存在免疫球蛋白耐药风险的患儿可考虑早期使用糖皮质激素合并阿司匹林(D 错)。糖皮质激素因可促进血栓形成,增加发生冠状动脉病变及冠状动脉瘤的风险,影响冠脉病变修复,故不宜单独应用(B 错)。

46. 答案:D

解析:高危滋养细胞肿瘤患者首选的化学方案是 EMA-CO 方案(D 对)。PVB, TP, BEP, EP-EMA 方案用于耐药复发病例的治疗(ABCE 错)。

47. 答案:B

解析:正常脐带内含有一条脐静脉,两条脐动脉(B 对)。

48. 答案:C

解析:麻风疫苗在出生 8 个月接种(A 错),卡介苗在刚出生时接种(B 错),

乙肝疫苗在 6 个月时进行第 3 次接种(C 对),百白破疫苗在出生 3, 4, 5 月分别接种 1 次(D 错)。脊髓灰质炎疫苗在出生 2 个月接种(E 错)。

49. 答案:C

解析:乳腺癌按照组织形态可分为非浸润性癌和浸润性癌两类:非浸润性癌包括导管内原位癌和小叶原位癌(D 错),导管内原位癌(C 对)又可分为粉刺癌、非粉刺型导管内癌、乳头 Paget 病伴导管原位癌;浸润性癌包括浸润性导管癌(B 错)、浸润性小叶癌(A 错)和特殊类型癌,特殊类型癌又可分为乳头 Paget 病伴导管浸润癌、典型髓样癌(E 错)等。

50. 答案:A

解析:患者青年男性,头疼 3 个月,加重伴呕吐、间断抽搐、视物模糊 1 个月(脑囊尾蚴病皮质型的典型表现),喜食生肉,眼底检查发现视神经乳头水肿(颅内压升高),最可能的诊断是脑囊尾蚴病(A 对)。结核性脑膜炎(B 错)起病缓慢,多于 1~2 周非特异性感染症状后,出现脑膜刺激征。隐球菌性脑膜炎(C 错)首发症状常为间歇性头痛、恶心及呕吐,伴低热、周身不适、精神不振等非特异性症状。随病情发展,头痛渐加重转为持续性、精神异常、躁动不安,严重者出现不同程度意识障碍,脑膜刺激征为早期最常见阳性体征。脑肿瘤(D 错)常无喜食生肉史。病毒性脑炎(E 错)病程大多在 1~2 周。

51. 答案:C

解析:青年女性患者,3 月前至省城求学(生活学习环境改变为诱因),1 月开始睡眠差,成绩下降,心烦、发愁,整日唉声叹气,觉得自己不如班里其他同学(社会适应能力差,抑郁表现)。结合患者的临床特点考虑最可能的诊断是适应障碍(C 对)。

52. 答案:C

解析:患者在分娩期间发生寒战、呛咳、气急(羊水栓塞可出现的前驱症状),呼吸困难、血压下降(心肺功能衰竭),血涂片见羊水有形物质,考虑为羊水栓塞,羊水栓塞通常起病急骤,来势凶险,一旦确诊或者说一旦怀疑羊水栓塞,应该立刻抢救,它的主要的治

疗原则抗过敏，抗休克，纠正呼吸循环功能衰竭和改善顽固性的低氧血症和低血压的情况，防止 DIC，防止多功能的衰竭。一旦疑诊羊水栓塞应立即静脉推注地塞米松 20mg(C 对)，其他急救措施包括面罩加压供氧，保持呼吸道的通畅，严重时气管插管进行供氧，多巴酚丁胺、磷酸二酯酶-5 抑制剂或氨茶碱静脉推注，解除肺动脉高压，静脉滴注低分子右旋糖苷扩张血容量，碳酸氢钠纠正酸中毒，肝素防治 DIC，静脉滴注多巴胺扩张血容量，维持血压，以及防治肾功能衰竭。

53. 答案:C

解析:研究者拟开展的这项研究是为了观察饮食习惯(可疑病因)与结肠癌(疾病)的关系，为了检验病因假设，用的是分析性研究。分析性研究中时间顺序合理的是队列研究(C 对)，它是将人群按是否暴露于某可疑因素分组，追踪各组的结局并比较其差异，属于前瞻性研究。生态学研究 and 横断面研究都属于描述性研究，用于提供病因线索(AB 错)。病例对照研究(D 错)是由“果”及“因”，检验病因的能力没有队列研究强。临床试验(E 错)属于实验性研究，该类研究分析的是实验措施与观察结局之间是否有因果关联。

54. 答案:A

解析:患者高热，心率，呼吸加快，热病容，双眼结合膜充血，口唇干裂，可见草莓舌。皮肤呈弥漫性红斑，颈部浅表淋巴结肿大，心音有力，手足硬性水肿，符合川崎病的诊断标准，可诊断为川崎病(A 对)。手足口病(B 错)手、足、口、臀等部位可见散发性的皮疹和疱疹，偶见于躯干，口腔内疱疹多位于舌、颊粘膜和硬腭等处，常发生溃疡。败血症(C 错)本身并无特殊的临床表现，在败血症时见到的表现也可见于其他急性感染，如反复出现的畏寒甚至寒战，高热可呈弛张型或间歇型，以瘀点为主的皮疹，累及大关节的关节痛，轻度的肝脾大，根据不同致病菌所引起的败血症，又有其不同的临床特点。风湿热(D 错)发病前常有链球菌感染史，有 5 个主要表现:游走性多发性关节炎、心脏炎、皮下结节、环形红斑、舞蹈病，这些表

现可以单独或合并出现。猩红热(E 错)临床表现有发热，咽痛，头痛，呕吐，杨梅舌，环口苍白圈，颈部淋巴结肿大，皮肤弥漫充血，上有密集针尖大小丘疹，全身皮肤均可受累，疹退后伴脱皮，出疹时高热。

55. 答案:B

解析:避孕套正确使用避孕率高达 93%~95%，还具有防止性传播性疾病的作用，无不良反应，推荐为最佳避孕方法(B 对)。该患者月经量增多 3 年，不适合使用宫内节育器，容易造成节育器下移或脱落(A 错)。体外排精避孕失败率较高(C 错)。紧急避孕药仅对一次无保护性生活有效，激素剂量大，副作用大(D 错)。短效口服避孕药亦有类早孕反应、不规则阴道流血、闭经等不良反应(E 错)。

56. 答案:B

解析:该患者为青春期女性，月经初潮后 1 年，月经周期 1~4 个月(周期不规则)，经量多伴血块，此次行经已 8 日(经期延长)，量仍多(为急性大量出血)，考虑青春期无排卵性功能失调性子宫出血。这是由于在青春期，下丘脑-垂体-卵巢轴激素间的反馈调节尚未成熟，导致雌激素水平低，子宫内膜修复能力差而引起出血。主要止血措施是应用大剂量雌激素(B 对 A 错)，其可迅速促使子宫内膜生长，短期内修复创面而止血。孕激素(C 错)止血机制是使雌激素作用下的持续增生的子宫内膜转化为分泌期，达到止血效果，停药后子宫内膜脱落较完全，起到药物性刮宫作用，适用于体内已有一定雌激素水平的患者。抗纤溶及促凝药物(D 错)适用于凝血功能异常的患者。刮宫术(E 错)可迅速止血，适用于绝经过渡期及病程长的生育年龄患者，但对无性生活史青少年，不轻易做刮宫术。

57. 答案:E

解析:急疹的典型特征为热退疹出(E 对)。麻疹(A 错)多在发热 3~4 天后出现皮疹，皮疹先出现于耳后、发际，渐及额、面、颈部，自上而下蔓延至躯干、四肢，最后达手掌与足底，出疹期为发热高峰期，疹退后皮肤留有棕褐色色素沉着伴糠麸状脱屑。水痘

(C 错)在发病 24 小时内出现皮疹, 皮疹先发于头皮、躯干受压部分, 呈向心性分布, 最初的皮疹为红色斑疹和丘疹, 继之变为透明饱满的水疱, 24 小时后水疱混浊并中央凹陷, 水疱易破溃, 2~3 天左右迅速结痂。风疹(B 错)全身症状轻, 在症状出现后 1~2 天后出疹, 出疹顺序为面颈部→躯干→四肢, 斑丘疹, 疹间有正常皮肤, 退疹后无色素沉着及脱屑。猩红热(D 错)临床表现有发热, 咽痛, 头痛, 呕吐, 杨梅舌, 环口苍白圈, 颈部淋巴结肿大, 皮肤弥漫充血, 上有密集针尖大小丘疹, 全身皮肤均可受累, 疹退后伴脱皮, 出疹时高热。

58. 答案:C

解析:患者外阴瘙痒伴灼热感 3 天, 检查见外阴红肿、小阴唇内侧及阴道黏膜表面有白色凝乳状物覆盖, 考虑为外阴阴道假丝酵母菌病(C 对)。外阴阴道假丝酵母菌病外阴阴道瘙痒、阴道分泌物增多, 阴道分泌物的特征为白色稠厚, 呈凝乳状或豆腐渣样。前庭大腺炎(A 错)起病急, 多为一侧, 检查可见局部皮肤红肿、压痛明显, 患侧前庭大腺开口处有时可见白色小点。若感染进一步加重, 脓肿形成并快速增大, 可触及波动感。滴虫阴道炎(D 错)主要症状是外阴瘙痒, 阴道分泌物异常, 分泌物典型特点为稀薄脓性、泡沫状、有异味。细菌性阴道炎(E 错)分泌物呈灰白色、均匀一致、稀薄状, 常黏附于阴道壁, 但容易从阴道壁拭去, 带有鱼腥臭味。淋菌性阴道炎(B 错)一般有不洁性病史, 其症状表现为下腹部疼痛, 阴道分泌物增多, 显脓性白带, 阴道口红肿疼痛。

59. 答案:B

解析:患者诊断为妊娠合并乙型病毒性肝炎(重型), 应在积极保肝、对症支持、防治并发症、防治感染等治疗稳定病情, 待凝血功能、白蛋白、胆红素、转氨酶等重要指标改善 24 小时左右迅速终止妊娠(D 错), 因母儿耐力差, 过度消耗可加重肝脏负担, 分娩方式应选择剖宫产术(B 对 E 错)。子宫动脉栓塞术(A 错)为宫缩乏力引起产后出血的处理措施之一。地西洋促进宫颈成熟(C 错)多用于高龄产妇产

颈成熟不良者。

60. 答案:E

解析:新生儿坏死性小肠结肠炎(NEC)是新生儿期常见的严重胃肠道疾病, 多见于早产儿, 临床以腹胀、呕吐、便血为主要表现, 腹部 X 线检查以肠壁囊样积气为特征。早产儿出生后人工喂养, 超肠蠕动和肠壁血流减少(均为 NEC 的发病病因), 生后 2 周出现精神萎靡, 纳差, 腹胀, 呕吐 2 次, 大便略稀, 粪隐血试验阳性(出现腹胀、呕吐、便血等 NEC 主要临床表现), 综上所述, 考虑诊断为新生儿坏死性小肠结肠炎(NEC)。肠壁积气和门静脉充气征(E 对)为 NEC 的特征性表现。

61. 答案:B

解析:患儿在喂奶半小时内发生喷射性呕吐, 无胆汁(先天性肥厚性幽门狭窄的典型体征), 进行性加重, 呕吐物为奶凝块, 患儿吐后食欲好, 体重下降, 考虑为先天性肥厚性幽门狭窄(B 对)。肠套叠(D 错)新生儿少见, 为突然发作剧烈的有规律的阵发性绞痛, 呕吐物含胆汁。胃食管反流病(C 错)可有反复呕吐、咽下困难, 及伴有反复发作的慢性呼吸道感染。十二指肠溃疡(E 错)表现为食欲差、呕吐、进食后啼哭、腹胀、生长发育迟缓, 也可表现为呕血、黑便。先天性肠旋转不良(A 错)可导致新生儿肠梗阻, 呕吐物含胆汁。

62. 答案:E

解析:男婴, 胎龄 38 周出生, 宫内窘迫, Apgar1 分钟评分 3 分(重度窒息), 经抢救 10 分钟评分 9 分, 生后 6 小时出现抽搐, 结合患儿的病史及临床表现初步诊断为新生儿缺氧缺血性脑病, 为控制惊厥, 防止窒息, 应首选药物是苯巴比妥(E 对)。吠塞米(A 错)为治疗脑水肿的药物, 为辅助治疗。肝功能不良者可将苯巴比妥改为苯妥英钠(A 错), 故苯妥英钠不是最佳选项。地塞米松(C 错)非本病的常规治疗用药。颅内压增高严重时可用甘露醇(D 错)。

63. 答案:E

解析:患儿 Hb 减少, MCV98f1 (>94f1), MCH 33pg (>32pg), MCHC 34% (正常 32%~34%), 为大细胞性贫血, 考虑为巨幼细胞性贫血, 有表情淡漠, 舌有

震颤的神经精神症状，为维生素 B12 缺乏所有症状，所以患儿贫血原因为维生素 B12 缺乏 (E 对)。叶酸缺乏不发生神经系统症状 (D 错)。缺铁为缺铁性贫血的贫血原因之一 (B 错)。

64. 答案:A

解析:患儿高热,反复抽搐,嗜睡,前囟膨隆,张力较高(颅内压增高),颈抵抗(+) (脑膜刺激征),凡急性发热起病,并伴有反复惊厥、意识障碍和颅内压增高表现的婴幼儿,应考虑为化脓性脑膜炎,首选确诊检查为脑脊液检查(A对)。血气分析,电解质检查,头颅超声,PPD 试验对确诊化脓性脑膜炎意义较小。

65. 答案:A

解析:老年女性患者,输血(急性溶血性反应的病因)时出现发热、腰痛(急性溶血反应的临床表现),导尿浓茶色(提示出现血红蛋白尿),结合患者症状及临床表现,考虑诊断发生急性溶血反应(A对)。

66. 答案:C

解析:阿尔茨海默病(AD)是发生于老年和老年前期、以进行性认知功能障碍和行为损害为特征的中枢神经系统退行性病变,临床上表现为记忆障碍、失语、失用、失认、视空间能力损害、抽象思维和计算力损害、人格和行为改变等。在疾病中期,严重时出现定向力障碍,一般先出现时间定向障碍再出现空间定向障碍,如在家中找不到自己的房间。患者情绪不稳,易激惹,一些患者还会出现较显著的幻觉和妄想,幻觉中以幻视较多见,妄想以被窃妄想和嫉妒妄想多见。老年男性患者,近2年记忆力下降(记忆障碍),在家附近2次迷路(出现空间定向障碍),经常说有人偷自己东西(被窃妄想),容易发脾气(情绪不稳、易激惹),既往体健,无心血管疾病(排除其他疾病)。因此,综上所述,结合患者临床症状及表现,考虑诊断为阿尔茨海默症(C对)。

67. 答案:E

解析:男孩,5岁,反复咳嗽,喘息2年,1周发作2次(支气管哮喘典型临床表现),查体:神志清楚,呼吸急促,双肺闻及呼气相哮鸣音(支气管哮喘

典型体征),心肺查体未见异常,给予“沙丁胺醇溶液”雾化后,喘息缓解,综上所述,考虑诊断为支气管哮喘。哮喘长期治疗的首选药物为吸入型糖皮质激素(ICS)(E对)。

68. 答案:C

解析:中年女性孕妇,36岁(年龄在35岁以上),3年前确诊为风湿性心脏病二尖瓣狭窄,2年前因心力衰竭住院治疗(既往有心脏病史,且病变复杂,病程较长),现妊娠8周,心悸、气短2天,属于不宜妊娠范围(ABD错)。因目前妊娠8周(大于药流49日小于10周,负压吸宫术适用于妊娠10周以内的孕妇),应进行负压吸引引流术(C对E错)。

69. 答案:D

解析:患儿全身苍白,0分。四肢可屈曲,1分。弹足底皱眉反应,1分。心率80次/分,1分。无呼吸,0分,合计为3分(D对)。

70. 答案:D

解析:青年女性患者,21岁,心情压抑,烦闷,兴趣下降3年(成年早期出现持久性心境低落状态为主的轻度抑郁,病程大于2年),3年前高考发挥不好,觉得学校不理想,渐渐做事情没有动力,很少参加社团活动,诉近3年来虽然能完成学业,但一直感觉疲惫,生活没有色彩(符合轻度抑郁标准,生活不受严重影响,低落心境与生活事件有关),综上所述,结合患者临床症状及表现,考虑诊断为恶劣心境(D对)。恶劣心境是一种以持久的心境低落状态为主的轻度抑郁,从不出现躁狂或轻躁狂发作,这种慢性的心境低落,无论从严重程度还是一次发作的持续时间,均不符合轻度或中度复发性抑郁障碍的标准(A错)。患者具有求治意愿,生活不受严重影响,通常起病于成年早期,持续数年,与生活事件及个人性格存在密切关系。社交恐惧症(B错)是以在社交场合持续紧张或恐惧,回避社交行为为主要临床表现的一类焦虑恐惧障碍。精神分裂症(C错)症状表现是该类疾病的原发性特征,而不是其他精神和行为障碍(如心境障碍、谵妄、物质使用及躯体疾病)的表现形式。双相障碍(E错)也称双相情感障碍,是指临床上既有躁狂或轻躁

狂发作，又有抑郁发作的一类心境障碍。

71. 答案:B

解析:初产妇, 25 岁, 妊娠 39 周。规律宫缩 10 小时, 宫口开全 2 小时, 宫缩良好, 阴道检查 LOT 位(枕左横位), S+3, 骨盆正常, 胎心 150, 应诊断为胎位异常(持续性枕横位)。枕横位下降过程中内旋受阻, 成为持续性枕横位时, 需用手或胎头吸引术将胎头转成枕前位, 然后胎头继续下降, 进行阴道分娩(B 对), 若自然分娩困难, 可行阴道产钳助产术(DE 错)。静脉滴注缩宫素(A 错)适用于协调性宫缩乏力、宫口扩张 $\geq 3\text{cm}$ 、胎心良好、胎位正常、头盆相称者。若 $S \leq +2$, 才考虑行剖宫产术(C 错)。

72. 答案:D

解析:男性患者, 突发性头颈项剧烈疼痛, 伴有大汗、恶心、呕吐 1 小时, 脑膜刺激征阳性, 为蛛网膜下腔出血主要症状, 故最可能的诊断为蛛网膜下腔出血(D 对)。脑栓塞(A 错)主要表现为对侧偏瘫, 偏身感觉障碍。

73. 答案:B

解析:因骨盆外测量骶耻外径 19.5cm, 髂棘间径 25cm, 髂嵴间径 28cm, 表明骨盆入口不狭窄; 坐骨棘间径 9cm, 坐骨结节间径 7cm, 表明中骨盆及骨盆出口平面狭窄, 应为漏斗型骨盆(B 对), 而不是均小骨盆、扁平型骨盆、类人猿型骨盆和佝偻病性扁平骨盆。

74. 答案:A

解析:患者四肢无力、手套袜套样感觉, 考虑吉兰巴雷综合征(A 对)。重症肌无力(B 错)于下午或傍晚因劳累后加重, 晨起或休息后减轻, 此种波动现象称之为“晨轻暮重”, 全身骨骼肌均可受累, 多以脑神经支配的肌肉最先受累。肌无力常从一组肌群开始, 范围逐步扩大, 首发症状常为一侧或双侧眼外肌无力, 四肢肌肉受累以近端无力为重, 表现为抬臂、梳头、上楼梯困难, 腱反射通常不受影响, 感觉正常。周期性麻痹(E 错)是一组以反复发作的骨骼肌弛缓性瘫痪为特征的疾病, 与钾代谢异常有关。急性脊髓炎(D 错)是指各种感染后引起自身免疫反应所致的急性横贯性脊髓炎性病变, 又称

急性横贯性脊髓炎, 是临床上最常见的一种脊髓炎, 以病损平面以下肢体瘫痪、传导束性感觉障碍和尿便障碍为特征。多发性肌炎(C 错)是一种以肌无力、肌痛为主要表现的自身免疫性疾病, 主要临床表现以对称性四肢近端、颈肌、咽部肌肉无力, 肌肉压痛, 血清酶增高为特征的弥漫性肌肉炎症性疾病。

75. 答案:E

解析:28 岁初产妇, 双胎妊娠, 妊娠 39 周, 规律宫缩 10 小时后宫口开全, 第一胎儿头位娩出, 新生儿体重 2600g。第二胎儿为单臀先露已衔接胎心正常。通常在第一个胎儿娩出后 20 分钟左右, 第二个胎儿娩出。孕妇、胎儿基本情况良好, 且已衔接, 无剖宫产指征, 等待臀助娩即可(E 对)。外转胎位术适用于单胎妊娠, 妊娠 32~34 周时(C 错)。目前胎儿、孕妇情况良好, 无需产钳牵引术或行内转胎位术(AB 错)。剖宫产术适用于骨盆狭窄、软产道异常、胎儿体重 $> 3500\text{g}$ 、胎儿窘迫等情况(D 错)。

76. 答案:B

解析:初产妇, 孕 36 周, NST 无反应型(提示胎儿有窒息), 考虑为宫内窘迫(B 对)。

77. 答案:C

解析:产前诊断可根据医疗条件、选择性应用以下方法。1. 胎儿外形观察:利用 B 型超声、X 线检查、胎儿镜、磁共振等观察胎儿体表畸形(D 对)。2. 染色体核型分析:利用羊水、绒毛细胞和胎儿血细胞培养, 检测染色体疾病(A 对)。3. 基因检测:利用 DNA 分子杂交、限制性内切酶、聚合酶链反应(PCR)技术检测 DNA(B 对)。4. 基因产物检测:利用羊水、羊水细胞、绒毛细胞或血液, 进行蛋白质、酶和代谢产物检测, 检测胎儿神经管缺陷、先天性代谢疾病等(E 对)。

78. 答案:A

解析:患儿 4 天前出现发热, 伴流涕咳嗽(前驱期), 1 天前出现热峰达 39.5°C , 耳后及面部逐渐出现皮疹(麻疹发热高峰期出疹), 耳后及颜面部散在红色充血性斑丘疹(出疹顺序自头面部 \rightarrow 颈 \rightarrow 躯干 \rightarrow 四肢), 睑结膜充血, 颊黏

膜可见较多灰白色小点，外有红晕。咽部充血，热峰期咳嗽加剧，呼吸急促，双肺呼吸音粗可闻及细湿罗音，考虑为麻疹合并肺炎，至少隔离至出疹后 10 天(A 对)。

79. 答案:B

解析:患儿生后两月口周发绀，哭闹后发绀加重，胸骨左缘第 2~4 肋间 3/6 级收缩期杂音，X 线示心尖上翘，肺动脉凹陷，综合患儿临床表现，辅助检查诊断为法洛氏三联症，患儿四肢颤动，意识丧失可为阵发性缺氧发作(B 对)。室间隔缺损胸骨左缘第 3、4 肋间可闻及 III~IV 级粗糙的全收缩期杂音(CDE 错)。伴肺脓肿可有咳嗽、咳黏液痰或黏液脓痰及肺部查体体征(AC 错)。

80. 答案:C

解析:患儿咳嗽，发烧，腹泻 2 天，1 天前抽搐 1 次。查体:颈项强直阳性，克尼格征阳性(脑膜刺激征)，白细胞增多，以中性粒为主，考虑为化脓性脑膜炎(C 对)。在脑膜炎时，血管通透性增加，血浆成分渗出，进入硬膜下腔或脑膜及脑的表层小静脉，尤其穿过硬膜下腔的桥静脉发生炎性栓塞，导致渗出和出血，局部渗透压增高，水分进入硬膜下腔形成硬膜下积液，凡经化脓性脑膜炎有效治疗 48~72 小时后脑脊液有好转，但体温不退或体温下降后再升高；或一般症状好转后又出现意识障碍、惊厥、前囟隆起或颅压增高等症状，首先应怀疑本症的可能性，硬膜下穿刺可确诊(B 错)。脑出血(A 错)多见于中老年患者，体力活动或情绪激动时突然发病，有头痛，呕吐，意识障碍等症状，发病快，在几分钟或几小时内出现肢体功能障碍及颅内压增高的症状。病毒性脑膜炎(D 错)临床表现与化脓性脑膜炎相似，感染中毒及神经系统症状均较化脓性脑膜炎轻，病程自限，大多不超过 2 周。脑脊液较清亮，白细胞数为 0 至数百 $\times 10^9/L$ ，分类以淋巴细胞为主，糖含量正常。脑脊液中特异性抗体和病毒分离有助诊断。结核性脑膜炎(E 错)不规则发热 1~2 周后才出现脑膜刺激征、惊厥或意识障碍等表现，脑脊液外观呈毛玻璃样，白细胞数多 < 500

$\times 10^9/L$ ，分类以淋巴细胞为主。

81. 答案:B

解析:患者半月前流产并清宫，发热腹痛 1 周，下腹压痛和反跳痛，宫口有脓性分泌物，白细胞增多，主要为中性粒细胞，子宫压痛，双附件压痛，考虑为盆腔炎性疾病(B 对)。盆腔炎性疾病常见症状为子宫颈举痛或子宫压痛或附件区压痛，阴道可见脓性臭味分泌物；子宫颈充血、水肿，将子宫颈表面分泌物拭净，若见脓性分泌物从子宫颈口流出，说明子宫颈管黏膜或宫腔有急性炎症。不全流产(C 错)为难免流产继续发展，部分妊娠物排出宫腔，还有部分残留于宫腔内或嵌顿于宫颈口处，或胎儿排出后胎盘滞留宫腔或嵌顿于宫颈口，影响子宫收缩，导致出血，甚至发生休克。妇科检查见宫颈口已扩张，宫颈口有妊娠物堵塞及持续性血液流出，子宫小于停经周数。溃疡性结肠炎(D 错)症状以腹泻为主，不会出现子宫的病理性改变。典型的急性阑尾炎(E 错)初期有中上腹或脐周疼痛，数小时后腹痛转移并固定于右下腹，一般没有子宫的病理性变化。异位妊娠(A 错)主要为输卵管妊娠，典型症状为停经、腹痛与阴道流血。

82. 答案:D

解析:滴虫性阴道炎(B 错)分泌物典型特点为稀薄脓性、泡沫状、有异味。细菌性阴道炎(A 错)分泌物呈灰白色、均匀一致、稀薄状，带有鱼腥臭味。老年性阴道炎(C 错)阴道分泌物增多、稀薄、呈淡黄色，严重者呈脓血性白带，有臭味。白色念珠菌阴道炎典型的白带呈凝乳状或为豆渣状。外阴阴道假丝酵母菌病阴道分泌物的特征为白色稠厚，呈凝乳状或豆腐渣样(DE 选项均可见豆腐渣样分泌物)。

83. 答案:C

解析:患儿 2 个月前睡眠不安，头部多汗，方颅，诊断为佝偻病，用维生素 D 及钙剂正规治疗 2 个月，症状好转，进入佝偻病的恢复期，长骨干骺端临时钙化带重现、增宽、密度增加(C 对)。

84. 答案:A

解析:医生拿着记录本和安排好顺序的问题，与患者面对面，一问一答的

心理评估方法属于晤谈法中的结构式会谈(A对)。调查的含义是当有些资料不可能从当事人那里获得时,就要从相关的人或材料那里得到。因此,调查(B错)是一种间接的、迂回的方式。观察法是通过被评估者行为表现直接或间接的观察或观测而进行心理评估的方式(C错)。心理测量(E错)主要采用量表的形式进行。量表是由一些经过精心选择的,一般能较正确而可靠地反映人的某些心理特点的问题或操作任务所组成。测量时让受试者对测量内容做出回答或反应,然后根据一定标准计算得分,从而得出结论。

85. 答案:E

解析:婴儿顽固性便秘,腹胀,呕吐,营养不良,首先考虑先天性巨结肠(E对)。先天性肥厚性幽门狭窄(B错)典型症状和体征为无胆汁的喷射性呕吐、胃蠕动波和右上腹肿块。胃食管反流病(C错)多有呕吐及反流性食管炎的症状。幽门痉挛(A错)可有反酸、恶心、呕吐、暖气、不爱吃饭等表现,呕吐物为酸性。胃扭转可有突然发生的严重而短暂的胸部或上腹部疼痛,持续干呕。

86. 答案:B

解析:根据患儿的杂音特点:胸骨左缘2~3肋间闻及3/6级收缩期喷射性杂音、P2增强,固定分裂,应诊断为房间隔缺损(B对)。动脉导管未闭的杂音特征为胸骨左缘第二肋间连续机械样杂音(C错)。肺动脉瓣狭窄(E错)胸骨左缘上部有洪亮的IV/VI级以上喷射性收缩期杂音,第二心音分裂(而不是肺动脉第二心音固定分裂)。室间隔缺损的杂音特征是胸骨左缘第3、4肋间响亮的全收缩期杂音,肺动脉第二心音正常或稍增强(DE错)。

87. 答案:A

解析:女性患者突然气促,心慌,濒死感(自主神经功能紊乱症状),15分钟后自行缓解(终止迅速),头颅CT、心电图未见异常,故诊断为惊恐发作(C对)。心绞痛和惊恐发作均可表现为胸闷、心悸伴有濒死感,但本例无明显诱因(过重的体力劳动),头颅CT、心电图检查正常,故患心绞痛的可能性较小(B错),为进一步明确诊断,需借

助心电图和心肌酶学检查进行排查。

88. 答案:B

解析:女性患者突然气促,心慌,濒死感(自主神经功能紊乱症状),15分钟后自行缓解(终止迅速),头颅CT、心电图未见异常,故诊断为惊恐发作。SSRIs和SNRIs治疗惊恐障碍有效,特别是当惊恐障碍与抑郁障碍、社交焦虑障碍、广泛性焦虑障碍、创伤后应激障碍或物质滥用共病时。目前用于临床的SSRIs为帕罗西汀(B对)。BZDs药物(如劳拉西泮)治疗惊恐发作起效快,但长期使用易导致依赖,故不宜选用。

89. 答案:D

解析:青少年男性患者,因右下肢肌肉血肿,关节腔出血两天入院(血友病常常表现为软组织或深部肌肉内血肿,负重关节如膝、踝关节等反复出血甚为突出),以往有多次发作史,家族中其舅舅有类似病史(血友病A是临床上最常见的遗传性出血性疾病)。综上所述,该患者可能诊断是血友病A(D对E错)。紫癜(AB错)为血管变态反应性疾病,常有皮肤紫癜,局限于四肢,以下肢及臀部多见,躯干极少累及,多数发病前1~3周有全身不适、低热、乏力及上呼吸道感染等前驱症状,一般无家族遗传史。血小板无力症(C错)患者自幼有出血症状,表现为中度或重度皮肤、黏膜出血,鼻出血、牙龈出血多见,一般无家族遗传史。

90. 答案:E

解析:青少年男性患者,因右下肢肌肉血肿,关节腔出血两天入院(血友病常常表现为软组织或深部肌肉内血肿,负重关节如膝、踝关节等反复出血甚为突出),以往有多次发作史,家族中其舅舅有类似病史(血友病A是临床上最常见的遗传性出血性疾病)。综上所述,该患者可能诊断是血友病A。血友病A又称FVIII缺乏症(E对ABCD错),是临床上最常见的遗传性出血性疾病。

91. 答案:C

解析:青少年男性患者,因右下肢肌肉血肿,关节腔出血两天入院(血友病常常表现为软组织或深部肌肉内血肿,负重关节如膝、踝关节等反复出血甚为突出),以往有多次发作史,家族中

其舅舅有类似病史(血友病 A 是临床上最常见的遗传性出血性疾病)。综上所述,该患者可能诊断是血友病 A。目前血友病的治疗仍以替代疗法为主,即补充缺失的凝血因子,它是防治血友病出血最重要的措施。主要制剂有基因重组的纯化 FVII、FVIII 浓缩制剂、新鲜冷冻血浆(C 对)、冷沉淀物(FVIII 浓度较血浆高 5~10 倍)以及凝血酶原复合物等。新鲜冷冻血浆中含有全部凝血因子和血浆蛋白,主要用于纠正止血功能异常。

92. 答案:E

解析:青少年女性患者,阴道流血 16 天,量多,无性生活史,13 岁初潮,月经不规则,查体:下腹部压痛明显,血红蛋白 54g/L,考虑诊断为无排卵性异常子宫出血。诊断性刮宫(E 错,为本题正确答案)可迅速止血,适用于绝经过渡期及病程长的生育年龄患者,但对无性生活史青少年,不宜做刮宫术。

93. 答案:A

解析:青少年女性患者,阴道流血 16 天,量多,无性生活史,13 岁初潮,月经不规则,查体:下腹部压痛明显,血红蛋白 54g/L (<80g/L),考虑诊断为无排卵性异常子宫出血。应用大剂量雌激素(A 对)可迅速提高血雌激素水平,促使子宫内膜生长,短期内修复创面而止血,适用于血红蛋白低于 80g/L 的青春患者。刮宫可迅速止血,并具有诊断价值,适用于大量出血且药物治疗无效需立即止血或需要子宫内膜组织学检查的患者(E 错)。口服避孕药适用于长期而严重的无排卵出血(D 错)。

94. 答案:D

解析:患儿早产,生后评分 5 分(轻度窒息),复苏后呼吸困难,青紫,逐渐加重,氧饱和度下降(正常约为 98%),CO₂ 分压增高(正常 35~45mmHg),X 线片双肺通透度减低,肺肝界肺心界消失(新生儿呼吸窘迫综合征的 X 线表现)。考虑为新生儿呼吸窘迫综合征(D 对)。胎粪吸入综合征(A 错)常见于足月儿或过期产儿,多有宫内窘迫史和(或)出生窒息史,症状轻重与吸入羊水的性质(混悬液或块状胎粪等)和量

的多少密切相关,X 线检查两肺透过度增强伴有节段性或小叶性肺不张,也可仅有弥漫性浸润影或并发纵隔气肿、气胸等。肺出血会出现咯血等临床表现(B 错)。先天性膈疝(E 错)生后不久表现为阵发性呼吸急促及青紫。腹部凹陷,患侧胸部呼吸音减弱甚至消失,可闻及肠鸣音,胸片可见患侧胸部有充气肠曲或胃泡影及肺不张,纵隔向对侧移位。新生儿肺炎(C 错)包括吸入性和感染性肺炎,吸入性肺炎 X 线可见两肺斑片状阴影,感染性肺炎多有感染史。

95. 答案:B

解析:患儿早产,生后评分 5 分(轻度窒息),复苏后呼吸困难,青紫,逐渐加重,氧饱和度下降(正常约为 98%),CO₂ 分压增高(正常 35~45mmHg),X 线片双肺通透度减低,肺肝界肺心界消失(新生儿呼吸窘迫综合征的 X 线表现)。考虑为新生儿呼吸窘迫综合征。对已确诊的新生儿呼吸窘迫综合征,机械通气联合肺表面活性物质,是新生儿呼吸窘迫综合征治疗的最佳选择(B 对)。手术修补膈疝(C 错)为先天性膈疝的治疗方案。机械通气,应用止血药为肺出血治疗方案(A 错)。药物治疗无效,可选手术方式(E 错),保温,保证营养供应为一般治疗,作为辅助治疗应用(D 错)。

96. 答案:A

解析:患儿早产,生后评分 5 分(轻度窒息),复苏后呼吸困难,青紫,逐渐加重,氧饱和度下降(正常约为 98%),CO₂ 分压增高(正常 35~45mmHg),X 线片双肺通透度减低,肺肝界肺心界消失(新生儿呼吸窘迫综合征的 X 线表现)。考虑为新生儿呼吸窘迫综合征。新生儿呼吸窘迫综合征的并发症多发生在氧气治疗过程中或在治疗后的恢复期。包括:①气漏:由于肺泡壁的损伤,气体溢至肺间质,或由于机械通气时吸气峰压或平均气道压过高引起间质性肺气肿,气体沿血管至纵隔,引起纵隔气肿。间质气肿也可引起气胸(A 对),气漏时呼吸更为困难。②氧中毒:当吸入氧浓度过高,或供氧时间过长,可能发生氧中毒,以支气管肺发育不良和眼晶体后纤维增生最常见,

前者为肺本身的病变，使呼吸机不易撤除，后者表现为晶体后视网膜增生或视网膜剥离，使视力减退，甚至失明。③恢复期的动脉导管开放：新生儿呼吸窘迫综合征经机械呼吸和供氧治疗后，在恢复期约 30% 病例出现动脉导管未闭，早产儿动脉导管的组织未成熟，不能自发关闭，但在肺透明膜病的早期肺血管阻力增加，不但不发生左向右分流，有时却相反发生右向左分流，至恢复期肺血管阻力下降，即可出现左向右分流，此时因肺动脉血流增加而致肺水肿，出现间歇性呼吸暂停和充血性心力衰竭，甚至危及生命。

97. 答案:C

解析：患者腹部受撞击后，持续性腹痛，有少量出血，脉搏加快，血压下降，胎心率减小，考虑为胎盘早剥。首选检查为超声检查(C 对)，可以了解胎盘在子宫壁的部位，明确胎盘早剥的类型，同时观察胎儿的大小及存活情况。胎心电子监护可以协助判断宫内胎儿状况(B 错)。

98. 答案:C

解析：患者腹部受撞击后，持续性腹痛，有少量出血，脉搏加快，血压下降，胎心率减小，考虑为胎盘早剥(C 对)。早产临产需符合下列条件：①出现规则宫缩(20 分钟 \geq 4 次，或 60 分钟 \geq 8 次)，伴有宫颈的进行性改变；②宫颈扩张 1cm 以上；③宫颈容受 \geq 80%。患者未出现宫缩及宫颈口的扩张(A 错)。巨大胎儿(B 错)孕妇妊娠期体重增加迅速，常在妊娠晚期出现呼吸困难，腹部沉重及两肋部胀痛等症状，一般不会有出血现象。子宫破裂(D 错)包括先兆子宫破裂，不完全性子宫破裂和完全性子宫破裂。先兆子宫破裂子宫收缩加强，有病理缩复环形成，不完全性子宫破裂，仅在不全破裂处有压痛，体征也不明显，完全性子宫破裂常发生于瞬间，产妇突感下腹一阵撕裂样剧痛，子宫收缩骤然停止。前置胎盘(E 错)典型症状为妊娠晚期或临产后发生无诱因、无痛性反复阴道流血。

99. 答案:D

解析：患者腹部受撞击后，持续性腹痛，

有少量出血，脉搏加快，血压下降，胎心率减小，考虑为胎盘早剥。如早剥面积大，出血多，胎儿可因缺血缺氧而死亡(E 对)。胎盘早剥是妊娠期发生凝血功能障碍最常见的原因，一旦发生 DIC，病死率较高，应积极预防(B 对)。发生子宫胎盘卒中时，子宫肌层收缩受影响可致严重产后出血，凝血功能障碍也导致产后出血，若并发 DIC，产后出血难以纠正，引起休克(C 对)。胎盘早剥大量出血使肾脏灌注严重受损，导致肾皮质或肾小管缺血坏死。且胎盘早剥多伴发妊娠期高血压疾病、慢性高血压、慢性肾脏疾病等，肾内小动脉痉挛，肾小球前小动脉极度狭窄，肾脏缺血，进而出现急性肾衰竭(A 对)。胎盘残留可见于不全流产，胎盘早剥并发症不易见胎盘残留(D 错，为本题正确答案)。

100. 答案:A

解析：患者高空坠落，进行性昏迷，瞳孔不等大，左侧瞳孔散大，对光反射消失，左颞枕部头皮血肿，考虑为急性硬脑膜下血肿并脑挫裂伤，首选检查为 CT，表现为脑表面与颅骨之间有新月形高密度、混杂密度或等密度影(A 对)。

101. 答案:D

解析：患者高空坠落，进行性昏迷，瞳孔不等大，左侧瞳孔散大，对光反射消失，左颞枕部头皮血肿，考虑为急性硬脑膜下血肿并脑挫裂伤。对于急性硬脑膜下血肿，术前未作 CT 检查确定血肿部位，应直接手术钻孔探查，再扩大成骨窗清除血肿。钻孔顺序可根据损伤方式和机制、瞳孔散大侧边、头部着力点、头皮挫伤处、颅骨骨折部位等来确定。一般先在瞳孔散大侧颞部骨折线处钻孔，若行 CT 扫描，根据 CT 扫描所见采用骨瓣或骨窗开颅，清除血肿，妥善止血(D 对 C 错)。钻孔血肿引流手术适用于慢性硬脑膜下血肿(E 错)。

102. 答案:A

解析：第一产程指从规律宫缩开始到宫颈口开全(10cm)，包括潜伏期和活跃期。当破膜且宫颈口扩张 \geq 6cm 后，若宫缩正常，宫颈口停止扩张 \geq 4 小时；若宫缩欠佳，宫颈口停止扩张 \geq 6 小时

称为活跃期停滞。患者宫缩正常，宫颈口停止扩张 4 小时，为活跃期停滞(A 对)。第二产程指从宫口开全至胎儿娩出，初产妇>3 小时，经产妇>2 小时产程无进展为第二产程延长(B 错)。从临产规律宫缩开始至活跃期起点(4~6cm)称为潜伏期。初产妇>20 小时、经产妇>14 小时称为潜伏期延长(C 错)。从活跃期起点(4~6cm)至宫颈口开全称为活跃期。活跃期宫颈口扩张速度<0.5cm/h 称为活跃期延长(E 错)。

103. 答案:C

解析:从临产规律宫缩开始至活跃期起点(4~6cm)称为潜伏期。初产妇>20 小时、经产妇>14 小时称为潜伏期延长，患者初产妇，临产 22 小时(>20 小时)，宫口开大 2cm，为潜伏期延长(C 对)。第一产程指从规律宫缩开始到宫颈口开全(10cm)，包括潜伏期和活跃期。当破膜且宫颈口扩张≥6cm 后，若宫缩正常，宫颈口停止扩张≥4 小时；若宫缩欠佳，宫颈口停止扩张≥6 小时称为活跃期停滞(A 错)。第二产程指从宫口开全至胎儿娩出，初产妇>3 小时，经产妇>2 小时产程无进展为第二产程延长(B 错)。从活跃期起点(4~6cm)至宫颈口开全称为活跃期。活跃期宫颈口扩张速度<0.5cm/h 称为活跃期延长(E 错)。

104. 答案:B

解析:能反映糖尿病近期血糖总水平，作为近期病情监测指标的是糖化血红蛋白(B 对)。红细胞的寿命约为 120 天，因此检测 GHb 的相对数量可反映近期血糖控制的平均水平，这比实时检测葡萄糖氧化酶活性的血糖绝对定量方法更为稳定、准确。

105. 答案:D

解析:C 肽测定不受血清中的胰岛素抗体和外源性胰岛素影响，因此用胰岛素治疗糖尿病的患者，能反映胰岛功能的指标是 C 肽(D 对)。

106. 答案:D

解析:卵巢性索间质肿瘤包括颗粒细胞-间质细胞瘤和支持细胞-间质细胞瘤。颗粒细胞-间质细胞瘤包括颗粒细胞瘤(D 对)，卵泡膜细胞瘤，纤维瘤。卵黄囊瘤，畸胎瘤为卵巢生殖细胞肿瘤(AE 错)。卵巢粘液性囊腺瘤为卵巢

良性肿瘤(B 错)。卵巢黄素囊肿为良性疾病(C 错)。

107. 答案:E

解析:卵巢生殖细胞肿瘤包括畸胎瘤，无性细胞瘤，卵黄囊瘤，其中，畸胎瘤为最常见的生殖细胞肿瘤(E 对)。

108. 答案:B

解析:女性淋菌性腹膜炎的常见感染途径为上行性感染(B 对)。直接扩散见于泌尿系感染(A 错)。透壁性感染见于肝硬化并发腹水、肾病、猩红热或营养不良等机体抵抗力低下时(C 错)。血型播散见于呼吸道或泌尿系的感染灶(D 错)。

109. 答案:C

解析:肝硬化自发性细菌性腹膜炎的常见感染途径为透壁性感染(C 对)。直接扩散见于泌尿系感染(A 错)。上行性感染可见于女性生殖道的细菌的扩散(B 错)。血型播散见于呼吸道或泌尿系的感染灶(D 错)。

110. 答案:A

解析:一期梅毒的特征性表现为硬下疳(A 对)。二期梅毒有皮疹、骨关节病变、眼部病变、神经系统病变及其他脏器病变等多系统表现，在肛周、阴唇、腹股沟、阴茎、大腿内侧等潮湿部位，常可见到扁平湿疣。三期梅毒有梅毒性树胶肿的非特异性肉芽肿样损害。

111. 答案:B

解析:二期梅毒有皮疹、骨关节病变、眼部病变、神经系统病变及其他脏器病变等多系统表现，在肛周、阴唇、腹股沟、阴茎、大腿内侧等潮湿部位，常可见到扁平湿疣(B 对)。一期梅毒的特征性表现为硬下疳。三期梅毒有梅毒性树胶肿的非特异性肉芽肿样损害。

112. 答案:D

解析:21-三体综合征标准核型是 47, XX(XY), +21(D 对)。21-三体综合征的嵌合型为 46, XX(XY)或 47, XX(XY), +21(C 错)。

113. 答案:C

解析:21-三体综合征标准核型是 47, XX(XY), +21(D 错)。21-三体综合征的嵌合型为 46, XX(XY)或 47, XX(XY), +21(C 对)。

第一单元

A1/A2 型选择题

1. 关于胆色素的描述, 正确的是

- A. 80%来源于肌红蛋白
- B. 属于水溶性物质
- C. 与蛋白结合后难溶于水
- D. 铁卟啉类化合物的分解代谢产物
- E. 在肠道中分解成尿胆红素

2. 属于医师执业规则的是

- A. 医师在执业活动中人格尊严人身安全不受侵犯
- B. 医师在执业活动中应当遵守法律法规, 遵守技术规范
- C. 对考核不合格的医师, 可以责令其接受培训和继续医学教育
- D. 医师应当使用经国家有关部门批准使用的药品、消毒药剂和医疗器械
- E. 对医学专业技术有重大突破、作出显著贡献的医师, 应当给予表彰或者奖励

3. 医疗机构未按照规定供应、接收、采购疫苗的, 不正确的是

- A. 予以警告, 没收违法所得
- B. 处 5 万元以上 50 万元以下的罚款
- C. 由县级以上人民政府卫生健康主管部门责令改正
- D. 情节严重的, 对负责人撤职处分
- E. 责令负有责任的医疗卫生人员暂停 1 年以上 18 个月以下执业活动

4. 衡量人群中在短时间内新发病例的频率采用的指标为

- A. 罹患率
- B. 发病率
- C. 患病率
- D. 感染率
- E. 续发率

5. 关于肿瘤的转移错误的是

- A. 胃癌可转移至盆腔
- B. 乳癌可转移至锁骨上淋巴结
- C. 交界性肿瘤不出现转移
- D. 肝癌可出现脑转移
- E. 肺癌可出现骨转移

6. 慢性肉芽肿病的发生原因是

- A. 先天性胸腺发育不全
- B. 吞噬细胞功能缺陷
- C. T、B 细胞混合缺陷
- D. 补体某些组分缺陷
- E. B 细胞发育和功能异常

7. 关于原癌基因特点的叙述, 下列哪项是错误的

- A. 广泛存在于生物界
- B. 基因序列高度保守
- C. 其作用通过表达产物来实现
- D. 基因处于静止或低表达状态
- E. 所有原癌基因都有致癌性

8. 下列关于氧化磷酸化偶联机制的化学渗透学说, 哪一项是错误的

- A. 呼吸链中各递氢体可将 H^+ 从线粒体膜内转运到膜外
- B. H^+ 不能自由通过线粒体内膜
- C. 在线粒体膜内外形成电化学梯度而储存能量
- D. 线粒体膜内外形成的电化学梯度包括 H^+ 浓度梯度和跨膜电位差
- E. 当质子顺浓度梯度回流时驱动 ADP 与 P_i 生成 ATP

9. 下列关于发热时机体代谢变化的叙述, 不正确的是

- A. 基础代谢率提高
- B. 可发生代谢性酸中毒
- C. 维生素 B 族和维生素 C 缺乏
- D. 出现正氮平衡
- E. 脂肪分解增强

10. 膝关节内侧半月板较外侧半月板更容易损伤是因为

- A. 紧附于胫侧副韧带
- B. 屈膝时股骨内旋
- C. 腓肌不适当地牵拉
- D. 形态较小
- E. 运动时被前交叉韧带向后推

11. 心理过程包括哪 3 个过程

- A. 气质、性格和能力
- B. 动力、活动和评价
- C. 认知、情绪和意志
- D. 认知、人格和活动
- E. 动力、情绪和意志

12. 体现了新公共健康精神的项目是

- A. 预防为主
- B. 三级预防
- C. 强化社区行动
- D. 人人享有卫生保健
- E. 群众性自我保健

13. 血管紧张素转换酶抑制剂 (ACEI) 的特点为

- A. 可用于各型高血压, 有反射性心率加快
- B. 对肾脏无保护作用
- C. 可防治高血压患者心肌细胞肥大
- D. 长期用药易引起电解质紊乱。对高血压患者的血管壁增厚无防治作用

14. 长期应用糖皮质激素治疗, 停药时应注意

- A. 检查患者血细胞
- B. 了解胃黏膜有无损伤
- C. 补充蛋白质
- D. 服用抗糖皮质激素药物
- E. 逐次减量停药

15. 关于流感病毒的特点哪项错误

- A. 是有包膜病毒
- B. 具有神经氨酸酶 (NA) 刺突
- C. 不易发生抗原性变异
- D. 具有分节段的 RNA 和核蛋白 (NP)
- E. 具有血凝素 HA 刺突

16. 临床进行膀胱穿刺时, 可不进入腹膜腔以减少感染, 其根据是

- A. 膀胱位于盆腔上方
- B. 膀胱位置浅表, 不必打开腹膜腔
- C. 膀胱是腹膜间位器官
- D. 膀胱体直接与腹前壁相邻
- E. 膀胱随尿液充盈程度不同而发生位置变化

17. 心理活动可以通过大脑直接影响以下系统来调节生理变化, 但需除外下列哪个系统

- A. 心血管系统
- B. 交感神经系统
- C. 内分泌系统
- D. 自主神经系统
- E. 免疫系统

18. 医技工作的道德要求不包括

- A. 严谨求实, 防止差错
- B. 及时准确, 尊重患者
- C. 静心管理, 保证安全
- D. 积极进取, 加强协作
- E. 调配迅速, 坚持查对

19. 健康伦理的核心包括

- A. 健康责任
- B. 健康权利
- C. 健康公正
- D. 健康义务
- E. 健康互助

20. 以下哪种疾病不属于生物地球化学性疾病的是

- A. 氟中毒
- B. 镉中毒
- C. 砷中毒
- D. 碘缺乏
- E. 克山病

21. 一氧化碳中毒的机制是

- A. 该气体与细胞色素氧化酶中三价铁和谷胱甘肽结合抑制细胞呼吸酶
- B. 引起氧分压增加, 导致组织供氧不足, 引起缺氧
- C. 使血氧饱和度增加, 组织不能利用氧
- D. 该气体与氧化型细胞色素氧化酶中的二价铁结合, 引起细胞内窒息
- E. 影响血液中氧的释放和传递, 导致低氧血症和组织缺氧

22. 十二指肠溃疡镜下观, 下列描述错误的是

- A. 表面有少量炎性渗出物
- B. 可见坏死组织
- C. 增殖性动脉内膜炎
- D. 可见异型增生细胞
- E. 底部神经节细胞变性

23. 颈静脉怒张常发生于

- A. 颈外静脉
- B. 颈内静脉
- C. 颈前静脉
- D. 颈静脉弓
- E. 甲状腺静脉

2021 年临床执业历年真题

24. A 型行为性格与下列哪项疾病有关
- A. 癌症
 - B. 溃疡病
 - C. 冠心病
 - D. 神经症
 - E. 哮喘
25. 长期吃精面粉容易导致哪种维生素缺乏
- A. 维生素 B1
 - B. 维生素 B12
 - C. 维生素 B6
 - D. 维生素 B2
 - E. 维生素 C
26. 以下有助于对尖锐湿疣诊断的是
- A. 多量角化不全细胞
 - B. 挖空细胞
 - C. 表皮棘层肥厚
 - D. 乳头状瘤样增生
 - E. 角质层肥厚
27. 对新型冠状病毒防治最有效的措施是
- A. 抗病毒治疗
 - B. 及时报告疫情
 - C. 隔离
 - D. 疫苗接种
 - E. 咽拭子筛查
28. 在不同年龄段的心理健康中, 流体智力升高, 晶体智力下降的人群是
- A. 儿童
 - B. 青少年
 - C. 中年人
 - D. 老年人
 - E. 婴幼儿
29. 慢性苯中毒主要损害的是
- A. 神经系统
 - B. 血液系统
 - C. 消化系统
 - D. 泌尿系统
 - E. 骨骼系统
30. 慢性非传染性疾病的一级预防, 不包括
- A. 隔离
 - B. 预防性治疗
 - C. 化学预防
 - D. 健康筛查
 - E. 健康咨询
31. 卫生服务需要主要取决于卫生服务消费者的
- A. 实际支付能力
 - B. 购买愿望
 - C. 购买愿望和支付能力
 - D. 自身健康状况
 - E. 健康状况和购买愿望
32. 乳糜池临近的椎体是
- A. T11
 - B. T12
 - C. L1
 - D. L2
 - E. L3
33. 奥美拉唑的抑酸机制属于哪种抑制
- A. 竞争性抑制
 - B. 非竞争性抑制
 - C. 可逆性抑制
 - D. 反竞争抑制
 - E. 不可逆性抑制
34. 旅游回来后, 和家人描述旅游时遇到的风景属于记忆的内容中的
- A. 运动记忆
 - B. 逻辑记忆
 - C. 形象记忆
 - D. 情绪记忆
 - E. 瞬时记忆
35. 坏血病常见缺乏
- A. 维生素 C
 - B. 维生素 B
 - C. 维生素 A
 - D. 维生素 K
 - E. 维生素 D
36. 对出血坏死性胰腺炎最具诊断价值的是
- A. 血脂肪酶增高
 - B. 血淀粉酶增高
 - C. 血钙降低
 - D. 血胆红素增高

E. B 超检查胰腺增大

37. 正常产程分娩中,可增加子宫对缩宫素的敏感性的激素是

- A. 雌激素
- B. 孕激素
- C. 雄激素
- D. 促性腺激素
- E. 生长激素

38. 葡萄胎患者行清宫术,需刮除的组织是

- A. 肌层绒毛
- B. 宫腔绒毛
- C. 子宫内绒毛
- D. 蜕膜组织
- E. 宫外绒毛

39. 宫颈上皮不典型增生病变累及 2/3 层以上到全层,但基底膜完整,属于

- A. CINIII 级
- B. CINIV 级
- C. CINI 级
- D. CINII 级
- E. 浸润癌

40. 了解子宫内膜周期性变化最可靠的诊断依据是

- A. B 超检查
- B. 基础体温测定
- C. 激素测定
- D. 诊断性刮宫
- E. 细胞学检查

41. 患者行 X 线检查,可见输尿管结石在第 5 腰椎水平,属于输尿管的哪段

- A. 上段
- B. 中段
- C. 下段
- D. 盆腔段
- E. 内段

42. 慢性萎缩性胃炎,出现贫血的最主要原因是

- A. 自身免疫性溶血
- B. 营养不良
- C. 铁吸收减少
- D. 再生障碍
- E. 内因子缺乏

43. 支气管哮喘中起主要作用的是

- A. IgG
- B. IgE
- C. IgM
- D. IgA
- E. IgD

44. 冠状动脉粥样硬化性心脏病患者的膳食原则,不包括

- A. 脂肪热量占总热量不超过 25%
- B. 胆固醇摄入 <200mg/d
- C. 增加植物胆固醇摄入
- D. 增加蔬果摄入量
- E. 食盐摄入应在 6~10g 之间

45. 可见燕麦细胞的肺癌类型是

- A. 鳞状细胞癌
- B. 腺癌
- C. 小细胞肺癌
- D. 大细胞癌
- E. 腺鳞癌

46. 股骨颈骨折易导致股骨头缺血坏死的主要原因是

- A. 股圆韧带内的小凹动脉损伤
- B. 旋股内侧动脉损伤
- C. 股骨干的滋养动脉升支损伤
- D. 闭孔动脉损伤
- E. 阴部外动脉损伤

47. 出现尿糖阳性时,血糖至少为

- A. 11.1mmol/L
- B. 7.0mmol/L
- C. 8.0mmol/L
- D. 6.1mmol/L
- E. 10.0mmol/L

48. 高钾血症易引起心脏骤停的发病机制,不正确的是

- A. 增加了心肌复极 2 期时 Ca^{2+} 的内流
- B. 动作电位 0 期心肌细胞膜内电位上升的速度减慢
- C. 细胞膜处于部分去极化
- D. 动作电位时间和有效不应期均缩短
- E. 细胞内钾的外流比正常时加快

49. 阵发性室上性心动过速患者出现胸痛的原因是

2021 年临床执业历年真题

- A. 冠状动脉痉挛
- B. 心肌缺血缺氧
- C. 易并发心肌炎
- D. 易导致自发性气胸
- E. 心脏舒张受限

50. 下列病变中不能根据肉眼所见确定坏死性质的是

- A. 凝固性坏死
- B. 液化性坏死
- C. 脂肪坏死
- D. 纤维素样坏死
- E. 干酪样坏死

51. 气性坏疽的致病菌产气荚膜梭菌的特点, 错误的是

- A. 有荚膜无鞭毛
- B. 属于专性厌氧菌
- C. 革兰阳性短效杆菌
- D. 可有“汹涌发酵”现象
- E. 外毒素致病

52. 齿状韧带由什么构成

- A. 硬脊膜
- B. 蛛网膜
- C. 软脑膜
- D. 软脊膜
- E. 硬脑膜

53. 能通过胎盘的抗体是

- A. IgM
- B. IgG
- C. IgE
- D. IgD
- E. IgA

54. 白化病是哪一种氨基酸酶异常或缺乏引起的

- A. 尿黑酸氧化酶
- B. 组氨酸酶
- C. 酪氨酸酶
- D. 精氨酸酶
- E. 苯丙氨酸羟化酶

55. 不含味蕾结构的是

- A. 轮廓乳头
- B. 菌状乳头
- C. 软腭的黏膜上皮
- D. 丝状乳头

E. 会厌的黏膜上皮

56. 气性坏疽的临床特点是

- A. 局部红肿、热、痛不明显
- B. 一般白细胞不升高
- C. 体温正常
- D. 休克发生早
- E. 局部肌坏死, 有血性分泌物, 恶臭

57. 关于流行病学中的疾病之间分布是指

- A. 性别分布、民族分布、地区分布
- B. 人群分布、时间分布、地区分布
- C. 历史分布、地区分布、职业分布
- D. 年龄分布、季节分布、地区分布
- E. 以上都不是

58. 健康管理的首要步骤是

- A. 人群的健康体检
- B. 收集健康信息
- C. 健康维护计划的制订
- D. 健康维护计划的实施
- E. 疾病危险度评估

59. 医疗机构应对无正当理由开具抗菌药物超常处方达到一定次数的医师提出警告, 应当予以警告的最低次数是

- A. 2 次
- B. 6 次
- C. 3 次
- D. 4 次
- E. 5 次

60. 母婴保健法及其实施办法中, 婚前医学检查服务的内容是指

- A. 进行性卫生知识生育知识的教育
- B. 进行遗传病知识的教育
- C. 对有关婚配问题提供医学意见
- D. 对有关生育健康问题提供医学意见
- E. 对严重遗传疾病指定传染病和有关精神病的检查

61. 室间隔缺损的患者最常见的并发症是

- A. 肺炎
- B. 亚急性细菌性心内膜炎
- C. 脑血栓
- D. 脑脓肿

2021 年临床执业历年真题

- E. 脑栓塞
62. 化脓性脑膜炎患者最易并发
- A. 脑积水
 - B. 脑脓肿
 - C. 硬脑膜下积液
 - D. 偏瘫
 - E. 亚急性硬化性全脑炎
63. 与水体富营养化密切相关的元素是
- A. 氟、氮
 - B. 汞、氟
 - C. 铅、汞
 - D. 氮、磷
 - E. 碘、磷
64. 淋病的致病菌是
- A. 溶血性链球菌
 - B. 淋病奈瑟球菌
 - C. 金黄色葡萄球菌
 - D. 大肠埃希菌
 - E. 钩端螺旋体
65. 小概率事件是指
- A. $P \leq 0.05$
 - B. $P \leq 0.01$
 - C. $0.01 \leq P \leq 0.05$
 - D. $0.05 \leq P \leq 0.1$
 - E. $P \leq 0.1$
66. 患者规律服用抗结核药物治疗, 若出现视神经炎, 应禁用
- A. 利福平
 - B. 乙胺丁醇
 - C. 异烟肼
 - D. 链霉素
 - E. 吡嗪酰胺
67. 人体站立时胸部最低的是
- A. 肋膈隐窝
 - B. 剑突
 - C. 肋弓下缘
 - D. 肝上缘
 - E. 食管裂孔
68. 下列属于阿片类药物的是
- A. 地西洋
 - B. 甲基苯丙胺
 - C. 美沙酮
 - D. 麦角酸二乙酰胺
 - E. 可拉明
69. 引发超敏反应的抗原是
- A. 同种异型抗原
 - B. 异嗜性抗原
 - C. 耐受原
 - D. 超抗原
 - E. 变应原
70. 大龄未婚女性想进行人工授精, 但被拒绝主要的原因是违背了
- A. 社会公正原则
 - B. 社会公益原则
 - C. 全社会参与原则
 - D. 互相协同原则
 - E. 信息公开原则
71. 下列行主动转运的物质是
- A. 二氧化碳
 - B. 维生素
 - C. 氨基酸
 - D. 递质
 - E. 激素
72. 米索前列醇属于哪类药物
- A. PGE1
 - B. PGE2
 - C. PGD
 - D. PGF
 - E. PGA
73. 欲比较两种药物的效果是否有差别, 若疗效评定为“很有效较有效, 效果一般, 基本无效”, 宜采用的统计分析方法是
- A. 卡方检验
 - B. 秩和检验
 - C. t 检验
 - D. 参数检验
 - E. F 检验
74. 猫头鹰细胞对以下疾病具有诊断价值的是
- A. 尖锐湿疣
 - B. 钩端螺旋体病
 - C. 巨细胞病毒感染
 - D. 生殖器疱疹

E. 梅毒

75. 下列疾病中骨髓有核红细胞出现“核老浆幼”现象的是

- A. 巨幼红细胞性贫血
- B. 急性红血病
- C. 缺铁性贫血
- D. 骨髓增生异常综合征
- E. 再生障碍性贫血

76. 下列哪项不是引起低容量性低钠血症的原因

- A. 长期持续使用速尿
- B. 肾上腺皮质功能亢进
- C. 慢性间质性肾疾患
- D. 大面积烧伤
- E. 大量出汗

77. 监测机构发现突发公共卫生事件，向所在地县级人民政府卫生行政部门报告的时限是

- A. 1 小时
- B. 2 小时
- C. 3 小时
- D. 4 小时
- E. 6 小时

78. 流行病学的三类偏倚是

- A. 选择、中心、混杂偏倚
- B. 中心、信息、混杂偏倚
- C. 选择、信息、混杂偏倚
- D. 选择、信息、中心偏倚
- E. 选择、数据、混杂偏倚

79. 大叶性肺炎患者出现明显发绀等缺氧症状时，其病变基础是

- A. 合并肺肉质变
- B. 充血水肿期
- C. 红色肝样变期
- D. 灰色肝样变期
- E. 溶解消散期

80. 弥漫性新月体性肾小球肾炎因肾小囊内新月体形成，阻塞囊腔，患者可迅速出现的临床表现是

- A. 血尿
- B. 蛋白尿
- C. 少尿
- D. 管型尿

E. 多尿

81. 患者，男，69 岁，因尿毒症于 2 周前行肾移植手术今出现腰痛、发热、乏力、无尿的症状彩超提示肾肿大。考虑肾移植失败，行移植肾切除术，病理见移植肾有大量淋巴细胞浸润。肾移植失败最主要的原因是

- A. 急性排斥反应
- B. 超急性排斥反应
- C. 慢性排斥反应
- D. 移植肾衰竭
- E. 移植肾发生急性肾炎

82. 患者，女，25 岁，突发下腹剧烈疼痛，面色苍白，停经 50 天，查 BP90/60mmHg，P110 次/分，R21 次/分；考虑异位妊娠破裂合并出血性休克的可能性大。应注意该患者可能并发

- A. 混合性酸中毒
- B. 代谢性碱中毒
- C. AG 正常型代谢性酸中毒
- D. 呼吸性酸中毒
- E. AG 升高型代谢性酸中毒

83. 老年患者发生脑出血急诊入院，无儿无女，其老伴经受不住打击出现精神恍惚。若要行急诊手术，应由谁同意签字

- A. 等待家属清醒后签字
- B. 医疗机构负责人
- C. 上报到市级卫生部门
- D. 可直接行急诊手术
- E. 等患者清醒后签字

84. 某考研女学生，相信自己一定会通过，但成绩出来后发现并不理想，此后出现情绪低落、焦虑。该学生属于

- A. 急性应激障碍
- B. 适应障碍
- C. 创伤后应激障碍
- D. 分离障碍
- E. 强迫障碍

85. 患者反复就医仍不能治愈疾病，近日情绪波动较大，过分担忧。该患者属于哪种精神障碍

- A. 惊恐障碍
- B. 焦虑障碍

- C. 强迫障碍
- D. 双相障碍
- E. 应激障碍

86. 患者，女，65 岁。端坐时出现腰腿痛，行走需要休息片刻缓解疼痛，直腿抬高试验阳性，加强试验阴性。该患者最可能损伤的部位是

- A. 闭孔内肌
- B. 臀小肌
- C. 臀中肌
- D. 臀大肌
- E. 梨状肌

87. 患者，女，54 岁。行人工流产术后 3 个月，出现持续性的不规则阴道流血，刮宫病理检查提示无绒毛结构，最可能的诊断是

- A. 葡萄胎
- B. 绒毛膜癌
- C. 侵蚀性葡萄胎
- D. 子宫内膜癌
- E. 转移性癌

88. 患者，女，26 岁。妊娠 16 周，心慌、怕热、多汗、易饿 4 周。查体：BP130/60mmHg，中等体型，皮肤潮红，手有细颤，轻度突眼，甲状腺弥漫性 II 度肿大，血管杂音(+)，心率 110 次 / 分，SH 5.0(正常范围 0.27~4.20)MIU/ml，FT3 13.34(2.0~4.4)pg/ml，FT4 5.18(0.93~1.70)pg/ml，诊断为妊娠合并甲状腺功能亢进症。甲亢的治疗选用

- A. 甲状腺大部切除术
- B. 核素 131I
- C. 丙基硫氧嘧啶
- D. 大剂量心得安
- E. 甲巯咪唑

89. 患儿，3 岁，因出现面色苍白、食欲下降来诊，其父母诉有喂食蚕豆病史，考虑诊断蚕豆病。该患儿最可能缺乏

- A. 磷酸果糖激酶-1
- B. 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶
- C. 丙酮酸羧化酶
- D. 过氧化物酶

E. ATP 合成酶

90. 患者，男，46 岁。大便带血 1 年，血色鲜红便中滴鲜血，患者自诉在便秘或饮酒后便血更甚，有头昏和贫血，但无疼痛不适，肛门外观有皮赘。经直肠指检未发现肿块，则进一步处理的原则是

- A. 对症处理，密切定期门诊随访
- B. 肛门镜检查
- C. 钡剂灌肠 X 线摄片
- D. B 超检查
- E. 纤维结肠镜检查

91. 患者，男，22 岁。反复发作喘息、呼吸困难、咳嗽 3 年。体检：双肺散在哮鸣音，心脏无异常。下列检查结果中有助于明确诊断的是

- A. 最大呼气流量显著降低
- B. 一秒钟用力呼气容积降低
- C. 最大呼气中段流量降低
- D. 支气管舒张试验阳性
- E. 抗生素治疗有效

92. 患者，28 岁经产妇。人工流产术后半年，术后断续阴道流血，量不多术后一直避孕。尿妊娠试验阳性，查子宫鸭卵大，软。胸片见两肺中下部有多处散在棉絮团影。本例最可能的疾病是

- A. 吸宫不全
- B. 葡萄胎
- C. 侵蚀性葡萄胎
- D. 绒毛膜癌
- E. 胎盘部位滋养细胞肿瘤

93. 患者，女，36 岁。月经周期延长，月经量较前减少，且出现泌乳、体重下降。考虑诊断催乳素腺瘤，最适宜的治疗是

- A. 溴隐亭药物治疗
- B. 经鼻-蝶窦垂体腺瘤切除术
- C. 环磷酰胺化疗
- D. 放射治疗
- E. 黄体酮药物治疗

94. 患者，男，39 岁。聚餐后出现上腹部疼痛、腰背痛，同时腹部出现瘀斑，腹部膨隆、全腹压痛反跳痛，肠鸣音

2021 年临床执业历年真题

减弱，查 BP 90/65mmHg，Fib 1.1g/L。考虑急性胰腺炎合并 DIC。胰腺炎患者出现 DIC 的机制是

- A. 通过钙与组织因子形成复合物
- B. 激活凝血酶原，促进凝血酶生成
- C. 导致血管内皮广泛损伤
- D. 促使大量组织因子入血
- E. 引起激肽释放酶原激活

95. 患者，男，75 岁。因左上臂丛损伤频发左上臂疼痛频发痛属于

- A. 病边侵犯
- B. 痛觉过敏
- C. 放射性痛
- D. 扩散性痛
- E. 牵涉痛

96. 患者，男，60 岁。胸闷、气促 2 周。查体：吸气时 BP85/60mmHg，呼气时 BP100/75mmHg，心尖搏动减弱，心界向两侧扩大，心率 125 次/分，律齐，心音低钝、遥远，心脏各瓣膜区未闻及杂音。与上述临床表现相符合的体征是

- A. DeMusset 征
- B. Ewart 征
- C. Corrigan 征
- D. Quincke 征
- E. Traube 征

97. 连某，因患严重的躁狂抑郁障碍正在精神病专科医院住院治疗。因病情恶化，患者出现伤人毁物等行为，医院在没有其他可替代措施的情况下对其实施了约束身体的措施但实施后没有及时通知连某的监护人。连某的父亲作为监护人探视时，看到儿子被捆绑在病床上非常气愤。该案例中所形成的医患关系模式是

- A. 主动-被动型
- B. 指导-合作型
- C. 契约许可型
- D. 指导参与型
- E. 共同参与型

98. 患者，女，32 岁。接受精神分析治疗，舒适地躺在沙发上，把进入头脑中的一切都讲出来，不论其如何微不足道、荒诞，都如实地报告出来，这

种方法是

- A. 移情
- B. 自由联想
- C. 释梦
- D. 阻抗
- E. 自我宣泄

99. 患儿，女，25 天。不明原因反复惊厥发作 3 次，首选的止惊药物是

- A. 地西洋
- B. 苯巴比妥
- C. 苯妥英钠
- D. 异丙嗪
- E. 硫喷妥钠

100. 患者，女，28 岁。停经 40 天，1 个月前始感恶心、厌食、乏力，且日渐加重。诊断：早孕、妊娠剧吐。此时孕妇心肌与脑组织活动的主要供能物质是

- A. 葡萄糖
- B. 脂肪酸
- C. 蛋白质
- D. 氨基酸
- E. 乙酰乙酸

101. 患者，男，55 岁。近 2 年来出现关节炎症状和尿路结石，进食肉类食物时病情加重。该患者发生的疾病涉及的代谢途径是

- A. 糖代谢
- B. 脂代谢
- C. 嘌呤核苷酸代谢
- D. 嘧啶核苷酸代谢
- E. 氨基酸代谢

102. 患者，女，23 岁。突发心悸半小时，自数脉率为 180 次/分，律齐，将面部沉浸在冰水中心悸突然好转，自数脉率为 70 次/分，律齐。冷刺激使其症状缓解的最主要机制是

- A. 房室交界区不应期延长
- B. 窦房结自律细胞增强
- C. 异常传导的兴奋性增高
- D. 房室延搁时间缩短
- E. 房室交界区细胞 4 期自动去极化减弱

103. 患者，男，44 岁，农民。以“发

热、全身不适、头痛 5 天”为主诉入院。查体:面色苍白、脉搏细弱而快,皮肤有少许出血点,体温 39.8℃,血压 60/40mmHg。末梢血象 WBC $30 \times 10^9/L$, 中性粒细胞 80%, 异型淋巴细胞 10%, 血小板 $50 \times 10^9/L$, 尿蛋白(++)。最可能的诊断是

- A. 流行性脑脊髓膜炎
- B. 败血症, 感染性休克
- C. 流行性出血热
- D. 钩端螺旋体病
- E. 传染性单核细胞增多症

104. 某医院未经批准新设医疗美容科, 从外地聘请了一位退休外科医师担任主治医师, 该院行为的性质属于

- A. 非法行医
- B. 超范围执业
- C. 正常医疗行为
- D. 特殊情况
- E. 正常执业

105. 某护士在给一位乙型肝炎病毒携带者注射时, 不慎被患者用过的针头刺伤手指。为预防乙型肝炎病毒感染, 应首先采取的措施是

- A. 注射抗生素
- B. 注射丙种球蛋白
- C. 注射乙型肝炎疫苗
- D. 注射 α -干扰素
- E. 注射 HBV Ig

106. 患者, 男, 38 岁。运动时扭伤踝关节, 导致足不能内翻, 最可能损伤的部位是

- A. 胫前肌腱
- B. 外侧副韧带
- C. 胫后肌腱
- D. 下胫腓韧带
- E. 腓总神经

107. 患者, 男, 17 岁。需行手术治疗, 最适宜应由谁签署知情同意书

- A. 患者的表兄弟
- B. 患者的爷爷
- C. 患者的老师
- D. 患者本人
- E. 患者的父母

108. 患者, 男, 22 岁, 大学生。平常乐于助人、尊师爱校不仅在学习上经常帮助同学而且在生活上也常常照顾他人, 并能积极组织班级的集体活动。这种行为方式在性格的特征中属于

- A. 行为特征
- B. 意志特征
- C. 态度特征
- D. 情绪特征
- E. 理智特征

109. 某边远医院收治一名宫外孕破裂失血性休克的患者, 紧急手术并输血, 当时该医院库存血液不足, 又无自体血液回输条件, 血站送血需要 3 小时车程, 在此情况下, 医院的正确做法应当是

- A. 动员社会人员互助捐血
- B. 等待血站送血
- C. 外借自体血液回输设备
- D. 立即将患者转院
- E. 临时采集血液, 并确保采血用血安全

110. 某育龄妇女因摔倒后腰部及下腹部剧烈疼痛, 经检查发现已妊娠 12 周。为进一步明确诊断, 接诊医师没有开放射相关的检查, 原因是

- A. 妊娠妇女且在 8~15 周孕期
- B. B 超即可诊断
- C. 就诊前服用止痛药
- D. 根据病史即可诊断
- E. 患者拒交相关费用

111. 患者, 男, 56 岁。患慢性粒细胞白血病 4 年, 恶病质, 符合安乐死条件, 医生使用药物结束其痛苦的生命, 称为

- A. 强迫安乐死
- B. 医助安乐死
- C. 被动安乐死
- D. 主动安乐死
- E. 自杀安乐死

112. 糖尿病患者由于反复注射胰岛素, 在注射局部出现红肿, 出血, 坏死等剧烈的炎症, 应是

- A. 类风湿性关节炎
- B. 类 Arthus 反应

- C. 血清病
- D. 免疫复合物型肾小球性肾炎
- E. SLE

113. 患者，男，24 岁。右大腿深部巨大血管瘤，术后情况良好，伤口一期愈合。拆线后下床活动 5 分钟后突然晕倒，抢救无效死亡。应考虑

- A. 脑血管意外
- B. 心肌梗死
- C. 休克致死
- D. 肺动脉栓塞
- E. 脂肪栓塞

114. 患儿，男，5 岁。发热、头痛、呕吐 4 天，昏迷半天，于 2 月 10 日入院。查体：T 39.6℃，P 115 次/分，R26 次/分，BP 60/20mmHg。神志不清，皮肤可见出血点，球结膜水肿，心肺腹(-)，颈抵抗(+)，双侧 Babinski(+)。实验室检查：血 WBC $16.4 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞 0.88，淋巴细胞 0.12。患者抢救无效于次日死亡。其脑组织病理检查最可能出现的结果是

- A. 颅底多发性闭塞性动脉内膜炎，引起脑实质损害
- B. 软脑膜充血、水肿、出血
- C. 脑沟和脑回可见小的肉芽肿、结节和脓肿，蛛网膜下腔可见有胶样渗出物
- D. 病变多发生在灰质、白质交界处，引起脑室扩大、脑积水及脑蛛网膜炎
- E. 脑血管高度扩张充血，蛛网膜下腔充满黄色脓性分泌物

115. 一名老年男性患者，尸检见肺组织内有同心圆排列的玻璃样变的胶原纤维、类上皮细胞、多核巨细胞及淋巴细胞构成的结节。该患者最后诊断为

- A. 肺结核
- B. 硅沉着病
- C. 肺纤维化
- D. 石棉肺
- E. 硅沉着病结核病

116. 患者，男，38 岁。肛周皮下有一深部脓肿一端向体表穿破，另一端向直肠穿孔，不断有脓、粪液流出，此

管道应称为

- A. 蜂窝织炎
- B. 溃疡
- C. 空洞
- D. 窦道
- E. 瘘管

117. 患者，男，38 岁。入院诊断为扩张型心肌病，心功能 IV 级。心电图示心率 98 次/分，心房颤动，血清钾 6.7mmol/L，血清钠 130mmol/L。该患者不宜应用

- A. 硝普钠
- B. 呋塞米(速尿)
- C. 螺内酯(安体舒通)
- D. 地高辛
- E. 阿司匹林

118. 患者，男，65 岁。COPD 急性发作伴发热。使用头孢他啶 10 天，体温曾降至正常，症状缓解 3 天后再次出现发热，检查发现口腔黏膜有白色念珠菌感染，此时抗生素拟改用

- A. 红霉素
- B. 氟康唑
- C. 青霉素
- D. 两性霉素 B
- E. 环丙沙星

119. 某患者血氧检查结果为： PaO_2 50mmHg，血氧容量 20ml/dl，动脉血氧含量 15ml/dl，动-静脉血氧含量差 4ml/dl。其缺氧类型是

- A. 低张性缺氧
- B. 血液性缺氧
- C. 淤血性缺氧
- D. 组织性缺氧
- E. 循环性缺氧

120. 某高血压患者，昏迷数小时后清醒。查体：右侧上、下肢呈痉挛性瘫痪，腱反射亢进病理反射阳性；伸舌时舌尖偏向左侧，左侧半舌肌萎缩。右侧躯干及上、下肢振动觉和精细触觉消失，但全身痛、温觉正常。患者可能受损的部位和结构是

- A. 左侧中脑腹侧部，受损结构有左侧锥体束、右侧内侧丘系
- B. 左侧脑桥腹侧部，受损结构有左侧

锥体束、右侧内侧丘系

C. 右侧脑桥腹侧部, 受损结构有右侧锥体束、左侧内侧丘系、左侧三叉神经核

D. 左侧延髓腹侧部, 受损结构有左侧锥体束、左侧内侧丘系、左侧舌下神经核

E. 右侧延髓腹侧部, 受损结构有右侧锥体束、右侧内侧丘系、右侧舌下神经核

121. 医生李某, 未经人体器官移植技术临床应用与伦理委员会审查同意摘取了王某的一个肾脏, 牟取私利, 其应受到的处罚是

A. 吊销其执业证书

B. 行政拘留

C. 暂停其 6 个月以上 1 年以下执业活动

D. 暂停其 1 年以上 2 年以下执业活动

E. 暂停其 2 年以上 3 年以下执业活动

122. 二人智商同为 85, 其一是山区农民, 结合他受教育程度和所处环境, 考虑其智力基本正常; 其二是某大学教授, 结合其他表现, 考虑有大脑退化性改变的可能这是遵循心理测验的

A. 标准化原则

B. 保密性原则

C. 客观性原则

D. 统一性原则

E. 以上都不是

123. 患者, 男, 80 岁。高血压病史 30 年, 血压 160/70mmHg, 患者脉压异常的最可能原因是

A. 动脉瓣关闭不全

B. 大动脉管壁硬化

C. 心功能不全

D. 甲状腺功能亢进

E. 肾功能不全

124. 患者, 男, 45 岁。2 周前烧伤, 烧伤面积 40%左右, 近 5 天开始发热, 体温 38~39°C, 间歇性, 逐渐加重并伴有寒战, 血培养出的细菌可产生凝固酶、杀白细胞素、肠毒素。最可能感染的细菌是

A. 肺炎链球菌

B. 溶血性链球菌

C. 厌氧芽孢杆菌

D. 大肠杆菌

E. 金黄色葡萄球菌

125. 肝体积明显缩小, 外观黄绿色, 表面呈结节状, 光镜下见肝细胞大片坏死, 同时可见肝细胞再生结节, 明显淤胆, 大量炎症细胞浸润, 结节间纤维组织及小胆管明显增生, 根据上述病变应诊断为

A. 急性黄疸性普通型肝炎

B. 重度慢性肝炎

C. 急性重型肝炎

D. 亚急性重型肝炎

E. 门脉性肝硬化

126. 患者男, 45 岁。吸烟 12 年, 每天 1 包, 自己知道吸烟的一些危害, 但认为不会发生在自己身上, 根据行为改变阶段理论, 对于该男士目前应采取的干预步骤是

A. 提供信息, 提高认知

B. 提高认识, 激动动机

C. 提供方法鼓励尝试

D. 支持鼓励, 加以强化、

E. 继续维持, 不断强化

127. 某女中学生, 在晚上遭遇一条白狗, 当时十分恐惧表现出心率加快、血压增高、呼吸加速和肌张力增强, 这些生理反应说明活动增强的神经内分泌系统是

A. 下丘脑-垂体-甲状腺轴

B. 下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴

C. 交感-肾上腺髓质轴

D. 下丘脑-垂体-性腺轴

E. 下丘脑-神经垂体轴系

128. 患者, 男, 29 岁。输血后感染艾滋病, 这是经

A. 下行传染

B. 垂直传播

C. 水平传播

D. 接触传播

E. 医源性传播

129. 患者, 男, 56 岁, 矽肺。因呼吸困难 2 天入院。患者曾在采矿场做采

2021 年临床执业历年真题

石工长达 15 年。那么患者所患的矽肺与其职业有关，可认定为

- A. 慢性病
- B. 急性病
- C. 工伤
- D. 职业病
- E. 与职业无关

130. 某学生希望毕业后成为外科医师，因此他在临床实习中主动向老师请教，积极为患者服务，并能结合临床案例查阅相关文献，他的行为表现在意志品质中称为

- A. 自觉性
- B. 坚韧性
- C. 果断性
- D. 自制力
- E. 意志力

131. 医生小刘在值班期间，某病房突然失火，小刘不顾个人安危，奋不顾身将卧床患者背下楼。其行为受到医患众人的好评。小李履行了下列哪项义务

- A. 维护医务人员之间、医院间的和谐
- B. 维护医务人员和医院的声誉
- C. 维护医务人员和医院的经济效益
- D. 维护医务人员和医院的自身利益
- E. 维护患者的利益和社会公益

132. 在微循环中，主要受局部代谢产物调节的结构是

- A. 微动脉
- B. 直捷通路
- C. 毛细血管前括约肌
- D. 真毛细血管
- E. 毛细血管后括约肌

133. 患者，男，56 岁。干咳，渐进性呼吸困难，诊断为特发性肺纤维化，最具特征性的是

- A. RV 降低
- B. VC 减少
- C. FEV1 减少
- D. FVC 减少
- E. MVV 减少

B1 型选择题

(134~135 题共用备选答案)

- A. 铅中毒
 - B. 汞中毒
 - C. 砷中毒
 - D. 硒缺乏
 - E. 镉缺乏
134. 与克山病有关的是

135. 与乌脚病有关的是

(136~137 题共用备选答案)

- A. 辐射散热
 - B. 传导散热
 - C. 对流散热
 - D. 蒸发散热
 - E. 以上均正确
136. 运动出汗属于

137. 给高热患者用冰帽降温是通过增加

(138~139 题共用备选答案)

- A. 化学预防
 - B. 健康筛查
 - C. 预防接种
 - D. 危险度评价
 - E. 健康咨询
138. 患者，女，30 岁，前来体检，医生为其行巴氏涂片检查，属于

139. 孕妇定期产检，医生嘱其口服叶酸，属于

(140~141 题共用备选答案)

- A. 国家医疗保险
 - B. 社会医疗保险
 - C. 商业医疗保险
 - D. 储蓄医疗保险
 - E. 企业医疗保险
140. 通过市场机制来筹集费用和提供服务的保险模式是

141. 通过国家立法形式强制实施，主要由雇主和雇员缴纳保费的保险模式

A3/A4 型选择题

(142~143 题共用题干)

某大学学生发生不明原因集体腹泻，为了寻找病因及流行的线索。

142. 首先应进行的研究是

2021 年临床执业历年真题

- A. 病例对照研究
- B. 队列研究
- C. 临床试验研究
- D. 理论流行病学研究
- E. 现况调查研究

143. 通过第一步的研究, 结果提示大批学生的腹泻可能与吃学校食堂饭菜有关, 下一步最好采取

- A. 病例对照研究
- B. 队列研究
- C. 现况调查研究
- D. 理论流行病学研究
- E. 临床试验研究

(144~145 题共用题干)

患者, 女, 48 岁。因胆道梗阻并发休克入院。使用去甲肾上腺素升压, 血压不易维持波动较大, 应用氢化可的松后血压升高并维持平稳, 治疗 3 天时, 患者出现精神失常, 躁狂。

144. 患者出现精神失常、躁狂, 因氢化可的松

- A. 提高中枢神经的兴奋性
- B. 加速蛋白质的分解代谢
- C. 减少脑组织对葡萄糖的利用
- D. 过量引起感染的扩散
- E. 增强升压药的作用

145. 加用氢化可的松后, 去甲肾上腺素升压作用增强的这种现象为

- A. 糖皮质激素的允许作用
- B. 两种药物作用的协同
- C. 糖皮质激素的刺激作用
- D. 糖皮质激素的抗感染作用
- E. 两种药物作用的叠加

(146~148 题共用题干)

用钼靶 X 线摄片检查方法做乳腺癌的筛检试验, 分别检查了 100 名经活检确诊为乳腺癌的妇女和 100 名未患乳腺癌的妇女, 结果如下: 乳腺癌妇女筛检结果阳性 64 例, 阴性 36 例; 非乳腺癌妇女筛检结果阳性 16 例, 阴性 84 例。

146. 此项筛检试验中灵敏度为

- A. 16%
- B. 84%
- C. 64%

- D. 36%
- E. 74%

147. 此项筛检试验中特异度为

- A. 16%
- B. 84%
- C. 64%
- D. 36%
- E. 74%

148. 此项筛检试验中粗一致率为

- A. 16%
- B. 84%
- C. 64%
- D. 36%
- E. 74%

(149~150 题共用题干)

患儿, 5 岁, 诊断为多动症, 医生给其开具了处方药, 但父母没立即取药。

149. 几天后再去取被告知已无法取药, 其原因是

- A. 处方超过规定用量
- B. 一张处方中超过 5 种药品
- C. 中药与西药开在同一张处方
- D. 家属未按规定签字
- E. 处方已超过期限

150. 若开具的是哌醋甲酯, 每张处方不得超过多少天的常日量

- A. 90 天
- B. 20 天
- C. 30 天
- D. 7 天
- E. 15 天

第二单元

A1/A2 型选择题

1. 粒细胞缺乏症的诊断标准是指外周血的中性粒细胞绝对数低于

- A. 0.2×10^9
- B. 0.5×10^9
- C. 4.0×10^9
- D. 1.5×10^9
- E. 3.0×10^9

2. 急性肾炎补体恢复正常一般在病后

- A. 1 周内

- B. 2 周内
C. 4 周内
D. 6 周内
E. 8 周内
3. 继发性高血压最常见的病因是
A. 内分泌疾病
B. 妊娠期合并高血压
C. 肾脏疾病引起的高血压
D. 肥厚型心肌病
E. 糖尿病
4. 急性心肌梗死支架术后阿司匹林至少需要服用
A. 6 个月
B. 8 个月
C. 12 个月
D. 18 个月
E. 24 个月
5. SLE 狼疮肾炎首选的免疫抑制剂为
A. 环磷酰胺
B. 甲氨蝶呤
C. 长春新碱
D. 依木兰
E. 雷公藤
6. 我国儿童慢性肾衰竭最常见的病因是
A. 慢性肾小球肾炎
B. 糖尿病肾病
C. 狼疮肾炎
D. 高血压肾病
E. 梗阻性肾病
7. I 型糖尿病的首选治疗药物是
A. 胰岛素
B. 格列喹酮
C. 二甲双胍
D. 普伐他汀
E. 阿卡波糖
8. 下列关于外阴阴道假丝酵母菌病治疗, 正确的是
A. 阴道内放置咪康唑栓
B. 阴道内放置甲硝唑栓
C. 阴道内放置己烯雌酚栓
D. 外阴应用氢化可的松软膏
E. 外阴应用 0.5% 醋酸液清洗
9. 出现睾丸浸润肿大, 且累及中枢神经系统的是
A. 急性粒细胞白血病
B. 急性单核细胞白血病
C. 急性淋巴细胞白血病
D. 急性粒-单核细胞白血病
E. 急性早幼粒细胞白血病
10. 急性心肌梗死最常导致
A. 二尖瓣狭窄
B. 二尖瓣关闭不全
C. 主动脉瓣狭窄
D. 主动脉瓣关闭不全
E. 肺动脉瓣狭窄
11. 缩窄性心包炎最具有特异性的体征是
A. 奇脉
B. 颈静脉怒张
C. 心包叩击音
D. 肝大
E. 浮肿
12. 妊娠 20 周合并甲亢首选的治疗药物是
A. 丙硫氧嘧啶
B. 普萘洛尔
C. 甲巯咪唑
D. 碘剂
E. 抗甲状腺药
13. 尺骨上 1/3 骨干骨折合并桡骨小头脱位为
A. 孟氏骨折
B. 盖氏骨折
C. 柯力氏骨折
D. 巴通氏骨折
E. 斯密氏骨折
14. 慢性粒细胞白血病用伊马替尼治疗无效后的治疗措施是
A. 造血干细胞移植
B. 改用羟基脲治疗
C. 改用马利兰治疗
D. 改用 α 干扰素治疗
E. 脾切除
15. 下列宜选用塞来昔布治疗的疾病

是

- A. 胃溃疡
- B. 痛风
- C. 骨关节炎
- D. 支气管哮喘
- E. 肾绞痛

16. 骨肉瘤可见到的骨膜反应是

- A. 肥皂泡样变
- B. 乒乓球样改变
- C. 三角形骨膜反应
- D. “日光射线”现象
- E. 花边形骨膜反应

17. 治疗细菌性阴道炎首选

- A. 甲硝唑
- B. 青霉素
- C. 雌激素
- D. 克霉唑
- E. 红霉素

18. 丙型病毒性肝炎的确诊检查是

- A. HCV 抗体检测
- B. HCV-DNA 检测
- C. HCV-RNA 检测
- D. 肝功能检查
- E. 腹部 CT

19. 成人最常见的延迟愈合的骨折是

- A. 胫骨上 1/3 骨折
- B. 胫骨中、下 1/3 骨折
- C. 胫骨中上 1/3 骨折
- D. 胫骨下 2/3 骨折
- E. 腓骨颈骨折

20. 脊柱骨折搬运时禁用的方法是

- A. 平托将伤员移至木板
- B. 平托将伤员移至担架
- C. 多人用手同时平托搬运
- D. 将患者躯干成一整体滚动
- E. 一人抬头一人抬足搬运

21. 孕妇 8 周，口服丙硫氧嘧啶抑制甲状腺素合成的机制是

- A. 抑制甲状腺过氧化物酶，阻止碘离子氧化
- B. 降低促甲状腺素 (TSH) 分泌
- C. 影响已合成的 T₃、T₄ 释放与利用
- D. 破坏甲状腺组织

E. 在周围组织中抑制 T₄ 转化为 T₃

22. 内痔的好发部位是截石位的

- A. 2 点、7 点、11 点
- B. 2 点、6 点、10 点
- C. 3 点、9 点、12 点
- D. 3 点、7 点、11 点
- E. 4 点、8 点、12 点

23. 符合糖尿病眼病 III 期表现的是

- A. 微血管瘤
- B. 机化物增生
- C. 玻璃体积血
- D. 棉絮状软性渗出
- E. 视网膜脱离

24. 下列关于伤寒的治疗措施，不正确的是

- A. 抗感染首选喹诺酮类抗生素
- B. 便秘时用高压灌肠
- C. 少进食豆奶等产气食物
- D. 低糖低脂饮食
- E. 禁止用新斯的明等促进肠蠕动药

25. 引起左心室前负荷过重的原因为

- A. 三尖瓣关闭不全
- B. 高血压
- C. 主动脉瓣狭窄
- D. 二尖瓣狭窄
- E. 二尖瓣关闭不全

26. 高血压伴有低钾血症首先考虑

- A. 皮质醇增多症
- B. 嗜铬细胞瘤
- C. 原发性醛固酮增多症
- D. 继发性慢性肾炎的高血压
- E. 肾动脉狭窄

27. 对鉴别肾小球源性血尿最有意义的是

- A. 全程血尿
- B. 合并尿路刺激征
- C. 尿潜血阳性
- D. 肉眼血尿
- E. 变形红细胞血尿

28. 膀胱癌最常见的组织类型是

- A. 腺癌
- B. 鳞状细胞癌

- C. 非上皮性肿瘤
- D. 小细胞癌
- E. 移行细胞癌

29. 尿毒症患者高血压最主要的原因是

- A. 肾素增多
- B. 促红细胞生成素减少
- C. 水钠潴留
- D. 血管升压素增多
- E. 交感神经兴奋

30. 肾综合征出血热早期休克的主要原因是

- A. 病毒血症
- B. 血浆外渗
- C. 心肌损害
- D. 微血管痉挛
- E. 电解质紊乱

31. 单侧多根多处肋骨骨折最严重的生理改变是

- A. 疼痛, 呼吸运动减弱
- B. 胸壁软化, 反常呼吸
- C. 咳嗽, 血痰
- D. 严重皮下气肿
- E. 出血, 休克

32. 关于风湿性疾病的临床特点, 下列哪项不正确

- A. 病程多呈慢性经过
- B. 临床表现差异很大
- C. 反复发作与缓解交替出现
- D. 免疫学异常表现复杂
- E. 对治疗反应的个体差异不大

33. 甲状腺癌预后最好的病理类型是

- A. 未分化癌
- B. 鳞状细胞癌
- C. 髓样癌
- D. 滤泡状腺癌
- E. 乳头状癌

34. 易引起严重低血糖不良反应的口服降血糖药是

- A. 双胍类口服降糖药
- B. 磺脲类口服降糖药
- C. α 葡萄糖苷酶抑制剂
- D. 胰岛素增敏剂

E. 胰岛 B 细胞保护剂

35. 急性尿潴留病因中属于非机械性梗阻的是

- A. 尿道结石
- B. 尿道狭窄
- C. 前列腺增生
- D. 外伤性高位截瘫
- E. 尿道断裂

36. 尿路感染最常见的途径是

- A. 上行感染
- B. 血行感染
- C. 直接感染
- D. 淋巴道感染
- E. 呼吸道感染

37. 二尖瓣狭窄最典型的体征是

- A. 胸骨右缘第二肋间舒张期叹气样杂音
- B. 胸骨左缘第二肋间舒张期隆隆样杂音
- C. 胸骨左缘第三肋间舒张期叹气样杂音
- D. 心尖部收缩期吹风样杂音
- E. 心尖部舒张期隆隆样杂音

38. 洋地黄中毒多见的心律失常是

- A. 室上性心动过速
- B. 室性期前收缩二联律
- C. 心房纤颤
- D. 房室传导阻滞
- E. 房性期前收缩

39. 下列属于类风湿关节炎特征的是

- A. 不出现关节畸形
- B. 多发生于儿童和青少年
- C. 常侵犯腕关节和近端指间关节
- D. 非对称性
- E. 为感染性疾病

40. 重型病毒性肝炎出血的最主要原因是

- A. 血小板减少
- B. 毛细血管脆性增加
- C. 凝血因子合成减少
- D. 肝素样物质增多
- E. 骨髓造血功能受抑制

2021 年临床执业历年真题

41. 钩端螺旋体的基本病理变化是

- A. 全身毛细血管的感染, 中毒性损伤
- B. 小血管及血管周围炎细胞浸润
- C. 肺毛细血管出血
- D. 急性肾功不全
- E. 弥散性血管内凝血

42. 急性心肌梗死, 其闭塞的冠状动脉最常见的是

- A. 左冠状动脉前降支
- B. 右冠状动脉
- C. 左冠状动脉主干
- D. 右冠状动脉加左冠状动脉回旋支
- E. 右冠状动脉主干

43. 属于非二氢吡啶类钙通道阻滞剂的是

- A. 硝苯地平
- B. 氨氯地平
- C. 非洛地平
- D. 吲达帕胺
- E. 维拉帕米

44. 骨折治疗原则中的首要步骤是

- A. 功能锻炼
- B. 内固定
- C. 复位
- D. 包扎
- E. 外固定

45. 桡骨头半脱位的治疗措施是

- A. 手法复位不必固定
- B. 切开复位内固定
- C. 切开复位韧带修复
- D. 手法复位外固定
- E. 切开复位外固定

46. 鉴别再障和白细胞不增多性白血病最重要的检查是

- A. 血小板计数
- B. 周围血找幼稚白细胞
- C. 周围血找红细胞
- D. 骨髓细胞学检查
- E. 网织红细胞计数

47. 患者, 男, 49 岁。反复出现腹胀 3 年。慢性肝炎病史 15 年。查体发现脐周静脉曲张呈海蛇头样, 其最可能的原因为

- A. 心包积液
- B. 上腔静脉阻塞
- C. 下腔静脉阻塞
- D. 门静脉高压
- E. 肝静脉阻塞

48. 患者, 男, 22 岁。晨起眼睑水肿 4 个月, 查体: 可见颜面、下肢水肿。尿常规: 尿蛋白(++++) , 其水肿原因主要考虑为

- A. 毛细血管血压增高
- B. 血浆胶体渗透压降低
- C. 淋巴回流受阻
- D. 组织液静水压降低
- E. 组织液胶体渗透压升高

49. 患者, 男, 55 岁。突发胸痛伴大汗 3 小时, 有吸烟史, 首选的检查是

- A. 胸部 X 线片
- B. 心肌核磁显影
- C. 冠状动脉 CT 造影
- D. 心电图
- E. 超声心动图

50. 患者, 男, 68 岁。排尿困难 2 年, 腹部平片提示膀胱区有 1.8cm 椭圆形致密影。首选的治疗方案是

- A. 体外冲击波膀胱碎石
- B. 大量饮水, 自然排出
- C. 多饮水+药物治疗
- D. 膀胱切开取石
- E. 服用中药排石

51. 患者, 男, 58 岁。无痛性全程肉眼血尿 3 天。P 见左肾盂内有不规则充盈缺损, 膀胱镜检见左侧输尿管口喷血, 应首先考虑诊断为

- A. 肾结核
- B. 膀胱癌
- C. 肾结石
- D. 肾盂癌
- E. 肾炎

52. 患者, 男, 76 岁。高血压病史 25 年。查体: 收缩压 170mmHg, 舒张压 55mmHg。患者脉压异常的最可能原因是

- A. 大动脉管壁硬化
- B. 动脉关闭不全

- C. 心脏每搏输出量增加
- D. 甲状腺功能亢进
- E. 末梢循环衰竭

53. 患者，女，38 岁。心悸、无力 4 个月。大便次数增多，不成形，体重下降。1 周前诊断为甲状腺功能亢进症，未治疗。今日晨起发现双下肢无力，不能活动。查血钾 2.0mmol/L。患者考虑诊断为

- A. 重症肌无力
- B. 周期性麻痹
- C. 周围神经炎
- D. 甲亢性肌病
- E. 肌营养不良症

54. 患者，女，66 岁。2 年前诊断左股骨颈骨折。近 3 个月左髋疼痛逐渐加剧。X 线片示左髋关节间隙变窄，股骨头变形。最佳治疗方案是

- A. 左下肢皮肤牵引
- B. 切开复位钢板内固定
- C. 人工关节置换术
- D. 闭合复位内固定
- E. 卧床休息对症治疗

55. 患者，男，36 岁。腰腿痛 3 个月，伴有乏力、盗汗。查体：双下肢感觉、运动功能正常。X 线显示 L2~3 椎间隙狭窄，椎旁软组织阴影增宽。最可能的诊断是

- A. 腰椎间盘突出
- B. 腰椎骨质增生症
- C. 腰椎肥大
- D. 腰椎结核
- E. 强直性脊柱炎

56. 患儿，男，11 岁。玩耍时摔倒后，右腿疼痛、肿胀，线示干骺端椭圆形病灶，边界清楚。最可能的诊断为

- A. 软骨肉瘤
- B. 骨肉瘤
- C. 纤维肉瘤
- D. 骨巨细胞瘤
- E. 骨囊肿

57. 患者，男，42 岁。吃海鲜后夜间突发左侧第一跖趾关节剧烈疼痛 1 天。查体：关节局部红肿，压痛明显。既往

无类似发作。查血尿酸 602umol/L。目前最主要的治疗药物是

- A. 苯溴马隆
- B. 别嘌醇
- C. 抗生素
- D. 依托考昔
- E. 甲氨蝶呤

58. 患者，女，25 岁。右肾结核行右肾切除抗结核治疗半年多，尿痛缓解，但尿频加重，每晚 7~8 次，静脉尿路造影见左肾显影尚好，仅伴轻度肾积水及膀胱挛缩，尿常规白细胞 0~2/HP，现治疗应选择

- A. 左肾造瘘术
- B. 继续抗结核治疗
- C. 左输尿管皮肤造瘘术
- D. 膀胱扩大术
- E. 膀胱造瘘术

59. 患者，女，28 岁。左手腕被镰刀割伤 2 小时。查体：左手拇指对掌功能障碍，桡侧掌面皮肤感觉障碍。初步判断应为

- A. 腓总神经损伤
- B. 桡神经损伤
- C. 正中神经损伤
- D. 尺神经损伤
- E. 腋神经损伤

60. 患者，男，33 岁。患慢性粒细胞白血病 3 年，应用羟基脲常规治疗。近 1 周出现发热。查体：T39.2℃，脾肋下 6cm。查红细胞无异常，Hb 70g/L，WBC $50 \times 10^9/L$ ，PLT $50 \times 10^9/L$ ，骨髓增生极度活跃，原始粒细胞占 15%。该患者目前最重要的治疗是

- A. 高剂量阿糖胞苷
- B. 小剂量高三尖杉酯碱+阿糖胞苷
- C. 高剂量甲氨蝶呤
- D. 小剂量柔红霉素+阿糖胞苷
- E. 高剂量羟基脲

61. 患者，男，28 岁。昏迷 2 小时入院。查体：体温 37.4℃，呼吸 8 次/分，瞳孔针尖样，颈、腋淋巴结肿大，无痛，活动好，肝肋下 2cm，肘部静脉多处针孔。首选的治疗药物是

- A. 纳洛酮

- B. 阿托品
- C. 解磷定
- D. 乙酰胺
- E. 维生素 K1

62. 患者，男，71 岁。尿少、尿细 2 个月，发热 3 天。B 超检查见前列腺增大，考虑诊断为前列腺癌。目前首选的处理方法是

- A. 抗感染
- B. 严密观察随诊
- C. 导尿管导尿
- D. 穿刺活检
- E. 化疗

63. 患者，50 岁，女。右肩痛半年，活动受限，近来自觉梳头都感到困难。检查：右肩活动受限，肩周肌肉萎缩，局部明显压痛，X 线片无异常。考虑为

- A. 关节结核
- B. 肩周炎
- C. 风湿性关节炎
- D. 肩部肿瘤
- E. 骨关节炎

64. 患者，女，35 岁。因服用有机磷农药半小时入院，经治疗后意识恢复，症状好转。3 天后患者出现视物模糊、呼吸困难，并再次出现意识障碍。查体：T 36.7℃，P 52 次/分，R 6 次/分。目前应立即给予的治疗措施是

- A. 彻底洗胃
- B. 应用阿托品
- C. 抗休克
- D. 静脉注射安定
- E. 气管插管

65. 患者，男，31 岁。真菌感染出现口腔白膜，治疗可选用的药物是

- A. 氟康唑
- B. 制霉菌素
- C. 两性霉素
- D. 青霉素
- E. 红霉素

66. 患者，男，26 岁。发现高血压 1 年。查体：双上肢血压 180/100mmHg，双下肢血压 140/80mmHg，肩胛区可闻及血管杂音，伴震颤。该患者最有可能的

诊断是

- A. 嗜铬细胞瘤
- B. 皮质醇增多症
- C. 原发性醛固酮增多症
- D. 主动脉缩窄
- E. 肾动脉狭窄

67. 患儿，男，10 岁。发热、头痛、呕吐 3 天。查体：精神萎靡，全身皮肤有散在瘀点、瘀斑，两肺无异常，腹软无压痛。诊断应首先考虑

- A. 流行性乙型脑炎
- B. 钩端螺旋体病脑膜脑炎型
- C. 流行性出血热
- D. 脑型疟疾
- E. 流行性脑脊髓膜炎

68. 患者，女，26 岁。曾在大便中发现白条状物。颈部有一圆形皮下结节，质地较硬，活动好，无压痛。明确诊断最有意义的检查是

- A. 血培养
- B. 大便常规
- C. 皮下结节活检
- D. 大便培养
- E. 环卵沉淀试验

69. 患者，女，56 岁。剧烈胸痛伴发热，ST 段除 aVR 导联以外呈弓背向下型抬高。该患者最可能的诊断为

- A. 高压性气胸
- B. 急性心包炎
- C. 急性心肌梗死
- D. 主动脉夹层动脉瘤破裂
- E. 变异型心绞痛

70. 患者，女，60 岁。发现主动脉瓣狭窄 10 年，快走时心前区憋闷 3 年，心电图示左心室肥厚，该患者治疗宜首选

- A. 主动脉瓣瓣膜置换术
- B. 主动脉瓣球囊成形术
- C. 心脏移植
- D. 冠状动脉搭桥术
- E. 主动脉瓣修补术

71. 患者，男，52 岁。诊断为扩张型心肌病，查体：心率 80 次/分，心律不规整，肝大肋下 3.0cm，下肢轻度水肿。

2021 年临床执业历年真题

治疗首选哪一种药物

- A. 毛花苷丙 0.8mg, 静脉注射
- B. 地高辛 0.25mg, 每日 1 次口服
- C. 呋塞米 20mg, 静脉注射
- D. 硝普钠 25mg, 静脉滴注
- E. 高流量吸氧

72. 患者, 男, 52 岁。突发心悸、头晕, 查体:BP 70/45mmHg, 心电图示宽 QRS 波心动过速, 心律稍不规则, 间断可见呈窄 QRS 波。首选的治疗是

- A. 静脉注射利多卡因
- B. 静脉注射普鲁卡因酰胺
- C. 直流电复律
- D. 静脉注射普罗帕酮
- E. 静脉注射胺碘酮

73. 患者, 男, 59 岁。排尿困难 1 个月。直肠指检前列腺增大, 有结节, 质地坚硬。泌尿系超声检查提示前列腺结节, 内部回声不均匀。该患者考虑诊断为

- A. 直肠癌
- B. 前列腺癌
- C. 睾丸肿瘤
- D. 膀胱癌
- E. 前列腺增生症

74. 患者, 男, 55 岁。右侧阴囊逐渐增大 1 年无疼痛。查体:见右侧阴囊肿大, 大小约 10cm×10cm, 呈囊性, 睾丸触不清, 透光试验阳性。首先应该考虑的诊断是

- A. 睾丸炎
- B. 精索静脉曲张
- C. 腹股沟斜疝
- D. 睾丸肿瘤
- E. 睾丸鞘膜积液

75. 患者, 女, 25 岁。咯血伴少尿 3 天。查体:T 36.8℃, P 74 次/分, BP 160/100mmHg, 颜面及双下肢水肿。实验室检查:尿红细胞(++), 尿蛋白(++); 尿素氮 10.5mmol/L, 血肌酐 189umol/L。B 超显示双肾体积增大。该患者最可能的病理诊断是

- A. 新月体性肾小球肾炎
- B. 急性肾盂肾炎
- C. 微小病变型肾炎

- D. 膜性肾小球肾炎
- E. 系膜增生性肾小球肾炎

76. 患者, 男, 30 岁。工地工人, 半小时前从 3 米高架坠落, 右腰部受伤, 剧烈疼痛, 有明显肉眼血尿。查体:烦躁不安, 脸色苍白, P120 次/分, BP80/40mmHg, 右腰部有包块。在对患者施行手术时宜采用的切口是

- A. 经 11 肋间切口
- B. 经 12 肋下切口
- C. 腰背部切口
- D. 经腹切口
- E. 胸腹联合切口

77. 一护士在给一位乙型肝炎病毒 (HBV) 携带者注射时, 不慎被患者用过的针头刺伤手指。为预防乙型肝炎病毒感染, 应首先采取的措施是

- A. 注射抗生素
- B. 注射丙种球蛋白
- C. 注射乙型肝炎疫苗
- D. 注射乙肝免疫球蛋白
- E. 注射 α-干扰素

78. 患者, 男, 25 岁, 腰背痛, 并向臀部放射。检查见腰背僵硬神经系统无异常, 线片显示脊柱呈“竹节”样改变骶髂关节间隙变窄, 实验室检查:血红蛋白减低、血沉快, HLA-B27 阳性。其诊断是

- A. 风湿性关节炎
- B. 类风湿关节炎
- C. 脊柱结核
- D. 强直性脊柱炎
- E. 腰椎间盘突出症

79. 患者, 男, 24 岁。被车撞伤致骨盆骨折, 不能排尿 1 天。查体:烦躁不安, BP 70/50mmHg, P 120 次/分, 下腹膨隆, 压痛明显。该患者入院后紧急治疗的最好办法是

- A. 尿道会师术
- B. 膀胱造瘘术
- C. 抗休克治疗后膀胱造瘘术
- D. 止痛止血镇静消炎
- E. 尿道缝合术

80. 患者, 女, 40 岁。肥胖、高血压、

闭经 2 年。查体:BP 160/90mmHg, 向心性肥胖、脸圆、多血质外貌, 腹部可见宽大紫纹。血糖 11.8mmol/L。该患者最可能的诊断是

- A. 库欣综合征
- B. 糖尿病
- C. 代谢综合征
- D. 肥胖症
- E. 高血压

81. 患者, 女, 30 岁。乏力、头晕伴月经过多半年。化验:Hb 60g/L, RBC $3.1 \times 10^{12}/L$, WBC $7.3 \times 10^9/L$, P1t $315 \times 10^9/L$, 红细胞中心淡染区扩大。该患者最可能的化验结果是

- A. 血清铁降低, 总铁结合力降低, 红细胞游离原卟啉降低
- B. 血清铁降低, 总铁结合力降低, 红细胞游离原卟啉增高
- C. 血清铁降低, 总铁结合力增高, 红细胞游离原卟啉增高
- D. 血清铁增高, 总铁结合力增高, 红细胞游离原卟啉降低
- E. 血清铁降低, 总铁结合力增高, 红细胞游离原卟啉降低

82. 患者, 女, 27 岁。发热 1 个月, 伴关节肿痛, 脱发和口腔溃疡。实验室检查:尿蛋白(+++), 红细胞 $20 \sim 30/HP$ 。血 ANA(+). 最可能的诊断是

- A. 系统性红斑狼疮
- B. 类风湿关节炎
- C. 干燥综合征
- D. 风湿热
- E. 成人斯蒂尔病

83. 患者, 男, 15 岁。活动后心慌、气短、胸痛两周, 两周前曾患“感冒”持续发热一周。查体:面色苍白, 心界向左下扩大, 心率 120 次/分, 频发早搏。第一心音减弱。心尖区闻及奔马律及 III 级全收缩期杂音。心肌酶谱检查 CK-MB 80U/L。首先考虑的诊断是

- A. 急性心肌梗死
- B. 扩张型心肌病
- C. 风湿性二尖瓣关闭不全
- D. 急性病毒性心肌炎
- E. 急性风湿热

84. 患者, 男, 41 岁。2 周前搬重物时出现腰部疼痛, 排便时加重, 并向左下肢放射, 逐渐出现左小腿皮肤感觉减退。查体:腰部活动受限左侧直腿抬高 40° 出现左下肢放射性疼痛。腰椎 X 线片未见异常。最可能的诊断是

- A. 腰椎间盘突出症
- B. 腰椎肿瘤
- C. 腰椎管狭窄症
- D. 强直性脊柱炎
- E. 腰扭伤

85. 患者, 女, 65 岁。摔伤致右髋关节疼痛, 功能障碍。线片示右股骨颈头下骨皮质连续性中断, Pauwels 角 25° 。该股骨颈骨折属于

- A. 不完全骨折
- B. 关节外骨折
- C. 不稳定骨折
- D. 稳定性骨折
- E. 内收骨折

86. 患者, 女, 35 岁。尿频、尿痛伴肉眼血尿 1 天。既往体健。查体无异常。尿亚硝酸盐阳性, 尿沉渣镜检红、白细胞满视野。抗生素疗程一般为

- A. 14 天
- B. 5 天
- C. 7 天
- D. 10 天
- E. 3 天

87. 患者, 男, 30 岁。甲状腺肿大 5 年, 右侧叶明显, 无不适, 近来出现 Horner 综合征。其诊断最可能是

- A. 甲状腺腺瘤
- B. 桥本甲状腺炎
- C. 单纯性甲状腺肿
- D. Graves 病
- E. 甲状腺癌

88. 患者, 女, 28 岁。反复左腰部胀痛不适 2 年, B 超发现左肾积水 $6cm \times 4cm$, 上尿路未见结石。为明确病因, 最有价值的检查是

- A. 静脉尿路造影
- B. 腹部 X 线平片
- C. 腹部 CT
- D. 左侧逆行肾盂造影

E. 放射性核素肾图

89. 患者, 男, 70 岁, 糖尿病肾病患者。腹部增强 CT 检查后出现少尿, 尿钠 54mmol/L, 最可能的诊断是

- A. 肾后性急性肾衰竭
- B. 肾前性氮质血症
- C. 急性肾小管坏死
- D. 急进性肾炎
- E. 急性间质性肾炎

90. 患者, 男, 35 岁。1 周来乏力、发热伴牙龈肿胀出血。化验 Hb 65g/L, WBC $3.0 \times 10^9/L$ 分类见原幼细胞 30%, Plt $35 \times 10^9/L$ 。骨髓检查原始细胞 80%, POX 染色部分呈弱阳性非特异性酯酶染色阳性, NaF 可抑制。该例急性白血病最可能的 FAB 分型是

- A. M1 型
- B. M2 型
- C. M3 型
- D. M4 型
- E. M5 型

91. 患者, 男, 14 岁。左膝关节肿胀 3 天, 自幼外伤后易出血不止。查体: 皮肤、黏膜未见出血及紫癜, 出血时间 2 分, 凝血时间 30 分, 凝血酶原时间正常。父亲也有类似病史。该患者所患疾病分类应为

- A. 纤维蛋白生成障碍
- B. 凝血酶生成障碍
- C. 血小板异常
- D. 凝血活酶生成障碍
- E. 血管壁功能异常

92. 患者, 男, 50 岁。发生严重车祸, 撞伤左小腿, 创口出血, 骨折端戳出伤口。现场紧急处理时不正确的是

- A. 包扎伤口
- B. 妥善地外固定
- C. 首先抢救生命
- D. 外露的骨折端立即复位
- E. 迅速运往医院

93. 小李儿子手术需要输血, 小李想献血。已知小李为 A 型血, 经交叉配血试验, 主侧不凝集而次侧凝集, 则小李儿子的血型应为

- A. A 型
- B. B 型
- C. AB 型
- D. O 型
- E. A 型或 B 型

94. 患者, 女, 70 岁, 因高血压、冠心病口服阿司匹林、卡托普利、普萘洛尔、硝苯地平、辛伐他汀等药物治疗, 用药过程中感觉四肢无力、肌肉酸痛、下肢肌肉疼痛, 血磷酸肌酸激酶水平明显增高。出现上述异常最可能的原因是

- A. 下肢深静脉血栓形成
- B. 下肢动脉粥样硬化
- C. 普萘洛尔的副作用
- D. 卡托普利的副作用
- E. 辛伐他汀的副作用

95. 患者, 男, 50 岁。间歇性水肿 20 年, 恶心呕吐 2 周, 血压 150/100mmHg, Hb 80g/L。尿蛋白(++)蜡样管型(+), 血 BUN 40mmol/L, SCr 760umol/L, 血钾 5.5mmol/L。最适宜的首选治疗方法是

- A. 降压治疗
- B. 利尿剂
- C. 纠正贫血
- D. 禁食疗法
- E. 血液透析

96. 患者, 女, 24 岁。服务业人员, 未婚, 不否认有性交行为, 半月前躯干, 四肢, 双手掌跖出现红斑, 无痒痛感觉, 查躯干, 四肢可见玫瑰色椭圆形斑疹, 对称分布, 掌跖部可见黄豆大小铜红色领圈样脱屑, 患者最大可能是

- A. 玫瑰糠疹
- B. 梅毒
- C. 红斑狼疮
- D. 麻疹
- E. 结节性红斑

97. 患者, 女, 28 岁。月经量多 1 年, 近 10 日经常鼻出血, 脾肋下未及。血红蛋白 90g/L, 白细胞 $10 \times 10^9/L$, 血小板 $30 \times 10^9/L$ 。骨髓检查: 粒红细胞系增生旺盛, 巨核细胞增多, 伴成

2021 年临床执业历年真题

障碍，应诊断为

- A. 特发性血小板减少性紫癜
- B. 血友病
- C. 过敏性紫癜
- D. 弥散性血管内凝血
- E. 血小板增多

98. 患者，男，80岁。体重45kg。因胃癌需要手术治疗。脉搏100次/分，血压140/95mmHg；Hb 60g/L，血小板 $90 \times 10^9/L$ ，医生决定给予输血。此时应该选用

- A. 新鲜全血
- B. 浓缩红细胞
- C. 红细胞悬液
- D. 浓缩红细胞和血浆
- E. 红细胞悬液和血浆

99. 患者，女，24岁。头晕、乏力伴月经量增多1年。既往体健。查体：下肢皮肤瘀点肝脾肋下未触及。血常规：Hb 60g/L，WBC $2.8 \times 10^9/L$ ，PLT $38 \times 10^9/L$ ，网织红细胞0.001。胸骨骨髓细胞学检查：骨髓增生活跃，未见巨核细胞。最可能的诊断是

- A. 特发性血小板减少性紫癜
- B. 再生障碍性贫血三系均减少
- C. 阵发性睡眠性血红蛋白尿
- D. 慢性失血性贫血
- E. 骨髓增生异常综合征

100. 患者，女，40岁。因宫颈癌接受化疗，近3天来常发生牙龈出血，血小板计数 $20 \times 10^9/L$ ，遂给予血小板输注，输注后20分钟，患者突然寒战、发热、恶心，体温 $39.5^\circ C$ ，尿色正常。该患者很可能发生的输血不良反应是

- A. 非溶血性发热性输血反应
- B. 溶血性输血反应
- C. 过敏反应
- D. 出血
- E. 循环超负荷

101. 患者，男，15岁。贫血伴尿色黄5年，未诊治。其弟弟有类似表现。查体：巩膜轻度黄染，脾肋下2cm。实验室检查：Hb 70g/L，MCV 70f1，MCHC 29%，网织红细胞0.09 尿胆红素(-)，尿胆原强阳性。最有帮助的检查是

- A. 酸溶血试验
- B. 自体溶血试验
- C. Coombs 试验
- D. 血红蛋白电泳
- E. 血沉

102. 患者，女40岁。闭经溢乳半年，磁共振发现垂体 $1.5cm \times 1.0cm$ 占位病变，需做激素检查。下列无助于诊断的检查是

- A. 泌乳素
- B. 生长激素
- C. 促肾上腺皮质激素
- D. 血管升压素
- E. 促甲状腺激素

103. 患者，男，44岁。身高1.62m，体重56kg，近3个月来口渴、多饮，查空腹血糖 $6.8mmol/L$ ，无糖尿病家族史。为确定有无糖尿病最有意义的实验室检查是

- A. 餐后2小时血糖
- B. 用药后测血糖
- C. 口服葡萄糖耐量试验
- D. 糖化血红蛋白
- E. 24小时尿糖定量

104. 患者，男，69岁。进行性排尿困难3年，不能自行排尿8小时，下腹胀痛。首选的治疗方法为

- A. 针灸
- B. 耻骨上膀胱穿刺
- C. 药物治疗
- D. 耻骨上膀胱造瘘
- E. 导尿并保留导尿管

105. 患者，男，5岁。突发高热寒战，体温 $39^\circ C$ ，右膝部疼痛剧烈，不敢活动，局部无明显肿胀。应首先考虑的是

- A. 风湿性关节炎
- B. 膝关节结核
- C. 骨关节炎
- D. 急性血源性骨髓炎
- E. 化脓性关节炎

106. 患者，女，52岁。急性前壁心肌梗死16小时，合并急性左心功能不全，血压170/100mmHg，治疗其心功能不全

应首选

- A. β 受体阻断药
- B. 地高辛
- C. 硝普钠
- D. 卡托普利口服
- E. 硝酸甘油

107. 患者，女，34 岁。吸烟，近 1 年来右下肢行走后疼痛，休息后好转，出现间歇性跛行。近 1 个月来，右脚趾变黑、皱缩、失去知觉。此种病变是

- A. 干酪样坏死
- B. 固缩坏死
- C. 干性坏疽
- D. 湿性坏疽
- E. 变性

108. 患者，男，50 岁。左肾结核无功能，右肾严重积水伴尿毒症，膀胱容量 20ml，宜先行

- A. 膀胱再造术
- B. 右肾造瘘术
- C. 左肾切除术
- D. 膀胱造瘘术
- E. 抗结核治疗

109. 患者，女，39 岁。腹胀、呕吐已半年，多于午后发作，吐出隔夜食物，吐量较大，吐后舒服，由于长期呕吐，除脱水外还会造成

- A. 低氯、高钾性碱中毒
- B. 低氯、低钾性碱中毒
- C. 低氯、高钾性酸中毒
- D. 低氯、低钾性酸中毒
- E. 低氯、低钾血症

110. 患者，女，20 岁，因食管烧伤 7 日入院，入院时口渴、躁狂，体重 55kg，血气分析 $\text{HCO}_3^- 6\text{mmol/L}$ ，血清钠 155mmol/L 输液时首选的是

- A. 0.9%氯化钠
- B. 0.45%氯化钠
- C. 5%碳酸氢钠
- D. 1.25%碳酸氢钠
- E. 1.86%乳酸钠

111. 女，22 岁。妊娠 30 周。出现外阴灰白色疣状物伴瘙痒、灼痛不适半个

月。外阴皮损病理组织学检查见挖空细胞。最可能的诊断是

- A. 梅毒
- B. 尖锐湿疣
- C. 淋病
- D. 细菌性阴道病
- E. 滴虫性阴道炎

112. 患者，女，28 岁。主诉尿急、尿频、尿痛 2 天，查体： $T 36.5^\circ\text{C}$ ，双肾区无叩痛，尿沉渣镜检： $\text{RBC } 5\sim 10/\text{HP}$ ， $\text{WBC } 20\sim 30/\text{HP}$ 。最可能的诊断为

- A. 急性膀胱炎
- B. 急进性肾小球肾炎
- C. 急性间质性肾炎
- D. 急性肾小球肾炎
- E. 急性肾盂肾炎

113. 患者，女，45 岁。主诉发热、腹痛、腹泻 2 小时，大便 10 余次，为脓血便，5 小时前曾在小餐馆进食。实验室检查：血 $\text{WBC } 13.0 \times 10^9/\text{L}$ ， $\text{N } 0.85$ ， $\text{L } 0.15$ 。粪便镜检： $\text{WBC } 80/\text{HP}$ ， $\text{RBC } 10/\text{HP}$ 。最可能的诊断是

- A. 急性胃肠炎
- B. 急性阑尾炎
- C. 急性病毒性腹泻
- D. 急性细菌性痢疾
- E. 食物中毒

114. 患者，女，22 岁。自述乏力、食欲减退、尿黄 10 天。近 1 个月经常在外进餐。既往无肝炎病史，无服用损害肝药物史。查体：意识清楚，巩膜轻度黄染，肝掌(-)，腹软，肝区叩痛(+)，肝脾肋下未触及。实验室检查： $\text{ALT } 2300\text{U/L}$ ， $\text{AST } 410\text{U/L}$ ， $\text{TBil } 60\mu\text{mol/L}$ ， $\text{DBil } 140\mu\text{mol/L}$ 。最可能的诊断是

- A. 自身免疫性肝炎
- B. 急性病毒性肝炎
- C. 脂肪肝
- D. 慢性肝炎急性发作
- E. 药物性肝炎

115. 患者，女，35 岁。出现心悸、消瘦 6 个月，高热、腹泻、谵语 1 天。查体： $T 40.2^\circ\text{C}$ ， $\text{BP } 90/60\text{mmHg}$ ，大汗，甲状腺 II 度肿大，可闻及血管杂音，双肺未闻及干湿性啰音， $\text{P } 200$ 次/分，

心律绝对不齐。应首先考虑的诊断是

- A. 甲状腺危象
- B. 感染性休克
- C. 甲状腺功能亢进症合并肠炎
- D. 甲亢性心脏病
- E. 急性甲状腺炎

116. 患者, 男, 5 岁。发现颜面、四肢水肿半个月。查体:BP 120/80mmHg。尿常规:蛋白(+++)。尿沉渣镜检查:RBC 20/HP。血总蛋白 40g/L, 清蛋白 25g/L。最可能的诊断是

- A. 急性肾小球肾炎
- B. 急进性肾小球肾炎
- C. 慢性肾小球肾炎
- D. 肾炎型肾病综合征
- E. 单纯型肾病综合征

B1 型选择题

(117~118 题共用备选答案)

- A. 肾淀粉样变性
- B. 紫癜性肾炎
- C. 肾病综合征
- D. 狼疮肾炎
- E. 膜性肾病

117. 青少年继发性肾炎最常见的类型是

118. 属于慢性肾炎的病理类型是

(119~120 题共用备选答案)

- A. T3、T4 降低, TSH 增高
- B. T3 降低, T4、TSH 增高
- C. T3、T4 降低, TSH 降低
- D. T3 增高, TSH 降低
- E. T3、T4、TSH 正常

119. 甲状腺功能减退的指标是

120. 单纯性甲状腺肿的血象表现是

(121~122 题共用备选答案)

- A. 骨盆骨折
 - B. 肱骨髁上骨折
 - C. 股骨颈骨折
 - D. 锁骨骨折
 - E. Colles 骨折
121. 易损伤血管且不易愈合的骨折

122. 青少年易合并血管神经损伤, 发

生外翻畸形的骨折是

(123~124 题共用备选答案)

- A. 呼吸道传播
 - B. 消化道传播
 - C. 接触传播
 - D. 虫媒传播
 - E. 血液、体液传播
123. 麻疹的传播途径是

124. 疟疾的传播途径是

(125~126 题共用备选答案)

- A. 颗粒管型
 - B. 上皮细胞管型
 - C. 红细胞管型
 - D. 脂肪管型
 - E. 白细胞管型
125. 对急性肾小球肾炎诊断有意义的尿常规检查是

126. 对急性肾盂肾炎诊断有意义的尿常规检查是

(127~128 题共用备选答案)

- A. 恶化型心绞痛
 - B. ST 段抬高型心肌梗死
 - C. 非 ST 段抬高型心肌梗死
 - D. 初发型心绞痛
 - E. 变异型心绞痛
127. 需要紧急溶栓的是

128. 急性冠脉综合征同等体力活动下心脏症状发作时间延长, 属于

A3/A4 型选择题

(129~130 题共用题干)

女, 19 岁。发热 1 周伴食欲减退。查体:T 39.6°C, 脉搏 74 次/分, 神志清楚, 表情淡漠腹部可见红色斑丘疹, 肝肋下 2cm, 脾肋下 1cm。外周血白细胞 $2.6 \times 10^9/L$ 。

129. 首先应考虑诊断是

- A. 伤寒
- B. 疟疾
- C. 斑疹伤寒
- D. 肾综合征出血热
- E. 败血症

2021 年临床执业历年真题

130. 为明确诊断最有意义的检查是

- A. 粪便培养
- B. 外斐反应
- C. 肥达反应
- D. 血涂片查疟原虫
- E. 血培养

(131~133 题共用题干)

女, 42 岁。系统性红斑狼疮患者, 长期服用糖皮质激素。半年来, 右侧髋部出现进行性疼痛, 呈跛行。查白细胞正常, X 线显示髋关节形态好、间隙正常。

131. 最有价值的辅助检查是

- A. MRI
- B. B 超
- C. 关节液检查
- D. 结核菌素试验
- E. CT

132. 患者考虑诊断为

- A. 股骨头缺血性坏死
- B. 髋关节结核
- C. 类风湿关节炎
- D. 强直性脊柱炎
- E. 髋关节骨关节炎

133. 该患者最适宜的治疗措施是

- A. 口服糖皮质激素
- B. 髋关节融合
- C. 髓芯减压术
- D. 关节镜下滑膜切除
- E. 理疗、避免负重

(134~136 题共用题干)

男, 25 岁。5 天来出现发热、头痛、眼眶痛。与啮齿类动物有接触史。查体: 面部潮红, 结膜充血, 胸背部皮肤有大小不等的出血点。尿常规: 尿蛋白(+++)。

134. 该患者的诊断可能为

- A. 流行性脑脊髓膜炎
- B. 斑疹伤寒
- C. 肾综合征出血热
- D. 钩端螺旋体病
- E. 败血症

135. 为明确诊断, 首选的检查是

- A. 肥达-外斐试验

- B. 尿培养
- C. 血清特异性抗体检测
- D. 血常规
- E. 咽拭子培养

136. 病原治疗首选的药物为

- A. 四环素
- B. 环丙沙星
- C. 利巴韦林
- D. 金刚烷胺
- E. 青霉素

(137~138 题共用题干)

患者, 男, 7 岁。近期剧烈运动后气短、乏力。查体: 心前区未触及震颤胸骨左缘第 2 肋间闻及 3/6 级收缩期喷射性杂音, P2 增强, 固定分裂。

137. 最可能的诊断是

- A. 动脉导管未闭
- B. 单纯肺动脉瓣狭窄
- C. 房间隔缺损
- D. 中型室间隔缺损
- E. 小型室间隔缺损

138. 明确诊断首选的检查是

- A. 心功能检查
- B. 超声心动图
- C. 磁共振成像
- D. 心导管检查
- E. 心电图

(139~140 题共用题干)

男, 40 岁。夜尿增多 1 年余。偶有双下肢水肿。查体: BP 150/110mmHg, 尿蛋白(+), 血肌酐 $180 \mu\text{mol/L}$ 。

139. 最可能的诊断是

- A. 急性肾小球肾炎
- B. 慢性肾小球肾炎
- C. 肾病综合征
- D. 急进性肾小球肾炎
- E. 高血压肾损害

140. 该患者应首选的降压药物是

- A. 袢利尿剂
- B. 血管紧张素转换酶抑制剂
- C. 钙通道阻滞剂
- D. β 受体拮抗剂
- E. α 受体拮抗剂

2021 年临床执业历年真题

(141~143 题共用题干)

男, 40 岁。反复发热半个月。查体:T 38.5℃, 双侧颈部及右侧腹股沟区可触及数个肿大淋巴结, 最大为 2cm×2cm, 活动, 无压痛。腹软, 肝、脾肋下未触及。淋巴结活检找到 R-S 细胞。胸部 CT 显示右侧胸腔积液, 穿刺胸水见大量淋巴瘤细胞。

141. 该患者首选的化疗方案为

- A. ABVD 方案
- B. CHOP 方案
- C. COP 方案
- D. HA 方案
- E. DVLP 方案

142. 该患者的临床分期为

- A. IIIB
- B. IVB
- C. IVA
- D. IIB
- E. IIIA

143. 患者最可能的诊断是

- A. 霍奇金淋巴瘤
- B. 淋巴结转移癌
- C. 非霍奇金淋巴瘤
- D. 急性淋巴细胞白血病
- E. 急性粒细胞白血病

(144~146 题共用题干)

男, 26 岁。坐位乘车时, 急刹车后右膝前方受到撞击, 出现髋关节剧痛, 髋关节运动障碍, 处于屈曲、内收、内旋畸形状态。

144. 患者应诊断为

- A. 股骨颈骨折
- B. 股骨粗隆间骨折
- C. 股骨粗隆下骨折
- D. 髋关节后脱位
- E. 髋关节前脱位

145. 应选择哪种治疗方法

- A. Hippocrates 法
- B. Kocher 法
- C. Allis 法
- D. 骨牵引
- E. 皮牵引

146. 可能合并的损伤是

- A. 坐骨神经
- B. 股神经
- C. 闭孔神经
- D. 胫神经
- E. 腓总神经

(147~148 题共用题干)

患者, 男, 35 岁。腹泻 10 余次, 水样便伴恶心、呕吐, 无腹痛、发热。查体:T 36.1℃, P 110 次分, BP 75/50mmHg。精神萎靡, 烦躁, 皮肤弹性差, 腹软, 无压痛, 肠鸣音亢进。粪动力试验阳性。

147. 该患者最有可能的诊断是

- A. 霍乱
- B. 细菌性痢疾
- C. 细菌性食物中毒
- D. 急性胃肠炎
- E. 胃肠型感冒

148. 该患最适合的治疗措施是

- A. 静脉点滴抗生素
- B. 静脉点滴碳酸氢钠
- C. 静脉补充电解质和液体
- D. 口服补液盐
- E. 口服止泻药

(149~150 题共用题干)

女, 57 岁。晚餐进食后突发呕血 3 小时, 呕吐物为鲜红色, 量约 500ml。既往有乙肝病史 10 年。查体:T 36.5℃, P 100 次/分, R 20 次/分, BP 110/70mmHg。皮肤未见出血点, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿啰音, 心律齐, 腹软, 无压痛。

149. 该患者发生呕血最可能的原因是

- A. 胃溃疡大出血
- B. 十二指肠溃疡大出血
- C. 急性胆道大出血
- D. 食管胃底曲张静脉破裂
- E. 急性糜烂性胃炎

150. 患者拟接受手术止血, 最主要的处置是

- A. 结扎切断胃底贲门周围血管
- B. 结扎切断胃十二指肠血管
- C. 结扎切断右及左胃网膜血管
- D. 结扎切断胃左及胃右动脉
- E. 缝合结扎食管旁曲张静脉

第三单元

A1/A2 型选择题

1. 诊断浅部脓肿的主要依据是

- A. 局部红肿
- B. 病变区发热, 有明显触痛
- C. 病变区有波动感
- D. CT 值低于周边
- E. B 超检查呈低回声

2. 成人每日消化道出血多少毫升出现黑粪

- A. 5ml
- B. 20ml
- C. 30ml
- D. 40ml
- E. 50ml

3. 对诊断肾结核最有意义的是

- A. PET
- B. 尿路平片
- C. B 超
- D. 静脉尿路造影
- E. 膀胱镜检

4. 急性糜烂出血性胃炎的常见病因不包括

- A. 幽门螺杆菌感染
- B. 脑外伤
- C. 乙醇
- D. 非甾体抗炎药
- E. 严重烧伤

5. 关于颅底骨折, 下列说法的错误是

- A. 形态多为线性骨折
- B. 根据部位可分为三型
- C. 若伤及颈动脉, 形成海绵窦瘘
- D. 可表现为中枢性面瘫
- E. X 线片仅显示为 30%~50%的骨折线

6. 类风湿关节炎最常见的关节外表现是

- A. 肺间质纤维化
- B. 类风湿结节
- C. 心包炎
- D. 脾肿大
- E. 血管炎

7. 不属于肠外营养成分的是

- A. 白蛋白
- B. 葡萄糖
- C. 水
- D. 二氧化碳
- E. 脂肪乳

8. 下列关于腹膜解剖生理的描述, 错误的是

- A. 由间皮细胞构成
- B. 是双向性半透膜
- C. 可分泌淋巴细胞及巨噬细胞
- D. 受交感神经和迷走神经支配
- E. 腹膜腔是人体最大的体腔

9. 下列有关手术前的准备, 错误的是

- A. 术前服用口服降糖药的, 改用胰岛素
- B. 术前血压 160mmHg 以下的不需降压
- C. 术前吸烟 30 年, 每天 10 根, 术前一天戒烟
- D. 术前停用阿司匹林
- E. 术前使用胰岛素的, 手术日晨停用

10. 一患者吸氧流量为 1.5L/min, 相当于多少氧浓度

- A. 37%
- B. 25%
- C. 33%
- D. 27%
- E. 30%

11. 下列检查结果中, 对诊断痰菌阴性肺结核意义最大的是

- A. PPD 试验阳性
- B. 典型的胸部 X 线表现
- C. 血结核抗体阳性
- D. 痰结核杆菌 PCR 阳性
- E. 血 ADA(腺苷脱氨酶)水平增高

12. 躯体疾病所致的精神障碍的处理原则以下哪项不对

- A. 首先必须治疗引起精神障碍的原发躯体疾病
- B. 支持疗法包括维持水电解质平衡、充足的营养供应等
- C. 护理包括安静、安全的环境和防止意外发生等
- D. 对精神症状的控制应遵从大剂量、足疗程的原则

E. 要考虑治疗药物对患者的副作用

13. 诊断肝癌首选的影像学检查的是

- A. CT
- B. MRI
- C. 血管造影
- D. 放射性核素肝扫描
- E. 腹部 B 超

14. 一氧化碳中毒时, 防止中毒性迟发性脑病最重要的手段是

- A. 静脉注射地塞米松
- B. 高压舱氧疗
- C. 静脉注射甘露醇
- D. 静脉注射呋塞米
- E. 护脑药物的应用

15. 女性股疝首选的手术方式是

- A. Ferguson 法
- B. Basini 法
- C. Mcvay 法
- D. Halsted 法
- E. 疝囊高位结扎术

16. 下列关于低位性肠梗阻的描述错误的是

- A. 梗阻多位于回肠末段
- B. 腹胀及腹痛明显
- C. 呕吐物多为粪性
- D. 腹部 X 线检查可见多个阶梯状气液平面
- E. 呕吐症状出现早

17. 乳腺癌雌激素受体阳性, 治疗首选

- A. 手术治疗
- B. 化疗
- C. 放疗
- D. 靶向治疗
- E. 内分泌治疗

18. 对鉴别是否肾小球源性血尿最有意义的是

- A. 全程血尿
- B. 合并尿道刺激征
- C. 尿潜血阳性
- D. 肉眼血尿
- E. 变形红细胞血尿

19. 可见高度脾大的疾病是

- A. 结缔组织病
- B. 急性白血病
- C. 慢性溶血性贫血
- D. 慢性粒细胞白血病
- E. 急性失血

20. 肺结核的原发综合征的典型 X 线表现是

- A. 斑点状阴影
- B. 粟粒状阴影
- C. 团块状阴影
- D. 云雾状阴影
- E. 哑铃状阴影

21. 下列指标无助于肝硬化判断病情的是

- A. 肝性脑病
- B. 腹水
- C. 白蛋白
- D. 血清电解质
- E. 凝血酶原时间

22. 直肠下缘距离肛门 10cm 的菜花样肿物应行

- A. Miles 手术
- B. Dixon 手术
- C. 拉下式直肠癌切除术
- D. 局部切除术
- E. Duhamel 手术

23. 车祸伤后腹腔淀粉酶 1000U/L, 可能损伤的部位是

- A. 肝
- B. 脾
- C. 胰腺
- D. 肾
- E. 胃

24. 老年人肠道 X 线造影见“鸟嘴征”考虑哪种疾病

- A. 克罗恩病
- B. 肠套叠
- C. 小肠扭转
- D. 乙状结肠扭转
- E. 肠结核

25. 引起过敏反应的主要血液成分是

- A. 红细胞
- B. 血浆

- C. 淋巴细胞
- D. 血小板
- E. 纤维蛋白

26. 溃疡性结肠炎的 X 线钡餐特征性表现是

- A. 结肠呈铅管样
- B. 回肠末端呈线样征
- C. 回肠部呈跳跃征
- D. 盲肠充盈缺损, 肠腔狭窄
- E. 盲肠运动加速, 结肠袋加深, 张力增强

27. 肛瘘手术的关键步骤在于

- A. 广泛切除瘘管周围瘢痕组织
- B. 切除瘘管后应一期缝合
- C. 确定外口和内口的位置
- D. 必须用探针穿入肛管造成内口再切开
- E. 麻醉选择

28. 治疗血吸虫病的首选药物是

- A. 吡喹酮
- B. 甲硝唑
- C. 甲苯达唑
- D. 氯喹
- E. 酒石酸钠

29. 胰腺癌首选的影像学检查是

- A. 腹部增强 CT
- B. 超声
- C. MRI
- D. 动脉造影
- E. ERCP

30. 反复肺部感染造成肺气肿的主要机制是

- A. α -抗胰蛋白酶的活性降低
- B. 破坏小支气管壁软骨而失去支架作用
- C. 使细支气管管腔狭窄而形成不完全阻塞
- D. 肺组织供血减少致营养障碍而使肺泡壁弹性减退
- E. 使白细胞释放的蛋白分解酶增加而形成肺大疱

31. 呼吸衰竭急性加重和失代偿期的最常见诱因是

- A. 精神紧张
- B. 过度劳累
- C. 急性呼吸道感染
- D. 心包积液
- E. 呼吸道阻塞

32. 慢性支气管炎有小气道阻塞时, 最早出现的肺功能改变是

- A. 肺活量下降
- B. 残气容积增加
- C. 闭合容量减小
- D. 肺最大通气量降低
- E. 流量-容积曲线降低

33. 特发性肺纤维化的患者, 肺功能检查最具特征性的表现是

- A. FVC 降低
- B. FEV1 降低
- C. MVV 降低
- D. VC 减少
- E. RV 降低

34. 胸片易出现空洞的肺炎是

- A. 支原体肺炎
- B. 肺炎球菌肺炎
- C. 军团菌肺炎
- D. 衣原体肺炎
- E. 金黄色葡萄球菌肺炎

35. 支气管哮喘长期控制最常用的药物是

- A. 口服头孢他啶
- B. 口服地塞米松
- C. 吸入利多卡因
- D. 吸入糖皮质激素
- E. 口服阿托品

36. 引起慢性阻塞性肺疾病 (COPD) 肺动脉高压最重要的原因是

- A. 肺小动脉内膜增厚
- B. 肺小动脉原位血栓形成
- C. 肺小动脉痉挛
- D. 肺小动脉壁纤维化
- E. 肺静脉血栓

37. 急性呼吸窘迫综合征床边肺功能监测结果, 对严重性评价和疗效判断有意义的是

- A. 肺顺应性降低

- B. 无效腔通气比例增加
- C. 无呼气流速受阻
- D. VD/VT
- E. 以上都不是

38. 导致尿路感染最常见的致病菌是

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 大肠杆菌
- C. 变形杆菌
- D. 粪链球菌
- E. 沙雷杆菌

39. 位于后纵膈脊柱旁肋脊区内最常见的纵膈肿瘤是

- A. 畸胎瘤
- B. 心包囊肿
- C. 胸腺瘤
- D. 神经源性肿瘤
- E. 胸内甲状腺

40. 不能作为判断幽门螺杆菌根除的检验方法是

- A. 活组织幽门螺杆菌培养
- B. 组织学检查找幽门螺杆菌
- C. ^{13}C 尿素酶呼气试验
- D. 快速尿素酶试验
- E. 血清抗幽门螺杆菌抗体检测

41. 黄疸患者合并肿大而无触痛的胆囊时, 最可能诊断

- A. 肝癌
- B. 慢性胆囊炎、胆囊积水
- C. 胆囊颈部结石嵌顿
- D. 中下段胆管癌
- E. 胆总管下段结石

42. 关于胸膜间皮瘤所致胸腔积液的叙述正确的是

- A. 介于漏出液和渗出液之间
- B. 是渗出液
- C. 是漏出液
- D. LDH $<200\text{U}$
- E. 比重 <1.018

43. 支配阑尾的神经是交感神经腹腔丛和以下哪个神经

- A. 内脏小神经
- B. 第 10 胸神经
- C. 第 12 胸神经

- D. 内脏大神经
- E. 坐骨神经

44. 下列哪项不是我国风湿病学会诊断系统性红斑狼疮的标准

- A. 颜面红斑, 非畸形关节炎
- B. 多发性浆膜炎
- C. 肾脏病变-蛋白尿
- D. 血沉增快
- E. 白细胞 $<4 \times 10^9/\text{L}$

45. 易并发结膜炎或巩膜炎的疾病是

- A. 强直性脊柱炎
- B. 银屑病关节炎
- C. 肠病性关节炎
- D. 幼年型强直性脊柱炎
- E. 反应性关节炎

46. 有机磷中毒患者几天后出现呼吸困难和意识障碍, 最可能的原因是

- A. 急性脑卒中
- B. 有机磷中毒加重
- C. 急性有机磷中毒迟发型脑病
- D. 中间型综合征
- E. 急性有机磷中毒迟发型多发性神经病变

47. 克雷伯杆菌肺炎的 X 线表现出现叶间隙下坠, 其机制是

- A. 肺泡内的渗出液由 Cohn 孔向周围肺泡蔓延所致
- B. 病变中的炎性渗出液黏稠而重
- C. 细菌在细胞内生长繁殖, 引起组织坏死、液化形成
- D. 肺泡内的纤维蛋白渗出较多
- E. 肺泡内的渗出含有较多的红白细胞

48. 对于胃黏膜之肠化和不典型增生, 下列哪项错误

- A. 这类病变可逆
- B. 这类病变最终一般均会发展为胃癌
- C. 一些药物可能帮助其逆转
- D. 对患者要耐心解释, 消除其恐癌心理
- E. 必要时定期复查胃镜

49. 关于闭合性肾损伤, 应考虑手术治疗的是

- A. 肾实质裂伤

- B. 保守治疗观察过程中出现血尿
- C. 血尿加重伴血压下降
- D. 血尿仍存在, 但血压在上升
- E. 伤后出现腰部或腹部包块

50. 患者, 女, 28 岁。反复右下腹痛 2 年, 伴便秘、口腔溃疡、无发热及乏力。否认结核病史及结核密切接触史。查体: 右下腹可触及边界不清的包块, 可移动, 压痛阳性。最先考虑的诊断是

- A. 结肠癌
- B. 溃疡性结肠炎
- C. 细菌性痢疾
- D. 克罗恩病
- E. 阑尾炎

51. 患者, 女, 26 岁。双侧乳房周期性胀痛 3 年, 并可触及不规则包块, 伴有触痛, 月经过后疼痛缓解, 包块略缩小考虑可能是

- A. 乳腺癌
- B. 乳腺炎
- C. 乳腺纤维瘤
- D. 乳腺囊性增生病
- E. 乳管内乳头状瘤

52. 患者, 男, 20 岁。被手榴弹炸伤右侧大腿 3 小时来院。查体: 一般情况好, 生命体征平稳, 右大腿外侧有约 6cm×3cm 伤口, 深达深筋膜表面, 无活动性出血, 检查无弹片残留。正确的处理是

- A. 彻底清创后缝合伤口
- B. 不做彻底清创, 切开深筋膜减压
- C. 清洗伤口, 消毒、包扎
- D. 彻底清创后, 开放伤口引流
- E. 彻底清创后, 放置引流管、缝合伤口

53. 患者, 女, 68 岁。诊断胃癌, 血压 160/100mmHg, 中度贫血, 消瘦, 术前准备不是必要的项目是

- A. 纠正贫血
- B. 改善营养状态
- C. 检测肝功能
- D. 血压降至正常
- E. 血生化检查

54. 患者, 女, 30 岁。低热、乏力伴腹胀 3 月, 查体: 腹部膨隆, 腹壁揉面感, 有压痛和反跳痛。腹腔积液为渗出液。下列哪项检查对明确诊断最有意义

- A. 腹部 B 超
- B. 胃肠道钡剂检查
- C. 血沉
- D. 腹腔积液细菌培养
- E. 腹腔镜检查

55. 70 岁老人, 咳嗽时右侧腹股沟处可触及震动, 平卧位时消失, 按压内口疝不能突出, 腹部肿块按压深环不突出, 平卧位消失, 可能的原因是

- A. 腹股沟直疝
- B. 腹股沟斜疝
- C. 精索鞘膜积液
- D. 股疝
- E. 交通性鞘膜积液

56. 患者, 男, 45 岁。工作强度大, 心理压力常便秘, 腹痛, 便后缓解, 检查均阴性。可能的诊断是

- A. 克罗恩病
- B. 溃疡性结肠炎
- C. 肠易激综合征
- D. 吸收不良综合征
- E. 炎症性肠病

57. 患者, 男, 80 岁, 有基础疾病, 胸上段食管癌, 能改善患者生活质量的是

- A. 胃肠造瘘
- B. 放化疗
- C. 手术
- D. 气管切开
- E. 注射营养液

58. 患者, 男, 62 岁, 左胸痛 5 天, 胸闷、气促 2 天。查体双下肺呼吸音粗, 心率 108 次/分, P2>A2, 胸片示左下肺透亮度增加, 对明确诊断的首选检查是

- A. 血 D-二聚体
- B. 超声心动图
- C. 胸部高分辨 CT
- D. 心电图
- E. CT 肺动脉造影(CTPA)

59. 患者，男，28 岁，喜抽烟。左下肢间歇性跛行 2 年。既往反复静脉炎病史。查体：左脚背动脉搏动减弱。可能的原因是

- A. 动脉硬化性闭塞病
- B. 下肢静脉曲张
- C. 血栓闭塞性脉管炎
- D. 血栓性浅静脉炎
- E. 深静脉血栓形成

60. 患者，女，25 岁。低热，便秘腹泻交替 3 年，右下腹 5cm×5cm 肿块，质中等，较固定，轻压痛，最具诊断意义的检查是

- A. 血沉
- B. 血常规
- C. 结肠镜检查
- D. X 线钡剂透视
- E. 诊断性腹腔穿刺

61. 患者，男，45 岁。右下腹隐痛 4 个月，近 3 个月来乏力，消瘦，常有低热，查体：结膜苍白，右侧 5cm×3cm 肿块；化验：血红蛋白 95g/L。若检查诊断为升结肠癌，最佳手术方式是

- A. 升结肠切除术
- B. 右半结肠切除术
- C. 全结肠切除术
- D. 升结肠及部分横结肠切除术
- E. 升结肠及末段回肠切除术

62. 女性肺癌患者，胸腔镜活检胸膜腺癌，考虑肺腺癌胸膜转移，EGFR(+)，首选治疗是

- A. 靶向治疗
- B. 放疗
- C. 化疗
- D. 内分泌治疗
- E. 手术治疗

63. 某肺心病患者血气分析结果：PH 7.25，BE+1.5，氧分压 <60mmHg，二氧化碳分压 >50mmHg，可能的诊断为

- A. 代偿期酸中毒
- B. 代偿期碱中毒
- C. 失代偿期呼吸性酸中毒
- D. 失代偿期碱中毒
- E. 呼酸合并代酸

64. 患者，男，35 岁。右上腹部钝性损伤后 1 小时，查体：面色苍白，脉快，血压 70/45mmHg，腹膜刺激征明显。X 线检查发现右侧膈肌上升。诊断首先考虑

- A. 十二指肠损伤
- B. 肝破裂
- C. 脾破裂
- D. 胰腺损伤
- E. 小肠损伤

65. 患者，男，35 岁，自觉肛门部坠胀感，伴发热、里急后重。查体：肛周无明显红肿。直肠指检直肠壁左侧饱满，有波动感，诊断应考虑

- A. 直肠肛管周围脓肿
- B. 坐骨肛管间隙脓肿
- C. 骨盆直肠间隙脓肿
- D. 肛周脓肿
- E. 直肠壁内脓肿

66. 患者，女，50 岁。胸闷、气急半月，胸片示右侧大量胸腔积液，胸穿抽出淡黄色胸水约 700ml，化验结果示：LDH 900U/L，ADA 9U/L，PPD(+)。CEA 34U/ml。最可能的诊断是

- A. 化脓性胸膜炎
- B. 结核性胸膜炎
- C. 恶性胸腔积液
- D. 乳糜样胸腔积液
- E. 结缔组织疾病

67. 患者，男，50 岁。从事烧烤店工作，反复咳嗽咳痰 10 年，发作时可自行好转，抗生素无效。查体：双肺可闻及散在哮鸣音，胸部 X 线片示双肺纹理增粗，该患者首先应考虑的诊断是

- A. 过敏性肺炎
- B. 支气管哮喘
- C. 支气管扩张
- D. 慢性阻塞性肺病
- E. 肺曲菌病

68. 患者，男，48 岁。突发呕血 300ml，黑便 200g 急诊入院，急诊胃镜检查发现十二指肠溃疡出血，伴血管外露，此时最合适的治疗是

- A. 内镜下止血
- B. PPI

- C. 血管断离术
- D. 补液、输血
- E. 应用氨甲环酸

69. 患者，女，30 岁。肛周及外生殖器丘疹、乳头状赘生物，醋酸白试验阳性。最可能感染的病原体是

- A. 疱疹病毒
- B. 沙眼衣原体
- C. 人免疫缺陷病病毒
- D. 苍白密螺旋体
- E. 人乳头瘤病毒

70. 男性患者，既往溃疡病史，近日出现刺激性咳嗽，行胃镜检查未见异常，下一步治疗首选

- A. X 线钡餐检查
- B. 胃液酸碱度测定
- C. 24 小时食管 PH 监测
- D. 胸部 CT
- E. 腹部 B 超

71. 患者，男，50 岁。反复发作右上腹绞痛 10 年，无寒战发热，发作时检查右上腹有压痛。Murphy 征(+)，B 超检查显示胆囊壁增厚大 0.5cm，囊内见高回声区，2cm×1.5cm 大小，其后伴声影。诊断为胆囊结石，此患者首选的治疗为

- A. 腹腔镜下胆囊切除术
- B. 体外震波碎石
- C. 胆总管切开
- D. T 管引流术
- E. 胆囊切开取石术

72. 患者长期胃肠减压，严格低盐饮食，出现嘴角抽搐，予补充葡萄糖酸钙后未见明显改善，可能的原因是

- A. 低钙血症
- B. 低镁血症
- C. 低钠血症
- D. 低钾血症
- E. 高钙血症

73. 患者，男，慢性腹泻 5 年，大便有少量脓血。纤维结肠镜检查：直肠、乙状结肠散在小溃疡，治疗上首选

- A. 氢化可的松保留灌肠
- B. 口服强的松

- C. 口服氟派酸
- D. 口服甲硝唑
- E. 口服 SASP

74. 患者，男，40 岁。左下肢红、肿、热、痛，边界不清，压痛明显，诊断应首先考虑

- A. 急性淋巴管炎
- B. 浅静脉炎
- C. 气性坏疽
- D. 丹毒
- E. 急性蜂窝织炎

75. 只做疝囊高位结扎而不做修补术的适应症是

- A. 嵌顿疝
- B. 绞窄疝
- C. 易复性疝
- D. 难复性疝
- E. 滑动性疝

76. 患者，男，68 岁。反复咳嗽、咳白痰、喘息 2 年。今早出现咳嗽较前频繁，痰量增多可见脓痰，伴有胸闷、轻微劳动后气喘加重。查体：双肺语颤减弱、可闻及干湿啰音心界缩小。P 120 次/分，R 22 次/分。该患者最可能的诊断为

- A. 慢阻肺急性加重
- B. 支气管哮喘
- C. 支气管扩张
- D. 肺结核
- E. 肺癌

77. 患者，女，45 岁。左下肢静脉曲张 2 年，长时间站立有酸胀感。查体：左下肢静脉呈串珠样曲张局部皮肤色素沉着。Trendelenburg 试验(+)。最可能的诊断是

- A. 下肢深静脉血栓形成
- B. 原发性深静脉瓣膜功能不全
- C. 原发性下肢静脉曲张
- D. 下肢血栓性浅静脉炎
- E. 动静脉瘘

78. 转移性右下腹疼痛 4 天，体温 38℃，右下可触及 5cm×5cm 包块伴压痛、反跳痛。下列处理不合适的是

- A. 抗生素应用

- B. 可食流质饮食
- C. 中药辅助治疗
- D. 行阑尾切除术
- E. 针灸或理疗

79. 患者，男，62 岁。腹部阵发性疼痛伴腹胀，停止排气排便 2 天。既往有类似发作，但较轻。查体：P 100 次/分，BP 110/70mmHg，腹肌紧张，压痛明显，反跳痛阳性，移动性浊音阳性。最可能的诊断是

- A. 麻痹性肠梗阻
- B. 不全性粘连性肠梗阻
- C. 绞窄性肠梗阻
- D. 完全性高位肠梗阻
- E. 单纯性机械性肠梗阻

80. 患者，男，43 岁。发热、乏力、食欲减退，左下腹痛、解稀烂便后出现黏液脓血便伴有里急后重感。诊断最可能是

- A. 急性胃肠炎
- B. 急性细菌性痢疾
- C. 肠伤寒
- D. 食物中毒
- E. 肠阿米巴痢疾

81. 患者，男，21 岁。腹泻，呈黏液脓血便，大便隐血试验阳性，内镜示结肠多发腺瘤样息肉。自诉父亲曾有“肠息肉病”。该患者最适宜的治疗是

- A. 内镜下摘除息肉
- B. 经肛切除直肠息肉
- C. 行根治性结肠切除术
- D. 放射治疗
- E. 抗生素治疗

82. 患者，男，52 岁。上腹痛伴进行性黄疸 1 个月，感乏力、食欲减退，症状逐渐加重，查体：腹部膨隆，腹软，未触及包块，肠鸣音弱，血 CA19-9 和 CEA 增高。为诊断和设计手术方案，最有意义的检查方法是

- A. ERCP
- B. MRI
- C. 上消化道造影
- D. 增强 CT
- E. 腹部 B 超

83. 患者，女，59 岁。因肝硬化失代偿期入院发热，腹部膨隆，查血提示全血细胞减少，最主要的原因是

- A. 病毒感染
- B. 消化道出血
- C. 肝功能减退
- D. 脾功能亢进
- E. 肝功能亢进

84. 患者，男，64 岁。右上腹剧痛 17 天，伴发热 10 天。乙肝病史 20 年，慢性支气管炎病史 8 年。查体：体温 38.3℃，慢性病容颈静脉无怒张，双肺呼吸音减弱，未闻及湿啰音，腹膨隆，肝右肋下 4cm，双下肢凹陷性水肿。肝功能检查正常。该患者肝大最可能的原因是

- A. 右心功能不全
- B. 淋巴瘤
- C. 胆道感染
- D. 肝脓肿
- E. 胃癌

85. 患者，女，54 岁。肝硬化 20 年，腹部 B 型超声检查：腹水最大液深 18cm，化验检查：血清 Na⁺142mmol/L，K⁺6.3mmol/L，BUN 23mmol/L，血肌酐 224mmol/L。治疗措施错误的是

- A. 10%葡萄糖酸钙 20ml 缓慢静脉注射
- B. 口服螺内酯
- C. 输白蛋白
- D. 控制液体入量
- E. 葡萄糖加胰岛素静点

86. 患者，女，48 岁。进餐后突发性上腹刀割样剧痛 3 小时。全腹压痛，板状腹，肝浊音界及肠鸣音消失。X 线显示膈下新月形游离气体。既往有胃溃疡史 25 年。下列治疗中最佳的手术方式是

- A. 胃大部切除术
- B. 全胃切除
- C. 迷走神经切断加胃窦切除术
- D. 高选择性迷走神经切断术
- E. 缝合穿孔后行迷走神经切断加胃空肠吻合术

87. 患儿，男，1 岁。生后 48 小时内无胎便，之后即有顽固性便秘和腹胀。

最常见的临床疾病是

- A. 先天性肠闭锁
- B. 功能性便秘
- C. 中毒性巨结肠
- D. 肠套叠
- E. 先天性巨结肠

88. 患儿，女，3岁。持续高热、频咳4天，喘憋加重伴精神萎靡2日就诊。就诊中突发全身发作性抽搐1次。查体：体温40℃，嗜睡，呼吸58次/分，心率150次/分，双肺少量湿啰音，右下肺闻及管状呼吸音，肝肋下1cm。血常规：白细胞计数 $12.0 \times 10^9/L$ 。X线显示大小不等的片状病灶或融合性病灶，以两肺下野及右上肺多见。该患儿最有可能的诊断是

- A. 肺炎链球菌肺炎
- B. 金黄色葡萄球菌肺炎
- C. 支原体肺炎
- D. 腺病毒性肺炎
- E. 急性咽喉炎

89. 患儿，男，6岁。4天前发热、流涕、咳嗽、结膜充血、畏光，今晨发现耳后及颈部有淡红色斑丘疹，体温39℃，两颊黏膜充血。最可能的诊断是

- A. 风疹
- B. 幼儿急疹
- C. 猩红热
- D. 肠道病毒感染
- E. 麻疹

90. 患者，女，26岁，面色苍白，易疲乏，时而烦躁，食欲减退。自诉为素食主义者，近期月经量过多。检查：Hb 86g/L，RBC $3.45 \times 10^{12}/L$ 。最可能的诊断是

- A. 叶酸缺乏性贫血
- B. 再生障碍性贫血
- C. 缺铁性贫血
- D. 维生素B12缺乏性贫血
- E. 生理性贫血

91. 患者，男，36岁。重症感染患者，每天上午9~10点出现寒战、高热，已连续5天。疑有败血症，应做血培养。最佳抽血时间应在

- A. 出现寒战时
- B. 预计发生寒战及发热前
- C. 寒战后体温升至最高时
- D. 体温正常后1小时
- E. 体温正常的任何时段

92. 患者，男，50岁。胃大部切除术后3天出现阵发性腹痛、腹胀，无肛门排气生命体征平稳，最可能的原因是

- A. 吻合口炎
- B. 腹腔内血肿形成
- C. 肠系膜血管缺血性疾病
- D. 肠扭转
- E. 手术后肠蠕动功能失调

93. 患者，女，65岁。颈后部皮肤红肿7天。初起时为小片皮肤硬肿，约3cm×2cm，有多个脓点，随后皮肤肿胀范围增大，出现浸润性水肿，局部疼痛加重表面皮肤呈青紫褐色，范围约6cm×5cm，T38.9℃，来院就诊，拟手术治疗，不正确的处理方法是

- A. 清除化脓或失活的组织
- B. 切口线应超过病变边缘
- C. 不可一期缝合切口
- D. 切口内可填塞纱条
- E. 沿皮纹行一横行切口

94. 患者，男，32岁。由高处跌落，引起骨盆骨折及股骨开放性骨折，伤口大量出血，现场急救治疗首先应进行

- A. 抗休克
- B. 有伤下肢临时固定
- C. 清创缝合
- D. 加压包扎止血
- E. 给予输血

95. 患者，女，26岁，风湿性心脏病患者，现妊娠45天出现心力衰竭，其处理原则应是

- A. 立即行负压吸宫术终止妊娠
- B. 控制心力衰竭后继续妊娠
- C. 边控制心力衰竭边终止妊娠
- D. 控制心力衰竭后行负压吸宫术
- E. 控制心力衰竭后行钳刮术

96. 患者，女，28岁。妊娠37周，诊断为先兆子痫，连用硫酸镁15g/日，治疗3天，发现膝腱反射消失，血Mg

浓度 $>3.5\text{mmol/L}$ 。本例应首先选择的处理方法是

- A. 给 20%甘露醇 250ml 静脉快速静注
- B. 立即肌注冬眠合剂半量
- C. 立即停用硫酸镁, 并给 10%葡萄糖酸钙 10ml 缓慢静注
- D. 静脉滴注低分子右旋糖酐 500ml
- E. 静注呋塞米(速尿) 40mg

97. 患者, 女, 51 岁。绝经 5 年, 阴道脱出肿物, 检查宫颈及部分宫体脱出阴道口外。患者治疗采用的方式是

- A. 阴道前壁修补术
- B. Manchester 手术
- C. 阴道纵膈形成术
- D. 经阴道子宫全切及阴道前后壁修补术
- E. 子宫悬吊术

98. 患者, 男, 32 岁。多次于饮酒后关节红肿疼痛发作, 累及的关节包括第一跖趾关节、踝或膝关节。该患者最可能出现的结果是

- A. 血 HLA-27(+)
- B. 尿酸水平升高
- C. X 线片示骰骨关节炎
- D. 尿渗透压降低
- E. 关节腔穿刺液呈脓性

99. 患者, 女, 30 岁。低热伴关节肿痛 3 个月, 轻度贫血, 抗核抗体(+), 抗双链 DNA 抗体(+), 疑患系统性红斑狼疮。治疗首选的免疫抑制剂是

- A. 环磷酰胺
- B. 甲氨蝶呤
- C. 长春新碱
- D. 依木兰
- E. 地塞米松

100. 患者, 女, 22 岁。患肺结核 6 年, 近 2 个月来低热, 咳嗽, 痰中带血。1 小时前突然咯血不止急诊入院。治疗应首选

- A. 抗结核治疗
- B. 输液
- C. 氧气吸入
- D. 镇咳剂
- E. 垂体后叶素

101. 患者, 男, 48 岁。因意识不清、话多零乱、看见鬼怪入院, 询问病史得知有长期饮酒史。患者可能属于

- A. 酒精毒性幻想症
- B. 酒精中毒性痴呆
- C. 酒精中毒性情感障碍
- D. 精神分裂症
- E. 情感性精神障碍

102. 患者, 男, 35 岁。车祸头部外伤, 昏迷 30 分钟后清醒。查体: 神志清楚右颞头皮血肿神经系统检查无阳性发现。入院观察, 5 小时后又转入昏迷, 伴右侧瞳孔逐渐散大, 左侧肢体瘫痪。临床诊断首先考虑是

- A. 急性硬脑膜下积液
- B. 脊髓横断
- C. 脑水肿
- D. 脑挫伤
- E. 急性硬脑膜外血肿

103. 患者, 男, 34 岁。患伤寒经治疗后体温渐降, 但未降至正常, 此后体温再次升高, 血培养阳性, 属于

- A. 复发
- B. 再燃
- C. 重复感染
- D. 混合感染
- E. 继发感染

104. 患者, 男, 65 岁。因呼吸困难、下肢水肿 2 周就诊。既往 COPD 病史 15 年。经检查确定诊断为 COPD, 慢性肺源性心脏病、心功能失代偿期。该患者体格检查时最不可能的体征是

- A. 脾脏肿大
- B. 肝颈静脉回流征(+)
- C. 三尖瓣区收缩期杂音
- D. 腹部移动性浊音(+)
- E. 颈静脉怒张

105. 患者, 男, 40 岁。因发热、右侧胸痛、咳嗽 4 天入院。查体: $T39.5^{\circ}\text{C}$, 右锁骨下可闻及支气管呼吸音。该患者右上肺叩诊音可能出现

- A. 清音
- B. 浊音
- C. 实音
- D. 鼓音

E. 过清音

106. 患者，男，67 岁，有吸烟史。有慢性阻塞性肺疾病病史 30 余年，家属发现患者呼之不应半小时急送医院。查体：血压 150/50mmHg，浅昏迷状，球结膜水肿，双肺可闻及干、湿啰音，A2 < P2，下肢水肿。为明确诊断首选的检查是

- A. 动脉血气分析
- B. 胸部 X 线片
- C. 心脏超声波
- D. 动态心电图
- E. 肺功能

107. 患者，男，56 岁。间断咳嗽、咳痰 3 年余。偶有痰中带血，经反复抗感染治疗效果欠佳，下肺纹理呈垂柳样改变。该患者最可能的诊断是

- A. 克雷伯杆菌肺炎
- B. 支气管扩张
- C. 支气管炎
- D. 干酪性肺炎
- E. 肺结核

108. 患者，男，55 岁。咳嗽伴声音嘶哑 4 个月，右锁骨上窝触及一个肿大的淋巴结，质硬无压痛。诊断是

- A. 喉炎
- B. 肺癌
- C. 胃癌
- D. 肺炎
- E. 肺不张

109. 患者，男，72 岁。咳嗽、咳痰 30 年，加重伴气短 10 天。查体：神志清楚，口唇发绀桶状胸，双肺闻及少许干、湿性啰音。胸部 X 线片示双肺纹理增粗、紊乱。血气分析示：PaO₂ 55mmHg，PaCO₂ 39mmHg。该患者发生呼吸衰竭的机制是

- A. 肺内分流
- B. 弥散功能障碍
- C. 肺通气不足
- D. 氧耗量增加
- E. 通气/血流比例失调

110. 患者，男，20 岁。体型瘦高，活动时突感右胸部撕裂样痛。查体：大汗

淋漓惊恐状气促，气管左偏，叩诊右胸空瓮音，右侧呼吸音消失。该患者最可能的诊断为

- A. 大叶性肺炎
- B. 胸腔积液
- C. 干性胸膜炎
- D. 右侧张力性气胸
- E. 肺癌

111. 患儿，女，5 岁，自幼体弱。查体：心前区稍隆起，未触及震颤，胸骨左缘第二肋间闻及 3/6 级收缩期杂音，P2 亢进，固定分裂。应考虑为

- A. 肺动脉瓣狭窄
- B. 室间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 房间隔缺损
- E. 生理性杂音

112. 患者，男，38 岁，马车翻车时砸伤下腹部。查体：耻骨联合处压痛，挤压试验阳性，膀胱胀满，橡皮导管插入一定深度未引出尿液，导管尖端见血迹。此时应考虑

- A. 导尿管插入深度不足
- B. 导尿管插入方法不对
- C. 导尿管阻塞
- D. 骨盆骨折并尿道断裂
- E. 骨盆骨折合并膀胱损伤

113. 患者女，33 岁。尿频、尿急、尿痛 2 年。尿常规检查示白细胞 30~50/HP 红细胞 15~25/HP。排泄性尿路造影显示右肾区散在小片状高密度阴影，右肾不显影，左肾中度积水，造影片上膀胱如乒乓球大小。应怀疑

- A. 右肾结核
- B. 左肾结核
- C. 双肾结核
- D. 右肾、膀胱结核
- E. 右肾多发结石+左输尿管结石

114. 患者，男，60 岁。左上肢摔伤，急诊来院。X 线摄片显示肱骨干横骨折，并有移位，经手法复位不理想，后改为牵引治疗，又经 X 线摄片见骨折端有分离。其最可能的后果是

- A. 桡神经损伤
- B. 肩关节强直

- C. 肘关节强直
- D. 损伤性骨化
- E. 骨折不愈合

115. 患者, 男, 5 岁。突发高热寒战, 体温 39°C, 右膝部疼痛剧烈, 不敢活动, 局部无明显肿胀。应首先考虑的是

- A. 风湿性关节炎
- B. 膝关节结核
- C. 骨关节炎
- D. 急性血源性骨髓炎
- E. 化脓性关节炎

116. 患者, 女, 65 岁。胆结石术后 8 天突发呼吸困难 2 小时, 有 COPD 史 20 余年。查体: 血压 110/80mmHg, 端坐呼吸, 烦躁不安, 大汗, 口唇发绀, 双肺可闻及少量干、湿啰音, 心率 130 次/分。该患者呼吸困难最可能的原因是并发

- A. 急性呼吸窘迫综合征
- B. 继发肺部感染
- C. 急性左心衰竭
- D. 自发性气胸
- E. 右心衰竭

117. 患者, 女, 31 岁。2 年前因胃出血行胃大部切除术, 近 1 年半来头晕、乏力, 面色逐渐苍白, 平时月经量稍多。检查: Hb 76g/L, RBC $3.1 \times 10^{12}/L$, WBC $5.3 \times 10^9/L$, 网织红细胞 0.015。在进行体格检查时, 不可能出现的体征是

- A. 皮肤干燥, 毛发干燥易脱落
- B. 步态不稳, 深感觉减退
- C. 口腔炎, 舌乳头萎缩
- D. 指甲变脆变平或匙状甲
- E. 心尖部收缩期吹风样杂音

118. 患者, 男, 55 岁。乙型肝炎病史 30 余年。3 小时前进食烧饼后突然出现呕血, 量约 1000ml。查体未发现全身皮肤、黏膜黄染和腹水。如果该患者需要接受急诊手术最佳手术方式是

- A. 经颈静脉肝内门体分流术
- B. 非选择性门体分流术
- C. 选择性门体分流术
- D. 贲门周围血管离断术

E. 脾切除术

119. 患者, 女, 35 岁。择期经上腹正中切口行胃大部切除术, 并置切口内乳胶片引流。一般拔除引流片的时间为术后

- A. 2 周
- B. 7~8 天
- C. 5~6 天
- D. 3~4 天
- E. 1~2 天

120. 患者, 女, 35 岁。择期经上腹正中切口行胃大部切除术, 并置切口内乳胶片引流。正常情况下, 该患者拆线时间应为术后

- A. 2 周
- B. 10~12 天
- C. 7~9 天
- D. 5~6 天
- E. 3~4 天

121. 患者, 女, 31 岁。咳嗽, 咳脓痰、间断咯血 10 年, 近 5 天来受凉后咳痰加剧伴咯血, 查体: T37°C, 左下肺闻及湿啰音, 血 WBC $13 \times 10^9/L$, N 0.85, Hb 101g/L, 痰培养示铜绿假单胞菌生长。该患者最可能的诊断是

- A. 先天性肺囊肿
- B. 大叶性肺炎
- C. 支气管扩张
- D. 肺脓肿
- E. 慢性支气管炎

122. 患者, 女, 31 岁。咳嗽, 咳脓痰、间断咯血 10 年, 近 5 天来受凉后咳痰加剧伴咯血, 查体: T37°C, 左下肺闻及湿啰音, 血 WBC $13 \times 10^9/L$, N 0.85, Hb 101g/L, 痰培养示铜绿假单胞菌生长。该患者抗感染治疗首选的抗生素是

- A. 头孢曲松
- B. 氨苄西林
- C. 头孢他啶
- D. 青霉素
- E. 阿米卡星

123. 患者, 女, 66 岁。反复上腹胀痛 2 年, 进食后呕吐 2 个月, 呕吐物含有

宿食。查体:贫血貌消瘦,上腹可见胃型,可闻及振水音。最有价值的辅助检查是

- A. B 超
- B. 腹部 CT
- C. 纤维胃镜
- D. 腹部 X 线平片
- E. MRI

124. 患者,女,66 岁。反复上腹胀痛 2 年,进食后呕吐 2 个月,呕吐物含有宿食。查体:贫血貌,消瘦,上腹可见胃型,可闻及振水音。患者最早出现的酸碱失衡和水、电解质紊乱的类型是

- A. 低钾血症、代谢性碱中毒
- B. 高钾血症、代谢性酸中毒
- C. 高钾血症、代谢性碱中毒
- D. 低钾血症、代谢性酸中毒
- E. 低氯血症、代谢性酸中毒

B1 型选择题

(125~126 题共用备选答案)

- A. 阿奇霉素
- B. 第三代头孢菌素
- C. 青霉素
- D. 红霉素
- E. 氯霉素

125. 孕妇感染沙眼衣原体首选的药物治疗是

126. 孕妇感染梅毒,首选治疗

(127~128 题共用备选答案)

- A. 苍白螺旋体
- B. 人乳头瘤病毒
- C. 沙眼衣原体
- D. 解脲支原体
- E. 人免疫缺陷病毒

127. 孕妇感染后首选青霉素治疗的病原体是

128. 孕妇感染后首选阿奇霉素治疗的病原体是

(129~132 题共用备选答案)

- A. 肛瘘
- B. 肛裂
- C. 内痔

- D. 直肠癌
- E. 直肠息肉

129. 长期便秘,大便干燥、带血,考虑

130. 直肠指检肛门条索状肿物,考虑

131. 直肠指诊摸到不平质硬肿物,指套上有脓血与黏液,应考虑

132. 直肠指检触及表面光滑且圆软的可推动肿物,应考虑

(133~134 题共用备选答案)

- A. 抑制细菌,减少氨气形成
- B. 促进氨的代谢
- C. 维持氨的平衡
- D. 减少假性神经递质产生
- E. 减少氨的吸收

133. 使用甲硝唑治疗肝性脑病的机制是

134. 使用天冬氨酸鸟氨酸治疗肝性脑病的机制是

(135~136 题共用备选答案)

- A. 咯血颜色鲜红
- B. 铁锈色血痰
- C. 砖红色胶冻样黏痰
- D. 粉红色乳样痰
- E. 粉红色浆液性泡沫样痰

135. 肺炎球菌肺炎

136. 左心衰竭肺水肿

A3/A4 型选择题

(137~138 题共用题干)

患者,女,65 岁。反复不规律上腹部胀痛 3 年,胃镜诊断为萎缩性胃炎。

137. 判断该患者炎症活动的客观依据是

- A. 胃黏膜肠上皮化生
- B. 胃黏膜出血
- C. 胃黏膜内中性粒细胞增多
- D. 胃黏膜中增多的主要是淋巴细胞
- E. 胃黏膜纤维组织增生

138. 该患者如考虑为 A 型胃炎,正确的是

- A. 壁细胞抗体阴性
- B. 胃酸升高
- C. 不出现厌食、体重下降
- D. 不出现恶性贫血
- E. 主要位于胃体部

(139~140 题共用题干)

患者，男，64 岁。反复发作上腹部疼痛 4 年，近 2 天上腹绞痛伴发热、寒战，皮肤巩膜黄染。

139. 该病最可能的原因是

- A. 肿瘤
- B. 结石
- C. 蛔虫
- D. 炎性狭窄
- E. 炎症

140. 若患者出现神志淡漠、嗜睡、血压 90/50mmHg，最有效的治疗措施是

- A. 纠正水、电解质和酸碱平衡紊乱
- B. 给予有效足量抗生素
- C. 应用肾上腺皮质激素
- D. 紧急手术解除胆道梗阻并减压
- E. 继续观察

(141~142 题共用题干)

患者，男，41 岁。上腹疼痛 7 小时。伴发热，体温 38.5℃，频繁呕吐。查体发现上腹部肌紧张，压痛，无移动性浊音。血白细胞 $15 \times 10^9/L$ 。X 线检查：膈下未见游离气体。

141. 如果患者治疗期间出现上腹部包块，首先考虑的诊断是

- A. 腹膜转移癌
- B. 粘连性肠梗阻
- C. 胰腺假性囊肿
- D. 胰腺癌
- E. 结肠癌

142. 该患者治疗最重要的措施是

- A. 急诊手术
- B. 禁食和胃肠减压
- C. 腹腔穿刺引流
- D. 腹腔镜切除胆囊
- E. 应用大量广谱抗生素

(143~144 题共用题干)

患者，男，45 岁。反酸、烧心 2 个月，站立时症状减轻，卧位、弯腰时加重。

143. 首先考虑的诊断是

- A. 消化性溃疡
- B. 胃食管反流病
- C. 食管癌
- D. 食管贲门失弛缓症
- E. 食管裂孔疝

144. 造成该病的主要发病机制不包括

- A. 食管酸廓清能力下降
- B. 下食管括约肌压力降低
- C. 胃排空异常
- D. 夜间胃酸分泌过多
- E. 异常的下食管括约肌一过性松弛

(145~146 题共用题干)

患者，男，24 岁。右手拇指针刺伤，当时未予特殊处理。2 天后出现拇指红肿、剧痛，伴发热。

145. 可能的原因是

- A. 化脓性骨髓炎
- B. 化脓性指头炎
- C. 甲沟炎
- D. 化脓性腱鞘炎
- E. 急性静脉炎

146. 正确的处理方法是

- A. 继续观察
- B. 应用抗生素
- C. 脓肿切开引流
- D. 热盐水浸泡患指
- E. 理疗

(147~148 题共用题干)

某患儿，男，10 岁，因发热 2 天就诊。家住平房蚊子多，周围有类似患者。查体：体温 39℃，心率 120 次/分，血压 140/90mmHg。皮肤无瘀斑、瘀点。脑膜刺激征阳性。实验室检查：血白细胞 $17 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞 0.8。

147. 该患儿最可能的诊断是

- A. 流行性乙型脑炎
- B. 流行性脑脊髓膜炎
- C. 钩端螺旋体病
- D. 结核性腹膜炎
- E. 肾综合征出血热

148. 确诊首选检查是

- A. 补体结合试验
- B. 冷凝集试验

- C. 中和试验
- D. 特异性 IgM 抗体检测
- E. 脑脊液检查

(149~150 题共用题干)

患者女, 45 岁。体重 50kg, 包括臀在内双下肢全部烫伤。查体: 臀部及双下肢有小水泡, 疼痛不明。

149. 该患者属于几度烧伤

- A. 深 II 度烧伤
- B. 浅 II 度烧伤
- C. I 度烧伤
- D. III 度烧伤
- E. 浅 III 度烧伤

150. 患者, 女, 45 岁。体重 50kg, 包括臀在内双下肢全部烫伤。查体: 臀部及双下肢有小水泡, 疼痛不明。第一个 24 小时的补液量是

- A. 5450ml
- B. 5750ml
- C. 3750ml
- D. 3450ml
- E. 6750ml

第四单元

A1/A2 型选择题

1. 早期妊娠最具有特异性的症状是

- A. 停经
- B. 早孕反应
- C. 乳房增大
- D. 子宫增大
- E. 黑加征

2. 可以出现双胎输血综合征的是

- A. 双绒毛膜双羊膜囊双胎
- B. 单绒毛膜双羊膜囊双胎
- C. 双绒毛膜单羊膜囊双胎
- D. 单绒毛膜单羊膜囊双胎
- E. 联体双胎

3. 早期流产最常见的因素是

- A. 胚胎因素(染色体异常)
- B. 母体因素
- C. 父亲因素
- D. 环境因素
- E. 免疫因素

4. 某哮喘急性发作患儿, 吸入沙丁胺醇后症状缓解, 下一步错误的治疗是

- A. 继续吸入沙丁胺醇
- B. 规律吸入糖皮质激素
- C. 静脉注射氨茶碱
- D. 避免过敏原
- E. 适量运动

5. 小儿死亡率最高的时期是

- A. 婴儿期
- B. 幼儿期
- C. 学龄前期
- D. 围生期
- E. 新生儿期

6. 孕激素的生理作用是

- A. 刺激并维持女性第二性征
- B. 促进乳腺小叶发育
- C. 促进乳腺腺泡发育
- D. 使体温升高 $0.3 \sim 0.5^{\circ}\text{C}$
- E. 促进水钠潴留

7. 婴儿, 1 岁, 71cm 高。下列情况不可能的是

- A. 每年增重 2kg
- B. 体重为出生时的 4 倍
- C. 3 个月为体重的 2 倍
- D. 头围为 46cm
- E. 乳牙 6 颗

8. 输卵管妊娠破裂出血需要输血治疗, 输血首选

- A. 储存式自体输血
- B. 稀释性自体输血
- C. 回收式自体输血
- D. 回收式和稀释式自体输血
- E. 储存式和回收式自体输血

9. 小儿 4 个月, 规律接种疫苗, 下一个接种的疫苗是

- A. 乙肝疫苗第三针
- B. 麻腮风疫苗第一针
- C. 百白破疫苗第二针
- D. 脊髓灰质炎疫苗第二针
- E. 乙脑减毒活疫苗第一针

10. 不与子宫直接相连的韧带是

- A. 宫骶韧带

- B. 卵巢固有韧带
- C. 圆韧带
- D. 主韧带
- E. 骨盆漏斗韧带

11. 8 月会爬的婴儿, 最不可能出现以下哪种动作

- A. 发出 mama 的声音
- B. 会换手
- C. 会拍手
- D. 指认身体的部位
- E. 会扶站

12. 孕期出现巨幼细胞性贫血主要是由于缺乏

- A. 泛酸
- B. 叶酸
- C. VitB12
- D. 蛋白质
- E. 铁

13. 苯丙酮尿症属于

- A. 染色体畸变
- B. 常染色体显性遗传
- C. 常染色体隐性遗传
- D. X 连锁显性遗传
- E. X 连锁隐性遗传

14. 辅食过渡期该如何添加辅食

- A. 加油加盐
- B. 少量多餐
- C. 循序渐进
- D. 单一到多元化
- E. 吃奶后辅食

15. 急性盆腔炎性疾病的最低诊断标准是

- A. 宫颈脓性分泌物
- B. 下腹压痛及反跳痛
- C. 阴道内见输卵管增粗
- D. 宫颈举痛
- E. 体温超过 38.3°C

16. 帕金森病的必备诊断标准是

- A. 左旋多巴有效
- B. 运动迟缓
- C. 静止性震颤
- D. 肌强直
- E. 姿势步态异常

17. 引起儿童输尿管积水的主要原因是

- A. 输尿管结石
- B. 肿瘤
- C. 先天性肾盂连接部狭窄
- D. 精索静脉曲张
- E. 尿道狭窄

18. 腹泻患儿重度低渗性脱水扩容应首先选用

- A. 2:1 等张含钠液
- B. 4:3:2(2/3 张) 混合液
- C. 2:3:1(1/2 张) 混合液
- D. 1:4(1/5 张) 混合液
- E. 1:2(1/3 张) 混合液

19. 动脉导管未闭的早产儿, 促进动脉导管闭合的首选药物是

- A. 青霉素
- B. 吲哚美辛
- C. 卡托普利
- D. 普萘洛尔
- E. 硝酸甘油

20. 纤维瘤常伴以下哪种疾病

- A. 卵巢内胚窦瘤
- B. 无性细胞瘤
- C. 梅格斯综合征
- D. 库肯勃瘤
- E. 畸胎瘤

21. 下列哪种疾病不会引起颅内压增高

- A. 颅骨外生性肿瘤
- B. 脑血管流量升高
- C. 颅内感染
- D. 颅腔狭小
- E. 颅内实质体积增大

22. 脑梗死的病因中最重要的是

- A. 动脉硬化
- B. 高血压
- C. 动脉壁炎症
- D. 真性红细胞增多症
- E. 血高凝状态

23. 高血压性脑出血最常见的出血部位是

- A. 脑室
- B. 脑干
- C. 小脑
- D. 基底节
- E. 脑叶

24. 小儿体格发育的两个高峰期是

- A. 新生儿期、学龄期
- B. 婴儿期、学龄期
- C. 幼儿期、学龄期
- D. 婴儿期、青春期
- E. 学龄前期、青春期

25. 不属于急性应激障碍治疗干预的基本原则是

- A. 谈话
- B. 及时
- C. 就近
- D. 简洁
- E. 紧扣重点

26. 关于急性脑病综合征的意识障碍表现错误的是

- A. 错觉
- B. 幻觉
- C. 被害妄想
- D. 关系妄想
- E. 逻辑障碍

27. 有关 OCT 的说法不正确的是

- A. 动脉注射缩宫素可以诱发宫缩
- B. 乳头刺激法可以诱发宫缩
- C. 需要用到胎儿监护仪
- D. 正弦波形提示在观察时胎儿存在酸碱失衡
- E. 必要时应紧急终止妊娠

28. 宫内节育器的抗生育原理主要是

- A. 抑制排卵
- B. 阻碍受精
- C. 抗孕激素
- D. 抗雌激素
- E. 干扰着床

29. 了解子宫内膜周期性变化最可靠的诊断依据是

- A. 诊断性刮宫
- B. 基础体温测定
- C. 宫颈黏液检查

- D. 血清雌激素测定
- E. 尿雌二醇测定

30. 维持子宫在正常位置是由

- A. 盆底肌肉及筋膜的支托作用
- B. 膀胱和直肠的支托
- C. 子宫韧带和盆底肌肉筋膜的支托
- D. 子宫四对韧带的作用
- E. 腹腔压力作用

31. 最常见的子宫内膜异位症病灶部位在

- A. 子宫肌层
- B. 卵巢
- C. 宫颈
- D. 直肠子宫陷凹
- E. 宫骶韧带

32. 左向右分流型先心病最常见的并发症为

- A. 细菌性心内膜炎
- B. 脑血栓
- C. 脑脓肿
- D. 肺炎
- E. 心力衰竭

33. 肺循环血量增多, 并伴左心房、左心室血量增多的先天性心脏病应是

- A. 原发性房间隔缺损
- B. 继发性房间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 室间隔缺损
- E. 法洛四联症

34. 缺铁性贫血早期最可靠的诊断依据是

- A. 血清铁减少
- B. 血清铁蛋白降低
- C. 血清总铁结合力增高
- D. 运铁蛋白饱和度降低
- E. 红细胞内原卟啉增高

35. 维生素 D 缺乏性佝偻病最可靠的早期诊断指标是

- A. 日光照射不足及维生素 D 摄入不足的病史
- B. 烦躁不安、夜惊、多汗等神经精神症状
- C. 血钙、磷、碱性磷酸酶水平异常

- D. 长骨 X 线检查异常及骨骼畸形
- E. 血 25-(OH)D₃ 与 1, 25-(OH)₂D₃ 水平下降

36. 蛋白质、能量营养不良患儿皮下脂肪逐渐减少或消失, 最后消失的部位

- A. 臀部
- B. 四肢
- C. 面颊
- D. 躯干
- E. 腹部

37. 脊髓休克见于

- A. 脊髓胶质瘤
- B. 脊髓蛛网膜粘连
- C. 急性横贯性脊髓炎
- D. 脊髓空洞症
- E. 脊髓后动脉血栓形成

38. 脊髓半横断(Brown-Sequard)综合征常见于

- A. 急性脊髓炎
- B. Guillam-Bare 综合征
- C. 急性硬脊膜外脓肿
- D. 脊髓外肿瘤
- E. 外伤

39. 颅前窝骨折造成的“熊猫眼征”指的是

- A. 双额部皮肤青紫
- B. 双眼视网膜出血
- C. 乳突部皮下淤血斑
- D. 双侧视神经乳头水肿
- E. 眶周广泛淤血斑

40. 下列胎心电子监测结果提示胎儿缺氧的是

- A. 胎心出现加速
- B. 胎心出现变异减速
- C. 胎心出现早期减速
- D. 胎心出现晚期减速
- E. 胎心出现无应激试验反应型

41. 抗精神病药物的抗精神病作用的主要通路是

- A. 中脑-边缘系统
- B. 网状上行系统
- C. 黑质-纹状体系统
- D. 结节-漏斗系统

E. 锥体外系统

42. 癫痫持续状态首选的治疗药物是

- A. 水合氯醛
- B. 异戊巴比妥
- C. 苯妥英钠
- D. 苯巴比妥钠
- E. 地西洋

43. 卵巢性激素以胆固醇为原料的合成途径, 正确是

- A. 雌激素→雄激素→孕激素
- B. 雌激素→孕激素→雄激素
- C. 雄激素→雌激素→孕激素
- D. 孕激素→雄激素→雌激素
- E. 孕激素→雌激素→雄激素

44. 提示上运动神经元损害最有意义的体征是

- A. 肌张力正常
- B. 浅反射消失
- C. 腱反射减弱
- D. 病理征阳性
- E. 瘫痪肌肉不萎缩

45. 急性严重的锥体束损害的断联休克表现为

- A. 弛缓性瘫, 腱反射消失
- B. 痉挛性瘫, 腱反射消失
- C. 弛缓性瘫, 腱反射亢进
- D. 痉挛性瘫, 腱反射亢进
- E. 完全性瘫, 腱反射存在

46. 下列药物容易通过胎盘而影响胎儿的是

- A. 极性药物
- B. 分子量大的药物
- C. 所有激素类药物
- D. 脂溶性低的药物
- E. 血浆蛋白结合率低的药物

47. 遗忘综合征的三大特征是

- A. 幻觉虚构、定向障碍
- B. 谵妄近记忆障碍、虚构
- C. 谵妄虚构、定向障碍
- D. 近记忆障碍、幻觉、定向障碍
- E. 近记忆障碍、虚构、定向障碍

48. 对正常足月新生儿, 暂不能引出的

神经反射是

- A. 握持反射
- B. 腹壁反射
- C. 觅食反射
- D. 拥抱反射
- E. 吮吸反射

49. 受损后造成软腭、喉部肌肉麻痹的神经核是

- A. 疑核
- B. 面神经核
- C. 迷走神经背核
- D. 三叉神经
- E. 运动核下泌涎核

50. 脑出血手术治疗的适应症是

- A. 脑桥出血、额叶出血、严重脑室出血
- B. 小脑血肿>10ml、延髓出血、严重脑室出血
- C. 壳核出血>40ml、额叶出血、脑桥出血
- D. 小脑血肿>10ml、壳核出血大于 40ml、中脑出血
- E. 小脑血肿>10ml、壳核出血大于 40ml、严重脑室出血

51. 下列关于女性生殖道的生理防御机制的描述, 正确的是

- A. 阴道正常情况下呈弱碱性环境
- B. 正常阴道菌群中不包括支原体和念珠菌
- C. 宫颈内口紧闭以及宫颈管有黏液栓利于防止上行感染
- D. 宫颈阴道部表面为单层鳞状上皮, 抗感染能力强
- E. 卵巢分泌的孕激素使阴道上皮增厚并富含糖原

52. 吉兰-巴雷综合征的脑脊液蛋白-细胞分离是指

- A. 蛋白正常, 细胞数正常
- B. 蛋白增高, 细胞数正常
- C. 蛋白增高, 细胞数降低
- D. 蛋白降低, 细胞数增高
- E. 蛋白正常, 细胞数增

53. 患者, 女, 23 岁。平素月经周期规律, 末次月经为 2000 年 5 月 17 日,

则预产期为

- A. 2 月 26 日
- B. 2 月 27 日
- C. 2 月 28 日
- D. 2 月 23 日
- E. 2 月 24 日

54. 某人, 性别不详, 约 30 岁。等待执业医师成绩未果, 表现为不认识亲人同事, 凭空看到医考中心工作人员就站在自己对面, 说:“你没过”, 随即奔向医院停车场, 同事劝阻也不理睬, 大喊:“哈哈, 我是傻逼, 我没疯! 我真的没疯!”两天后突然清醒, 对病情经过不能完全回忆。该患者的状态是

- A. 幻觉妄想状态
- B. 抑郁状态
- C. 朦胧状态
- D. 谵妄状态
- E. 强迫状态

55. 某产妇, 产后不想母乳喂养, 医生指导其母乳喂养, 以下作用不属于的是

- A. 增加母婴感情
- B. 促进子宫复旧
- C. 避孕
- D. 提高婴儿免疫力
- E. 预防产后出血

56. 老年女性患者, 阴道肿物脱出 1 年。妇科检查: 宫颈光滑, 屏气用力后阴道脱出宫颈和部分宫体, 该患者目前的情况为

- A. 子宫脱垂 II 度重型
- B. 子宫脱垂 III 度
- C. 子宫脱垂 II 度轻型
- D. 子宫脱垂 I 度重型
- E. 子宫脱垂 II 度中型

57. 7 岁小儿, 神志淡漠, 智力发育障碍, 身材矮小皮肤粗糙。以下症状哪个符合此病

- A. 食欲增加
- B. 心率快
- C. 肌张力亢进
- D. 肌力下降
- E. 反射亢进

58. 患者, 女, 23 岁。失恋后哭笑无常, 他人询问年龄, 奶声奶气地回答: “叔叔, 我 3 岁了”。该患者的症状属于

- A. 刚塞综合征
- B. 童样痴呆
- C. 错构
- D. 谵妄状态
- E. 虚构

59. 某产妇, 妊娠 39 周。既往风心病史, 未产检, 现心功能 III 级, 临产 8 小时, 宫口开大 6cm。下一步该如何做?

- A. 等待自然分娩
- B. 静滴催产素, 加强宫缩
- C. 剖宫产结束分娩
- D. 产钳助产
- E. 指导产妇屏气用力

60. 老年男性患者, 既往高血压、脑梗病史。停药 1 个月。打麻将时右眼一过性黑朦, 之后身体感觉肌力下降, 数分钟后恢复。可能的诊断是

- A. 颈内 TIA
- B. 椎基底 TIA
- C. 脑出血
- D. 脑血栓形成
- E. 脑栓塞

61. 患者, 女, 50 岁。停经 1 年, 自觉潮热、汗出、心悸。检查: FSH 600U/L, E2 6pg/ml。考虑

- A. 绝经综合征
- B. 经前期综合征
- C. 甲亢
- D. 早期卵巢功能不全
- E. 神经衰弱

62. 某孕妇, 孕 12 周, 行 NT 检查 2.5mm, 为预防遗传性疾病, 下一步应做何检查

- A. 随访 NT
- B. 羊膜腔穿刺染色体检查
- C. 母亲血液中提取 DNA
- D. 血清学检查
- E. 基因检测

63. 患者, 女, 28 岁。结婚 5 年未孕。月经稀少, 多毛, 痤疮。B 超示卵巢多

囊表现。该患者可能的诊断是

- A. 多囊卵巢综合征
- B. 生殖器结核
- C. 无排卵性功能失调性子宫出血
- D. 卵巢早衰
- E. 子宫内膜异位症

64. 育龄期妇女, 多年未孕, 男伴精子正常, 下一步该做的检查是

- A. 经子宫输卵管造影
- B. 宫腔镜检查
- C. 腹腔镜检查
- D. B 超检测卵泡发育
- E. 女性激素测定

65. 患者, 女, 35 岁。已婚, 2 年前行人工流产术, 术后未来月经。行雌孕激素试验无撤退性出血, 雌孕激素序贯试验阴性。闭经的原因是

- A. 下丘脑性闭经
- B. 垂体性闭经
- C. 卵巢性闭经
- D. Asherman 综合征
- E. 难以确定

66. 患儿, 男, 8 个月, 因咳嗽 1 天, 发热 3 小时就诊。就诊过程中突然双目凝视, 口吐白沫, 四肢强直, 呼之不应, 持续 1~2 分钟缓解。查体: T 39.5°C, 咽红, 心、肺、腹及神经系统检查无异常。则该患儿最可能诊断是

- A. 低钙惊厥
- B. 中毒性脑病
- C. 化脓性脑膜炎
- D. 癫痫
- E. 热性惊厥

67. 患者, 女, 46 岁。阴道接触性出血 3 个月, 病理活检提示: 宫颈上皮组织水肿淋巴细胞浸润增多, 血管增多。可能的诊断是

- A. 宫颈癌
- B. 宫颈上皮内瘤病
- C. 宫颈息肉
- D. 子宫内膜炎
- E. 宫颈糜烂

68. 患者, 女, 60 岁。绝经 10 年, 阴

道流血伴流液 2 个月就诊，行分段诊刮，诊断为子宫内膜癌 I 期，首选的治疗方案为

- A. 子宫全切术
- B. 腔内放射治疗
- C. 盆腔外照射治疗
- D. 扩大子宫全切术及+双附件切除术
- E. 子宫广泛切除术+盆腔淋巴结清扫术

69. 患者，男，35 岁。外伤后致小便障碍。查体：四肢肌力、肌张力正常，感觉运动正常。其受损的部位是

- A. 胸段脊髓
- B. 脊髓圆锥
- C. 颈段脊髓
- D. 传入神经
- E. 前角细胞

70. 某经产妇，40 岁。已育两小孩，安置宫内节育环后出现少量阴道流血，后出现经期延长及经血量增多，此时应该

- A. 随访观察
- B. 取出节育环
- C. 使用止血药物
- D. 抗感染治疗
- E. 卧床休息

71. 某产妇，产后 5 天，突发下腹疼痛，有压痛，伴发热，乳房胀痛。妇科检查：宫颈损伤，阴道内见脓血性分泌物。目前考虑

- A. 子宫肌炎
- B. 急性宫颈炎
- C. 急性输卵管炎
- D. 急性乳腺炎
- E. 脓毒血症

72. 某经产妇，妊娠 41 周，临产后 7 小时出现烦躁不安，下腹疼痛难忍，子宫强直性收缩。检查子宫可触及见病理性缩复环，下腹拒按胎心不稳。目前可能的情况是

- A. 胎膜早破
- B. 子宫破裂
- C. 先兆子宫破裂
- D. 前置胎盘
- E. 胎盘早剥

73. 某产妇，宫缩来临时，胎心监护见胎心降到 100 次/分，持续 10 秒左右迅速恢复，可能的原因是

- A. 胎头受压
- B. 胎儿宫内缺氧
- C. 脐带受压
- D. 脐带脱垂
- E. 胎盘功能不良

74. 幼儿，3 岁，出现发热 2 天，伴咽痛、皮疹。查体：体温 38.5℃，咽部充血，双侧扁桃体 II° 肿大，颈部可触及数个肿大淋巴结，脾肿大；全身皮肤见红色斑丘疹，压之退色。血常规检查：异型淋巴细胞可检出。可能的诊断是

- A. 川崎病
- B. 传染性单核细胞增多症
- C. 猩红热
- D. 风疹
- E. 皮疹

75. 患者，男，44 岁。感冒后出现大小便障碍，进行性四肢无力伴麻木，对称性痛、温、振动觉消失，无汗。考虑患者为

- A. 急性硬脊膜外脓肿
- B. 脊柱结核
- C. 急性脊髓炎
- D. 转移性肿瘤
- E. 脊髓出血

76. 患者，男，36 岁。车祸外伤致头颅骨折，塌陷 2cm，昏迷半小时，醒来 4 小时，意识清楚，对答如流说头晕，恶心，呕吐，随即又陷入昏迷。首先考虑为

- A. 硬脑膜下血肿
- B. 脑震荡
- C. 颅底骨折
- D. 硬脑膜外血肿
- E. 脑干损伤

77. 男婴，其母 G1P1，足月顺产，出生体重 3.5kg，生后 10 小时出现黄疸，并有加重趋势，总胆红素 342mmol/L(20mg/dl)，最可能的诊断是

- A. 生理性黄疸
- B. 新生儿肝炎
- C. 母乳性黄疸
- D. ABO 溶血病
- E. Rh 溶血病

78. 患者, 男, 15 岁。突起四肢无力 2 天。查体: 四肢肌力 2 级, 肌张力低, 腱反射消失病理征未引出, 无明显感觉障碍, 双侧腓肠肌疼痛。最可能的诊断是

- A. 重症肌无力
- B. 周期性麻痹
- C. 吉兰-巴雷综合征
- D. 多发性肌炎
- E. 急性脊髓炎

79. 初孕妇, 30 岁。妊娠 37+2 周, 夜间睡眠中突然出现阴道大量流血, 无阵发性腹痛。查体: 重度贫血貌, P 110 次/分, BP 80/60mmHg。妇科检查: 子宫软、枕后位胎心率 166 次/分。此时最佳的处理措施是

- A. 立即进行 B 超检查
- B. 立即行无应激试验
- C. 输血同时进行人工破膜
- D. 输血同时行剖宫产术
- E. 立即输血纠正休克

80. 患者, 女, 40 岁。外阴瘙痒伴烧灼感 4 天。妇科检查见外阴局部充血小阴唇内侧及阴道黏膜表面有白色片状薄膜或凝乳状物。诊断首先考虑什么病

- A. 细菌性阴道炎
- B. 滴虫性阴道炎
- C. 外阴阴道念珠菌病
- D. 淋病性阴道炎
- E. 萎缩性阴道炎

81. 患者, 女, 35 岁。继发性痛经 5 年, 检查子宫后倾屈, 7.5cm×7.0cm 大, 质硬。本例不可能出现的临床表现为

- A. 不孕
- B. 性接触疼痛
- C. 经量过多
- D. 经期延长
- E. 月经稀发

82. 患者, 男, 62 岁。外出途中突发头痛、眩晕, 伴呕吐、走路不稳前来急诊。查体: BP 182/110mmHg, 心率 65 次/分, 双眼向右水平眼震, 右手指鼻不准, 右侧跟膝胫试验阳性。最可能的诊断是

- A. 右小脑半球出血
- B. 脑桥出血
- C. 基底节区出血
- D. 右枕叶出血
- E. 右大脑梗死

83. 初产妇, 27 岁, 妊娠 39 周, 规律宫缩 6 小时, 枕左前位, 估计胎儿体重 2700g, 胎心 142 次/分。阴道检查: 宫口开大 3cm, 未破膜, S=+1, 骨盆外测量未见异常。此时恰当处理应是

- A. 抑制宫缩, 使其维持至妊娠 40 周
- B. 等待自然分娩
- C. 人工破膜加速产程进展
- D. 静脉滴注缩宫素
- E. 行剖宫产术

84. 初产妇, 25 岁。足月顺产后第 3 天, 纯母乳喂养。乳房胀痛, 无红肿乳汁排出不畅, 体温 37.6°C。恰当的处理方法是

- A. 生麦芽煎服
- B. 少喝水
- C. 让新生儿吸吮双乳
- D. 抗生素治疗
- E. 芒硝外敷用

85. 初孕妇, 25 岁, 妊娠 37 周, 今晨剧烈头痛病呕吐 1 次。查体: BP 160/110mmHg, 下肢明显水肿, 无宫缩, 枕右前位, 胎心 138 次/分胎儿稍小, 尿蛋白(++)。首选的处理方法是

- A. 肌注哌替啶 100mg
- B. 静滴硫酸镁及甘露醇
- C. 立即行剖宫产术
- D. 静脉滴注缩宫素
- E. 人工破膜后静滴缩宫素

86. 患儿, 男, 2 岁。胸骨左缘 3~4 肋间可闻及 IV 级收缩期粗糙杂音, 广泛传导, 可触及收缩期震颤, P2 亢进, 胸部 X 线显示主动脉结(弓)影缩小。最可能的诊断是

- A. 房间隔缺损
- B. 室间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 法洛四联症
- E. 肺动脉狭窄

87. 患儿，男，6岁。因尿少、水肿入院体检：两侧眼睑及下肢水肿，血压150/90mmHg，尿镜检RBC 20个/HP，蛋白(+++)，血浆白蛋白2.0g/L。最可能的诊断是

- A. 单纯性肾病
- B. 肾炎性肾病
- C. 泌尿系感染
- D. 急性肾小球肾炎
- E. 肾结石

88. 患儿，男，10天。因发热、拒奶3天，惊厥2次来诊。查体：反应差，中度黄染脐部有脓性分泌物，前囟饱满。WBC $20 \times 10^9/L$ ，N 0.78，L 0.22。最可能的病原体是

- A. 流感嗜血杆菌
- B. 新型隐球菌
- C. 大肠埃希菌
- D. 肺炎链球菌
- E. 脑膜炎双球菌

89. 患者，男，70岁。夜间醒来发现失语伴右上肢活动无力，自觉症状进行性加重，但意识清楚，脑脊液检查无异常。最可能的诊断是

- A. 脑出血
- B. 脑血栓形成
- C. 脑栓塞
- D. 蛛网膜下腔出血
- E. 短暂性脑缺血发作

90. 患儿，女，3天。嗜睡1天来诊。足月产，有窒息史。查体：R 32次/分，面色发绀，前囟饱满紧张，心率92次/分，心音低钝，四肢肌张力差，拥抱反射消失。最可能的诊断是

- A. 新生儿湿肺
- B. 新生儿低血糖
- C. 新生儿肺透明膜病
- D. 胎粪吸入综合征
- E. 新生儿缺氧缺血性脑病

91. 患者，女，28岁。5天前受惊吓后突然不语不动，不吃不喝，肢体僵硬，口中唾液外流，不知主动吐出，晚间自己到厨房找吃的。患者1年前曾有凭空闻语、捡拾垃圾等怪异行为，持续1个月好转。患者最可能的诊断是

- A. 妄想性障碍
- B. 急性应激障碍
- C. 精神分裂症
- D. 脑器质性精神障碍
- E. 分离(转换)性障碍

92. 患者，男，30岁。车祸伤后昏迷2周。查体：昏迷，压眶反射消失，颈后仰伸，四肢强直性伸直，上肢内收、过度旋前和下肢内收、内旋、踝跖屈。该患者的损害水平在

- A. 小脑
- B. 脑干
- C. 脊髓
- D. 基底节
- E. 大脑皮层

93. 患者，女，40岁。当听到家中房子因洪水倒塌的消息后突然哭闹叫喊，手舞足蹈，拿砖头打砸旁边的房子表情恐惧而紧张，1天后恢复平静。该患者最可能的诊断是

- A. 分离性障碍
- B. 躁狂发作
- C. 精神分裂症
- D. 癫痫所致精神障碍
- E. 急性应激障碍

94. 患者，女，29岁。溢乳并继发性闭经1年，无孕产史。妇科检查未见异常。实验室检查：血PRL升高。蝶鞍MRI发现垂体萎缩，首选的治疗措施是

- A. 放射治疗
- B. 手术治疗
- C. 应用GnRH-a
- D. 应用氯米芬
- E. 应用溴隐亭

95. 初孕妇，26岁。妊娠35周，自觉头痛、视物模糊2周，晨起突然出现持续性腹痛且逐渐加重。腹部检查：子宫板状硬。该患者最可能的诊断是

- A. 先兆早产

- B. 胎盘早剥
- C. 急性阑尾炎
- D. 前置胎盘
- E. 先兆子宫破裂

96. 一男婴, 营养状况良好, 头围 46cm, 前囟 0.5cm, 身高 75cm。最可能的月龄是

- A. 4 个月
- B. 8 个月
- C. 10 个月
- D. 6 个月
- E. 12 个月

97. 患儿, 男, 7 岁。近年来多次从睡眠中惊吓醒来表情恐惧, 呼吸急促, 出汗, 持续数分钟, 对家人的呼唤没有相应的反应, 早晨起来后往往不能回忆。脑电图检查无特殊发现。该患儿最可能的诊断是

- A. 梦魇
- B. 夜惊
- C. 神经衰弱
- D. 睡行症
- E. 分离性障碍

98. 患者, 女, 25 岁。近 1 年来认为自己过胖每日专注于自己的体重、体型, 严格限制每日饮食, 偶有贪食情况, 但饱餐之后立即自行呕吐, 或服泻剂, 先出现畏寒, 体温偏低, 月经停止, 比标准体重减轻 25%, 经详细询问病史及各种检查既往无躯体疾病史, 最可能的诊断是

- A. 癌症
- B. 结核病
- C. 神经性厌食症
- D. 神经性贪食症
- E. 甲状腺功能不全

99. 初产妇, 30 岁。孕 38 周。临产后静脉滴注缩宫素, 自然破膜 1 分钟后出现烦躁不安、呛咳、呼吸困难、发绀数分钟后死亡。该患者最可能的诊断是

- A. 子痫
- B. 重度胎盘早剥
- C. 子宫破裂
- D. 羊水栓塞

- E. 重度子痫前期

100. 患者, 男, 35 岁。持续性头痛 1 周。自觉后枕部紧箍样疼痛, 无恶心、畏光和畏声。查体: T36.5°C, BP 126/72mmHg, 眼压正常, 张口颞颌关节无弹响, 双颞肌和枕肌明显压痛, 余神经系统检查无异常。脑 MRI 无异常。最可能的诊断是

- A. 颈椎病
- B. 紧张性头痛
- C. 血管性头痛
- D. 无先兆偏头痛
- E. 颞颌关节紊乱

101. 患者, 女, 36 岁。医生检查问:“你在想什么?”答:“详细讲就是细菌问题, 细菌在我们脑子里有些冲动力, 空气不太新鲜, 也不奇怪, 冻死苍蝇。”该患者的症状属于

- A. 思维云集
- B. 思维破裂
- C. 强制性思维
- D. 思维插入
- E. 音联意联

102. 患者, 男, 30 岁。头部摔伤 2 小时, 头颅 CT 示后颅窝高密度影, 发生脑疝。其类型最可能是

- A. 枕骨大孔疝
- B. 小脑幕切迹疝
- C. 大脑镰下疝
- D. 小脑幕切迹上疝
- E. 穿颅疝

B1 型选择题

(103~105 题共用备选答案)

- A. 手足口病
- B. 麻疹
- C. 幼儿急疹
- D. 风疹
- E. 水痘

103. 小儿热退后, 耳后、枕后淋巴结肿大, 考虑

104. 幼儿手足口臀部出现皮疹, 口腔黏膜有溃疡, 是

105. 小儿热退一天后出疹, 是

(106~108 题共用备选答案)

- A. 胎盘早剥
- B. 子宫收缩乏力
- C. 凝血功能障碍
- D. 胎盘剥离不全
- E. 软产道损伤

106. 产妇娩出胎儿 10 分钟后, 出现大量阴道流血, 子宫轮廓清晰。最可能的原因是

107. 某产妇, 胎儿娩出后, 立即出现阴道流血, 数分钟内出鲜血 200ml, 出血的原因是

108. 双胎生产, 第一胎顺产, 第二胎人工破膜后随即出血, 出血的原因是

(109~110 题共用备选答案)

- A. 病毒性肠炎
- B. 真菌性肠炎
- C. 侵袭性大肠埃希菌性肠炎
- D. 出血性大肠埃希菌性肠炎
- E. 金黄色葡萄球菌性肠炎

109. 起病急, 体温 40°C, 粪便呈粘液和脓血状, 中毒症状明显, 伴里急后重, 考虑

110. 应用多种抗生素后, 出现呕吐、腹泻, 呈暗绿色水样便, 镜检发现大量脓细胞, 考虑

(111~112 题共用备选答案)

- A. 呼吸道合胞病毒
- B. 金黄色葡萄球菌
- C. 腺病毒
- D. 支原体
- E. 衣原体

111. 1 岁小儿, 出现稽留热, 咳嗽、咳痰。查体: 双肺未闻及干湿啰音。检查: 血白细胞及分类均不高, 考虑什么感染

112. 小儿全身中毒症状重, 伴发作性喘憋。检查: 血白细胞正常; 胸部 X 线片见点片状阴影和肺气肿。考虑什么感染

(113~114 题共用备选答案)

- A. 乳腺囊性增生病
- B. 乳腺癌
- C. 乳腺纤维腺瘤
- D. 乳管内乳头状瘤
- E. 乳腺炎

113. 雌孕激素分泌失调导致乳腺实质性细胞增生过度和复旧不全, 造成

114. 小叶纤维细胞对雌激素敏感性异常增高引起

(115~116 题共用备选答案)

- A. 透明细胞癌
- B. 腺鳞癌
- C. 内膜腺样癌
- D. 鳞状细胞癌
- E. 腺癌

115. 宫颈癌最常见的病理类型是

116. 子宫内膜癌最常见的病理类型是

(117~118 题共用备选答案)

- A. 稽留流产
- B. 不全流产
- C. 复发性流产
- D. 完全流产
- E. 先兆流产

117. 最容易出现凝血功能障碍的流产是

118. 最容易出现失血性休克的流产是

A3/A4 型选择题

(119~121 题共用题干)

初产妇, 27 岁。剖宫产术后 16 天, 突发阴道大量流血 3 小时入院就诊。入院时测血压 80/60mmHg, 心率 120 次/分; 急查血常规: Hb 84g/L。

119. 该患者应立即采取的处理措施不包括

- A. 行 B 超检查
- B. 行清宫术止血
- C. 静滴缩宫素
- D. 建立静脉通道, 补液输血
- E. 静滴广谱抗生素预防感染

120. 该患者最可能的出血原因是

- A. 胎盘附着面复旧不全
- B. 胎盘胎膜残留

- C. 胎盘附着面血栓脱落
- D. 继发性子宫收缩乏力
- E. 子宫切口裂开出血

121. 该患者最有效的处理措施是

- A. 清宫术
- B. 宫腔镜检查并止血
- C. 剖腹探查，行子宫次全切除术
- D. 剖腹探查，行子宫全切除术
- E. 剖腹探查，若切口周围组织坏死范围小，则清创缝合

(122~123 题共用题干)

患者，女，48 岁。近 1 年来怕脏，不敢倒垃圾和上厕所。在街上遇到垃圾车也害怕，会反复洗手。自己知道不应该，但不能控制，为此感到苦恼而就诊。

122. 首选的治疗药物是

- A. 奥氮平
- B. 奥曲肽
- C. 阿普唑仑
- D. 丁螺环酮
- E. 氯米帕明

123. 最宜联合使用的治疗方法是

- A. 家庭治疗
- B. 电抽搐治疗
- C. 口服丙戊酸钠
- D. 认知行为治疗
- E. 经颅磁刺激治疗

(124~126 题共用题干)

患儿，男，6 个月。反复发作性吸入性呼吸困难伴吸气时喉鸣，口唇青紫 3 次，无发热。发作期间一般情况良好，枕部指压有乒乓球样感，心肺未见异常。

124. 首先考虑的诊断为

- A. 急性喉炎
- B. 气管异物
- C. 急性喉气管炎
- D. 支气管肺炎
- E. 维生素 D 缺乏性手足搐搦症

125. 首选的检查是

- A. 咽拭子培养
- B. 胸片 X 线片
- C. 喉镜

- D. 血电解质
- E. 血气分析

126. 该患儿再次突然出现发作性呼吸困难缺氧时，首要的急救措施是

- A. 气管插管
- B. 静注钙剂
- C. 补充维生素 D
- D. 应用甘露醇
- E. 应用地西洋，保持呼吸道通畅

(127~129 题共用题干)

患者，男，72 岁，车祸后即昏迷，伤后 2 小时被送至医院。查体：昏迷状态，左顶枕部有一直径 4cm×4cm 头皮血肿，右侧瞳孔散大，对光反射消失，左侧肢体肌张力增高，病理反射阳性。头颅 CT 示右额颞部骨板下新月形高密度影。

127. 该患者最可能的诊断是

- A. 右额颞脑内血肿脑疝
- B. 右额颞脑挫伤脑疝
- C. 右额颞急性硬脑膜外血肿，脑疝
- D. 右额颞急性硬脑膜下积液脑疝
- E. 右额颞急性硬脑膜下血肿脑疝

128. 该患者颅内出血最可能来自

- A. 矢状窦
- B. 大脑中动脉
- C. 脑表面小血管
- D. 硬脑膜中动脉
- E. 蛛网膜颗粒

129. 需要立即采取的治疗措施是

- A. 激素治疗
- B. 冬眠疗法
- C. 气管切开
- D. 止血，抗感染
- E. 颅内血肿清除

(130~131 题共用题干)

幼儿，3 岁，发热 1 天。查体：T39℃，眼结膜充血，舌红，呈草莓样，皮肤有浅红色斑丘疹右颈淋巴结肿大。双肺呼吸音粗，心率 120 次/分，腹软，肝、脾无肿大，指、趾端水肿，伴少许膜状脱皮。

130. 最可能的诊断是

- A. 手足口病

- B. 猩红热
- C. 传染性单核细胞增多症
- D. 川崎病
- E. 麻疹

131. 治疗首选

- A. 丙种球蛋白+阿司匹林
- B. 糖皮质激素+阿司匹林
- C. 丙种球蛋白+环磷酰胺
- D. 糖皮质激素+环磷酰胺
- E. 阿司匹林+环磷酰胺

(132~133 题共用题干)

某新生儿出生后不久出现进行性呼吸困难缺氧。

132. 诊断为

- A. 湿肺
- B. 新生儿肺透明膜病
- C. 吸入性肺炎
- D. 急性呼吸窘迫综合征
- E. 肺部感染

133. 首要的治疗措施为

- A. 保温
- B. 表面活性物质替代治疗
- C. 无创通气
- D. 液体疗法
- E. ECMO 治疗

(134~135 题共用题干)

某患儿，生后 48 小时内无胎便，之后出现腹胀明显，大便难解，需灌肠。

134. 该患儿可能的诊断是

- A. 先天性肠闭锁
- B. 功能性便秘
- C. 肠套叠
- D. 先天性肥厚性幽门狭窄
- E. 先天性巨结肠

135. 若灌肠症状缓解，几天后，患儿突发高热，腹胀再次加重，则可能出现的并发症是

- A. 脓毒症
- B. 肠穿孔
- C. 小肠结肠炎
- D. 肠梗阻
- E. 败血症

(136~137 题共用题干)

某患儿，足月产。出生后 3 天出现皮肤轻度黄染，一般情况好，吃奶好，无发热，无肝脾肿大。血清胆红素 214mmol/L。

136. 应考虑为

- A. 生理性黄疸
- B. 溶血性黄疸
- C. 母乳性黄疸
- D. 新生儿胆道闭锁
- E. 新生儿肝炎

137. 治疗为

- A. 功能测定
- B. 光照疗法
- C. 抗生素疗法
- D. 观察，监测胆红素值
- E. 换血疗法

(138~139 题共用题干)

患者，女，28 岁。葡萄胎清宫术后阴道持续少量流血 3 个月。妇科检查：子宫如妊娠 50 天大小，质软，双侧附件均可触及囊性肿物，大小约 5cm×4cm，活动好。尿 HCG 阳性，盆腔超声示子宫肌层有一 4cm×3cm 不均质回声，血流信号丰富，两侧附件区有囊性低回声包块。

138. 该患者最可能的诊断为

- A. 子宫腺肌病合并卵巢囊肿
- B. 不全流产
- C. 早孕合并卵巢囊肿
- D. 绒毛膜癌
- E. 侵蚀性葡萄胎

139. 首选的治疗为

- A. 卵巢囊肿切除术
- B. 放射治疗
- C. 子宫病灶切除术
- D. 清宫术
- E. 化学治疗

(140~141 题共用题干)

患者，女，40 岁，因患“子宫腺肌病”予住院进一步治疗。

140. 若行保留双附件的全子宫切除术，不需要切断的韧带是

- A. 骨盆漏斗韧带
- B. 卵巢固有韧带
- C. 子宫主韧带

- D. 子宫阔韧带
- E. 子宫骶骨韧带

141. 若予保守治疗, 药物宜选用

- A. 雌激素
- B. 孕激素
- C. GnRH-a
- D. 雌孕激素交替
- E. 镇痛药物

(142~143 题共用题干)

某产妇, 正常分娩, 分娩过程中胎头已出, 左肩露出, 后产程延长。

142. 目前情况考虑什么

- A. 肩难产
- B. 第二产程延长
- C. 小儿发育畸形
- D. 巨大儿
- E. 滞产

143. 助产士手法助产后顺娩一 4500g 胎儿, 检查发现胎儿左手不能抬, 可能的原因是

- A. 臂丛神经损伤
- B. 肌皮神经损伤
- C. 腋神经损伤
- D. 肱骨骨折
- E. 肌肉拉伤

(144~145 题共用题干)

男性患者, 长期入睡困难, 一会就醒, 每周三到四次, 害怕睡眠越想越严重, 害怕社交怕自己免疫力降低。

144. 该患者目前的情况是

- A. 广泛性焦虑障碍
- B. 恐惧性焦虑障碍
- C. 失眠障碍
- D. 抑郁症
- E. 躁狂

145. 应如何治疗

- A. 认知疗法
- B. 催眠
- C. 生物反馈
- D. 口服地西洋
- E. 暗示疗法

(146~147 题共用题干)

初产妇, 31 岁。宫口已开全, 阴道检

查胎头矢状缝与骨盆横径一致, 胎儿小囟门在 3 点位, 大囟门 9 点位。

146. 根据目前情况, 胎儿属于什么胎位

- A. LOT
- B. LOP
- C. LOA
- D. ROA
- E. ROT

147. 分娩时要如何旋转才能正常娩出

- A. 顺时针旋转 45°
- B. 顺时针旋转 90°
- C. 逆时针旋转 90°
- D. 逆时针旋转 45°
- E. 不需要旋转

(148~150 题共用题干)

连某, 因患严重的躁狂抑郁障碍正在精神病专科医院住院治疗。因病情恶化, 患者出现伤人毁物等行为, 医院在没有其他可替代措施的情况下, 对其实施了约束身体的措施但实施后没有及时通知连某的监护人。连某的父亲作为监护人探视时, 看到儿子被捆绑在病床上非常气愤。

148. 依照《精神卫生法》对患者连某实施约束行为的性质属于

- A. 治疗性措施
- B. 惩罚性措施
- C. 保护性医疗措施
- D. 诊断性措施
- E. 警告性措施

149. 对患者连某实施身体约束而未告知其监护人的做法, 侵犯的患方权利是

- A. 生命权
- B. 健康权
- C. 认知权
- D. 知情权
- E. 名誉权

150. 该案例中所形成的医患关系模式是

- A. 主动-被动型
- B. 指导-合作型
- C. 契约许可型
- D. 指导参与型
- E. 共同参与型

答案

第一单元

1. 答案:D

解析:胆色素是体内铁卟啉类化合物的主要分解代谢产物(D对),包括胆红素、胆绿素、胆素原和胆素等。这些化合物主要随胆汁排出体外。胆红素是人胆汁的主要色素,呈橙黄色。80%来源于衰老红细胞中血红蛋白的分解(A错);在生理 pH 条件下胆红素是难溶于水的脂溶性物质(B错)。胆红素进入肝细胞后,与胞浆中两种载体蛋白-Y 蛋白和 Z 蛋白相结合形成复合物,结合胆红素水溶性强(C错),随胆汁排入小肠。在肠菌的作用下脱去葡萄糖醛酸基,并被逐渐还原生成胆素原、粪胆素原和尿胆素原(E错),统称为胆素原。

2. 答案:D

解析:根据《医师法》的用药规则规定:医师应当使用经国家有关部门批准使用的药品、消毒药剂和医疗器械(D对)。除正当诊断治疗外,不得使用麻醉药品、医疗用毒性药品、精神药品和放射性药品。

3. 答案:B

解析:《疫苗管理法》规定,疾病预防控制机构、接种单位有下列情形之一的,由县级以上人民政府卫生健康主管部门责令改正(C对),给予警告,没收违法所得(A对);情节严重的,对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予警告直至撤职处分(D对),责令负有责任的医疗卫生人员暂停1年以上18个月以下执业活动(E对);造成严重后果的,对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予开除处分,由原发证部门吊销负有责任的医疗卫生人员的执业证书:①未按照规定供应、接收、采购疫苗;②接种疫苗未遵守预防接种工作规范、免疫程序、疫苗使用指导原则、接种方案;③擅自进行群体性预防接种。故根据题目应选B。

4. 答案:A

解析:罹患率和发病率一样均是人群新病例数的指标。罹患率通常多指在

某一局限范围,短时间内的发病率(A对)。其优点是可以根据暴露程度精确地测量发病概率。

5. 答案:C

解析:交界性肿瘤也可出现转移,如卵巢交界性肿瘤可存在淋巴结转移及种植转移(C错,为本题正确答案)。

6. 答案:B

解析:慢性肉芽肿病患者的吞噬细胞功能缺陷(B对),细胞呼吸暴发缺陷,缺乏 NADPH 氧化酶,不能有效地产生杀灭细菌的过氧化物。表现为频发细菌、真菌感染和肉芽肿的形成。

7. 答案:E

解析:不是所有的原癌基因都有致癌性。原癌基因是指存在于生物正常细胞基因中的癌基因。正常情况下,这些基因处于静止或低表达状态,不仅对细胞无害,而且对维持细胞的正常功能具有重要作用。只有当其受到致癌因素作用被活化并发生异常时,才导致细胞癌变。

8. 答案:A

解析:氧化磷酸化偶联机制的化学渗透学说,其基本要点是电子经呼吸链传递时,可将质子(H⁺)从线粒体内膜基质侧泵到内膜胞浆侧,产生膜内外质子电化学梯度,以此储存能量。当质子顺浓度梯度回流时驱动 ADP 与 Pi 生成 ATP。

9. 答案:D

解析:体内物质消耗,尤其是糖、脂肪、蛋白质分解增多,使机体处于能量代谢的负平衡。①蛋白质代谢:总蛋白和白蛋白量减少,尿素氮明显增高,呈负氮平衡;②糖与脂肪代谢:发热时糖原分解增高,血糖增高,糖原的储备减少;发热动物体食欲低下,糖类摄入不足,导致脂肪分解也加强,大量脂肪分解且氧化不全可使血中酮体增加;由于糖分解代谢加强,氧供应相对不足,于是糖酵解增加,血乳酸增多;③水、电解质与维生素代谢:发热动物体维生素不足,尤其是维生素 C 和 B 族缺乏;在发热的体温上升期和高热持续期,由于尿量减少,可致水、钠、氮等在体内潴留。在体温下降期,由于皮肤、呼吸道大量蒸发水分,出汗增多及尿量增多,可引起高渗性脱

水。发热时，组织分解代谢增强，细胞内钾释放入血，血钾增高，肾脏排钾减少，尿钾增高。严重者因乳酸、酮体增多及高钾血症，可发生代谢性酸中毒。

10. 答案:A

解析:半月板位于膝关节上下关节面之间，且内侧半月板与关节囊及胫侧副韧带紧密连接，膝关节运动时，容易受到挤压而损伤。

11. 答案:C

解析:心理过程是指人对现实的反映过程，是一个人心理现象的动态过程，包括认识过程、情感过程和意志过程。

12. 答案:C

解析:疾病的三级预防属于健康观的内容；强化社区行动，这是实现综合保健目标的前提，体现了新公共健康精神的一个项目；“人人享有卫生保健”是卫生保健的战略目标；21 世纪我国的卫生服务体制将属于卫生保健型体制，突出预防为主和群众性自我保健。

13. 答案:C

解析:血管紧张素转换酶抑制剂通过抑制血管紧张素 II 和醛固酮的生成，使其含量减少，以达到血管扩张、血容量减少，血压下降的目的。还可减少缓激肽的降解，使血中缓激肽浓度增加，缓激肽可扩张血管使血压下降。血管紧张素转换酶抑制剂降压作用较强，对收缩压和舒张压均有降压作用，适用于各型高血压，长期服用无耐受性。降压时不伴心率加快，还可扩张肾血管，增加肾血流量。长期应用不易引起电解质紊乱和脂质代谢障碍，增强机体对胰岛素敏感性。此外，还能预防和逆转心室肥厚、血管的重构，发挥直接或间接保护作用，降低高血压死亡率，因此是常用的抗高血压药。

14. 答案:E

解析:长期应用尤其是连日给药的患者，减量过快或突然停药时，可引起肾上腺皮质萎缩和功能不全。这是长期大剂量使用糖皮质激素反馈性抑制垂体-肾上腺皮质轴所致。有少数患者特别是当遇到感染、创伤、手术等严重应激情况时，可发生肾上腺危象，需及时救治。所以停药须经缓慢的减量过程，不可骤然停药。

15. 答案:C

解析:流感病毒易变异，其变异主要发生在 HA 和 NA，两者变异可同时出现，也可单独出现。抗原变异幅度小称抗原漂移，若变异幅度大称为抗原转变，可引起大规模流行。

16. 答案:E

解析:膀胱空虚时全部位于盆腔内，充盈时膀胱腹膜反折线可上移至耻骨联合上方，此时，可在耻骨联合上方施行穿刺术，不会伤及腹膜和污染腹腔。因此正确答案为 E。

17. 答案:A

解析:心理社会因素以各种信息形式作用于大脑皮质，而大脑皮质又是通过生理中介机制，使各器官产生病变。比较重要的中介机制是神经系统。故本题选 A。

18. 答案:E

解析:医技工作的道德要求包括严谨求实，防止差错，及时准确，尊重患者，静心管理，保证安全，积极进取，加强协作。

19. 答案:C

解析:健康伦理的核心包括健康公正。

20. 答案:B

解析:生物地球化学性疾病是由于地球表面的某种化学元素含量过多或缺乏而影响到该地区人群对化学元素的摄入量，从而产生的疾病。克山病的发生与环境中的硒水平过低有密切的关系；镉中毒会导致痛痛病，主要是由于环境污染引起的，属于公害病。

21. 答案:E

解析:一氧化碳很快进入血流，与血红蛋白结合形成碳氧血红蛋白，取代正常情况下氧气与血红蛋白结合成的氧合血红蛋白，使血红蛋白失去输送氧气的功能，导致低氧血症和组织缺氧。

22. 答案:D

解析:十二指肠溃疡的形成经历了糜烂、急性溃疡、慢性溃疡的发展过程。慢性溃疡时，有少量渗出物及坏死组织附着。镜下病变:由内向外分 4 层:渗出层、坏死组织层、肉芽组织层、瘢痕层。瘢痕组织中的小动脉常发生增殖性动脉内膜炎；不易愈合原因:瘢痕层内的小动脉由于炎症刺激出现增殖性动脉内膜炎，使小动脉管壁增厚，

管腔狭窄或者有血栓形成，引起局部血液循环障碍，妨碍组织再生，使溃疡不易愈合。产生疼痛的原因：溃疡底部的神经节细胞及神经纤维常发生变性和断裂，神经纤维断端呈小球状增生，产生疼痛。

23. 答案:A

解析:颈外静脉末端的管腔内有一对瓣膜，但功能不全，不能防止血液的回流，且该静脉位置表浅，故颈外静脉怒张为上腔静脉回流受阻或右心衰竭的重要体征之一。

24. 答案:C

解析:A 型行为是指容易发生冠心病的行为模式，其特征为：(1)时间紧迫感，如同一时间做两件事，行为急促，说话快、走路快、办事快。(2)脾气暴躁，容易激动。(3)争强好胜。(4)对人有敌意等。

25. 答案:A

解析:长期进食过于精工细作的食物，可以出现维生素 B 族缺乏是身体症状。比如:维生素 B1 缺乏会出现食欲不佳、便秘、恶心、抑郁、脚气病等。

26. 答案:B

解析:尖锐湿疣镜下表皮角质层轻度增厚，几乎全为角化不全细胞，棘层肥厚。表皮浅层挖空细胞出现有助于诊断。因此选 B。

27. 答案:D

解析:新型冠状病毒防治最有效的措施是疫苗接种。

28. 答案:B

解析:流体智力是在信息加工和问题解决过程中所表现的能力。一般人在 20 岁以后，流体智力发展达到顶峰，30 岁以后将随年龄的增长而降低。总体来看，经历一个倒 U 形变化趋势。晶体智力是获得语言、数学等知识的能力。晶体智力在人的一生中一直在发展，只是到 25 岁以后，发展速度渐趋平缓。故选 B。

29. 答案:B

解析:慢性苯中毒主要损害的系统有:神经系统、造血系统、呼吸道系统、循环系统、消化系统。造血系统的损害表现是慢性苯中毒的主要特征，以白细胞计数减少和血小板计数减少最为常见。

30. 答案:A

解析:第一级预防，亦称“病因预防”。在疾病尚未发生时针对病因采取的预防措施，是预防、控制和消灭疾病的根本措施。内容包括:加强对病因的消除，减少对危险因素的暴露，预防接种及化学预防等。从机体的疾病自然史的角度而言，它还包括健康促进和健康保护两方面的内容。

31. 答案:C

解析:卫生服务需求由需要转化而来，人们的卫生服务需要只有转化为需求，才有可能去利用卫生资源，需求才有可能得到满足。需要能否转化为需求，除取决于个体自身(购买愿望和支付能力)的需要外，还与个体的收入水平、家庭人口、职业、文化程度、社会地位、风俗习惯以及卫生服务机构的设置和服务质量等多种因素有关。故选 C。

32. 答案:C

解析:乳糜池是胸导管起始端呈囊状膨大的部分，位于第 1 腰椎的前面，由左、右腰干和肠干汇合而成。

33. 答案:E

解析:奥美拉唑被称为质子泵抑制剂，临床又称之为 PPI，由于可以与胃壁细胞 H⁺-K⁺ATP 酶不可逆性结合，从而抑制胃酸的分泌，抑酸作用强大而持久，因而对胃溃疡、十二指肠溃疡、胃酸反流引起的“烧心”有良好的疗效。

34. 答案:C

解析:形象记忆是以感知过的事物的具体形象为内容的记忆，主要依靠的是表象。

35. 答案:A

解析:维生素 B1 又称为抗脚气病因子，缺乏可引起脚气病，维生素 C 又称为抗坏血酸，缺乏可引起坏血病。维生素 D 缺乏是导致佝偻病的主要原因。维生素 A 缺乏可导致夜盲症。维生素 K 缺乏可导致凝血障碍。

36. 答案:C

解析:出血坏死型胰腺炎表现较重，腹膜炎范围宽、体征重，腹胀明显，肠鸣音弱或消失，可见 Cullen 征和 Grey-Turner 征，腹水呈血性或脓性，可伴休克，可并发脏器功能障碍和严重的代谢障碍，白细胞增高，血糖升高，血钙降低，MODS 等。故选 C。

37. 答案:A

解析:雌激素有促进子宫发育,使肌层变厚,血供增加,并使子宫收缩力增强以及增加子宫平滑肌对缩宫素的敏感性。

38. 答案:C

解析:葡萄胎是指妊娠后胎盘绒毛滋养细胞增生,间质高度水肿,形成大小不一的水泡,水泡间相连成串,形如葡萄,亦称水泡状胎块(HM)。葡萄胎分为两类:①完全性葡萄胎:胎盘绒毛全部受累,整个宫腔充满水泡,弥漫性滋养细胞增生,无胎儿及胚胎组织可见;②部分性葡萄胎:部分胎盘绒毛肿胀变性,局部滋养细胞增生,胚胎及胎儿组织可见,但胎儿多死亡,有时可见较孕龄小的活胎或畸胎,极少有足月婴诞生。

39. 答案:A

解析:宫颈上皮内瘤变(CIN)分为3级:①CIN I即宫颈上皮轻度不典型增生。病变局限于上皮层的下1/3,细胞略大,核大深染,核分裂象少;排列虽不整齐,但存在极性。②CIN II即宫颈上皮中度不典型增生。病变局限于上皮层的下2/3,细胞核大,异型明显,染色质加深,核分裂象多;细胞排列紊乱。③CIN III包括宫颈上皮重度不典型增生及原位癌。宫颈重度不典型增生病变累及2/3层以上或全部上皮层。细胞异型显著,核大、深染、染色质分布不均,有核分裂象;上皮极性几乎均消失。原位癌又称上皮内癌,上皮全层极性消失,细胞显著异型性,但基底膜完整,无间质浸润。

40. 答案:D

解析:了解子宫内膜周期性变化量可靠的诊断依据是诊断性刮宫,通过刮取子宫内膜行活组织检查,作出病理学诊断。

41. 答案:A

解析:输尿管按行径可分为腹段、盆段和壁内段。输尿管自肾盂下端起始后,在腹后壁腹膜的深面,沿腰大肌前面向下。达小骨盆入口处,左、右输尿管分别越过左髂总动脉末端和右髂动脉起始部的前面,此段称为腹段。从髂血管入盆腔,先沿盆侧壁向下向后,越过盆壁血管神经的表面,约在坐骨

棘水平转向前内侧穿入膀胱底的外上角,这一段称为盆段。

42. 答案:C

解析:慢性萎缩性胃炎并发贫血的主要原因是铁吸收障碍。

43. 答案:B

解析:IgE是体内介导变态反应的抗体。当变应原进入机体后,可刺激机体,由B淋巴细胞合成特异性IgE。IgE结合于肥大细胞、嗜碱性粒细胞表面的IgE受体。当变应原再次进入体内,可与IgE交联,使该细胞合成并释放多种活性介质导致平滑肌收缩、粘液分泌增加、血管通透性增高和炎症细胞浸润。

44. 答案:E

解析:动脉粥样硬化性心脏病患者的膳食原则包括1、限制总能量摄入,保持理想体重;2、限制脂肪和胆固醇的摄入;3、提高植物性蛋白的摄入,少吃甜食;4、保证充足的膳食纤维摄入;5、供给充足的维生素和微量元素;6、饮食清淡,少盐和少饮酒,每日盐摄入量应在6g以下;7、多吃保护性食物。

45. 答案:C

解析:小细胞未分化癌包括燕麦细胞癌、中间细胞癌和混合性癌。

46. 答案:B

解析:股骨头的血液供应是:①股骨滋养血管升支经股骨颈至股骨头;②旋股内、外侧动脉的分支在股骨颈基底关节囊滑膜返折处进入股骨头;③圆韧带内的小凹动脉。股骨头缺血坏死的主要原因是旋股内侧动脉损伤。

47. 答案:E

解析:当血糖浓度平均 $>10\text{mmol/L}$ 时,将会超过此肾阈值,尿中出现尿糖。

48. 答案:A

解析:在轻度高钾血症时,静息期细胞内 K^+ 外流减少,静息电位负值减小,故心肌兴奋性增高。静息电位减小说明细胞膜处于部分去极化状态,因而在动作电位的0期,膜内电位上升的速度较慢,幅度较小。这是因为在部分去极化的状态下,膜的快钠孔道部分失活,所以在0期钠的快速内流减少。当血清钾显著升高时,由于静息电位过小,心肌兴奋性也将降低甚至

消失，因为这时快钠孔道大部或全部都失活，心搏可因而停止。高钾血症时携带复极化钾电流的快钠孔道在开放的速度与程度上都加大，故钾外流加速，复极化 3 期加速，因此动作电位时间和有效不应期均缩短。快钠孔道开放的加速与加大，虽然也倾向于使复极化 2 期(坪)缩短，但由于细胞外液中 K⁺浓度的增高抑制了 Ca²⁺在 2 期的内流，故坪实际上有所延长。

49. 答案:B

解析:阵发性室上性心动过速会由于心率太快导致心脏泵血功能减弱而导致心肌缺血缺氧，出现胸痛。

50. 答案:D

解析:纤维素样坏死仅在光镜下才可看到，肉眼看不到。镜下，坏死组织成细丝、颗粒状的红染的纤维素(纤维蛋白)样，聚集成片块。

51. 答案:C

解析:产气荚膜梭菌，人类气性坏疽的主要病原菌。厌氧性革兰氏阳性梭状芽胞粗短杆菌，无鞭毛，有荚膜，专性厌氧。糖发酵能力强，产酸产气。本菌的特征之一是在牛乳培养基中呈暴烈发酵现象。产气荚膜梭菌既能产生强烈的外毒素，又有多种侵袭性酶，并有荚膜，构成其强大的侵袭力，引起感染致病。

52. 答案:D

解析:齿状韧带为软脊膜向两侧伸出的三角形结构。呈额状位，介于前、后根之间。其外侧缘形成三角形齿尖，与硬脊膜相连。齿状韧带每侧有 15~22 个，有维持脊髓正常位置的作用。

53. 答案:B

解析:IgG 是血清中含量最高的免疫球蛋白，是再次免疫应答的主要抗体，也是唯一能通过胎盘的抗体。

54. 答案:C

解析:白化病是由于酪氨酸酶缺乏或功能减退引起的一种皮肤及附属器官黑色素缺乏或合成障碍所导致的遗传性白斑病。患者视网膜无色素，虹膜和瞳孔呈现淡粉色，怕光。皮肤、眉毛、头发及其他体毛都呈白色或黄白色。白化病属于家族遗传性疾病，为常染色体隐性遗传，常发生于近亲结婚的人群中。

55. 答案:D

解析:丝状乳头，量最多，细长圆锥形，上皮浅层细胞角化，均匀分布于舌尖和舌背。

56. 答案:E

解析:气性坏疽的临床特点是进行性局部肌组织坏死，伤口中有大量浆液性或血性渗出物，有恶臭。皮下如有积气，可触及捻发音，局部胀痛明显，病情发展迅速，应及时减张，彻底清创。

57. 答案:B

解析:流行病学用于描述疾病与健康状态的分布特点，这些分布特点应该用数量正确地把它表示出在地区、时间、人群的分布上，进而提示发病因素的分布的不同。

58. 答案:B

解析:居民健康档案内容包括个人基本信息、健康体检、重点人群健康管理记录和其他医疗卫生服务记录。个人基本情况包括姓名、性别等基本信息和既往史、家族史等基本健康信息，于居民首次建立健康档案时填写。因此健康管理的首要步骤一般是搜集个人基本信息。

59. 答案:C

解析:超常处方 3 次提出警告，再 2 次取消处方权，即 3+2。

60. 答案:E

解析:《母婴保健法》第八条规定“婚前医学检查包括对下列系列疾病的检查:(1)严重遗传疾病(2)指定传染病(3)有关的精神病。”婚前医学检查不同于一般体格检查，它的重点在于通过医学检查的手段发现有影响结婚和生育的疾病，给予及时治疗，并提出有利于健康和出生子代素质的医学意见。因此，婚前医学检查的重点是严重遗传性疾病、指定传染病和有关精神病，而且通过一些化验检查发现亚临床的性传播疾病，采取有效措施预防母婴垂直传播。

61. 答案:A

解析:室间隔缺损可以造成左向右分流，引起肺血增多。容易出现反复呼吸道感染，表现为感冒、支气管炎、肺炎等。

62. 答案:C

解析:化脓性脑膜炎最易引起的并发症是硬膜下积液。本病潜伏期 1~7 日,一般 2~3 日,临床上按病情及表现分为四型:普通型、暴发型、轻型、慢性败血症型。

63. 答案:D

解析:只富含磷酸盐和氮素的水,在光照和其他环境适宜的情况下,水中的营养物质使水中的藻类过量生长。

64. 答案:B

解析:淋病是由淋病奈瑟球菌(简称淋球菌)所引起的泌尿生殖系感染的性传播疾病。

65. 答案:A

解析:在假设检验中, α 代表第一类错误发生的概率, β 代表第二类错误发生的概率, $1-\beta$ 代表假设检验的检验效能, P 代表检验得到的概率值,若 $P \leq \alpha$ ($\alpha = 0.05$) 即可判定发生小概率事件。

66. 答案:B

解析:乙胺丁醇的不良反应是球后视神经炎。

67. 答案:A

解析:人体站立时胸部最低的是肋膈隐窝。

68. 答案:C

解析:中枢神经系统兴奋剂包括咖啡因、苯丙胺类兴奋剂、可卡因等。阿片类药物均是作用于阿片受体而发挥其生物学活性的,包括天然、人工合成或部分合成的阿片类物质,如海洛因、吗啡、鸦片、美沙酮、二氢埃托啡、哌替啶、丁丙诺啡等。致幻剂能改变意识状态或感知觉,如麦角酸二乙酰胺(LSD)、仙人掌毒素(mescaline)等。可拉明俗名尼可刹米,是一种中枢兴奋药。主要用于中枢性呼吸及循环衰竭、麻醉药、其他中枢抑制药的中毒急救。

69. 答案:E

解析:引起超敏反应的抗原性物质叫变应原。

70. 答案:B

解析:公共卫生伦理原则包括:①全社会参与原则;②社会公益原则;③社会公正原则;④互助协同原则;⑤信息公开原则。社会公益原则需要在个人利益与社会利益之间找到最佳平衡

点。

71. 答案:C

解析:主动转运是指细胞通过本身的某种耗能过程使某种物质的分子或离子逆浓度差作跨膜运动,即由膜的低浓度一侧移向高浓度一侧的过程。自由扩散的物质有氧气、二氧化碳、水分子。主动转运的物质有氨基酸、各种离子进入细胞,葡萄糖进入小肠上皮细胞。维生素进入细胞为易化扩散。递质为大分子物质,不能跨膜,所以是胞吞胞吐。激素有很多种,例如:性激素是小分子脂溶性—自由扩散,甲状腺激素是氨基酸衍生物,耗能—主动运输,其他一些大分子激素,大部分是一胞吞胞吐。

72. 答案:A

解析:米索前列醇,为前列腺素 E1 衍生物,具有强大的抑制胃酸分泌的作用,同时对妊娠子宫有收缩作用。

73. 答案:B

解析:题中两个样本分别来自方差相等的正态分布总体的假设是不成立的,为等级资料两样本的比较,应采用 Wilcoxon 秩和检验(B 对),其主要目的是比较两样本代表的总体分布位置是否有差别。

74. 答案:C

解析:Giemsa 染色查巨大细胞包涵体:孕妇宫颈脱落细胞或尿液涂片行 Giemsa 染色后,在光镜下检测脱落细胞核内嗜酸性和嗜碱性颗粒,这种特异细胞称为猫头鹰细胞,具有诊断巨细胞病毒感染的价值。

75. 答案:C

解析:缺铁性贫血的骨髓象特点为:增生活跃或明显活跃;以红系增生为主,粒系、巨核系无明显异常;红系中以中晚幼红细胞为主,其体积小,核染色质致密,胞浆少,偏蓝色,边缘不整齐,血红蛋白形成不良,呈“核老浆幼”现象。故本题的正确答案是 C。

76. 答案:B

解析:低容量性低钠血症,失 Na^+ 多于失水,血清 Na^+ 浓度 $< 130\text{mmol/L}$,血浆渗透压 $< 280\text{mmol/L}$,伴有细胞外液量的减少。也可称为低渗性脱水。肾上腺皮质功能亢进,分泌醛固酮增多,使肾脏排钾功能增强,有时可引起严

重的低钾血症。

77. 答案:B

解析:突发事件监测机构、医疗卫生机构和有关单位发现突发公共卫生事件,应当在 2 小时内向所在地县级人民政府卫生行政主管部门报告;接到报告的卫生行政主管部门应当在 2 小时内向本级人民政府报告,并同时向上级人民政府卫生行政主管部门和国务院卫生行政主管部门报告。

78. 答案:C

解析:在流行病学研究中易出现且对观察结果有较大影响的偏倚可以分为选择偏倚、信息偏倚、混杂偏倚三类。

79. 答案:C

解析:大叶性肺炎病变有四期:充血水肿期、红色肝样变期、灰色肝样变期、溶解消散期。红色肝样变期(3~4 天):①镜下:肺泡壁毛细血管显著扩张充血;肺泡腔内大量纤维素及大量红细胞;②肉眼:病变肺叶肿胀,重量增加,色暗红,质实如肝,切面呈粗糙颗粒状;③临床:铁锈色痰,胸痛,呼吸困难及紫绀,肺实变体征,大片致密阴影,可检出多量肺炎球菌。

80. 答案:C

解析:急进性肾小球肾炎是指在肾炎综合征基础上短期内出现少尿、无尿,肾功能急骤进展,短期内达尿毒症的一组临床综合征。

81. 答案:A

解析:急性排斥反应,一般发生于术后 3 个月内,临床表现为肾肿胀压痛、发热、乏力、尿量减少,体重增加及血压升高。生化检查中血肌酐及尿素氮水平升高,内生肌酐清除率降低,尿蛋白和红、白细胞增多。彩色多普勒超声检查可发现肾肿大,血管阻力增加;肾扫描发现肾血流量减少。

82. 答案:E

解析:引起 AG 升高型代谢性酸中毒的原因是产酸增加。缺氧、休克、心跳呼吸骤停等使有氧氧化障碍,无氧酵解,增加乳酸生成增多。酮体和乳酸含量升高都可造成血中有机酸阴离子浓度增加,AG 增大,血浆中 HCO₃⁻为中和这些酸性物质而大量消耗,引起 AG 升高型代谢性酸中毒。

83. 答案:B

解析:因抢救生命垂危的患者等紧急情况,不能取得患者或者其近亲属意见的,经医疗机构负责人或者授权的负责人批准,可以立即实施相应的医疗措施。

84. 答案:B

解析:适应障碍是指在可以辨认的日常生活中的应激性事件的影响下,由于易感个性,适应能力不良,个体对该应激源出现超出常态的反应性情绪障碍或适应不良行为,导致正常工作和人际交往受损。这种障碍的程度一般较轻,持续时间不长(不超过 6 个月),随应激事件的消除和应付能力的改善而恢复。

85. 答案:B

解析:日常生活中,当人们面对即将发生的、且自己担心后果的事件时,焦虑就会自然而然产生,比如面对考试、当众讲话等,可能会产生紧张、害怕,期待结果又害怕结果的心境,并为此坐立不安、搓手顿足甚至频频上厕所,这就是焦虑,是面对压力所产生的正常情绪反应。

86. 答案:E

解析:梨状肌损伤表现有臀部困痛及下肢坐骨神经痛,直腿抬高 60° 以内痛加重,超过 60° 反而减轻。

87. 答案:B

解析:持续性的不规则阴道流血,无绒毛结构(组织学检查时若仅见成片滋养细胞浸润及坏死出血,未见绒毛结构者,则诊断为绒癌,最有可能的诊断是绒毛膜癌。

88. 答案:C

解析:丙基硫氧嘧啶(PTU)和甲巯咪唑(他巴唑)均可用于孕妇,PTU 较甲巯咪唑更适用于妊娠期甲亢。因 PTU 不易通过胎盘,用最小有效剂量(如每日 100-300mg,分 2~3 次口服),控制甲亢症状后,尽快减至维持量,维持甲状腺功能稍高于正常水平,避免治疗过度导致的母体和胎儿甲减。故选 C。

89. 答案:B

解析:6-磷酸葡萄糖脱氢酶分子缺陷引起的蚕豆病。

90. 答案:B

解析:患者长期便中带血,已造成贫血状况,但无疼痛症状,直肠指检未发

现肿块。已有贫血，所以不能对症处理，排除 A。因便时带血，可做肛门镜检查，排除肛门周围病变。C 和 E 均是检查肠道病变。故此题选 B。

91. 答案:D

解析:根据题干,该患者最可能诊断为支气管哮喘,检查主要是肺功能试验,包括通气功能检测、支气管激发试验、支气管舒张试验和呼气峰流速及其变异率测定,故选 D。A、B、C、E 均不是明确诊断的选项,不易与其他疾病鉴别,故不选。

92. 答案:D

解析:绒毛膜癌临床表现为:①流产、分娩或葡萄胎排空术后阴道不规则出血。②腹痛(子宫肌壁受累或癌组织穿破子宫内出血)。③检查子宫长大不规则或有盆腔肿块。④转移灶相应的症状及体征肺转移(咯血、胸痛),阴道转移(流血及转移结节破损),脑转移(出现脑血管栓塞、颅内高压、脑疝等相应症状)。⑤HCG 测定葡萄胎清宫术后 12 周,流产后、自然流产后 1 个月,HCG 值持续升高。X 线胸片、B 超、CT 等检查可协助确定转移部位。

93. 答案:A

解析:女性患者主要表现为闭经、溢乳、排卵障碍及继发性骨质疏松等。治疗垂体催乳素腺瘤的药物主要有以下几种:溴隐亭、卡麦角林、培高利特及喹高利特。

94. 答案:B

解析:DIC 的原因和发病机制:1. 组织或细胞损伤 2. 血管内皮损伤 3. 血小板被激活,血细胞大量破坏 4. 促凝物质入血:急性坏死性胰腺炎时,大量胰蛋白酶入血,可激活凝血酶原,促进凝血酶生成。

95. 答案:B

解析:患者频发痛属于痛觉过敏。

96. 答案:B

解析:患者老年男性,有胸闷气促症状,查体:吸气时 BP85/60mmHg 而呼气时 BP100/75mmHg(奇脉的典型表现);心尖搏动减弱、心界向两侧扩大且心音低钝遥远(大量心包积液的典型体征),结合患者的病史和典型体征,该患者考虑为心包积液引起心脏压塞。当心包积液量大时可于左肩胛骨下出现叩

浊音,听诊闻及支气管呼吸音,称心包积液征(Ewart 征)(B 对)。De-Musset 征(点头征)(A 错)是指头部出现与心跳一致的规律性点头样运动;Corrigan 征(C 错)即水冲脉,指脉搏骤起骤落,犹如潮水涨落;Quincke 征(D 错)即毛细血管搏动征,指轻压指甲可见甲床随脉搏发白和变红;Traube 征(E 错)即枪击音,指在股动脉搏动处听到的刺耳音,若出现这四种体征可称为周围血管征阳性,常见于主动脉瓣重度关闭不全、甲状腺功能亢进和严重贫血等,一般少见于心脏压塞患者。

97. 答案:A

解析:主动-被动型模式中,医患双方不是双向作用,而是医师对患者单向发生作用。这种模式适用于昏迷、休克、精神病患者发作期、严重智力低下者以及婴幼儿等一些难以表达主观意志的患者。

98. 答案:B

解析:移情是咨询者把过去生活中某些重要人物的情感转移到治疗师身上的过程。自由联想是会谈时让患者选择自己想谈的题目,总之,随着脑中涌现的念头脱口而出,不管说出来的事情彼此有无关联,是否合乎逻辑或幼稚可笑,治疗师均不干涉。释梦是对治疗者的梦进行解析。阻抗是治疗者谈到某些关键时刻所表现出来的阻力。自我宣泄是让治疗者自由的表达被压抑的情绪。

99. 答案:A

解析:小于 5 次的不明原因反复惊厥首选地西洋,>5 次的不明原因反复惊厥首选苯巴比妥。

100. 答案:A

解析:与其他组织不同,心肌与脑组织主要依靠葡萄糖供能,不能依靠脂肪和氨基酸代谢供能,因此选 A。

101. 答案:C

解析:痛风是指遗传性或获得性病因致嘌呤代谢障碍、血尿酸增高伴组织损伤的一种疾病。临床表现为关节炎和尿路结石,进食肉类食物时加重。发病的先决条件是血尿酸增高。尿酸为嘌呤代谢的最终产物,主要由氨基酸和其他嘌呤类化合物以及食物中的

嘌呤经酶的作用分解而来，因而该病涉及的代谢途径为嘌呤核苷酸代谢。故选 C。

102. 答案:E

解析:患者青年女性,突发心悸半小时,脉率为 180 次/分(室上速心室率为 150~250 次/分),脉率齐,诊断为阵发性室上速。治疗阵发性室上速可先尝试刺激迷走神经的方法:颈动脉窦按摩(患者取仰卧位,先行右侧,每次 5~10 秒,切莫双侧同时按摩)、Valsalva 动作(深吸气后屏气、再用力作呼气动作)、诱导恶心、将面部浸没于冰水内等方法可使心动过速终止。冷刺激使阵发性室上速缓解的机制是刺激迷走神经,释放的递质 ACh 则可增加外向钾电流而降低内向电流,使房室交界区细胞 4 期自动去极化减弱(E 对)。由于迷走神经对心脏有抑制作用,不会使窦房结细胞自律性增强(B 错)、房室延搁时间缩短(D 错)。房室交界区不应期延长(A 错)、异常传导通路的兴奋性增强(C 错)均与冷刺激导致的心率减慢无关。

103. 答案:C

解析:根据题干所述症状、体征,满足“发热、休克、充血、出血和急性肾衰竭”五大典型症状,考虑为肾综合征出血热,即流行性出血热,选 C。

104. 答案:B

解析:《医疗机构管理条例》关于经营范围的规定。《医疗机构管理条例》第二十七条规定:“医疗机构必须按照核准登记的诊疗科目开展诊疗活动。”因此该医院的行为属超范围执业。

105. 答案:E

解析:紧急预防方法是用含有高效价抗-HBs 制备的人免疫球蛋白(HBVIg),一般在一周内注射有预防效果。

106. 答案:A

解析:足不能内翻,损伤的是胫前肌腱。

107. 答案:E

解析:17 岁属于未成年人,行手术需要监护人签署知情同意书。

108. 答案:C

解析:性格的结构可以分为四个维度的特征,分别是态度特征、意志特征、理智特征、情绪特征。态度特征(C 对)是指个体在对现实生活各个方面的态

度中表现出来的一般特征。题中同学乐于助人、尊师爱校的行为方式属于性格的态度特征。理智特征(E 错)是指个体在认知活动中表现出来的心理特征。情绪特征(D 错)是指个体在情绪表现方面的心理特征。意志特征(B 错)是指个体在调节自己的心理活动时表现出的心理特征。

109. 答案:E

解析:为保证应急用血,医疗机构可以临时采集血液,但应当确保采血用血安全。

110. 答案:A

解析:因为在怀孕早期,也就是 1~3 个月是胎儿最不稳定的时间段,此时间段接受 X 线照射会给胎儿造成伤害。这个时候胎儿的四肢、器官都在发育,如果受到辐射影响易发生畸形。

111. 答案:D

解析:主动安乐死是指对符合安乐死条件的病人,医生使用药物或其他方式尽快结束病人痛苦的死亡过程,让其安宁、舒适地死去。这种安乐死争议较大,是立法时主要解决的问题。

112. 答案:B

解析:阿瑟氏(arthus)反应也就是实验性局部过敏反应。是指在预防接种过程中,经过多次注射后,注射局部出现水肿、出血和坏死等剧烈炎症反应。

113. 答案:D

解析:术后下床活动导致栓子脱落阻塞肺动脉主干,引起呼吸衰竭死亡。故选 D。

114. 答案:E

解析:儿童患者,发热,头痛,呕吐 4 天,昏迷半天于 2 月 10 日入院,查体见皮肤出血点,以及一系列脑膜刺激症状,血白细胞(WBC)数量升高(正常值 $(4.0 \sim 10.0) \times 10^9/L$),考虑诊断为流行性脑脊髓膜炎,其脑组织病理检查可见:脑血管高度扩张充血,蛛网膜下腔增宽,充满黄色脓性分泌物(E 对)。颅底多发性闭塞性动脉内膜炎,引起脑实质损害(A 错)为结核性脑膜炎的病变特点。软脑膜充血、水肿、出血(B 错)为流行性乙型脑炎的病变特点。脑沟和脑回可见小的肉芽肿,结节和脓肿,蛛网膜下腔可见有胶样渗出物(C

错)为新型隐球菌性脑膜炎的病变特点。病变多发生在灰质、白质交界处,引起脑室扩大,脑积水及脑蛛网膜炎(D 错)为脑囊虫病的病变特点。

115. 答案:E

解析:结核病是一种特殊性炎症,其病变特点是形成结核性肉芽肿,但基本病变是渗出、变质和增生。当细菌量较少、毒力较低、机体免疫力较强时,表现为增生为主的病变,形成具有一定形态特征的结核结节。镜下典型结核结节中央常有干酪样坏死,其中含有结核杆菌,周围有类上皮细胞、Langhans 巨细胞以及外周浸润的淋巴细胞和少量增生的成纤维细胞。

116. 答案:E

解析:瘻管是肛管直肠与肛门周围皮肤相通的感染性管道,其内口位于齿线附近,外口位于肛门周围皮肤上,不断有脓、粪液流出,长年不愈,故选 E 项。

117. 答案:C

解析:扩张型心肌病由于病因未明,预防较困难。治疗主要包括:①休息及避免劳累;②有心力衰竭者治疗原则与一般心力衰竭相同;③对预防栓塞性并发症可用口服抗凝药或抗血小板聚集药;④改善心肌代谢的药物如维生素 C、三磷酸腺苷、辅酶 A、环化腺苷酸、辅酶 Q10 等可作为辅助治疗;⑤对长期心力衰竭,内科治疗无效者应考虑作心脏移植。螺内酯(安体舒通)可引起血钾增高,该患者血清钾 6.7mmol/L,故不适合应用。

118. 答案:D

解析:COPD 急性发作患者经广谱抗生素治疗好转后再次发热,口腔有白色念珠菌感染,考虑为继发的二重感染,治疗应选用抗真菌药。红霉素为大环内酯类抗菌药,是支原体、衣原体感染的首选用药,对真菌不敏感;氟康唑对真菌无效;青霉素对真菌无作用;环丙沙星属于喹诺酮类药物,对真菌无效;两性霉素 B 是多烯类抗深部真菌抗生素,目前是治疗深部真菌感染的首选药物。

119. 答案:A

解析:PaO₂ 低于 8kPa(60mmHg)时,血氧容量正常值约 20ml/dl,动脉血氧含

量 (CaO₂) 正常范围:8.55~9.45mmol/dl(19~21ml/dl),正常动-静脉血氧含量差是 5ml/dl,其缺氧类型是低张性缺氧。

120. 答案:D

解析:在延髓的腹内侧部,前正中裂的两侧为锥体,锥体深面有锥体束,在中线两侧锥体的背侧有内侧丘系。舌下神经三角深面的舌下神经核发出的纤维行向腹侧经锥体和橄榄之间出脑形成舌下神经。损伤了左侧舌下神经根,导致左侧半舌肌瘫痪,伸舌时舌尖偏左侧。损伤了左侧锥体束,导致右侧上、下肢肌痉挛性瘫痪。损伤了左内侧丘系,导致右侧上、下肢和躯干意识性本体感觉和精细触觉障碍,为左侧延髓内侧综合征或舌下神经交叉性偏瘫。因此,正确答案为 D。

121. 答案:A

解析:医务人员有下列情形之一的,依法给予处分;情节严重的,由县级以上地方人民政府卫生主管部门依照职责分工暂停其 6 个月以上 1 年以下执业活动;情节特别严重的,由原发证部门吊销其执业证书:(1)未经人体器官移植技术临床应用与伦理委员会审查同意摘取人体器官的;(2)摘取活体器官前未依照人体器官移植条例规定履行说明、查验、确认义务的;(3)对摘取器官完毕的尸体未进行符合伦理原则的医学处理,恢复尸体原貌的。

122. 答案:C

解析:应用心理测验所应遵循的原则主要有:①标准化原则,必须采用标准化的测验工具,按照标准化的程序操作;②保密性原则,测验操作者有义务对测验材料及内容保密;③客观性原则,对测验结果的解释要根据被试者的实际情况考虑,实事求是,而不是仅仅凭分数判断。

123. 答案:B

解析:脉压增大就是收缩压升高、舒张压降低、脉压增大的情况,常见于:动脉瓣关闭不全、高血压、动脉硬化、甲状腺功能亢进、急性心功能不全等。一般认为,主动脉及其他大动脉粥样硬化、动脉壁的弹性和伸展性降低是单纯性收缩期血压增高引起的。

124. 答案:E

解析:金黄色葡萄球菌可以产生凝固酶、杀白细胞素和肠毒素。

125. 答案:D

解析:亚急性重型肝炎肉眼观:肝体积明显缩小,外观黄绿色,表面呈结节状。光镜下见肝细胞大片坏死,同时可见肝细胞再生结节,明显淤胆,大量炎症细胞浸澜,结节间纤维组织及小胆管明显增生。本例患者病变符合亚急性重型肝炎的病变特点。

126. 答案:B

解析:应对该男士提高其认识,激动其戒烟动机。

127. 答案:C

解析:当个体生存遇到威胁或者个人需求得不到满足时,就有可能发生应激,这是个体在长期进化过程中获得的适应性、防御性反应,有利于个体在变动的环境中维持自身稳态。而在应激时最重要的神经内分泌反应是交感-肾上腺髓质系统和下丘脑-垂体-肾上腺皮质系统。本题中,此人的呼吸、心率和血压的变化是由于血液中去甲肾上腺素和肾上腺素浓度提高所致。故选C。

128. 答案:E

解析:病原体通过母体传给子代称为垂直传播。患艾滋病孕妇使病毒经胎盘累及胎儿,称为经胎盘传播,属于垂直传播。接受被艾滋病病毒污染的血液或血制品而感染艾滋病,属于医源性传播的一种。社会人群个体之间的传播,统称为水平传播。

129. 答案:D

解析:职业病:当职业性有害因素作用于人体的强度超过一定限度时,造成的损害机体已不能代偿,从而导致一系列功能性和(或)器质性病理变化,出现相应的临床症状和体征,即成为职业病。

130. 答案:A

解析:意志的品质具有自觉性、果断性、坚韧性、自制性。自觉性(A对)是指能主动地支配自己的行动,使其能达到既定目标的心理过程。自觉性表现在个体具有明确的行动目的,并能充分认识行动效果的社会意义,使自己的行动符合社会、集体的利益,不屈从于周围人的压力,按照自己的信念、

知识和行动方式进行行动的品质,题中学生的行为正是如此。与自觉性相反的有意志的动摇性、受暗示性、盲从、随波逐流、刚愎自用和独断性等。坚韧性(B错)是指一个人能长期保持充沛的精力,战胜各种困难,不屈不挠地向既定的目的前进的品质。果断性(C错)是指人善于明辨是非,迅速而合理地采取决断,并实现目的的品质。自制性(D错)是指一种能够自觉地、灵活地控制自己的情绪和动机,约束自己的行动和语言的品质。

131. 答案:E

解析:共同维护患者的利益和社会公益是医务人员共同的首要义务和天职。

132. 答案:C

解析:在微循环中,毛细血管前括约肌起着“分闸门”的作用,它的开闭直接影响到真毛细血管的血流量。而该处的血流量对物质交换最为重要。毛细血管前括约肌很少或不受交感缩血管神经的支配,主要受体液因素的调节。

133. 答案:B

解析:特发性肺纤维化诊断主要根据临床特征、胸部影像学表现、肺通气及弥散功能、病理活检等。肺功能检查 IPF 的典型肺功能改变包括限制型通气损害(肺活量 VC 减少)、肺容量缩小、肺顺应性降低和弥散量降低。严重者出现 PaO₂ 下降和 PaO₂ 增宽。

134. 答案:D

解析:人体微量元素异常会导致疾病。低硒与克山病和骨节病有关;缺碘导致呆小症;铁过剩致血红蛋白沉着;汞中毒发生水俣病;铜代谢异常引起 Wilson 病。

135. 答案:C

解析:砷中毒,乌脚病主要与长期摄入含有高砷的食物和水,以及吸入含有高砷的空气有关,导致体内砷含量超标。

136. 答案:D

解析:蒸发散热是指体液的水分在皮肤和粘膜(主要是呼吸道粘膜)表面由液态转化为气态,同时带走大量热量的一种散热方式。

137. 答案:B

解析:传导散热指机体的热量直接传

给与之接触的温度较低物体的一种散热方式。给高热患者用冰帽降温即通过使冰帽直接接触机体使机体热量直接传导至冰帽达到降温目的。

138. 答案:B

解析:体检属于健康筛查。

139. 答案:A

解析:叶酸是一种水溶性 B 族维生素,对细胞的分裂生长及核酸、蛋白质的合成起着重要作用,也是胎儿生长发育不可缺少的营养素。若妊娠早期缺乏叶酸,会影响胎儿大脑与神经的发育,造成神经管畸形。孕妇口服叶酸属于化学预防。

140. 答案:C

解析:通过市场机制来筹集费用和提供服务的保险模式是商业医疗保险。

141. 答案:B

解析:通过国家立法形式强制实施,主要由雇主和雇员缴纳保费的保险模式是社会医疗保险。

142. 答案:E

解析:病例对照研究:选择患病及没患病的为病例组和对照组,回顾过去暴露情况,由果及因,可从一种疾病寻找多种病因线索。队列研究:选择未患病的人群按是否暴露分组观察患病结局。有果有因。临床试验研究:以患者为研究对象,以个体为单位进行随机化分组的试验方法。理论流行病学研究:也叫数理流行病学研究,是将流行病学调查所得到的数据,建立有关的数学模型或用电子计算机仿真,进行理论研究。现况调查研究:研究某个特定时间点和特定范围内人群中的有关变量(因素)与疾病或健康状况的关系,又称为横断面研究。本题应采用现况调查研究,故选 E。

143. 答案:A

解析:腹泻疾病的产生可能与吃学校食堂饭菜这个暴露因素有关,调查它们之间的关系,最好采取病例对照研究,故选 A。

144. 答案:A

解析:糖皮质激素可提高中枢神经的兴奋性,有些患者因大量长期应用,可引起欣快、激动、失眠,偶可诱发精神失常、躁狂。B 项,加速蛋白质的分解代谢常为大量甲状腺的作用。C 项,

糖皮质激素可以加强脑组织对于葡萄糖的利用。

145. 答案:A

解析:糖皮质激素对有些组织细胞虽无直接活性,但可给其他激素发挥作用创造有利条件,称为允许作用。例如糖皮质激素(氢化可的松)可增强儿茶酚胺(去甲肾上腺素)的血管收缩作用,从而使去甲肾上腺素的升压作用增强(A 对,BCDE 错)。

146. 答案:C

解析:灵敏度指金标准确诊的病例中被评试验也判断为阳性者所占的百分比。即 64%。

147. 答案:B

解析:特异度指金标准确诊的非病例中待评价试验也判断为阴性者所占的百分比,特异度= $d/(b+d) \times \%$,其中 d 代表真阴性,b 代表假阳性。根据题目描述,可知 d 为 84,b 为 16,特异度= $84/(16+84) \times \%=84\%$ (B 对)。

148. 答案:E

解析:粗一致性是试验所检出的真阳性和真阴性例数之和占受试人数的百分比,所以应为 $(64+84)/200$,结果为 74%。

149. 答案:E

解析:处方开具当日有效。特殊情况下需延长有效期的,由开具处方的医师注明有效期限,但有效期最长不得超过 3 天。处方一般不得超过 7 日用量;急诊处方一般不得超过 3 日用量;对于某些慢性病、老年病或特殊情况,处方用量可适当延长,但医师应当注明理由。

150. 答案:E

解析:治疗儿童多动症的“哌醋甲酯”,开具的处方不得超过 15 天。

第二单元

1. 答案:B

解析:中性粒细胞缺乏症的诊断标准是中性粒细胞绝对数 $<0.5 \times 10^9/L$ 。

2. 答案:E

解析:急性肾炎补体恢复正常一般在病后 8 周内。

3. 答案:C

解析:肾性高血压:肾性高血压为最常

见的继发性高血压，它是由于肾脏血管或肾脏实质的病变引起的高血压。

4. 答案:C

解析:冠心病支架术后同时要维护支架,就需要抗血小板治疗,比如氯吡格雷、阿司匹林,至少需要服用一年。

5. 答案:A

解析:肾上腺皮质激素单独或与免疫抑制药物合用是治疗狼疮性肾炎的有效方法。首选的免疫抑制剂为环磷酰胺。

6. 答案:A

解析:我国慢性肾衰竭的最常见病因是慢性肾小球肾炎,西方国家慢性肾衰竭的最常见病因是糖尿病肾病。

7. 答案:A

解析:I 型糖尿病选用胰岛素,或者与双胍类、 α -糖苷酶抑制剂联合使用。

8. 答案:A

解析:替硝唑及甲硝唑为治疗滴虫阴道炎的药物。咪康唑栓剂及克霉唑栓剂为治疗阴道假丝酵母菌病(VVC)的药物。单纯性(VVC)采用大剂量、短疗程治疗;复发性 VVC 需延长疗程。

9. 答案:C

解析:急性淋巴细胞白血病最常引起睾丸浸润,是髓外复发的第二根源。

10. 答案:B

解析:心肌梗死时,乳头肌可因急性缺血性坏死而在数小时内完全断裂。虽然腱索和瓣叶无异常病变,但相应部位的二尖瓣瓣叶丧失启闭功能,在发生梗死后早期即呈现严重的二尖瓣关闭不全。

11. 答案:C

解析:奇脉、颈静脉怒张、水肿、肝大等可在大量心包积液、有心衰竭等疾病时出现,只有心包叩击音才是缩窄性心包炎的特异性体征。

12. 答案:A

解析:妊娠合并甲亢时宜首选丙基硫氧嘧啶治疗,因其通过胎盘少于甲硫咪唑,对胎儿影响小,故不用甲硫咪唑。碳酸锂和普萘洛尔均疗效不满意而不首选,碘剂宜首选治疗甲亢危象。

13. 答案:A

解析:尺骨上 1/3 骨折合并桡骨头脱位,即孟氏骨折,需手术治疗。手术的目的是复位尺骨并且固定,桡骨小头复

位。

14. 答案:A

解析:慢性粒细胞白血病治疗首选酪氨酸激酶抑制剂,如伊马替尼、尼罗替尼,酪氨酸激酶抑制剂无效或无法耐受时考虑配型相合的相关或无关供者的异基因造血干细胞移植。

15. 答案:C

解析:塞来昔布为选择性 COX-2 抑制剂,主要通过肝药酶 CYP2C9 代谢。主要用于缓解骨关节炎、类风湿关节炎、强直性脊柱炎的肿痛症状。

16. 答案:D

解析:骨肉瘤的骨膜反应是 Codman 三角,“日光射线”现象,葱皮样变,骨膜增厚。

17. 答案:A

解析:治疗细菌性阴道炎最有效的是甲硝唑。

18. 答案:C

解析:HCV-RNA 即丙型肝炎病毒的核糖核酸,是 HCV 的遗传物质,是表示体内感染 HCV 的直接指标。目前用 PCR 方法可以直接检测血中的 HCV-RNA,可用于 HCV 感染的早期诊断。因其较丙型肝炎抗体出现早,故是丙型肝炎病原学诊断和判断传染性的一项有用的指标。

19. 答案:B

解析:骨折延迟愈合系指骨折在正常愈合时间内,未达到骨折完全愈合标准。多发生在血液供应差的部位,由于胫骨干主要靠中、下 1/3 交界处后面进入髓腔内的滋养动脉自上而下的血液供应,因此胫骨干中、下 1/3 骨折的骨折端可损伤此处的滋养动脉,造成骨折延迟愈合、甚至不愈合。

20. 答案:E

解析:脊柱骨折者从受伤现场转运至医院内的急救搬运方式至关重要。一人抬头,一人抬脚或用搂抱的搬运方式十分危险,因这些方法会增加脊柱的弯曲,可以将碎骨片向后挤入椎管内,加重脊髓的损伤。正确的方法是采用担架、木板甚至门板搬运。先使伤员双下肢伸直,木板放在伤员一侧,三人用手将伤员托至门板上,或二三人采用滚动法,使伤员保持平直状态,成一整体滚动至木板上。故选 E。

21. 答案:A

解析:丙硫氧嘧啶主要作用机制是抑制过氧化物酶,从而阻止酪氨酸的碘化及耦联,而药物本身则作为过氧化物酶的底物被碘化。

22. 答案:D

解析:内痔的好发部位常位于患者位于截石位时的 3、7、11 点处:来自肠系膜下动脉的直肠上动脉是直肠供应动脉中最主要的一支,也是内痔的主要供应血管,其分支分别位于左侧、右前和右后,因此这三处成为内痔的好发部位。

23. 答案:D

解析:糖尿病眼病共分为 6 期:一期,眼底仅出现微血管瘤小的出血点,病人无任何自觉症状。二期,眼底出现黄色硬性渗出及出血斑,此期也无明显的自觉症状。三期,眼底出现棉绒斑及弥散的出血斑,病人可出现不同程度的视力下降。四期,眼底有新生血管,并有玻璃体出血,病人视力下降明显。五期,眼底新生血管和纤维增殖,此期病人视力下降明显,可出现视物障碍。六期,眼底新生血管和纤维增殖,并发牵拉性视网膜脱离,此期病人视力基本丧失。

24. 答案:B

解析:伤寒的对症治疗:(1)高热时适当应用物理降温,不宜用发汗退热药,以免虚脱。(2)便秘时用开塞露或生理盐水低压灌肠,禁用泻药。(3)腹泻时可用收敛药,忌用阿片制剂。(4)腹胀可用松节油腹部热敷及肛管排气,禁用新斯的明类药物。注意出现便秘时不能使用高压灌肠,也不能使用泻药,否则容易肠出血、肠穿孔出现严重并发症。

25. 答案:E

解析:心室前负荷又称容量负荷,前负荷加重时可见于瓣膜反流性病变,如二尖瓣和主动脉瓣关闭不全致左心室前负荷过重。

26. 答案:C

解析:高血压伴有低血钾是原发性醛固酮增多症的特征性表现。凡是出现高血压伴有低血钾,首先应考虑原发性醛固酮增多症,原发性醛固酮增多症引起的高血压占高血压患者的

0.4%~2%,而其他选项的高血压很少伴有低血钾。故选 C。

27. 答案:E

解析:变形红细胞血尿为肾小球源性,均一形态正常红细胞血尿为非肾小球源性。

28. 答案:E

解析:膀胱癌的组织类型、细胞分化程度、浸润深度均与预后有关。上皮性肿瘤占 95%以上,其中绝大多数为移行细胞乳头状癌;鳞癌和腺癌各占 2%~3%,但恶性度较高,呈浸润性生长。非上皮性肿瘤罕见。

29. 答案:C

解析:尿毒症患者出现水钠潴留,导致血容量增加而使血压升高。

30. 答案:B

解析:肾综合征出血热早期休克是因全身小血管通透性增加,血浆外渗引起血容量锐减。

31. 答案:B

解析:多根多处肋骨骨折将使局部胸壁失去完整肋骨支撑而软化,出现反常呼吸运动,即吸气时软化区胸壁内陷,呼气时外突,又称为连枷胸。连枷胸的反常呼吸可使伤侧肺受到塌陷胸壁的压迫,呼吸时两侧胸腔压力的不平衡造成纵膈扑动,影响肺通气,导致体内缺氧和二氧化碳滞留,严重时可发生呼吸和循环衰竭,连枷胸常伴有广泛肺挫伤、挫伤区域的肺间质或肺泡水肿导致氧弥散障碍,出现低氧血症。

32. 答案:E

解析:风湿性疾病是一组以内科治疗为主的肌肉骨骼系统疾病,其特点为病程多呈慢性经过,临床表现差异大,反复发作与缓解交替出现,多种疾病有复杂的免疫学异常,同一疾病的不同个体对治疗的反应有很大差异。

33. 答案:E

解析:甲状腺癌按肿瘤的病理类型可以分为乳头状癌、滤泡状腺癌、未分化癌和髓样癌,未分化癌恶性程度最高。未分化癌通过淋巴道、血道转移,高度恶性,浸润广泛,生长迅速,甚至先有淋巴结、肺转移,放疗为主,预后极差。乳头状癌是一种分化好的甲状腺癌,青年人发病较多,多为单

发,生长缓慢,预后最好。

34. 答案:B

解析:双胍类药物的不良反应为胃肠道反应,偶有过敏反应。在缺氧情况下易发生乳酸性酸中毒。 α -葡萄糖苷酶抑制剂常见不良反应为胃肠道反应。胰岛素增敏剂不良反应主要有水肿、体重增加。磺脲类药物的不良反应主要是低血糖症。故本题应选 B。

35. 答案:D

解析:非机械性梗阻是指中枢或周围神经疾病造成某部分尿路功能障碍,影响尿液排出。外伤性高位截瘫是由于脊柱损伤,而使脊髓受压挫伤或横断,所造成的不同平面的截瘫,即中枢神经受损。

36. 答案:A

解析:尿路感染常见感染途径有:①上行感染:最主要的感染途径,病原菌由尿道经膀胱、输尿管上行至肾脏;②血行感染:多呈现双侧感染;③直接感染:邻近组织脏器感染蔓延所致;④淋巴道感染:极少见。

37. 答案:E

解析:二尖瓣狭窄的典型杂音是心尖部舒张中晚期隆隆样杂音,系舒张期左房血液流向左室,经过狭窄的二尖瓣,血流形成涡流所致。

38. 答案:B

解析:室性期前收缩是洋地黄中毒常见的心律失常,以频发多源性室性期前收缩呈二联律最常见。

39. 答案:C

解析:类风湿关节炎为自身免疫性疾病,好发于中年女性,常对称性侵犯手部关节,可致关节畸形。

40. 答案:C

解析:重型肝炎可表现为黄疸迅速加深;由于凝血因子合成障碍出现明显出血倾向;肝萎缩,可有肝臭;神经系统症状有烦躁、谵妄、定向力和计算力障碍,嗜睡以至昏迷,多数病人有脑水肿;肝肾综合征。

41. 答案:A

解析:钩端螺旋体病病理损害为毛细血管损伤所致的严重功能紊乱。

42. 答案:A

解析:绝大多数急性心肌梗死(AMI)患者冠脉内可见在粥样斑块的基础上有

血栓形成,使管腔闭塞。心肌梗死最常发生的部位为左前降支,常引起左心室前壁、心尖部、下侧壁、前间隔和二尖瓣前乳头肌梗死

43. 答案:E

解析:选择性的钙通道阻滞剂(CCB)可进一步分为二氢吡啶类 CCB 和非二氢吡啶类 CCB(包括苯并硫氮革与苯烷基胺类)。其中属于二氢吡啶类 CCB 药物临床使用的最多常用的有硝苯地平、尼莫地平、氨氯地平、左氨氯地平、非洛地平、拉西地平、尼卡地平、非洛地平等;属非二氢吡啶类的药物是地尔硫革和维拉帕米。

44. 答案:C

解析:在骨折的“复位→固定→康复”三大治疗原则中,复位是首先要执行的,其次才是固定,然后在不影响固定的前提下进行康复锻炼。而“包扎”是具体治疗方法,属于骨折急救的步骤。

45. 答案:A

解析:治疗不用麻醉即可进行手法复位。术者一手握住腕部,另一手托住肘部,以拇指压在桡骨头部位,肘关节屈曲至 90° ,做轻柔的前臂旋后、旋前活动,反复数次,并用拇指轻轻推压桡骨头即可复位。复位成功的标志是可有轻微的弹响声,肘关节旋转、屈伸活动正常,复位后不必固定,但须告诫不可再暴力牵拉,以免复发。

46. 答案:D

解析:血液系统诊断首选骨髓检查。骨髓检查是确诊白血病及其类型的重要依据。

47. 答案:D

解析:老年男性患者,根据其肝炎病史及脐周静脉曲张考虑患者发生肝硬化。肝硬化主要表现为肝功能减退和门静脉高压。脐周静脉曲张为门静脉高压的征象。

48. 答案:B

解析:水肿形成机制:①血浆胶体渗透压降低(营养不良、各种原因导致的低蛋白血症);②毛细血管内静水压升高(各种原因引起的静脉回流障碍、循环血容量增加等);③毛细血管壁通透性增高(血管活性物质、炎症、细菌毒素、缺氧等);④淋巴液回流受阻(淋巴结

切除术后或淋巴管阻塞等)。由病例可知,患者尿蛋白(++++)，可导致低蛋白血症，因此答案选 B。

49. 答案:D

解析:突发胸痛伴大汗 3 小时提示急性心肌梗死,确诊首选心电图,心电图中心面向梗死部位的导联 ST 段抬高,并有异常 Q 波。

50. 答案:A

解析:体外冲击波碎石一般适用于大于六毫米,小于两厘米的膀胱结石。

51. 答案:D

解析:①间歇性无痛性肉眼血尿为肾盂癌最常见临床表现,IVP 显示左肾盂内有充盈缺损,膀胱镜检见左侧输尿管口喷血,说明出血来源于左肾,结合病史及临床表现,本例应诊断为左肾盂癌,故本题答案选 D。②肾结核常表现为慢性膀胱刺激征、终末血尿、脓尿等。

52. 答案:A

解析:脉压差增大的常见原因有动脉瓣关闭不全、高血压、动脉硬化、甲状腺功能亢进、急性心功能不全等。考虑到患者年龄及高血压病史,其脉压增大的最可能原因是大动脉管壁硬化。

53. 答案:B

解析:甲状腺功能亢进患者若反复发作弛缓性瘫痪,发作时血钾降低,称为周期性麻痹。

54. 答案:C

解析:股骨颈陈旧性骨折不愈合、影响功能的畸形愈合、股骨头缺血坏死或合并髋关节骨性关节炎者适合人工关节置换术。

55. 答案:D

解析:青年男性患者,腰背部疼痛,伴有乏力、盗汗(提示可能有结核杆菌感染),双下肢感觉运动功能正常(提示无脊髓、神经受压表现),X 线示 L2~3 椎间隙狭窄(腰椎结核的影像学表现),椎旁软组织阴影增宽(流注脓肿表现),结合患者症状、体征和影像学表现,该患者最可能的诊断为腰椎结核。

56. 答案:E

解析:骨囊肿为一种囊肿样局限性骨的瘤样病损,并非真正的囊肿。常见于儿童和青少年;好发于长管状骨的

干骺端,依次为肱骨上段、股骨上段、胫骨上端和桡骨下端。

57. 答案:D

解析:根据题意,患者 42 岁,吃海鲜后夜间突发左足第一跖趾关节剧烈疼痛,红肿和压痛明显,血尿酸增高,故诊断为痛风性急性关节炎。别嘌醇属于抑制尿酸合成药物,适用于尿酸生成过多或不适合使用促尿酸排泄药物者;苯溴马隆能抑制近端肾小管对尿酸盐的重吸收,从而增加尿酸的排泄,主要适于肾功能良好的患者,但两者都不能在急性期使用(AB 错);甲氨蝶呤属于改变病情抗风湿药物,常用于类风湿关节炎(E 错);痛风不是感染性疾病,抗生素无效(C 错)。依托考昔是一种非甾体抗炎药,用于治疗痛风性急性关节炎。

58. 答案:D

解析:膀胱扩大术适用于结核性膀胱挛缩,切除病肾,再经 3~6 个月抗结核治疗炎症愈合后,无尿道狭窄,肾功能及膀胱三角区明显异常者,可行膀胱扩大术。

59. 答案:C

解析:正中神经损伤:拇指对掌功能障碍,拇、示指捏物障碍,手掌桡侧半、桡侧 3 个半手指掌面及其中节和远节手指背面的皮肤感觉障碍;尺神经损伤:环指、小指爪形手畸形,手尺侧半和尺侧 1 个半手指的掌侧和背侧皮肤感觉障碍;桡神经损伤:垂腕畸形,手背桡侧半,桡侧两个半手指近节背面的皮肤感觉障碍,以虎口最为明显。

60. 答案:B

解析:高三尖杉酯碱用于治疗慢性粒细胞白血病。

61. 答案:A

解析:纳洛酮可拮抗吗啡等纯粹的阿片受体激动药。

62. 答案:D

解析:前列腺癌应行前列腺穿刺活检明确诊断。

63. 答案:B

解析:根据典型的临床表现:50 岁,女,右肩痛、活动受限,梳头困难,检查:右肩活动受限,肩周肌肉萎缩,局部明显压痛,X 线片无异常。可诊断为肩关节周围炎。

64. 答案:E

解析:急性有机磷中毒经积极有效治疗,在急性胆碱能危象控制后,于迟发性多发性周围神经病之前,出现类似于重症肌无力的症状的一组临床综合征称中间综合征。中间综合征是一种并不罕见的,有一定自限性的,临床表现以颅神经支配的肌肉,屈颈肌和四肢近端肌肉,以及呼吸肌的无力或者麻痹。轻者仅有轻度抬头无力,肢体力弱,重者呼吸肌麻痹,病情发展快而凶险,若不及时应用呼吸机,患者常死于呼吸衰竭。

65. 答案:B

解析:制霉菌素主要用于内服治疗消化道真菌感染或外用于表面皮肤真菌感染。

66. 答案:D

解析:主动脉缩窄:上肢血压大于下肢血压。年轻患者,上下肢血压不同,提示主动脉狭窄。

67. 答案:E

解析:流行性脑脊髓膜炎的流行季节为冬春季,儿童多见,临床表现为突发高热、剧烈头痛、呕吐、皮肤黏膜瘀点、脑膜刺激征阳性,白细胞和中性粒细胞增高。

68. 答案:C

解析:大便里有白色条状的东西考虑是由于寄生虫感染导致的。皮下结节需进行皮下结节活检。

69. 答案:B

解析:急性心包炎可以表现为剧烈胸痛,且咳嗽或深呼吸时可以加重,伴有发热,心电图表现为除 aVR 导联以外所有导联 ST 段呈弓背向下型抬高。本患者最可能为急性心包炎。故选 B。

70. 答案:A

解析:患者为中老年女性,发现主动脉瓣狭窄 10 年,有行走时心前区憋闷史,左心室肥厚,提示患者已有临床症状,因此该患者治疗宜首选主动脉瓣膜置换术(A 对)。主动脉瓣球囊成形术(B 错)有创伤小、耗资低等优点,但是不能降低远期死亡率,且临床应用范围局限,主要用于治疗高龄、有心力衰竭等手术的高危患者。心脏移植(C 错)适用于各种原因导致的心功能衰竭的终末状态,不适合本例患者。冠状动

脉搭桥术(D 错)急性心肌梗死多支血管病变患者。主动脉瓣修补术(E 错)主要用于创伤、感染性心内膜炎所致瓣叶穿孔的患者。

71. 答案:C

解析:扩张型心肌病治疗:β受体阻滞剂、钙拮抗药、利尿剂,用利尿剂呋塞米 20mg,静脉注射,同时需补钾补镁。

72. 答案:C

解析:室性心动过速能导致血流动力学紊乱,必须得到及时纠正,绝大多数应入院治疗。药物治疗首选利多卡因,50~100mg 稀释后缓慢静推,无效时可重复使用,起效后以 1~4mg/min 静滴维持,也可选用普罗帕酮 75mg 或胺碘酮 150mg 稀释后缓慢静推,并静脉点滴维持。存在明显血流动力学障碍时首选同步直流电复律,复律能量以 300J 为佳。同时应积极治疗基础心脏病和补充血钾。该患者 BP70/45mmHg,故选 C。

73. 答案:B

解析:患者老年男性(前列腺癌好发人群),直肠指检前列腺稍增大,有结节(前列腺癌常见体征)。

74. 答案:E

解析:睾丸鞘膜积液常发生于一侧,通常表现为无痛性增大的肿块;透光试验阳性为区别其他疾病的重要方法。

75. 答案:A

解析:该患者出现血尿、蛋白尿、水肿、高血压,发生急性肾衰竭(少尿、尿素氮和血肌酐升高),考虑为急进性肾小球肾炎,即新月体性肾小球肾炎。

76. 答案:D

解析:青年男性患者,右腰部受伤后,出现局部疼痛和肉眼血尿(肾脏损伤的表现)。施行手术需经腹切口。

77. 答案:D

解析:对高危人群(尤其 HBsAg 阳性,同时 HBcAg 阳性孕妇的新生儿;意外受 HBV 感染,如被 HBsAg 阳性血液污染的针头刺伤或被 HBsAg 阳性血液溅入眼结膜或口腔黏膜或输入 HBsAg 阳性血液、手术刀损伤皮肤等)多主张立即(24 小时之内)肌内注射乙肝免疫球蛋白,故选 D。

78. 答案:D

解析:强直性脊柱炎属血清阴性反应的结缔组织疾病, 以此与类风湿关节炎相鉴别。强直性脊柱炎患者 HLA-B27 的阳性率可高达 88%~96%, 病变一般自骶髂关节开始, 缓慢沿着脊柱向上延伸, 累及椎间小关节的滑膜和关节囊, 可使整个脊柱周围的软组织钙化, 病变发展, 椎间盘的纤维环, 前、后纵韧带发生骨化, 形成典型“竹节样”脊柱。

79. 答案:C

解析:骨盆骨折所致尿道损伤多为后尿道损伤, 治疗以耻骨上膀胱造瘘常用, 三个月后可行尿道修补。本例患者已出现休克, 且不能排尿, 因此应首先抗休克补充血容量, 之后行膀胱造瘘。

80. 答案:A

解析:库欣综合征的表现表现为肥胖、高血压、闭经、向心性肥胖等。

81. 答案:C

解析:缺铁性贫血患者血清铁降低($<50 \mu\text{g/L}$, 总铁结合力升高($>4500 \mu\text{g/L}$), 转铁蛋白饱和度降低($<15\%$)。当幼红细胞合成血红素所需的铁供给不足时, 红细胞原卟啉值升高, 一般 $>600 \mu\text{g/L}$ 。故选 C。

82. 答案:A

解析:ACR 修订的 SLE 分类标准中, 免疫学异常和自身抗体阳性包括:抗 Sm 抗体、抗 dsDNA 抗体、抗磷脂抗体和 ANA 阳性。患者可能是系统性红斑狼疮。

83. 答案:D

解析:活动后心慌、气短、胸痛两周, 两周前曾患“感冒”, 持续发热一周。面色苍白, 心界向左下扩大, 心率增快, 频发早搏。第一心音减弱。心尖区闻及奔马律及 III 级全收缩期杂音。心肌酶谱检查 CK-MB 升高, 均符合病毒性心肌炎症状体征。

84. 答案:A

解析:患者有搬重物史, 腰部疼痛并下肢放射, 同时直腿抬高试验阳性, 考虑诊断为腰椎间盘突出症。

85. 答案:D

解析:当 Pauwels 角小于 30 度时, 为稳定骨折(外展型); 当 Pauwels 角大于 50 度时, 为不稳定骨折(内收型)。

86. 答案:E

解析:有尿频、尿痛伴肉眼血尿等膀胱刺激征体征, 首先考虑为急性细菌性膀胱炎, 用 3 天治疗。

87. 答案:E

解析:单纯性甲状腺肿的主要临床表现为肿大结节对周围器官的压迫症状, Graves 病和桥本甲状腺炎有临床症状, 甲状腺腺瘤不会出现 Horner 综合征, 以上各项均排除。

88. 答案:D

解析:根据病史, 左腰部胀痛不适 2 年, B 超左肾积水, 上尿路未见结石, 应考虑行左侧逆行肾盂造影。

89. 答案:C

解析:增强 CT 检查需注射对比剂, 该试剂经肾脏代谢, 有损伤肾小管的可能, 所以该患者增强 CT 检查后出现少尿、电解质紊乱, 提示出现急性肾小管坏死。

90. 答案:E

解析:贫血、出血及继发感染, 骨髓增生极度活跃, 考虑为急性白血病。原始细胞过氧化物酶染色弱阳性, 非特异性酯酶染色特性, 阳性反应可被氟化钠抑制提示为 M5 型, 即急性单核细胞白血病。

91. 答案:B

解析:出血时间 2 分钟, 凝血时间 30 分钟, 凝血酶原时间正常, 应为凝血酶生成障碍。

92. 答案:D

解析:遇开放性骨折时, 外露的骨组织, 禁止将其纳回伤口内, 以免引起严重深部感染。

93. 答案:C

解析:献血者为 A 型, 其红细胞含 A 凝集原, 血清中含抗 B 凝集素。主侧不凝表示受血者血清中不含抗 A 凝集素; 次侧凝集表示其红细胞上含 B 凝集原, 且血清中不可能含 B 凝集素。血清中不含抗 A, 也不含抗 B 凝集素, 表示其血型为 AB 型。

94. 答案:E

解析:辛伐他汀的副作用偶有横纹肌溶解症, 可出现四肢无力、肌肉酸痛, 可出现血磷酸肌激酶水平增高, 故选 E。

95. 答案:E

解析:该患者为中年男性, 慢性病程, 有高血压、贫血及消化道症状, 实验

室检查:蛋白尿、高钾血症,血 BUN 和 Cr 明显升高,考虑慢性肾衰竭的可能性大,且 Cr>707 μmol/L,已经进展为尿毒症期,应进行肾脏替代治疗,如血液透析和腹膜透析。因此选 E。

96. 答案:B

解析:根据患者病史和临床表现,高度怀疑为二期梅毒,表现为全身广泛性皮肤黏膜损害,即梅毒疹,并伴有全身淋巴结肿大。

97. 答案:A

解析:血友病血小板水平正常,不选 B。过敏性紫癜血小板一般不低,不选 C。弥散性血管内凝血骨髓象正常,故不选 D。该患者血小板计数减低,故不选 E。特发性血小板减少性紫癜慢性型多见于青年女性,表现有月经量多、皮肤黏膜出血,脾不大,血象主要是血小板减少,白细胞不低,长期失血可造成血红蛋白下降。骨髓象粒红系正常,巨核细胞正常或增多,伴成熟障碍。该患者符合上述表现,故本题选 A。

98. 答案:D

解析:患者血红蛋白、血小板均降低,浓缩红细胞可纠正低血红蛋白,而血浆补充凝血因子,防止出血,同时,成分输血可减少过敏反应。

99. 答案:E

解析:患者青年女性,头晕、乏力(贫血表现)伴月经量增多 1 年,查体:下肢皮肤瘀点,提示出血,血常规 Hb60g/L(成年女性正常值 110~150g/L),提示贫血, WBC $2.8 \times 10^9/L$ (正常 $4 \sim 10 \times 10^9/L$), Plt $38 \times 10^9/L$ (正常 $100 \sim 300 \times 10^9/L$),网织红细胞 0.001(正常值 0.005~0.015),提示全血细胞减少(符合骨髓增生异常综合征的血象特点),胸骨骨髓细胞学检查:骨髓增生活跃,未见巨核细胞(符合骨髓增生异常综合征的骨髓象特点),故患者最可能的诊断是骨髓增生异常综合征(E 对)。特发性血小板减少性紫癜(A 错)可有贫血、皮肤黏膜出血表现,但骨髓象巨核细胞数量正常或增加,有成熟障碍;再生障碍性贫血(B 错)常表现为全血细胞减少,贫血、出血、感染等症状,但骨髓增生减低或重度减低;阵发性睡眠性血红蛋白尿(C 错)典型表现为血红蛋白尿,可出

现全血细胞减少,网织红细胞计数增高,骨髓增生活跃或明显活跃,尤以红系明显;慢性失血性贫血(D 错)骨髓代偿性增生活跃,网织红细胞计数增高,粒系、巨核系无明显变化。

100. 答案:A

解析:患者输注血小板后 20 分钟,突发寒战、高热($39.1^{\circ}\text{C} \sim 41^{\circ}\text{C}$ 称为高热)、恶心,尿色正常,故该患者很可能发生的输血不良反应是非溶血性发热性输血反应(A 对)。发热反应属最常见的早期输血并发症之一,多发生于输血开始后 15 分钟~2 小时内,主要表现为畏寒、寒战和高热,体温可上升至 $39^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$,同时可伴有头痛、恶心等症状。溶血性输血反应(B 错)的典型症状为血红蛋白尿(呈酱油色或浓茶色)及溶血性黄疸。过敏反应(C 错)表现为皮肤瘙痒及荨麻疹。循环超负荷(E 错)是由输血过多或速度过快导致的,常表现为心率加快、呼吸急促、发绀或咳血性泡沫痰等症状。

101. 答案:C

解析:患者尿胆红素(-),尿胆原强阳性,因此为溶血性贫血,Coombs 试验是其特异检查方法。本病与以下造成贫血的疾病鉴别点:①遗传性球形红细胞增多症:外周血小球形红细胞 >10%;红细胞渗透脆性试验阳性;②阵发性睡眠性血红蛋白尿症:酸溶血试验、蛇毒因子溶血试验、热溶血试验、蔗糖溶血试验阳性;尿含铁血黄素试验阳性;③葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症:高铁血红蛋白还原试验阳性;荧光斑点试验阳性。

102. 答案:D

解析:该患者为中年女性,闭经泌乳半年,磁共振发现垂体 $15\text{cm} \times 10\text{cm}$ 占位病变,疑为垂体肿瘤引起的垂体性闭经,需检查激素辅助诊断。位于蝶鞍内的腺垂体各种腺细胞均可发生肿瘤,肿瘤可分泌激素抑制 GnRH 分泌和(或)压迫分泌细胞,使促性腺激素分泌减少,继而可出现闭经及相应症状。腺垂体腺细胞包括泌乳素腺细胞(A 对)、生长激素腺细胞(B 对)、促肾上腺皮质激素腺细胞(C 对)及促甲状腺激素腺细胞(E 对)。而血管加压素(D 错,为本题正确答案)是由神经垂体分泌的,

无助于腺垂体肿瘤的诊断。

103. 答案:C

解析:其诊断标准为:症状+任意时间血浆葡萄糖水平 $\geq 11.1\text{mmol/L}$,或空腹血浆葡萄糖水平 $\geq 7.0\text{mmol/L}$ 或OGTT试验中,2小时血浆葡萄糖水平 $\geq 11.1\text{mmol/L}$ 。故选C。

104. 答案:E

解析:患者可能有前列腺疾病导致膀胱尿潴留,紧急处理是解决膀胱内压力,在病症没有根除前,保留尿管。

105. 答案:D

解析:凡有以下表现均应考虑有急性血源性骨髓炎的可能:①急骤的高热与毒血症表现;②长骨干骺端疼痛剧烈而不愿活动肢体;③该区有一明显的压痛区;④白细胞计数和中性粒细胞比例增高。该患儿突发寒战、高热,右膝局部剧烈疼痛,肢体不敢活动,局部无明显肿胀,应首先考虑是否有急性血源性骨髓炎的可能。故选D。

106. 答案:C

解析:急性心肌梗死后的心衰应迅速降低心脏的前后负荷,缓解肺水肿。患者血压偏高,更宜使用硝普钠。故本题答案是C。

107. 答案:C

解析:患者有吸烟史,有慢性下肢逐渐缺血的表现,符合血栓闭塞性脉管炎的诊断。右脚趾变黑、皱缩、失去知觉是趾坏疽的表现。在坏疽中包括干性、湿性及气性坏疽,该病例符合干性坏疽。

108. 答案:B

解析:一侧肾结核,对侧肾积水伴肾功能不良应争取先引流解决肾积水,挽救肾功能,而后再切除结核肾,而挛缩膀胱的手术治疗必须在结核控制以后,因此选B。

109. 答案:B

解析:胃酸即HCl,长期呕吐导致大量氢离子及氯离子丢失,产生低氯血症及代谢性碱中毒,碱中毒是几乎都同时存在低钾血症。

110. 答案:B

解析:高渗性缺水多见于严重烧伤患者,表现为口渴、乏力,唇舌干燥,烦躁不安,谵妄昏迷。此时补液应用5%葡萄糖或0.45%氯化钠。故选B。

111. 答案:B

解析:挖空细胞是由鳞状细胞的“底层细胞”(幼稚细胞或储备细胞)在受到人乳头瘤病毒(HPV)所致的损害后,加速受损细胞的成熟化而形成的表层鳞状细胞;其受损主要为非典型增生、非典型角化和挖空细胞,是细胞学诊断低度病变(CIN2或轻度非典型增生)的重要指标。常见于尖锐湿疣。

112. 答案:A

解析:尿频、尿急、尿痛提示膀胱刺激征。

113. 答案:D

解析:该患者有不洁饮食史(5小时前曾在小餐馆进食),发热、腹痛、腹泻,脓血便,诊断为急性细菌性痢疾。

114. 答案:B

解析:常见症状为乏力、全身不适、食欲减退、肝区不适或疼痛、腹胀、低热,体征为面色晦暗、巩膜黄染、可有蜘蛛痣或肝掌、肝大、质地中等或充实感,有叩痛,脾大严重者,可有黄疸加深、腹腔积液、下肢水肿、出血倾向及肝性脑病。ALT是丙氨酸氨基转移酶,正常值10-40U/L。谷草转氨酶(AST)的正常值为0-40U/L,肝功能出现异常时,ALT、AST会增高。总胆红素(TBIL)正常值是5.1-19 $\mu\text{mol/L}$,直接胆红素(DBIL)正常值是1.7-6.8 $\mu\text{mol/L}$ 。

115. 答案:A

解析:患者心悸、消瘦,查体甲状腺II度肿大,考虑诊断甲亢。患者目前出现高热、脉快、神志模糊,该症状符合甲状腺危象的诊断标准。

116. 答案:D

解析:患儿发热,皮肤出血点,考虑为肾病综合征。出现血尿RBC20/HP,有肾炎的表现,故诊断为肾炎性肾病综合征。

117. 答案:B

解析:青少年最常见的就是过敏性紫癜造成的过敏性紫癜性肾炎。

118. 答案:E

解析:慢性肾炎常见的病理类型包括系膜增生性肾小球肾炎,局灶节段性肾小球硬化,膜性肾病和系膜毛细血管性肾小球肾炎。

119. 答案:A

解析:血清 TSH 增高、TT4、FT4 降低是诊断甲状腺功能减退症的必备指标。严重病例才有血清 TT3、FT3 降低。

120. 答案:E

解析:单纯性甲状腺肿患者血清 TSH、T3、T4 水平正常。

121. 答案:C

解析:股骨颈的骨折,股骨颈骨折属于关节内的骨折,在股骨颈骨折是很容易损伤到支配股骨头的血管和血供,从而较容易引起股骨颈骨折的不愈合或者延迟愈合,甚至会引起股骨头的坏死。

122. 答案:B

解析:肱骨髁上骨折以儿童多发易并发血管神经损伤。

123. 答案:A

解析:麻疹主要经空气飞沫直接传播。

124. 答案:D

解析:疟疾的传播途径是经蚊虫叮咬皮肤。

125. 答案:C

解析:急性肾小球肾炎早期可见血尿、蛋白尿,白细胞和上皮细胞稍增多,并常有颗粒管型和红细胞管型等,其中红细胞管型对其有诊断意义。白细胞管型常见于急性肾盂肾炎、急性间质性肾炎。颗粒管型可见于各种肾炎、肾病。

126. 答案:E

解析:白细胞管型常见于急性肾盂肾炎、急性间质性肾炎。

127. 答案:B

解析:急性 ST 段抬高心肌梗死患者溶栓治疗时间窗是发病后 12 小时。

128. 答案:A

解析:恶化型劳力性心绞痛:同等程度劳累所诱发的胸痛发作次数、严重程度及持续时间突然加重。

129. 答案:A

解析:19 岁女性患者,发热 1 周伴食欲减退,体检:体温 39.6℃,脉搏 74 次/分(相对缓脉),肝肋下 2cm,脾肋下 1cm(肝脾大),WBC $2.6 \times 10^9/L$ (正常参考值 $4 \sim 10 \times 10^9/L$),根据患者的临床表现和实验室结果,应考虑诊断是伤寒。

130. 答案:E

解析:患者持续发热 1 周,说明在病程

第 1~2 周,此时血培养阳性率最高,可达 80%~90%,为确定诊断对该患者应选用血培养(E 对)。粪便培养(A 错)在第二周阳性率才逐渐升高,不用作早期诊断。

131. 答案:A

解析:MRI 检查可用于髋关节骨折、骨髓水肿、股骨头缺血坏死、髋关节结核及肿瘤等的诊断和鉴别诊断。当患者出现髋关节外伤或不明原因的疼痛、活动受限等症状时,也可行 MRI 检查明确诊断。

132. 答案:A

解析:系统性红斑狼疮患者,长期大剂量服用激素是导致股骨头坏死的主要原因之一。

133. 答案:C

解析:系统性红斑狼疮合并股骨头坏死的患者行股骨头坏死髓芯减压+血小板激活因子植入术。

134. 答案:C

解析:肾综合征出血热是由汉坦病毒引起的一种自然疫源性疾病,鼠为主要传染源。临床上以发热、休克、充血、出血和急性肾功能衰竭为主要表现。

135. 答案:C

解析:特异性 IgM 阳性或发病早期和恢复期两次血清特异性 IgG 抗体效价递增 4 倍以上,均有确诊价值。

136. 答案:C

解析:肾综合征出血热是由汉坦病毒引起的一种自然疫源性疾病,给予利巴韦林抗病毒治疗。

137. 答案:C

解析:根据患儿的杂音特点:胸骨左缘 2 肋间闻及 3/6 级缩期喷射性杂音、P2 增强固定分裂,应诊断为房间隔缺损(C 对)。动脉导管未闭的杂音特征为胸骨左缘第二肋间连续机械样杂音(A 错)。肺动脉狭窄胸骨左缘上部有洪亮的 IV/VI 级以上喷射性收缩期杂音,第二心音分裂(而不是肺动脉第二心音固定分裂)(B 错)。室间隔缺损的杂音特征是胸骨左缘第 3、4 肋间响亮的全收缩期杂音,肺动脉第二心音正常或稍增强(DE 错)。

138. 答案:B

解析:超声心动图是主要的诊断方法。

超声心动图可显示房间隔中断，右心房、室内径增大，肺动脉增宽，三尖瓣活动幅度增大。

139. 答案:B

解析:慢性肾小球肾炎主要临床表现为蛋白尿、血尿、水肿和高血压。

140. 答案:B

解析:慢性肾小球肾炎常用的降压药物有血管紧张素转化酶抑制剂(ACEI), 比如卡托普利、贝那普利等; 血管紧张素受体拮抗剂(ARB), 比如缬沙坦、氯沙坦等药物; 长效钙通道阻滞剂(CCB), 如硝苯地平, 氨氯地平等; β 受体阻滞剂, 比如比索洛尔, 普萘洛尔等药物。由于ACEI和ARB除具有降低血压作用外, 还有减少蛋白和延缓肾功能恶化的肾保护作用, 故是首选治疗药物。

141. 答案:A

解析:患者男性, 双侧颈部和腹股沟淋巴结肿大, 无压痛, 肝脾不大(以淋巴结进行性无痛性肿大为突出症状符合淋巴瘤的表现)提示淋巴瘤可能性大。ABVD方案是临床上用于治疗霍奇金淋巴瘤最常用的方案之一。ABVD代表4种药物, A是阿霉素, B是博来霉素, V是长春花碱, 或长春花碱酰胺、长春地辛、长春瑞宾, D是氮烯咪胺。

142. 答案:B

解析:患者男性, 双侧颈部和腹股沟淋巴结肿大, 无压痛, 肝脾不大(以淋巴结进行性无痛性肿大为突出症状符合淋巴瘤的表现)提示淋巴瘤可能性大; 反复发热半个月, 查体:T38.5°C(1.不明原因发热大于38°C; 2.盗汗; 3.半年内体重下降10%以上, 全身症状有其中之一者即为B组)提示为B组; 双侧颈部和腹股沟淋巴结肿大, 肝脾不大, CT示右侧胸腔中等量积液, 穿刺后胸水细胞学检查见大量淋巴细胞(IV期:弥漫性(多灶性)单个或多个结外器官受侵犯, 伴或不伴相关淋巴结肿大, 或孤立性结外器官受侵犯伴远处(非区域性)淋巴结肿大。如肝或骨髓受累, 即使局限也属IV期)提示远处转移、非区域性淋巴结肿大, 可分为IV期, 综合分析患者应属IVB(B对)。

143. 答案:A

解析:HL淋巴结穿刺以可见典型R-S细

胞为诊断依据。

144. 答案:D

解析:坐位、膝前受较大外力、髌剧痛、功能受限, 出现屈曲内收内旋畸形, 应诊断为髌关节后脱位。股骨颈骨折和股骨转子间骨折受伤机制为摔倒后髌部痛、功能障碍, 患肢呈内收外旋畸形, 可除外髌关节前脱位, 患肢呈屈曲外展外旋畸形也可除外。

145. 答案:C

解析:髌关节后脱位绝大多数用手法复位治疗, 为保持肌肉松弛, 复位常在全麻或椎管内麻醉下进行, 常用Allis法尽早、尽可能在24小时内进行。如超过48小时复位将十分困难。

146. 答案:A

解析:髌关节后脱位时, 向后脱出股骨头可挫伤或压迫坐骨神经, 出现相应的临床表现, 因大多数为挫伤, 2~3个月后可自行恢复, 无须特殊处理。

147. 答案:A

解析:霍乱患者悬滴检查(动力试验), 如动力试验阳性、制动试验阳性即可做出初步诊断。

148. 答案:C

解析:1. 在治疗方面, 及时适量补充水及电解质是治疗的关键, 静脉补液是抢救和治疗重、中型患者最常用的主要手段。2. 补液原则为早期、快速、足量, 先盐后糖, 先快后慢, 及时补碱, 见尿补钾。3. 抗菌治疗首选氟喹诺酮类。4. 患者症状消失后大便培养每日1次, 停药后连续3次阴性时才符合出院标准。

149. 答案:D

解析:有乙肝病史, 发生呕血最可能的原因是食管胃底曲张静脉破裂。

150. 答案:A

解析:食管胃底曲张静脉破裂手术治疗采用贲门周围血管离断术, 结扎切断胃底贲门周围血管。

第三单元

1. 答案:C

解析:浅部脓肿表现为局部红、肿、痛及压痛, 继而出现波动感, 其主要诊断依据是波动感。

2. 答案:E

解析:成人每日消化道出血量超过 50ml 时可出现黑粪。

3. 答案:D

解析:主要是根据静脉尿路造影的表现。其特征是轻度病变可见肾盏有虫蚀样破坏或肾盏颈狭窄、肾盏变形或消失,严重者累及肾盏及肾功能完全丧失而不显影。

4. 答案:A

解析:急性糜烂出血性胃炎的常见病因有药物(非甾体抗炎药)、应激(严重创伤、大手术、大面积烧伤、颅内病变、败血症及其他严重脏器病变或多器官功能衰竭等)和酒精。故选 A。

5. 答案:D

解析:颅底骨折绝大多数是线形骨折,个别为凹陷骨折,按其发生部位分为:颅前窝、颅中窝、颅后窝骨折。颅中窝骨折可因面神经损伤出现面瘫。

6. 答案:B

解析:类风湿关节炎最常见的关节外表现是类风湿结节。

7. 答案:A

解析:肠外营养是经静脉途径供应病人所需要的营养要素,包括热量(碳水化合物、脂肪乳剂)、必需和非必需氨基酸、维生素、电解质及微量元素。

8. 答案:D

解析:腹膜分为相互连续的壁层腹膜和脏层腹膜两部分。腹膜面积几乎与全身的皮肤面积相等,约为 1.7~2.0 平方米。在正常情况下,腹腔内有 75~100ml 黄色澄清液体,起润滑作用,但没有气体。腹膜的表面是扁平间皮细胞,无大量腺体。腹膜是双向的半透性膜,急性炎症时,腹膜分泌出大量的渗出液,以稀释毒素和减少刺激。腹膜具有很强的吸收能力,能够吸收腹腔内的积液、血液和细菌毒素。壁层腹膜受体神经支配,痛觉敏感,定位准确。脏层腹膜受交感神经和迷走神经支配,对炎症、压迫刺激敏感,定位较差,却易引发心率、血压改变。

9. 答案:C

解析:术前 2 周停止吸烟。

10. 答案:D

解析:吸氧浓度(%) = 21 + 4 × 氧流量(L/min)。

11. 答案:B

解析:痰结核分枝杆菌检查是确诊肺结核病的主要方法,但对痰菌阴性肺结核患者,胸部 X 线检查为最有意义的检查方法,可以发现早期轻微的结核病变,确定病变范围、部位、形态、密度、与周围组织的关系、病变阴影的伴随影像,判断病变性质、有无活动性、有无空洞、空洞大小和洞壁特点等。

12. 答案:D

解析:躯体疾病所致精神障碍随着躯体疾病的好转,精神症状也会逐渐好转,如需用抗精神病药物时,因患者的耐受性低,应该短期小剂量使用,一旦精神症状控制即可考虑减量或停用。

13. 答案:E

解析:B 超是肝病的重要诊断手段。是筛查肝癌的首选影像学检查。

14. 答案:B

解析:一氧化碳中毒时,对迟发脑病者可给予高压氧,神经细胞营养药及对症支持治疗。

15. 答案:C

解析:股疝最常用、最恰当的手术方法是 McVay 修补法,此法不仅能加强腹股沟管后壁,同时还能堵住股环。当发生绞窄性疝时,疝内容物已坏死,常需行肠切除吻合术,手术区多被污染,在高位结扎疝囊后,一般不宜作疝修补术,以免因感染而致修补失败。

16. 答案:E

解析:低位小肠梗阻,扩张的肠襻在腹中部,呈阶梯状排列,而结肠无积气,盲肠胀气不明显,临床上腹胀明显,呕吐次数少,呕吐物带粪臭味。

17. 答案:E

解析:雌激素受体阳性的乳癌在根治术后最常用的是激素治疗方法。

18. 答案:E

解析:新鲜尿沉渣相差显微镜检查,变形红细胞血尿为肾小球源性。

19. 答案:D

解析:脾大系由于白血病细胞浸润引起,该病脾大突出,就医时可达脐或脐以下,本题中各选项均可引起脾大,但最显著的是慢性粒细胞白血病。

20. 答案:E

解析:发型肺结核的原发综合征呈“双

极”病变，即一端为原发病灶，一端为肿大的肺门淋巴结。X 线表现为哑铃状双极影。

21. 答案:D

解析:Child-pugh 分级可判断肝硬化预后，其中包括肝性脑病、腹水、总胆红素、白蛋白及凝血酶原时间延长。

22. 答案:B

解析:经腹会阴联合直肠癌根治术(Miles 手术)适用于距肛门缘 7cm 以内的直肠癌。经腹腔直肠癌切除术(Dixon 手术)又叫直肠前切除术。适用于直肠癌下缘距肛门 10cm 以上者，手术时尚能留下足够的直肠，可在腹腔内与乙状结肠行对端吻合。拉下式直肠癌切除术适用于直肠癌下缘距肛门 7~10cm 之间的病人。

23. 答案:C

解析:淀粉酶升高，提示胰腺损伤。

24. 答案:D

解析:在乙状结肠扭转患者行钡剂灌肠检查时，钡剂迅速充盈其梗阻远端。当钡柱头端逐渐接近阻塞处时，直肠扩张，近狭窄处管腔变尖，形似鸟嘴。鸟嘴征是乙状结肠扭转在钡剂灌肠造影相上的特征性 X 线征象。

25. 答案:B

解析:血浆内的血浆蛋白容易引起过敏反应。

26. 答案:A

解析:溃疡性结肠炎在钡灌肠表现为黏膜粗乱、多发溃疡、息肉形成，肠管狭窄短缩，结肠袋消失呈管状肠管的特征。

27. 答案:C

解析:确定外口和内口位置，对明确肛瘘诊断非常重要。

28. 答案:A

解析:吡喹酮为广谱抗血吸虫药和驱绦虫药，对寄生于人体内的埃及、曼氏、日本血吸虫具有高效驱杀作用，对线虫和原虫感染无效。

29. 答案:A

解析:胰腺癌影像诊断的首选方法为 CT 检查。

30. 答案:E

解析:反复肺部感染造成肺泡局部中性粒细胞及巨噬细胞的活化和聚集，这些中性粒细胞通过释放中性粒细胞

弹性蛋白酶等多种生物活性物质与多种蛋白分解酶，可降解肺泡基质，导致肺泡结构损毁，形成肺大泡，从而引发肺气肿。

31. 答案:C

解析:急性呼吸道感染是导致呼吸衰竭急性加重和失代偿的最常见诱因。呼吸衰竭的临床表现除原发病的发现外，主要由缺氧和二氧化碳潴留所引起。

32. 答案:E

解析:本病早期常规肺功能检查往往无异常，如有小气道阻塞时肺顺应性降低，最大呼气流速-容量曲线在 75% 和 50% 肺容量时流量降低，闭合气量增加。

33. 答案:D

解析:特发性肺纤维化诊断主要根据临床特征、胸部影像学表现、肺通气及弥散功能、病理活检等。肺功能检查 IPF 的典型肺功能改变包括限制型通气损害、肺容量缩小、肺顺应性降低和弥散量降低。严重者出现 PaO₂ 下降和 PaO₂ 增宽。

34. 答案:E

解析:葡萄球菌肺炎胸片显示肺段或肺叶实变，可形成空洞，或呈小叶状浸润，其中有单个或多发的液气囊腔。另一特征是 X 线阴影的易变性，表现为一处炎性浸润消失而在另一处出现新的病灶，或很小的单一病灶发展为大片阴影。故选 E。

35. 答案:D

解析:吸入型糖皮质激素是哮喘长期控制的首选药物。

36. 答案:C

解析:缺氧是肺动脉高压形成最重要的因素，缺氧主要导致肺小动脉收缩、痉挛。

37. 答案:A

解析:肺顺应性是指在静态情况下，外来压力克服肺弹性阻力所引起的肺容量变化，弹性阻力大，则肺扩张度小，表示肺顺应性小，肺淤血、水肿，纤维化等均可降低肺的顺应性，增加吸气时的弹性阻力。

38. 答案:B

解析:导致尿路感染最常见的致病菌是大肠埃希菌。

39. 答案:D

解析:神经源性肿瘤多起源于交感神经,少数起源于外围神经。这类肿瘤多位于后纵膈脊柱旁肋脊区内。

40. 答案:E

解析:诊断幽门螺杆菌感染首选快速尿素酶试验,判断幽门螺杆菌是否根除,则首选非侵入性试验中的¹³C尿素酶呼气试验,也可行快速尿素酶试验、活组织幽门螺杆菌培养或组织学检查。血清抗幽门螺杆菌抗体在幽门螺杆菌根除后滴度可维持较长一段时间,故不能作为幽门螺杆菌是否根除的判断方法,而是作为幽门螺杆菌感染的协助诊断和流行病学调查。故选E。

41. 答案:D

解析:黄疸可因胆道感染合并梗阻或胆道肿瘤阻塞胆管而引起。但通常胆道的感染如胆囊炎、胆囊颈部结石嵌顿或胆总管下段的结石等胆道良性病变引起的胆道梗阻,常与炎症并存,均应伴有胆囊炎性肿大,因此应为疼痛性胆囊肿大;慢性胆囊炎合并胆囊积水时,虽为无痛性胆囊肿大,但由于胆囊管已闭锁故不应合并黄疸;题中只有中下段胆管癌符合条件。

42. 答案:B

解析:胸膜炎症(肺结核、肺炎)、风湿性疾病(系统性红斑狼疮、类风湿关节炎等)、胸膜肿瘤(恶性肿瘤转移、间皮瘤等)、肺梗死、膈下炎症(膈下脓肿、肝脓肿、急性胰腺炎)等常导致胸膜通透性增加,产生渗出液。

43. 答案:A

解析:阑尾的神经由交感神经纤维经腹腔丛和内脏小神经传入,由于其传入的脊髓节段在第10、11胸节,所以当急性阑尾炎发病开始时,常表现为脐周的牵涉痛,属内脏性疼痛。

44. 答案:D

解析:我国(1987)SLE诊断标准:1.蝶形红斑或盘状红斑;2.日光过敏;3.口腔溃疡;4.非畸形性关节炎或关节痛;5.浆膜炎(胸膜炎或心包炎);6.肾脏病史(蛋白尿和(或)管型尿和(或)血尿);7.神经系统损害(癫痫或精神、神经症状);8.血液学异常(白细胞 $<4 \times 10^9/L$ 和(或)血小板 $<80 \times 10^9/L$ 和(或)溶血性贫血);9.狼疮细胞和

(或)抗dsDNA抗体阳性;10.抗Sm抗体阳性;11.免疫荧光抗核抗体阳性(IFANA);12.狼疮带试验或肾活检阳性,13.C3补体低于正常。13项中符合4项者即可诊断SLE。

45. 答案:E

解析:反应性关节炎患者可出现结膜炎、角膜炎、角膜溃疡、表面巩膜炎、视神经和球后神经炎、前房出血。

46. 答案:D

解析:急性有机磷中毒经积极有效治疗,在急性胆碱能危象控制后,于迟发性多发性周围神经病之前,出现类似于重症肌无力的症状的一组临床综合征称中间综合征。中间综合征是一种并不罕见的,有一定自限性的,临床表现以颅神经支配的肌肉,屈颈肌和四肢近端肌肉,以及呼吸肌的无力或者麻痹。轻者仅有轻度抬头无力,肢体力弱,重者呼吸肌麻痹,病情发展快而凶险,若不及时应用呼吸机,患者常死于呼吸衰竭。

47. 答案:B

解析:克雷伯杆菌肺炎时,由于病变中的炎性渗出液黏稠而重,导致的X线表现出现叶间隙下坠。

48. 答案:B

解析:胃黏膜之肠化和不典型增生并不一定发展成胃癌。

49. 答案:C

解析:闭合性肾损伤的手术适应证为出现无法纠正的失血性休克、腰部或腹部肿块增大、高热或腰痛加重、可疑合并其他腹腔脏器损伤,以及血尿呈进行性加重,因此应选C。

50. 答案:D

解析:患者,反复右下腹痛(克罗恩病腹痛多位于右下腹或脐周)1年,伴便秘,口腔溃疡(克罗恩病的肠外表现)。查体:右下腹(克罗恩病的好发部位为回肠末段)可触及边界不清的包块(腹部包块见于10%~20%的克罗恩病患者),可移动,压痛阳性。综合该患者的病史及查体,考虑诊断为克罗恩病(B对)。

51. 答案:D

解析:据年轻女性,与月经周期有关的乳房胀痛考虑为D。

52. 答案:D

解析:火器伤严禁早期缝合,初期清创时,挫伤区和震荡区参差交错,不易判断,因此只能在开放伤口引流 3~5 天后,再根据情况进行延期缝合,故本题答案为 D。

53. 答案:D

解析:血压在 160/100mmHg 以下可不必做特殊准备,血压过高者,使血压平稳在一定水平。但不必要求降至正常水平才能手术。

54. 答案:E

解析:中青年女性患者,低热、乏力(结核毒血症状)伴腹胀 3 个月。查体:腹壁柔韧感(结核性腹膜炎的典型体征),有压痛和轻反跳痛。腹水为渗出液(结核性腹膜炎引起腹水为渗出液)。综合患者病史、体检与腹水检查,考虑诊断为结核性腹膜炎,腹腔镜检查结合病理活检(E 对)对其有确诊价值。腹部 B 型超声(A 错)仅能用于诊断患者是否有腹腔积液,对腹腔积液病因的诊断没有特异性。胃肠道钡剂检查(B 错)可发现肠粘连、肠结核、肠瘘、肠腔外肿块等征象,对结核性腹膜炎无确诊价值。血沉(C 错)增高可见于多种疾病,如急性炎症、白血病、结缔组织病及结核病的活动期,不具有特异性,不能确诊结核性腹膜炎。结核性腹膜炎的腹水普通细菌培养结果为阴性,结核分枝杆菌培养的阳性率很低(D 错)。

55. 答案:B

解析:根据病人的表现,应考虑腹股沟斜疝。斜疝的疝环是腹股沟管的深环,其位置位于腹股沟韧带中点上方 1.5~2.0cm。

56. 答案:C

解析:肠易激综合征是一种以腹痛或腹部不适伴排便习惯改变为特征的功能性肠病,需经检查排除可引起这些症状的器质性疾病。患者检查均为阴性,所以最可能的诊断是肠易激综合征。

57. 答案:A

解析:胸上段食管癌先通过造瘘行肠内营养加上静脉营养支持,这样在放化疗期间也能够提高患者的营养状况,辅助抗肿瘤治疗。

58. 答案:E

解析:患者老年男性,左胸痛 5 天,胸闷、气促, P2>A2,胸部 X 线片示左下肺透亮度增加,提示为肺血栓栓塞,CT 肺动脉造影能准确发现段以上肺动脉内的血栓。

59. 答案:C

解析:该患者为男性青壮年,并有长期大量吸烟史,并且患者右下肢反复发作静脉炎,并有间歇性跛行,根据以上表现最可能诊断为血栓闭塞性脉管炎。

60. 答案:C

解析:青年女性患者,便秘腹泻交替 3 年,右下腹肿块,提示患者结肠病变。对结肠疾病的诊断最具价值的是结肠镜(C 对),其可直接观察病灶的形态,并可在直视下做活检,以确定诊断。血沉(A 错)增高可见于多种疾病,如急性炎症、白血病、结缔组织病及结核病的活动期,不具有特异性,不能诊断结肠疾病。血常规(B 错)可用于鉴别患者的发热原因,但对结肠疾病的诊断没有价值。X 线钡剂透视(D 错)是诊断结肠疾病的次选检查,效果逊于结肠镜。诊断性腹腔穿刺(E 错)用于腹腔积液、腹腔内出血等疾病,不用于肠结核的诊断。

61. 答案:B

解析:诊断为升结肠癌,右下腹隐痛,应作右半结肠切除术,切除范围包括右半横结肠、升结肠、盲肠及长约 15~20cm 的回肠末段。

62. 答案:A

解析:肺腺癌胸膜转移首选治疗是靶向治疗。

63. 答案:C

解析:如果动脉血碳酸氢根水平降低($<22\text{mmol/L}$),而二氧化碳分压基本正常或有所下降,则可诊断代谢性酸中毒。如 pH 在正常范围(7.35~7.45)则可诊断代谢性酸中毒代偿;如 pH 降低(<7.35),则诊断为代谢性酸中毒失代偿。正常动脉血 PaCO₂ 为 35~45mmHg,平均 40mmHg,代谢性酸中毒时 PaCO₂ 降低。

64. 答案:B

解析:腹部损伤目前患者出现休克征象,且有贫血,说明可能引起内出血,考虑患者右上腹钝性损伤,排除脾破

裂，胰腺损伤。实质器官损伤主要表现为腹腔内出血，空腔脏器破裂主要表现为弥漫性腹膜炎，患者因有内出血表现，也有腹膜炎体征，考虑肝破裂引起胆汁溢漏，引起腹膜炎体征。故选 B。

65. 答案:C

解析:患者肛门坠胀感、发热、里急后重、直肠指检直肠壁左侧饱满，有波动感，应诊断为骨盆直肠间隙脓肿。

66. 答案:C

解析:无寒战、高热、乏力等结核中毒症状。有恶性胸腔积液临床表现胸闷、气急，癌胚抗原(CEA)在恶性胸水中早期即可升高，若胸水 CEA $>20\mu\text{g/L}$ 或胸水/血清 CEA >1 ，常提示为恶性胸水。

67. 答案:B

解析:咳嗽咳痰，抗生素治疗无效，双肺可闻及散在哮鸣音，胸部 X 线片示双肺纹理增粗，应诊断是支气管哮喘。

68. 答案:B

解析:质子泵抑制剂(PPI)促进溃疡愈合的速度较快、愈合率较高，是治疗十二指肠溃疡的首选药。

69. 答案:E

解析:肛周及外生殖器丘疹、乳头状赘生物，醋酸白试验阳性，提示感染人乳头瘤病毒。

70. 答案:C

解析:患者既往溃疡病史，出现刺激性咳嗽，行胃镜检查未见异常，食道 24 小时 PH 监测是用于反流性食管炎的诊断和鉴别诊断的方法，是胃食管反流性疾病最好的检查方法。

71. 答案:A

解析:胆囊结石合并慢性胆囊炎的治疗首选胆囊切除。①胆囊结石和慢性胆囊炎是互为因果的疾病，只有去除病变的胆囊，才能同时治愈胆囊结石和胆囊炎，如果去除结石，只能部分治疗了这一疾病，所以胆囊切除是治疗的最好选择；②对于合并有其他严重疾病的患者，由于不能耐受胆囊切除手术，才选择其他的治疗方法，如体外震波碎石、服药物等治疗；③胆囊切除有两种手术方法。腹腔镜胆囊切除由于损伤小、恢复快等优点，近年已成为胆囊切除的主要方法；④慢性胆囊炎患者没有胆总管探查的适应

证，不应作胆总管切开、T 管引流术。

72. 答案:C

解析:患者长期低盐饮食，补充葡萄糖酸钙后未见明显改善，考虑为低钠血症。

73. 答案:E

解析:本例为溃疡性结肠炎，药物治疗首选 SAPA(柳氮磺吡啶)口服，对直肠、乙状结肠病变可考虑保留灌肠，但病人未曾治疗过，且无应用 SASP 禁忌，加之病程常达 5 年，故不宜首选氢化可的松保留灌肠治疗；其他各药均不作为单独使用的药物。

74. 答案:E

解析:急性蜂窝织炎局部症状为:病变局部红、肿、热、痛，并向周围迅速扩大。红肿的皮肤与周围正常组织无明显的界限，中央部颜色较深，周围颜色较浅。感染部位较浅、组织较松弛者，肿胀明显且呈弥漫性，疼痛较轻；感染位置较深或组织较致密时，则肿胀不明显，但疼痛剧烈。

75. 答案:B

解析:绞窄疝考虑到手术区污染，在高位结扎疝囊后，一般不强求做疝修补术。

76. 答案:A

解析:慢阻肺急性加重可出现，患者短期内咳嗽、咳痰、气短和/或喘息加重，痰量增多，呈脓性或黏脓性，可伴发热等炎症明显加重表现的阶段。

77. 答案:C

解析:原发性下肢静脉曲张以大隐静脉曲张为多见；以下肢多见；主要临床表现为下肢浅静脉扩张、迂曲，下肢沉重、乏力感；可出现踝部轻度肿胀和足靴区皮肤营养性变化:皮肤色素沉着、皮炎、湿疹、皮下脂质硬化和溃疡形成；大隐(浅)静脉瓣膜功能试验(Trendelenburg 试验)提示大隐静脉瓣膜功能不全；仅这项阳性可以诊断为原发性(单纯性)下肢静脉曲张。

78. 答案:D

解析:患者有典型的转移性右下腹疼痛，右下腹可触及包块伴压痛，一般发现右下腹触及包块，边界不清，固定，考虑阑尾穿孔已包裹形成阑尾周围脓肿。宜应用抗生素治疗或中药治

疗促进脓肿吸收消退，也可在 B 超引导下穿刺抽脓。阑尾周围脓肿应在治愈后三个月左右做择期手术切除阑尾。所以 D 是不合适的。

79. 答案:C

解析:绞窄性肠梗阻预后严重,须及早进行手术治疗。绞窄性肠梗阻具体表现:①腹痛发作急骤,起始即为持续性剧烈疼痛,或在阵发性加重之间仍有持续性疼痛。肠鸣音可不亢进。有时出现腰背部痛,呕吐出现早、剧烈而频繁。②病情发展迅速,早期出现休克,抗休克治疗后改善不显著。③有明显腹膜刺激征,体温上升、脉率增快、白细胞计数增高。④腹胀不对称,腹部有局部隆起或触及有压痛的肿块(胀大的肠袢)。⑤呕吐物、胃肠减压抽出液、肛门排出物为血性,或腹腔穿刺抽出血性液体。⑥经积极非手术治疗而症状、体征无明显改善。⑦腹部 X 线检查见孤立、突出胀大的肠袢、不因时间而改变位置,或有假肿瘤状阴影;或肠间隙增宽,提示有腹腔积液。结合患者体征考虑选择 C。

80. 答案:B

解析:黏液脓血便是细菌性痢疾的特征性临床表现。

81. 答案:C

解析:结肠多发性腺瘤性息肉属于结肠癌的癌前病变。最适宜的治疗是行根治性结肠切除术。

82. 答案:D

解析:老年患者出现上腹痛伴进行性黄疸及胃肠道症状,结合 CA199 和 CEA 增高,考虑诊断为胰腺癌。胰腺增强 CT 检查在临床中广泛应用,对于胰腺肿瘤的定性、定位诊断提供非常重要的影像学依据,尤其是对胰腺肿瘤的术前可切除性评估具有重要意义,目前可作为胰腺肿瘤病人的首选影像学检查手段。

83. 答案:D

解析:失代偿期肝硬化患者全血细胞减少的主要原因为脾功能亢进,导致血细胞破坏增加。

84. 答案:D

解析:患者右上腹剧痛,发热,肝大,双下肢凹陷性水肿,肝功能正常,诊断为肝脓肿。

85. 答案:B

解析:肝肾综合征在积极改善肝功能前提下,可采取以下措施:①迅速控制上消化道大出血、感染等诱发因素;②严格控制输液量,量出为入,纠正水、电解质和酸碱失衡;③输注右旋糖酐、白蛋白或浓缩腹水回输,在扩容的基础上应用利尿剂;④活性血管药如多巴胺可改善肾血流量,增加肾小球滤过率,故 C、D 正确, A、E 选项为治疗高血钾的有效措施。故选 B。

86. 答案:A

解析:本病诊断为胃溃疡合并穿孔,因此首选术式为:毕罗 I 式胃大部分切除术。

87. 答案:E

解析:先天性巨结肠、肠梗阻多有胎便排出延迟或少,并有腹胀,呕吐物含有胆汁。

88. 答案:D

解析:腺病毒肺炎临床特点为:起病急骤,高热持续时间长,可持续 2~3 周,中毒症状重,萎靡嗜睡,面色苍白,咳嗽较剧,频咳或阵咳,可出现阵发性喘憋、呼吸困难、发绀等。肺部体征如啰音出现较晚,多于高热 3~7 日后开始呈现湿啰音,以后因肺部病变融合而出现肺实变体征。易合并心肌炎、心力衰竭和多器官功能衰竭。X 线特点:①X 线改变较肺部体征出现早,肺部啰音不明显时,即可出现 X 线改变,故强调早期摄片;②大小不等的片状阴影或融合成大病灶,甚至一个大叶,肺气肿多见。

89. 答案:E

解析:麻疹分四期:潜伏期、前驱期、出疹期、恢复期。出疹期多在发热后 3~4 天,皮疹开始为不规则的红色斑丘疹,始于耳后、颈部、发际边缘,24 小时遍及面部、躯干、四肢,大部分丘疹压之褪色。

90. 答案:C

解析:患者的临床表现符合贫血表现,实验室检查提示小细胞低色素性贫血,缺铁性贫血。

91. 答案:C

解析:为提高阳性率应多次、最好在发生寒战、高热时抽血作细菌培养。

92. 答案:E

解析:手术后胃肠道功能常易紊乱,从患者的症状考虑可能是肠蠕动功能失调。

93. 答案:E

解析:患者老年女性,颈部皮肤红肿,有多个脓点,后出现浸润性水肿,疼痛,表面皮肤呈紫褐色,诊断为颈部疔(疔一般以中、老年发病居多,病变好发于皮肤较厚的部位,如在项部和背部。初起表现为局部小片皮肤硬肿,其中可有数个凸出点或脓点,随后局部病灶的皮肤硬肿范围增大,周围呈现浸润性水肿,局部疼痛加剧,全身症状加重,其间皮肤可因组织坏死呈紫褐色)。患者已出现多个脓点、表面紫褐色,需要及时切开引流,应在静脉麻醉下作“+”或“++”形切口切开引流,而不是沿皮纹行一横行切口(扩大清创范围,并减轻对周围皮肤组织的牵拉)(E错,为本题正确答案),切口线应超过病变边缘皮肤(B对),清除化脓或失活的组织(A对),然后在切口内填塞生理盐水或凡士林纱布(D对),外加干纱布绷带包扎,以后每日更换敷料,等炎症控制后伤口内可用生肌散,促进肉芽组织生长,促进创面收缩愈合,不可一期缝合切口(C对)。

94. 答案:D

解析:骨盆骨折后可引起广泛出血,巨大血肿可沿腹膜后疏松结缔组织间隙蔓延到肾区、膈下或肠系膜,短时间出现血压下降,休克而危及生命,现场急救应立即加压包扎止血。因此选D。

95. 答案:D

解析:心衰妇女不宜妊娠,一旦妊娠,应在妊娠12周前行人工流产。负压吸引术适用于孕10周以内者,可用吸管伸入宫腔,以负压将胚胎组织吸出而终止妊娠。钳刮术是人工流产术中较大的一种手术,一般适用于妊娠11~14周,必须住院施行。此时胎儿已较大,手术操作也较为繁杂。

96. 答案:C

解析:硫酸镁具有解痉及一定的镇静降压作用,对胎儿影响小,是预防控制子痫的首选药物。同时注意硫酸镁中毒反应:①膝腱反射消失;②尿量每小时少于25ml;③呼吸每分钟少于16次。一旦出现上述症状应立即停药,

并给予10%葡萄糖酸钙10ml静注拮抗。

97. 答案:D

解析:患者属于子宫脱垂II度,应采用的方式是经阴道子宫全切及阴道前后壁修补术;Manchester手术适用于年龄较轻,希望保留子宫的II, III度脱垂伴阴道前后壁脱垂者。

98. 答案:B

解析:痛风常见于40岁以上的中老年人,男性占95%,急性关节炎是其最常见的首发症状,好发于趾关节且第一次发作通常在夜间。高尿酸血症的诊断标准为:男 $>420\mu\text{mol/L}$,女 $>357\mu\text{mol/L}$,尿酸盐沉积在关节囊软骨等处。

99. 答案:A

解析:环磷酰胺作为免疫抑制剂,用于各种自身免疫性疾病,如严重类风湿性关节炎、全身性红斑狼疮、儿童肾病综合征、多发性肉芽肿、天疱疮以及溃疡性结肠炎、特发性血小板减少性紫癜等。也用于器官移植时抗排斥反应,通常与泼尼松、抗淋巴细胞球蛋白合用。

100. 答案:E

解析:肺结核并发大量咯血必须积极治疗:首先必须保持呼吸道通畅,止血措施首选垂体后叶素10单位加入生理盐水或50%葡萄糖溶液40ml内,缓慢于10分钟内注完,或将10单位加入生理盐水250ml内静滴。

101. 答案:A

解析:酒精中毒性幻觉症以幻听为主,也可见幻视,错觉,及视物变形。

102. 答案:E

解析:青年男性患者,头部外伤,昏迷30分钟后清醒,5小时后又转入昏迷(硬膜外血肿的典型表现),右颞头皮血肿,右侧瞳孔逐渐散大(提示右侧动眼神经受压),左侧肢体瘫痪(提示右侧脑功能区受压迫)。脑挫伤常表现为伤后立即出现的意识障碍,无中间清醒期,一般不出现瞳孔改变和肢体偏瘫;脑水肿主要表现为头痛、呕吐等颅内压增高的症状,一般不出现意识障碍、瞳孔改变等表现;硬脑膜下积液,多为外伤后硬膜下腔出现的脑脊液积聚,可分为急性和慢性两种,以慢性者多见,多表现为逐渐加重的颅

内压增高症状，无瘫痪、瞳孔改变。

103. 答案:B

解析:有些传染病在临床恢复后,已进入恢复期,体温已完全正常一段时间,体内潜伏的病原体再度繁殖至一定程度,使初发病的症状再度出现,称为复发。如患者已进入恢复期,体温尚未下降至正常时又出现发热,称之为再燃。

104. 答案:A

解析:慢性肺源性心脏病失代偿期引起右心衰竭,可导致颈静脉怒张、肝颈静脉回流征阳性、腹水及三尖瓣区收期杂音。但无脾脏肿大,因为脾静脉和门静脉相连,和下腔静脉不直接相连。故选 B。

105. 答案:B

解析:大叶性肺炎早期叩诊稍浊,肺实变时叩诊浊音,该患者右侧锁骨下闻及支气管呼吸音。

106. 答案:A

解析:COPD 患者急性加重时会出现呼吸衰竭,发生低氧血症和(或)高碳酸血症,具有缺氧和二氧化碳潴留的表现,除呼吸困难之外还会出现意识障碍,应首选血气分析。故本题答案是 A。

107. 答案:E

解析:该患者胸片示下肺纹理呈垂柳样改变,为纤维空洞性肺结核的典型胸片表现。支气管扩张胸片示显著扩张的支气管囊腔,腔内可见气液平面。

108. 答案:B

解析:患者老年男性,咳嗽伴声音嘶哑 3 个月,右锁骨上窝触及一个肿大的淋巴结,质无压痛,首先考虑诊断肺癌。咳嗽为气管受压引起,声音嘶哑为喉返神经受压引起,右锁骨上窝有肿瘤的淋巴结转移。故答案选 B。喉炎、肺结核通常不会出现锁骨上窝的淋巴结肿大;胃癌的淋巴结转移可出现在左锁骨上窝(Virchciw 淋巴结)。鼻咽癌多表现为鼻出血、鼻塞、耳鸣、复视、头痛等,少见咳嗽声嘶。故选 B。

109. 答案:E

解析:一型呼衰:单纯的缺氧,换气功能障碍。发生机制主要是通气/血流比例失调,其次是肺的弥散功能障碍。二型呼衰:缺氧伴二氧化碳潴留,通气功能障碍。发生机制是肺泡通气量下

降。由题干分析,符合一型呼衰。故选 E。

110. 答案:D

解析:青年男性,突发右侧胸痛,气促,大汗淋漓,且有活动作为诱因,应考虑气胸,进一步的体检发现气管左偏,右胸叩空瓮音,呼吸音消失支持此诊断。

111. 答案:D

解析:患儿自幼体弱,无发绀,无反复肺炎史,未触及震颤,胸骨左缘等 2 肋间可闻及 III 级收缩期杂音, P2 亢进、固定分裂符合房间隔缺损。

112. 答案:D

解析:挤压试验阳性证明有骨盆骨折;膀胱胀满,证明膀胱未破裂,且积有尿液,此时导尿未引出尿液且有血,必定有尿道损伤。

113. 答案:D

解析:肾结核时,若肾盏纤维化狭窄或完全闭塞时,排泄性尿路造影可见空洞充盈不完全或完全不显影。目前患者右肾不显影,考虑右肾结核,患者出现膀胱体积减少,当出现膀胱结核时候,膀胱挛缩。膀胱结核病变常致输尿管口狭窄,导致尿液梗阻,引起对侧肾积水。故考虑右肾、膀胱结核。故选 D。

114. 答案:A

解析:在肱骨干下 1/3 段后外侧有桡神经沟,其内有桡神经走行。当发生肱骨干横骨折时,有移位且经手法复位及牵引治疗,出现骨折端分离,紧贴肱骨骨面走行的桡神经容易造成损伤。故选 A。

115. 答案:D

解析:凡有以下表现均应考虑有急性血源性骨髓炎的可能:①急骤的高热与毒血症表现;②长骨干骺端疼痛剧烈而不愿活动肢体;③该区有一明显的压痛区;④白细胞计数和中性粒细胞比例增高。该患儿突发寒战、高热,右膝局部剧烈疼痛,肢体不敢活动,局部无明显肿胀,应首先考虑是否有急性血源性骨髓炎的可能。故选 D。

116. 答案:A

解析:急性呼吸窘迫综合征多于原发病起病后 5 天内发生,约半数发生于 24 小时内。除原发病的相应症状和体

征外，最早出现的症状是呼吸加快，并呈进行性加重的呼吸困难、发绀，常伴有烦躁、焦虑、出汗等。本题老年女性 COPD 患者，腹部手术后 8 天突然出现呼吸困难、端坐呼吸、烦躁不安、口唇发绀；无发热，无咳粉红色泡沫痰，无肺部呼吸音减弱、无右心衰体征。考虑存在急性呼吸窘迫综合征。

117. 答案:E

解析:患者有胃大部切除病史，月经量多，近 1 年半来头晕，乏力，面色逐渐苍白，Hb76g/L 降低，RBC 降低，网织红细胞 0.015(正常值 0.005~0.015)，患者的临床表现及实验室检查符合缺铁性贫血。ABCD 均可发生在缺铁性贫血。心尖部收缩期吹风样杂音为二尖瓣关闭不全的体征。

118. 答案:D

解析:门静脉高压征所致食管胃底曲张静脉破裂出血，如需急诊手术，贲门周围血管离断术最为有效，既确切控制了曲张静脉破裂出血，又保证了肝的血供。

119. 答案:E

解析:腹手术后乳胶片引流拔除时间一般在术后 1~2 天。

120. 答案:C

解析:手术后创口缝线的拆除时间根据切口部位、局部血液供应情况、病人年龄、营养状况等来决定。一般头、面、颈部在术后 4~5 日拆线，下腹部、会阴部在术后 6~7 日拆线，胸部、上腹部、背部、臀部手术 7~9 日拆线，四肢手术 10~12 日拆线(近关节处可适当延长)，减张缝线 14 日拆线。

121. 答案:C

解析:年轻女性，咳嗽，咳脓痰、间断咯血、左下肺闻及湿啰音考虑最可能为支气管扩张，痰培养示铜绿假单胞菌，需使用第三代头孢菌素。

122. 答案:C

解析:年轻女性，咳嗽，咳脓痰、间断咯血、左下肺闻及湿啰音考虑最可能为支气管扩张，痰培养示铜绿假单胞菌，需使用第三代头孢菌素。

123. 答案:C

解析:反复上腹胀痛 1 年，进食后呕吐 1 个月，呕吐物含有宿食考虑为胃癌合

并幽门梗阻，上腹可见胃型，可闻及振水音进一步证实诊断，因此选 C。

124. 答案:A

解析:根据题干叙述的病史、症状和体征，其诊断应考虑是胃十二指肠溃疡幽门梗阻。最有价值的辅助检查是纤维胃镜检查，不但可以确定梗阻，并可明确梗阻的原因和性质。幽门梗阻病人，由于于长期反复呕吐，胃液丧失过多，丧失大量的 H⁺和 Cl⁻代谢过程中又排出 K⁺，再加上长期摄入不足，可出现低钾低氯性碱中毒。

125. 答案:A

解析:沙眼衣原体感染所致子宫颈炎治疗药物主要有:四环素类、大环内酯类、氟喹诺酮类，孕妇首选阿奇霉素(A 对)，属大环内酯类，孕妇禁用多西环素、喹诺酮类和四环素。

126. 答案:C

解析:梅毒感染首选青霉素。

127. 答案:A

解析:螺旋体治疗首选青霉素。

128. 答案:C

解析:沙眼衣原体感染所致子宫颈炎治疗药物主要有:四环素类、大环内酯类、氟喹诺酮类，孕妇首选阿奇霉素，属大环内酯类。

129. 答案:B

解析:肛裂:疼痛、便秘和出血:排便时肛管烧灼样或刀割样疼痛，疼痛多剧烈，有典型的周期性;可形成特疼痛便秘恶性循环;常在粪便表面或便纸上见到少量血迹，或滴鲜血。

130. 答案:A

解析:大部分肛痿患者可在肛缘触及索条状硬块，按压轻度疼痛。

131. 答案:D

解析:直肠指检是诊断直肠癌的必要检查步骤。约 80%的直肠癌患者就诊时可通过直肠指检被发现。可触及质硬、凹凸不平肿块;晚期可触及肠腔狭窄，肿块固定。指套见含粪的污浊脓血。

132. 答案:E

解析:直肠息肉的特点为直肠触诊触及柔软光滑而有弹性，可推动的包块，为良性肿块的特点。直肠癌直肠触诊触及质地坚硬、表面凹凸不平的包块，此亦为恶性肿瘤的典型特点。

133. 答案:A

解析:口服新霉素、甲硝唑(灭滴灵)可抑制细菌,减少肠内氨的生成,对肝性脑病的短期治疗有效,但因为它由肝代谢,故用量应减少。

134. 答案:B

解析:鸟氨酸、天冬氨酸:通过促进体内尿素循环,促进氨的代谢,而降低血氨。

135. 答案:B

解析:肺炎球菌肺炎是肺炎球菌侵入肺组织引起肺实变炎症,临床表现为突然的寒战、高热、胸痛、铁锈色痰等症状,检查有肺实变体征。X线检查可见密度较高、均匀一致的片状阴影,呈节段或大叶性分布。有的可出现感染性休克。

136. 答案:E

解析:咳浆液粉红色泡沫痰是急性左心衰肺水肿时的特征性表现。

137. 答案:C

解析:胃黏膜内中性粒细胞浸润时显示有活动性炎症,称为慢性活动性胃炎。炎症静息时浸润的炎性细胞主要是淋巴细胞和浆细胞,活动时见中性粒细胞增多。

138. 答案:E

解析:①胃黏膜内中性粒细胞浸润时显示有活动性炎症,称为慢性活动性胃炎。②A型胃炎萎缩和肠化生主要局限在胃体部。可出现明显厌食和体重减轻,可伴有贫血,均有胃酸缺乏。血清中可测得抗壁细胞抗体和抗内因子抗体。

139. 答案:B

解析:患者反复发作上腹部疼痛4年,本次急性发作,考虑胆道疾病,结石是胆道系统疾病最可能原因。

140. 答案:D

解析:病人出现神志淡漠,嗜睡, BP90/50mmHg,提示急性梗阻性化脓性胆管炎(AOSC),最有效的治疗措施是手术解除梗阻并减压引流,及早有效降低胆管压力。

141. 答案:C

解析:膈下未见游离气体排除了肠穿孔倾向于胰腺炎。血淀粉酶6~12h开始升高,尿淀粉酶12~14h升高,血清脂肪酶24~72h开始升高。胰腺炎的局部并发症包括:胰腺脓肿、胰腺假性囊

肿。

142. 答案:B

解析:治疗以保守治疗为主,包括禁食禁水、胃肠减压、静脉输液和止痛治疗,当与胆道疾病有关时可使用抗生素,减少胰液分泌用生长抑素及其类似物奥曲肽,抑制胰酶活性用胰肽酶。胰腺炎有并发症时或经内科治疗无效时可手术。故选B。

143. 答案:B

解析:胃食管反流病常表现为胸骨后或剑突下烧灼样疼痛,卧位、弯腰或腹压增高时反流会加重,疼痛亦加重,直立位可减轻。

144. 答案:D

解析:胃食管反流病的主要发病机制是抗反流防御机制减弱和反流物对食管黏膜攻击作用的结果。夜间胃酸分泌过多不是胃食管反流病的发病机制,而其余四项均与胃食管反流病的发病有关。

145. 答案:B

解析:拇指针刺伤,出现拇指红肿、剧痛,伴发热,考虑为化脓性指头炎。

146. 答案:C

解析:指头炎出现跳痛,明显肿胀,应立即切开减压、引流,不能等待波动出现。

147. 答案:A

解析:流行性乙型脑炎简称乙脑,是由嗜神经的乙脑病毒所致的中枢神经系统性传染病。经蚊等吸血昆虫传播,流行于夏秋季,多发生于儿童,临床上以高热、意识障碍、惊厥、呼吸衰竭及脑膜刺激征为特征。部分患者留有严重后遗症,重症患者病死率较高。

148. 答案:D

解析:可用于流行性乙型脑炎早期诊断的实验室检查是特异性IgM抗体检测。

149. 答案:A

解析:I度烧伤:红斑烧伤,仅表皮层。红斑状、干燥,烧灼感,7日之内痊愈,无瘢痕。浅II度烧伤:伤及真皮乳头层。水疱形成,含淡黄色或澄清液体,水疱皮脱落后,创面红润、潮湿,疼痛剧烈2周痊愈。无瘢痕。深II度烧伤:完全伤及真皮层,水疱皮壁较厚,基底苍白与潮红相间,痛觉迟钝。3~4周

痊愈，有瘢痕增生。Ⅲ度烧伤：伤及皮肤全层，到达皮下、肌肉甚至骨骼。痛觉消失，创面无水疱，焦黄色或焦痂状，树枝状栓塞的血管。需要植皮。

150. 答案:A

解析:成人:第一个 24 小时补液量 = $1.5\text{ml} \times \text{体重 (kg)} \times \text{烧伤面积 (\%)} / 2 + 2000$ 。

第四单元

1. 答案:A

解析:早期妊娠最具有特异性的症状是停经。

2. 答案:B

解析:双胎输血综合征只发生在单绒毛膜性双胎,占到 15%,其诊断必要条件是一胎羊水过多,一胎羊水过少,胎儿大小以及是否有血红蛋白相差并非诊断必要条件。

3. 答案:A

解析:流产的病因包括胚胎因素、母体因素、父亲因素和环境因素,其中胚胎或胎儿染色体异常是早期流产最常见的原因。

4. 答案:C

解析:沙丁胺醇与茶碱类药物并用时,可能会增加松弛支气管平滑肌的作用,加强止咳作用,但也可能会使不良反应加重。患儿症状已缓解,无需再静脉注射氨茶碱。

5. 答案:D

解析:围生期(围产期):指胎龄满 28 周(体重 $\geq 1000\text{g}$)至出生后 7 足天。这一时期从妊娠的晚期经分娩过程至新生儿早期,经受了巨大的变化,是生命遭遇最大危险的时期。这一时期的死胎、死产和活产新生儿死亡率均较高。

6. 答案:D

解析:孕激素的生理作用是:维持子宫妊娠环境;促进乳腺发育;生热效应。使阴道上皮增生、角化,使宫颈分泌大量清亮、稀薄的黏液和刺激乳腺导管和结缔组织增生是雌激素的生理作用。

7. 答案:B

解析:2 岁时体重约为出生体重的 4 倍。

8. 答案:C

解析:回收式自体输血主要适用于外

伤性脾破裂、异位妊娠破裂等造成的腹腔内出血及大血管、心内直视手术及门静脉高压症等手术时的失血回输和术后 6 小时内所引流血液的回输等。

9. 答案:C

解析:小儿 4 个月,应接种百白破疫苗第二针。

10. 答案:E

解析:子宫阔韧带前后两叶,其上缘游离,形成骨盆漏斗韧带,又称卵巢悬韧带,为固定卵巢的韧带。宫骶韧带,固有韧带,圆韧带和主韧带都直接与卵巢相连,可以防止卵巢过度移位。

11. 答案:D

解析:8 月的婴儿,会换手、会拍手、会扶站,会发出妈妈、爸爸的声音。

12. 答案:B

解析:叶酸和维生素 B12 缺乏, DNA 合成障碍引起的巨幼细胞贫血。

13. 答案:C

解析:苯丙酮尿症是由于苯丙氨酸代谢途径中酶缺陷所致的较常见的常染色体隐性遗传病。

14. 答案:D

解析:添加方式根据小儿营养需要及消化能力循序渐进,适应一种食品后再增加一种,从少到多,从稀到稠,从细到粗,逐步过渡到固体食物。

15. 答案:D

解析:盆腔炎性疾病的最低诊断标准为:宫颈举痛或宫体压痛或附件区压痛,而非下腹疼痛,下腹反跳痛,下腹压痛。体温大于 38.3°C 是附加标准之一。

16. 答案:B

解析:帕金森病的诊断主要包括肢体动作缓慢、偏侧肢体起病、肢体静止性震颤及齿轮状肌张力增高。

17. 答案:C

解析:引起儿童输尿管积水的主要原因是先天性肾盂连接部狭窄。

18. 答案:A

解析:重度低渗性脱水伴休克时,可用 2:1 等张含钠液 $20\text{ml} / \text{kg}$,总量小于 300ml 于 30~60 分钟内静脉推注或快速点滴。

19. 答案:B

解析:患儿生后 1 周内用吲哚美辛以促

进导管关闭，也可用前列腺素抑制药。

20. 答案:C

解析:梅格斯综合征,是一种良性卵巢纤维瘤。

21. 答案:A

解析:因为脑内血肿、硬脑下血肿、颅内肿瘤、脑水肿会导致病变部位压力首先增高,使附近的脑组织受到挤压而发生移位,并把压力传向远处,造成颅内各腔隙间的压力差,所以会导致颅内压增高。

22. 答案:A

解析:动脉粥样硬化是脑梗死的基本病因,常伴高血压、糖尿病和高脂血症。动脉壁炎症、真性红细胞增多症、血高凝状态为其少见病因。

23. 答案:D

解析:备选答案均是脑出血的病位,其中基底节占70%,脑叶、脑干、小脑各占10%,脑室出血极少。

24. 答案:D

解析:小儿体格发育是一连续的过程,又具有阶段性,具有两个生长高峰,分别是婴儿期和青春期。

25. 答案:A

解析:急性应激障碍治疗干预的基本原则是及时、就近、简洁、紧扣重点。

26. 答案:D

解析:关系妄想不是脑病引起的意识障碍,而是多见于精神分裂症,多是心理因素。急性脑病综合征又称为谵妄。表现为意识障碍、行为紊乱、没有目的、注意力不集中,通常起病急,病情昼夜波动明显。该综合征常见于老年患者。患者的认知功能下降,觉醒度改变,感知觉异常,昼夜颠倒。

27. 答案:A

解析:OCT 试验叫做缩宫素激惹实验,试验的主要目的就是通过静点缩宫素诱发宫缩。

28. 答案:E

解析:宫内节育器的避孕机制主要有杀精毒胚作用和干扰着床。

29. 答案:A

解析:子宫内膜有无周期性变化,不仅受体内雌、孕激素的影响。更受子宫及子宫内膜的发育、有无病变及其雌、孕激素受体的含量等影响,所以只有通过诊断性刮宫取子宫内膜行组织病

理学检查,才能确切了解子宫内膜的周期性变化。

30. 答案:C

解析:维持子宫正常位置的是子宫四对韧带(圆韧带、阔韧带、主韧带、宫骶韧带)及盆底肌肉筋膜的支托作用。

31. 答案:B

解析:异位的子宫内膜侵犯部位的大体病理有卵巢、宫底韧带、直肠子宫陷凹、子宫后壁下段、盆腔腹膜、输卵管及宫颈、等其他部位,但卵巢是最易被异位内膜所侵犯。

32. 答案:D

解析:左向右分流,肺循环血流量增多,易并发支气管肺炎。

33. 答案:C

解析:动脉导管未闭的血流动力学特点:血液自主动脉向肺动脉分流。此时肺动脉接受右心室及主动脉分流来的两处血,故肺动脉血流增加,致肺脏、左心房及左心室的血流增加,因而出现左心房、左心室的扩大,室壁的肥厚。听诊:于胸骨左缘第2肋间闻有粗糙、响亮的连续性机器样杂音。X线检查:左心房、左心室增大,肺动脉段凸出,肺门血管影增粗,可有肺门“舞蹈”。有肺动脉高压时,右心室亦增大。主动脉弓增大。

34. 答案:B

解析:血清铁蛋白值可较灵敏地反映体内贮铁情况,在缺铁的初期即已降低,其放射免疫法测定值低于12 μ g/L提示缺铁。

35. 答案:E

解析:1, 25-(OH)2D3 是维生素D在血浆中的主要存在形式,其正常值为15~125nmol/L(10-50ng/ml),佝偻病早期1, 25-(OH)2D3 即明显降低,维生素D治疗则升高,当<8ng/ml时可诊断此病,是可靠的诊断指标。

36. 答案:C

解析:蛋白质-能量营养不良患儿皮下脂肪逐渐减少或消失,首先为腹部,其次为躯干、臀部、四肢,最后为面颊部。

37. 答案:C

解析:急性横贯性脊髓炎又称急性脊髓炎,是各种感染后变态反应引起的病变。急性起病,迅速发展,早期常

为脊髓休克，表现为四肢瘫或双下肢弛缓性瘫痪，肌张力低下，腱反射消失，病理征阴性。

38. 答案:D

解析:脊髓半切综合征表现为病变节段以下，同侧上运动神经元性瘫痪及触觉、深感觉的减退，对侧病变平面2~3个节段以下的痛温觉丧失。脊髓外肿瘤进行性生长，体积增大，压迫而损害脊髓和神经根，脊髓受到挤压而逐渐出现脊髓传导束受压的症状。常见于脊髓部分受压期，腰髓以下一侧病变不引起这一综合征。

39. 答案:E

解析:颅前窝骨折累及眶顶和筛骨，可出现眶周软组织广泛淤斑(“熊猫眼”征)和球结膜下淤斑，鼻漏，累及筛板或视神经管可伤及嗅神经和视神经。

40. 答案:D

解析:晚期减速特点是子宫收缩开始后一段时间出现胎心率的减慢，但是下降缓慢，持续时间较长，回复也缓慢，一般认为是胎儿缺氧的表现。早期减速一般认为是宫缩时胎头受压，脑血流量一时性减少的表现。变异减速一般认为是子宫收缩时脐带受压兴奋迷走神经所致。而变异的频率 ≥ 6 次/分和波动范围在10~25次/分是正常胎心率基线变异的频率和振幅。

41. 答案:A

解析:中脑-边缘系统和-皮质通路与抗精神病药物的治疗作用有关。

42. 答案:E

解析:地西洋对各型发作状态都有效，作用快，5分钟内生效，最适用于癫痫持续状态控制发作。

43. 答案:D

解析:卵巢合成及分泌的性激素均为甾体激素，主要有雌激素(雌二醇及雌酮)、孕激素和少量雄激素。顺序是孕激素→雄激素→雌激素。

44. 答案:D

解析:提示上运动神经元损害最有意义的体征是病理征阳性。

45. 答案:A

解析:断联休克症状:中枢神经系统局部急性严重病变，引起功能上与受损部位密切联系的远隔部位神经功能短暂缺失。

46. 答案:E

解析:分子量小、脂溶性高、血浆蛋白结合率低、非极性的药物容易通过胎盘而影响胎儿。并非所有激素都容易通过胎盘，如泼尼松不易通过胎盘屏障到达胎儿。

47. 答案:E

解析:遗忘综合征又称为柯萨可夫综合征，患者无意识障碍，智能相对完好，主要表现为近事记忆障碍、定向力障碍和虚构。多见于酒精中毒性精神障碍、颅脑损伤所致精神障碍、脑肿瘤及其他脑器质性精神障碍。

48. 答案:B

解析:生理反射包括:①觅食反射指用手指或乳头轻触新生儿的口角或面颊部，小儿就会将头转向被触摸的这一侧，可并有张嘴和吸吮动作，该反射正常在生后3~4个月时消失;②握持反射是将手指或笔杆触及小儿手心时，小儿马上将其握紧不放，该反射正常在生后3个月时消失;③拥抱反射是当突然改变新生儿的姿势时，或者当他听见大的声音时，小儿出现两上肢向两侧外展伸直、手指伸开、两下肢伸直，然后两上肢向胸前屈曲内收，呈拥抱状姿势，有时伴有啼哭，该反射正常一般在生后4~5个月时消失;④吸吮反射是将乳头或手指放在小儿两唇之间或口内，即出现有力的吸吮动作，该反射正常在生后4个月左右时消失。这四种反射阴性提示神经系统异常。

49. 答案:A

解析:疑核受损后造成软腭、咽喉部肌肉麻痹。

50. 答案:E

解析:脑出血手术治疗的适应症是小脑血肿 $>10\text{ml}$ 、壳核出血 $>40\text{ml}$ 、严重脑室出血。

51. 答案:C

解析:女性生殖道的生理防御机制包括解剖学机制和阴道生态平衡。①宫颈阴道部表面为复层鳞状上皮，抗感染能力强，宫颈内口紧闭，宫颈管有黏液栓;②阴道正常的酸性环境($\text{pH}4.5$ ，多为 $3.8\sim 4.4$);③雌激素使阴道上皮增生变厚，并增加细胞内糖原含量;④正常阴道内有多种细菌存

在, 其中包括乳酸杆菌、双歧杆菌有益菌, 及滴虫、霉菌、大肠杆菌、白色念珠菌等引起各种妇科疾病的有害菌和致病微生物。

52. 答案:B

解析: 吉兰巴雷综合征典型的脑脊液改变是蛋白质含量增高, 而细胞数正常, 称为蛋白-细胞分离现象。这在起病后两周较为明显。

53. 答案:E

解析: 预产期推算按末次月经第一天算起, 月份加 9 或减 3, 日数加 7。

54. 答案:A

解析: 对病情经过不能完全回忆属于幻觉妄想。

55. 答案:C

解析: 母乳喂养的优点是: (1) 含有 4-6 个月婴儿所需的全部营养物质; (2) 易于消化吸收; (3) 具有抗感染的物质如免疫蛋白、乳铁蛋白, 可以增加婴儿的抵抗力; (4) 温度适中, 无菌, 随时可哺喂; (5) 不会过敏; (6) 增加母婴感情交流, 吸吮也利于产妇产后子宫的恢复, 减少产后出血; (7) 经济实惠; (8) 减少母亲将来发生乳腺癌、卵巢癌的机会。

56. 答案:A

解析: 传统以患者平卧用力向下屏气时, 子宫下降最低点为分度标准, 将子宫脱垂分为 3 度。(1) I 度: 轻型: 宫颈外口距处女膜缘 < 4cm, 尚未达到处女膜缘; 重型: 宫颈外口已达处女膜缘, 在阴道口能见到宫颈。(2) II 度: 轻型: 宫颈已脱出阴道口外, 宫体仍在阴道内; 重型: 宫颈及部分宫体已脱出至阴道口外。(3) III 度: 宫颈及宫体全部脱出至阴道口外。本例患者阴道前壁膨出, 宫颈光滑, 用力时宫颈及部分宫体脱出阴道口外, 应诊断为 II 度重型子宫脱垂伴阴道前壁膨出。

57. 答案:D

解析:

58. 答案:B

解析: 童样痴呆: 病人主要表现为类似一般儿童那样幼稚的样子, 比如学儿童说话声, 自认为三岁左右, 自称自己为宝宝, 逢人就喊“叔叔”“阿姨”等。

59. 答案:C

解析:

60. 答案:A

解析: 脑动脉系统包括颈内动脉系统和椎-基底动脉系统。颈内动脉系统分支主要包括: 眼动脉、脉络膜前动脉、后交通动脉、大脑前动脉和大脑中动脉, 供血部位包括眼部和大脑半球前 3 / 5 部分。故一侧颈内动脉 TIA 可出现病变侧单眼一过性黑矇、对侧偏瘫及感觉障碍。

61. 答案:A

解析: 绝经综合征诊断: 血清 FSH 值及 E2 值测定应检查血清 FSH 值及 E2 值了解卵巢功能。绝经过渡期血清 FSH > 10U/L, 提示卵巢储备功能下降。闭经、FSH > 40U/L 且 E2 < 10~20pg/ml, 提示卵巢功能衰竭。

62. 答案:B

解析: NT 值的检测, 是对孕 11~14 周之间的胎儿颈后皮下组织内液体积聚的厚度进行探查, 从而推测胎儿发育的异常情况, 一般认为, NT 值小于 2.5mm 为正常, 超过 2.5mm 为异常。但 NT 的检查不能确诊疾病, 如果异常, 还需要通过羊水穿刺和脐血穿刺, 进行染色体检测, 才能确定。

63. 答案:A

解析: 肥胖、月经稀发或闭经, 面部痤疮, 有胡须, 提示高雄激素血症, 超声卵巢多囊样改变, 是多囊卵巢综合征。

64. 答案:A

解析: 子宫输卵管造影适用于不孕症, 经丈夫精液检查无异常, 病人 BBT 为双相且黄体功能良好已连续 3 个月经周期, 仍未能受孕者。

65. 答案:D

解析: Asherman 综合征是子宫性闭经最常见的原因。因人工流产刮宫过度或产后、流产后出血刮宫损伤引起, 尤其当伴有子宫内膜炎时, 更易导致宫腔粘连或闭锁而闭经。颈管粘连者有月经产生, 但不能流出; 宫腔完全粘连者则无月经。

66. 答案:E

解析: 典型的高热惊厥具有以下特点: ①多见于 6 个月~5 岁小儿; ②患儿体质较好; ③惊厥多发生在病初体温骤升时, 常见于上感; ④惊厥呈全身性, 次数少, 时间短, 恢复快, 无异

常神经系统症状，一般预后好。和患儿表现相符。

67. 答案:A

解析:阴道接触性出血提示宫颈癌。

68. 答案:D

解析:子宫内膜癌首选的治疗方式为手术治疗，I 期患者子宫次根治手术及双侧附件切除术，II 期应行子宫广泛切除术及双侧盆腔淋巴结清扫术。

69. 答案:B

解析:正常人脊髓终止于第 1 腰椎下缘，因此第 1 腰椎骨折可发生脊髓圆锥损伤。脊髓圆锥损伤表现为会阴部皮肤鞍状感觉缺失及括约肌功能丧失，两下肢的感觉和运动仍保留正常。

70. 答案:A

解析:安置宫内节育环后出现少量阴道流血，后出现经期延长及经血量增多，此时应该随访观察。

71. 答案:C

解析:急性输卵管炎是由化脓菌引起的化脓性炎。阴道内见脓血性分泌物。

72. 答案:C

解析:①病史:多见于骨盆狭窄、胎位不正、巨大胎儿及胎儿脑积水等梗阻性难产时。也可发生在使用缩宫素不当时。②临床表现:产程时间较长，宫缩良好，但进展缓慢或处于停滞状态。产妇表现烦躁不安，阵缩时疼痛难忍，呼吸急促，腹部拒按。由于胎头压迫，小便常不能自解，导尿常为血性。③出现病理缩复环，下腹拒按。解题关键:先兆子宫破裂出现病理缩复环，下腹拒按，血尿。

73. 答案:A

解析:胎头受压是早期减速，减速与子宫收缩几乎同时开始，子宫收缩后迅即恢复正常。

74. 答案:B

解析:传染性单核细胞增多症主要是由 EB 感染引起的急性自限性传染病。典型临床三联征为发热、咽峡炎和淋巴结肿大，可合并肝脾肿大，外周淋巴细胞及异型淋巴细胞增高。

75. 答案:C

解析:急性脊髓炎多急性起病，青壮年较常见，病前常有感染症状，可有疲劳、外伤及受凉等诱因，多为双下肢麻木无力、束带感。多有运动障碍、

感觉障碍和自主神经功能障碍，如早期尿潴留等。

76. 答案:D

解析:患者伤后原发性昏迷时间较短，出现中间清醒期，考虑为硬脑膜外血肿。

77. 答案:D

解析:新生儿溶血病的特点:①黄疸:发生早，Rh 溶血一般在生后 24 小时内出现。黄疸常迅速加重，血清胆红素上升很快。②贫血:轻症患儿早期可无贫血，到新生儿后期才出现贫血;重症则早期出现贫血，常发生贫血性心衰。③Rh 溶血病很少发生在第一胎，ABO 溶血病的一半发生在第一胎。④胎儿水肿:见于病情严重者，出生时全身水肿，皮肤苍白，常有胸、腹腔积液，肝脾大及贫血性心衰，如不抢救大多死亡，宫内溶血严重者为死胎。故选 D。

78. 答案:C

解析:突发四肢下运动神经元性瘫痪，符合吉兰-巴雷综合症的诊断。急性脊髓炎往往有尿便障碍，可排除。重症肌无力为波动性无力，不符合。

79. 答案:D

解析:青年初孕妇，妊娠 37+2 周(妊娠 28 周及以后为妊娠晚期)突然出现阴道大量流血，无阵发性腹痛，诊断为前置胎盘(典型症状为妊娠晚期发生无诱因、无痛性反复阴道流血)。并出现大量失血，血压下降至 80/60mmHg(血压低于 90/60mmHg)，枕后位(胎位异常，短时间内无法阴道分娩)最佳处理是输血同时行剖宫产术(出血量较多，大量失血，符合剖宫产的指征)(D 对)。立即进行 B 超检查、立即行无应激试验有助于诊断，并不属于治疗措施。输血同时进行人工破膜、立即输血纠正休克不能在短时间内结束分娩，会危及孕妇及胎儿生命。

80. 答案:C

解析:念珠菌性阴道炎的症状是外阴瘙痒，小阴唇内侧及阴道黏膜表面有白色片状薄膜或凝乳状物覆盖，故选 D。

81. 答案:E

解析:根据患者育龄期女性，继发性痛经 3 年，查体:子宫后倾屈，偏大，质硬，考虑诊断子宫腺肌病。可有不孕、

性接触疼痛、经量过多、经期延长表现，不是月经稀发。故选 E。

82. 答案:A

解析:小脑出血与高血压病有直接关系，是由小脑齿状核动脉破裂所致。吸烟、酗酒、食盐过多、体力和脑力劳动过度，都会发生小脑出血。小脑出血多数表现为突然起病的眩晕、频繁呕吐，枕部头痛，可有眼球震颤。

83. 答案:B

解析:该初产妇规律宫缩 6 小时 (<8 小时) 宫口扩张 3cm，说明第一产程潜伏期顺利，胎儿体重 2700g (正常出生体重儿:BM \geq 2500g 并 \leq 4000g 的新生儿)，说明胎儿大小在正常范围内，胎心 142 次/分，说明胎儿情况良好，此时胎头已下降至坐骨棘平面以下 1cm，说明头盆已衔接，骨盆外测量未见异常，故此时恰当处理应是等待自然分娩 (B 对)。该产妇已足月，规律宫缩 6 小时，宫口已开，故诊断为临产，不能抑制宫缩，使其维持至妊娠 40 周 (A 错)，否则不能正常进入活跃期和第二产程。人工破膜 (C 错) 适用于宫口扩张 \geq 3cm、无头盆不称、胎头已衔接而产程延缓者，该产妇进展顺利，正常破膜多发生在宫口开全时，故不需人工破膜加速产程进展。静脉滴注缩宫素 (D 错) 适用于协调性宫缩乏力、宫口扩张 \geq 3cm、胎心良好、胎位正常、头盆相称者，该产妇宫缩良好，故不需静脉滴注缩宫素。该产妇能够阴道分娩，不具剖宫产指征，故不采取行剖宫产术 (E 错)。

84. 答案:C

解析:产后乳房胀痛，因乳腺管不通导致，应用热毛巾湿热敷并按揉乳房，促使乳汁通畅，同时让新生儿频繁吸吮，以利引流。

85. 答案:B

解析:该患者为子痫前期，出现神经系统症状，但胎心正常，故对症处理。重度妊娠高血压综合征时，治疗原则为解痉、降压、镇静、合理扩容利尿、适时终止妊娠。患者头痛剧烈伴呕吐为脑水肿引起颅内压升高的表现，此时应使用快速利尿药甘露醇快速静脉滴注、脱水，降颅压。

86. 答案:B

解析:室间隔缺损是最常见的先天性心脏病，体检:心前区隆起，心界增大，心尖搏动弥散，胸骨左缘第 3~4 肋间可闻及 III~V 级粗糙的全收缩期杂音，传导广泛，可触及震颤。肺动脉第二音亢进。当肺血管病变发展至不可逆的阻力性肺动脉高压，左向右分流逆转为双向分流或右向左分流，患儿呈持续发绀，即艾森门格综合征 (B 对)。

87. 答案:B

解析:肾病综合征诊断标准:大量蛋白尿 (尿蛋白+++~++++; 1 周内 3 次, 24 小时尿蛋白定量 $>$ 50mg/kg); 血浆白蛋白低于 30g/L; 血浆胆固醇高于 5.7mmol/L; 不同程度的水肿。在此基础上凡具有以下四项之一或多项者属于肾炎型肾病:①2 周内分别 3 次以上离心尿检查 RBC \geq 10 个/HPF, 并证实为肾小球源性血尿者。②反复或持续高血压, 学龄儿童 \geq 130/90mmHg, 学龄前儿童 \geq 120/80mmHg, 并除外糖皮质激素等原因所致。③肾功能不全, 并排除由于血容量不足等所致。④持续低补体血症。

88. 答案:C

解析:患儿, 出生 10 天, 因发热拒奶 3 天, 惊厥 2 次来诊, 提示出生 7 天发病 (早发型 7 天内发病), 怀疑感染, 查体反应差 (新生儿败血症一般临床表现), 中度黄染 (黄疸可为败血症唯一表现), 脐部有脓性分泌物 (提示感染), 前囟饱满 (提示颅内压升高)。WBC $20 \times 10^9/L$ (\leq 3 天者 WBC $>$ $25 \times 10^9/L$; $>$ 3 天 WBC $>$ $20 \times 10^9/L$ 者提示存在感染), NO. 78, LO. 22。根据该患儿的临床表现、体查及实验室检查, 最可能诊断为新生儿败血症早发型合并脑膜炎。早发型新生儿败血症常由母亲垂直传播引起, 病原菌以大肠埃希菌 (C 对) 等革兰阴性杆菌为主。

89. 答案:B

解析:脑血栓临床表现和诊断要点:(1) 50 岁以上多见;(2) 有 TIA 病史或高血压、糖尿病等危险因素;(3) 发病急骤、但还可缓慢加重;(4) 常于安静状态或休息时出现偏瘫、偏身感觉障碍、偏盲、失语或其他脑局灶损害症状;(5) 大多无明显头痛和呕吐;(6)

一般无意识障碍；(7)脑脊液检查基本正常。

90. 答案:E

解析:新生儿缺氧缺血性脑病诊断:①围生期窒息病史有胎儿宫内窘迫或产时窒息史,出生时 Apgar 评分低。②临床表现窒息后不久出现的神经系统症状和体征,主要为意识、肌张力及新生儿反射的改变,可伴有前囟隆起,呼吸不规则,心率增快或减慢,瞳孔扩大或缩小,或有惊厥。

91. 答案:C

解析:该患者 5 天前受惊吓后突然不语不动,不吃不喝,肢体僵硬(木僵是紧张型精神分裂症的典型症状)为主要表现,故诊断为精神分裂症(D 对)。分离(转换)性障碍常因暗示而发作,也可因暗示而消失,发作时可表现为分离遗忘、漫游、木僵、出神及附体等。急性应激障碍常于应激刺激后数分钟或数小时内发病,一般不会出现木僵。题干未叙述脑器质性病变。妄想性障碍是指在病态推理和判断基础上形成的一种病理性歪曲的信念,妄想的内容有一定的事实基础。

92. 答案:B

解析:颈后仰伸,四肢强直性伸直,上肢内收、过度旋前和下肢内收、内旋,踝跖屈是去大脑僵直的表现,病变在中脑。而延髓、脑桥和中脑统称为脑干。

93. 答案:E

解析:急性应激障碍常于应激刺激后数分钟或数小时内发病,一般不会出现木僵。

94. 答案:E

解析:继发性闭经伴泌乳素升高提示垂体瘤,大的垂体瘤选择手术,小的则应用溴隐亭。

95. 答案:B

解析:胎盘早剥分为 3 度。(1) I 度:多见于分娩期。胎盘剥离面积小,患者常无腹痛或腹痛轻微,贫血体征不明显。子宫软,大小与妊娠周数相符,胎位清楚,胎心率正常。产后检查见胎盘母体面有凝血块及压迹。(2) II 度:胎盘剥离面达胎盘面积 1/3 左右。主要症状为突然发生持续性腹痛、腰酸或腰背痛,疼痛程度与胎盘后积血量

成正比。无阴道流血或流血量不多,贫血程度与阴道流血量不相符。子宫大于妊娠周数,宫底随胎盘后血肿增大而升高。胎盘附着处压痛明显(胎盘位于后壁则不明显),宫缩有间歇,胎位可触清,胎儿存活。(3) III 度:胎盘剥离面超过胎盘面积 1/2。临床表现较 II 度重。患者出现恶心、呕吐、面色苍白、四肢湿冷、脉搏细数、血压下降等休克症状,休克程度多与阴道流血量不成正比。子宫硬如板状,于宫缩间歇时不能松弛,胎位扪不清,胎心消失。患者无凝血功能障碍属 III a,有凝血功能障碍属 III b。

96. 答案:E

解析:按照胸围和头围关系,1 岁时胸围与头围大致相等。该患儿胸围等于头围,因此年龄应为 12 个月。

97. 答案:B

解析:患者多次从睡眠中惊吓一声醒来,表情恐惧,呼吸急促,出汗,持续数分钟,对家人的呼唤没有相应的反应,早晨起来后往往不能回忆,脑电图检查无特殊发现,提示可能为夜惊。

98. 答案:C

解析:神经性厌食症,又称为厌食症,是患者自己有意造成的体重明显下降至正常生理标准体重以下,并极力维持这种状态的一种心理生理障碍。多见于青少年,发病年龄多在 13~25 岁期间,主要罹及女性,男性与女性患病之比约为 1:9.5。

99. 答案:D

解析:本例有宫内压增高的诱因和胎膜破裂,并有呼吸困难、发绀较典型的羊水栓塞症状以及快速死亡的特点。

100. 答案:B

解析:紧张性头痛常见于 20~40 岁成人,以双侧或单侧颞部、枕后或全头部疼痛多见。通常持续性钝痛,头部紧箍样疼痛,可伴有头昏、失眠、抑郁等症状,无恶心、呕吐,偶有畏光或畏声,神经系统检查无异常。

101. 答案:B

解析:思维破裂指在没有智力损害、意识障碍、情绪激动和精神运动兴奋等情况时,患者的言语表现为句与句之间缺乏可以理解的联系。思维散漫是

联想速度变慢，反应迟钝。

102. 答案:A

解析:病史及 CT 提示后颅窝出血，最可能引起枕骨大孔疝。

103. 答案:D

解析:风疹临床上以前驱期短、低热、皮疹和耳后、枕部淋巴结肿大为特征。

104. 答案:A

解析:小儿手足口病出现的症状:发热、皮疹、口腔黏膜疹。皮疹主要表现为口周、手足心、臀部皮肤可以出现疱疹样的皮疹。

105. 答案:C

解析:幼儿急疹为热退疹出。

106. 答案:D

解析:胎儿娩出后数分钟内出血考虑胎盘剥离不全。

107. 答案:E

解析:胎儿娩出后即有新鲜的活动性出血考虑软产道损伤。

108. 答案:B

解析:出血的原因是子宫收缩乏力。

109. 答案:C

解析:侵袭性大肠埃希菌性肠炎的症状为发热，腹痛腹泻，里急后重，脓血便，严重的可能会导致感染性休克。

110. 答案:E

解析:金黄色葡萄球菌肠炎多继发于使用大量抗生素后，主要表现为呕吐、发热、腹泻，典型大便为暗绿色，量多带黏液，镜检有大量脓细胞。

111. 答案:C

解析:腺病毒肺炎，白细胞数早期大都正常或减少。

112. 答案:A

解析:呼吸道合胞病毒，X 线呈全肺梗阻性肺气肿，肺纹理增粗，间质性肺炎、肺气肿。也可有小点片状淡薄阴影。

113. 答案:A

解析:乳腺囊性增生病是内分泌失调引起的，雌、孕激素的比例失控导致乳腺实质增生过度 and 复旧不全。

114. 答案:C

解析:小叶纤维细胞对雌激素敏感性异常增高引起乳腺纤维腺瘤。

115. 答案:D

解析:宫颈癌属于鳞状细胞癌。

116. 答案:C

解析:子宫内膜癌属于内膜腺样癌。

117. 答案:A

解析:稽留流产是指胎儿在宫腔里死亡，但是并没有及时排出体外的现象。就会影响孕妇的凝血功能。

118. 答案:B

解析:不全流产胚胎组织没有完全排出而堵塞宫颈口，使宫腔内的血块及蜕膜排不出来，影响子宫收缩出现大出血引起休克，不全流产要及时的进行清宫。

119. 答案:B

解析:患者剖宫产术后 16 日(>24 小时)阴道大量流血，诊为晚期产后出血，该患者有剖宫产史，并出现休克等状况，最可能的原因是子宫切口裂开，故不宜行清宫术。

120. 答案:E

解析:因是剖宫产不可能会有胎盘残留或胎儿组织，出血多为子宫切口裂开出血。

121. 答案:E

解析:因是剖宫产不可能会有胎盘残留或胎儿组织，不应采用清宫。

122. 答案:E

解析:氯米帕明用于治疗强迫症。

123. 答案:D

解析:依据题意诊断为强迫症，强迫症的主要治疗是认知行为治疗。

124. 答案:E

解析:患儿属维生素 D 缺乏性手足搐搦症好发年龄组，有典型发作，发作间期无特殊表现，故应诊为维生素 D 缺乏性手足搐搦症。

125. 答案:D

解析:维生素 D 缺乏性手足搐搦症首选的检查是血电解质。

126. 答案:E

解析:维生素 D 缺乏性手足抽搐征发生喉痉挛时情况危急，易发生窒息，所以此时的急救处理应为静注或肌注地西洋来控制喉痉挛，同时应给氧和保持呼吸道通畅，可进行口对口呼吸，必要时进行气管插管。静注钙剂和补充维生素 D 均为维生素 D 缺乏性手足抽搐征的治疗措施，但不用于急救。甘露醇为脱水剂，常用于脱水利尿和降颅压。

127. 答案:E

解析:老年男性患者,车祸后持续昏迷,左顶枕部有一头皮血肿(提示右额颞部对冲伤),右侧瞳孔散大,对光反射消失(提示右侧动眼神经受压),左侧肢体肌张力增高,病理反射阳性(提示右侧小脑扁桃体疝),头颅CT示右额颞部骨板下新月形高密度影(急性硬膜下血肿的典型影像学表现),结合患者病史、临床表现和影像学检查,最可能的诊断为右额颞急性硬脑膜下血肿,小脑扁桃体疝。

128. 答案:C

解析:出血来源多为脑皮质的血管破裂。

129. 答案:E

解析:急性硬脑膜下血肿合并脑疝的患者应及时行开颅手术,清除颅内血肿,以降低颅内压,缓解脑疝症状。气管切开可用于重度颅脑损伤的患者,以防治呼吸道分泌物潴留,保持呼吸道通畅,但不是首要治疗措施。冬眠疗法(可降低脑代谢,保护脑组织不致受缺氧、缺血的损害;减少脑血流量、减轻脑水肿,从而降低颅内压)、激素治疗(可减轻脑水肿)及止血、抗感染为颅内血肿的一般治疗措施,多作为术后的辅助治疗。

130. 答案:D

解析:眼结膜充血,口唇鲜红、干裂,舌呈草莓样,皮肤有浅红色斑丘疹,右颈淋巴结蚕豆大,双肺呼吸音粗,心率增快,腹软,肝、脾无肿大,指、趾端少许皸状脱皮。提示川崎病。

131. 答案:A

解析:川崎病治疗首选丙种球蛋白+阿司匹林。

132. 答案:B

解析:新生儿肺透明膜病指新生儿出生后不久即出现进行性呼吸困难和呼吸衰竭等症状,主要是由于缺乏肺泡表面活性物质所引起,导致肺泡进行性萎陷。

133. 答案:C

解析:新生儿肺透明膜病首要的治疗措施为无创通气。

134. 答案:E

解析:先天性巨结肠、肠梗阻多有胎便排出延迟或少,并有腹胀,呕吐物含有胆汁。

135. 答案:C

解析:先天性巨结肠发生小肠结肠炎表现为腹胀、腹泻、发热。

136. 答案:A

解析:该患儿,出生后3天除黄疸外无其他异常,符合生理性黄疸的诊断。

137. 答案:D

解析:该患儿出生3天有黄疸,是生理性黄疸,属于正常情况,观察,监测胆红素值。

138. 答案:E

解析:患者为年轻女性,葡萄胎清宫术后阴道持续少量流血3个月(妊娠滋养细胞肿瘤在葡萄胎排空、流产或足月产后,有持续的不规则阴道流血,量多少不定)。妇科检查:子宫如妊娠50天大小,质软(常在葡萄胎排空后4~6周子宫尚未恢复到正常大小,质地偏软),双侧附件均可触及囊性肿物,大小约5cm×4cm,活动好(由于hCG的持续作用,在葡萄胎排空、流产或足月产后,双侧或一侧卵巢黄素化囊肿持续存在),尿hCG阳性,盆腔超声示子宫肌层有一4cm×3cm不均质回声,血流信号丰富(超声检查时肌层内有回声不均匀区域或团块,边界不清且无包膜,彩色多普勒超声主要显示丰富的血流信号和低阻力型血流频谱),两侧附件区有囊性低回声包块。考虑为妊娠滋养细胞肿瘤,其包括侵蚀性葡萄胎和绒毛膜癌,继发于葡萄胎排空后半年以内多数为侵蚀性葡萄胎(E对),一年以上者多数为绒毛膜癌(D错)。子宫腺肌病合并卵巢囊肿(A错)表现为经量增多、经期延长和逐渐加重的进行性痛经,无阴道持续少量流血。不全流产(B错)指难免流产继续发展,部分妊娠物排出宫腔,还有部分残留,影响子宫收缩,致大量出血,妇检见子宫小于停经周数。早孕合并卵巢囊肿(C错)主要表现为停经、早孕反应、乳房和生殖系统的变化,B超检查可见妊娠囊,与妊娠滋养细胞肿瘤相鉴别。

139. 答案:E

解析:继发于葡萄胎半年内的妊娠滋养细胞肿瘤的组织学诊断多数为侵蚀性葡萄胎,1年以上者多数为绒毛膜癌。妊娠滋养细胞肿瘤的治疗以化疗为主。

140. 答案:A

解析:骨盆漏斗韧带是连接卵巢和盆壁的韧带,保留附件的子宫切除不需要切断此韧带。

141. 答案:C

解析:子宫腺肌病药物宜选用:促性腺激素释放激素激动剂 GnRH-a。

142. 答案:A

解析:正常分娩,分娩过程中胎头已出,左肩露出,后产程延长,考虑肩难产。

143. 答案:A

解析:肩难产助产后,胎儿左手不能抬,可能的原因是臂丛神经损伤。

144. 答案:A

解析:广泛性焦虑障碍(GAD)简称广泛焦虑症,是以持续的显著紧张不安,伴有自主神经功能兴奋和过分警觉为特征的一种慢性焦虑障碍,是最常见的一种焦虑障碍。

145. 答案:A

解析:广泛性焦虑障碍治疗,可采用认知疗法。

146. 答案:A

解析:胎位 LOT 是指左枕横位,是胎头的一种姿势,胎头的枕骨在母亲骨盆的左侧,胎儿的面部在母亲骨盆的右侧,胎儿以侧屈的形式处于母亲的子宫中。

147. 答案:D

解析:左枕横位需逆时针旋转 45°才能正常娩出。

148. 答案:C

解析:《精神卫生法》规定,精神障碍患者在医疗机构内发生或者将要发生伤害自身、危害他人安全、扰乱医疗秩序的行为(连某患严重的躁狂抑郁障碍,因病情恶化,出现伤人毁物等行为),医疗机构及其医务人员在没有其他可替代措施的情况下,可以实施约束、隔离等保护性医疗措施(C对)。

149. 答案:D

解析:未告知其监护人,属于侵犯的患方权利是知情权。

150. 答案:A

解析:主动-被动型模式中,医患双方不是双向作用,而是医师对患者单向发生作用。这种模式适用于昏迷、休克、精神病患者发作期、严重智力低下者以及婴幼儿等一些难以表达主观

意志的患者。

第一单元

A1/A2 型选择题

001. 急性肾损伤后，患者出现肾小管原尿回漏的原因是

- A. 肾小球滤过率降低
- B. 肾间质水肿，挤压肾小管
- C. 输尿管梗阻
- D. 肾小管上皮细胞坏死、脱落
- E. 肾小管的水钠重吸收减弱

002. 人的最低层次的需要是

- A. 生存的需要
- B. 安全的需要
- C. 归属与爱的需要
- D. 尊重的需要
- E. 自我实现的需要

003. 分级诊疗正确的是

- A. 非急症患者不可急诊就诊
- B. 自下向上进行转诊
- C. 鼓励非急症患者到基层医院首诊
- D. 各级医院报销比例相等
- E. 患者可根据自己意愿就诊

004. 医务人员之间相互协作的基础是

- A. 尊重
- B. 竞争
- C. 平等
- D. 信任
- E. 独立

005. 支撑呼吸道的软骨是

- A. 甲状软骨
- B. 杓状软骨
- C. 环状软骨
- D. 麦状软骨
- E. 会厌软骨

006. 不属于慢性肺源性心脏病的心室改变的为

- A. 右心室壁前壁肺动脉圆锥膨隆
- B. 右心室壁肥厚增生
- C. 心尖圆钝
- D. 右心室腔扩张
- E. 右心室乳头肌和肉柱萎缩

007. ABO 血型，O 型血所含的的抗原是

- A. A 抗原
- B. H 抗原
- C. O 抗原
- D. B 抗原
- E. MHC 抗原

008. 提出“六不治”理念的是谁

- A. 扁鹊
- B. 张仲景
- C. 孙思邈
- D. 陈实功
- E. 苏耽

009. 吸烟是肺癌的危险因素，下列吸烟的相关因素中与肺癌关系不密切的是

- A. 烟草燃烧所产生的一氧化碳量
- B. 吸烟量
- C. 烟草中尼古丁含量
- D. 烟草中焦油含量
- E. 吸烟年数

010. 输液时须遵循三查七对原则，以下不属于七对的是

- A. 姓名
- B. 性别
- C. 剂量
- D. 药物
- E. 床号

011. 在一定 pH 条件下，分子在 SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳中，决定其迁移速度的主要因素是

- A. 分子形状
- B. 分子电荷

- C. 分子极性
- D. 分子量大小
- E. 分子溶解度大小

012. 患者男, 34 岁, 身高 180cm, 体重 72kg, 根据我国 BMI, 患者属于

- A. 正常
- B. 消瘦
- C. 超重
- D. 肥胖
- E. 轻度肥胖

013. 椎内静脉丛位于

- A. 硬膜下隙
- B. 椎体内
- C. 椎体旁
- D. 蛛网膜下隙
- E. 硬膜外隙

014. DNA 聚合链中最稳定的碱基对是

- A. A-G
- B. A-T
- C. G-C
- D. A-U
- E. C-U

015. 依据人们的实际健康状况与“理想健康状态”之间存在差距而提出的对预防、保健、医疗、康复等服务的客观要求是

- A. 卫生服务需要
- B. 卫生服务需求
- C. 卫生服务利用
- D. 卫生服务提供
- E. 卫生服务购买

016. 非处方药分为甲类、乙类的依据是

- A. 有效性
- B. 安全性
- C. 可及性
- D. 稳定性

E. 经济性

017. 胃壁细胞分泌 H^+ 的方式是

- A. 原发性转运
- B. 继发性转运
- C. 出胞作用
- D. 单纯扩散
- E. 易化扩散

018. 在生理性止血过程中, 血小板起到的主要作用

- A. 血小板粘附于创面上, 填补创面, 止血栓形成
- B. 血小板释放 5-HT 等缩血管物质, 引起血管收缩
- C. 释放 ADP 和 TXA₂, 引起血小板聚集
- D. 纤溶蛋白原转换成不溶性的纤溶蛋白, 加固止血栓形成
- E. 提供磷脂表面, 止血栓形成

019. 属于胸腺非依赖性抗原的是

- A. 血清白蛋白
- B. 卡介苗
- C. 脂多糖
- D. 类毒素
- E. 抗病毒血清

020. 未列入临时急性用血的原则是

- A. 危及病人生命急需输血
- B. 所在地血站无法及时提供血液, 且无法及时从其他机构调剂血液, 而其他医疗措施不能替代输血治疗
- C. 各抢救科室具备处理输血反应的能力和条件
- D. 临床机构批准
- E. 符合采血标准

021. 患者因食用大量腌制腊肉及咸菜后出现恶心、呕吐等消化系统症状, 查体: 口唇青紫色, 患者缺氧类型为

- A. 血液型缺氧

- B. 组织型缺氧
- C. 循环型缺氧
- D. 乏氧型缺氧
- E. 低张型缺氧

022. 对暗适应是在暗环境中

- A. 视觉感受性不断降低的过程
- B. 视觉感受性不断提高的过程
- C. 视觉感觉阈限不断提高的过程
- D. 视觉的差别阈限不断提高的过程
- E. 视觉对比度不断提高的过程

023. 医生于某医疗机构，参加抗菌药物合理使用培训并参加考核，合格后取得使用权，该医疗机构属于

- A. 一级医院
- B. 乡镇卫生院
- C. 社区卫生服务中心
- D. 二级医院
- E. 村卫生室

024. 根据《传染病防治法》要求，能增加或减少乙类传染病的机构是

- A. 当地政府部门
- B. 全国人大常委会
- C. 县级卫生部门
- D. 国务院卫生行政部门
- E. 疾病控制预防中心

025. 某地区发生群体性不明原因疾病时，应急管理措施不正确的是

- A. 分工合作，联防联控
- B. 及时上报
- C. 统一领导，统一响应
- D. 信息共享，及时沟通
- E. 控制与治疗并重

026. 肺通气/血流比值 >0.8 主要见于哪种疾病

- A. 肺血栓栓塞
- B. 肺气肿

- C. 哮喘
- D. 慢性支气管炎
- E. 肺水肿

027. 酶活性中心以外必需基团的功能是

- A. 结合多个底物分子
- B. 调控其他的酶活性
- C. 维持酶活性中心的空间结构
- D. 加快催化反应
- E. 生成肽键

028. 最容易引起淋巴结窦性组织细胞增生的疾病是

- A. 传染性单核细胞增多症
- B. 癌肿引流区的淋巴结
- C. 药物过敏反应
- D. 化脓性感染
- E. 病毒接种不良反应

029. 卵巢黏液性囊腺瘤的病理学特征是

- A. 单个囊腺泡，内上皮为单层扁平状上皮
- B. 内层为多层高柱状上皮
- C. 大小不一的囊腔，充满富含糖蛋白的粘稠液体
- D. 囊腔和间质可见多个砂粒体
- E. 可见明显异型性细胞

030. 下列属于正反馈调节的是

- A. 甲状腺素对促甲状腺素释放激素的调节
- B. 排卵前黄体生成素的释放
- C. 皮质醇对下丘脑的调控
- D. 肺牵张反射
- E. 降压反射

031. 下列哪项不直接影响细胞内氧化磷酸化的速率

- A. 呼吸链电子传递速度
- B. ATP 合酶活性
- C. ADP 水平

D. 细胞内解耦联

E. 蛋白激酶的作用

032. 医疗机构麻醉药品处方的最低保存年限是

A. 1 年

B. 2 年

C. 3 年

D. 4 年

E. 5 年

033. 良性前列腺增生的病理特点

A. 腺体、平滑肌、纤维均增生

B. 基质增生

C. 血管增生

D. 上皮细胞增生

E. 腺上皮化生

034. 伤寒的病理特征性表现

A. 侵入淋巴细胞

B. 感染性肉芽肿

C. 干酪样坏死

D. 淋巴细胞增多

E. 假膜的形成

035. 心理测评的参考指标

A. 作品

B. 信度

C. 效度

D. 误差

E. 常模

036. 属于髋关节囊内韧带的是

A. 髂股韧带

B. 股骨头韧带

C. 坐股韧带

D. 髌白横韧带

E. 耻骨韧带

037. 肾上腺素与受体结合后，细胞内发生什么变化

A. 核受体激活

B. cAMP 升高

C. cGMP 升高

D. 细胞内受体结合

E. IP₃ 降解

038. 启动肌肉收缩过程的是

A. 肌球蛋白

B. 原肌球蛋白

C. 钙调蛋白

D. 肌动蛋白

E. 肌钙蛋白

039. 公共卫生的核心功能是什么

A. 预防疾病、宣传健康、职业病管理

B. 环境保护，预防传染病，保障卫生服务

C. 发布医疗卫生有关信息，促进卫生经济调控

D. 对灾难作出应急反应，保证卫生服务的有效性和及时性

E. 防治传染病，职业病管理，母婴保健

040. 医学科研的灵魂和科研人员的良心是什么

A. 同情

B. 公正

C. 廉洁

D. 诚实

E. 勤奋

041. 基因工程中的“转”指的是

A. 目的基因的选择

B. DNA 转录为 RNA

C. 逆转录 RNA 的合成

D. 目的 DNA 转入受体细胞

E. 目的基因导入质粒

042. 肾母细胞瘤的组织学特征是

A. 角化

B. 胞质透明

- C. 梭状
- D. 形状, 大小不等
- E. 包括间叶组织的细胞, 上皮细胞, 和幼稚细胞

043. 关于临床预防的原则, 下列哪项正确?

- A. 以治疗疾病为导向
- B. 以收集临床资料为主
- C. 以健康体检为主
- D. 以健康咨询和健康促进为主
- E. 以医生的决策为导向

044. 重大疾病医疗保险范围涵盖

- A. 城镇居民医疗保险与城乡居民新农合
- B. 城镇居民医疗保险与城镇职工医保
- C. 所有大病居民
- D. 城镇职工医疗保险与城乡新农合
- E. 所有参保公民

045. 传染病防控中, 属于切断传播途径的是

- A. 隔离病人
- B. 医学隔离
- C. 治愈病人
- D. 注射疫苗
- E. 消毒

046. 临终关怀的范围

- A. 急诊患者
- B. 重症患者
- C. 晚期肿瘤患者
- D. 慢性病患者
- E. 危重症患者

047. 沙丁胺醇治疗支气管哮喘的机制

- A. 激动 β_1 受体
- B. 激动 β_2 受体
- C. 激动 β_1 、 β_2 受体
- D. 激动 α 受体
- E. 激动 α 、 β 受体

048. 高血压患者服用呋达帕胺和氨氯地平, 应注意检测

- A. 血常规
- B. 血钾
- C. 血肌酐
- D. 血丙氨酸转移酶
- E. 血 pH

049. 高胆固醇, 低密度脂蛋白偏高, 治疗选用

- A. 他汀类药物
- B. 贝特类
- C. 烟酸类
- D. 普罗布考
- E. 依折麦布

050. 判断代谢性酸中毒类型的指标是

- A. PH
- B. AB
- C. BE
- D. AG
- E. PCO₂

051. 下列符合卫生法的形式之一是

- A. 临床路径
- B. 临床实践指南
- C. 卫生法规
- D. 卫生标准
- E. 专家共识

052. 医学心理学包括的医学类型是

- A. 心理范围 文化范围 社会范围
- B. 心理范围 文化范围 病理范围
- C. 文化范围 社会范围 病理范围
- D. 心理范围 社会范围 医学范围
- E. 病理范围 文化范围 心理范围

053. 急性左心衰缓解肺水肿的措施

- A. 静脉注射吗啡
- B. 氨茶碱

2022 年临床执业历年真题

- C. 硝酸甘油
- D. 静脉注射呋塞米
- E. 应用洋地黄制剂

054. 美托洛尔降低心肌收缩力的机制

- A. $\alpha 1$ 受体激动剂
- B. $\beta 2$ 受体阻断剂
- C. M 受体激动剂
- D. $\beta 1$ 受体阻断剂
- E. $\alpha 2$ 受体激动剂

055. 普萘洛尔不能用于以下哪种疾病

- A. 高血压伴支气管哮喘
- B. 急性心肌梗死
- C. 心力衰竭
- D. 心绞痛
- E. 心律失常

056. P2 大于 A2, 可能见于那种疾病

- A. 肺栓塞
- B. 肺炎
- C. 肺结核
- D. 主动脉夹层
- E. 胸腔积液

057. 肢体浅感觉的 2 级神经元位于

- A. 脊神经节
- B. 内侧丘系
- C. 白质前联合
- D. 脊髓后角
- E. 薄束核

058. 不属于子宫内膜癌的病理

- A. 鳞癌
- B. 粘液性癌
- C. 透明细胞癌
- D. 腺癌
- E. 浆液性癌

059. 为评估急性淋巴细胞白血病患者用药的预后情况, 哪项不能作为观察结局

- A. 缓解
- B. 复发
- C. 车祸死亡
- D. 失访
- E. 自行出组

060. 对儿童进行乙肝型肝炎疫苗接种的临床试验研究, 为评价其流行病学预防效果, 最好选用的指标是

- A. 效果指数
- B. 发病率
- C. 感染率
- D. 死亡率
- E. 病死率

061. 破伤风抗毒素细胞来源

- A. 单克隆 B 细胞
- B. 单克隆 T 细胞
- C. NK 细胞
- D. 多克隆 B 细胞
- E. 多克隆 T 细胞

062. 下列哪项不是反应运动的相对强度的指标?

- A. 体重指数
- B. 运动中的主观运动强度
- C. 运动的代谢当量
- D. 运动的持续时间
- E. 运动的绝对强度

063. 三羧酸循环的关键酶

- A. 异柠檬酸脱氢酶
- B. 丙酮酸激酶
- C. 6-磷酸葡萄糖激酶
- D. 琥珀酸脱氢酶
- E. 苹果酸脱氢酶

064. 衣原体的繁殖形式是

- A. 内基小体
- B. 中介体
- C. 二十面体

- D. 原体
- E. 始体

065. 下列属于二级预防的是

- A. 体检
- B. 预防并发症
- C. 术后护理
- D. 术后康复锻炼
- E. 开展健康教育工作

066. 真核生物前体 mRNA 转录后的加工过程

- A. 乙酰化修饰
- B. 磷酸化修饰
- C. 高尔基体糖基化修饰
- D. 内含子剪切
- E. 在内质网折叠

067. 肉毒梭菌或肉毒毒素侵入人体的途径主要为

- A. 医源性感染
- B. 经被污染的空气吸入
- C. 经伤口入侵
- D. 节肢动物叮咬
- E. 污染的食物

068. 古希腊医师希波克拉底认为医学有两件东西可以治病，一是语言二是药物，希波克拉底说这句话时处于什么医学模式

- A. 生物医学模式
- B. 生物心理社会医学模式
- C. 自然哲学医学模式
- D. 神灵医学模式
- E. 机械医学模式

069. 食物特殊动力最高的

- A. 脂肪
- B. 蛋白质
- C. 糖类
- D. 维生素

E. 氨基酸

070. 心理治疗中，医生和患者的桥梁

- A. 互相信任
- B. 医疗技术
- C. 医生与患者的良好关系
- D. 医生的医疗水平
- E. 互相尊重

071. 若已知一份资料中，18 名成年女子分两组用两种测量肺活量的仪器测最大呼吸率(L/min)，比较两种方法检测结果有无差别，可进行

- A. 配对设计的 Z 检验
- B. 成组设计的 t 检验
- C. 配对设计的 t 检验
- D. 成组设计的 Z 检验
- E. q 检验

072. 某大学实行戒烟活动，开展戒烟班，规定吸烟者不可领奖学金，不得参与学生会，问这种行为属于什么

- A. 健康促进活动
- B. 行为相关活动
- C. 健康引导活动
- D. 健康咨询活动
- E. 卫生指导行为

073. 完全随机的样本分析中，样本总数 30，分为 3 组，每组的组内变异自由度是多少

- A. 2
- B. 3
- C. 29
- D. 27
- E. 26

074. 患者从卧位转为立位是，血压 80/60mmHg，心率 115 次/分，其机制为

- A. 主动脉神经传入冲动减少，心交感传出增强

- B. 主动脉神经传入冲动减少，心交感传出减少
- C. 窦神经传入冲动减少，心交感传出增强
- D. 窦神经传入冲动减少，心迷走传出增强
- E. 窦神经传入冲动增强，心迷走传出增强

075. 冬季，某居民在家用煤气热水器洗澡时晕倒，皮肤黏膜呈樱桃红色，引起该症状最可能的气体是

- A. CO
- B. CO₂
- C. NH₃
- D. SO₂
- E. NO

076. “入芝兰之室，久而不闻其香”说明的是

- A. 感觉适应
- B. 感觉减退
- C. 感觉相互作用
- D. 感觉过敏
- E. 疲劳

077. 食管癌发病危险因素的病例对照被研究时，为减少因研究对象回忆不准确而收集错误应使用以下哪种信息

- A. 现患病例
- B. 死亡病例
- C. 现存病例
- D. 住院病例
- E. 新发病例

078. 男，21岁，呕吐寒战高热1周，隔日发作一次。8月15日入院。1周前由云南回来，次日出现寒战、发热、头痛，体温时高时低，无定规律性，出汗多，近2天来发作过一次高热，伴头痛，持续4小时，热退后精神如常食欲

正常，体温39℃，血象：WBC 6.8×10^9 /L，中性粒细胞64%，淋巴细胞36%，RBC 3.2×10^{12} /L，Hb 105g/L。患者最可能的诊断是

- A. 疟疾
- B. 血吸虫
- C. 登革热
- D. 钩端螺旋体
- E. 艾滋病

079. 女，45岁，大学教授，因车祸导致颅脑损伤，智力测验显示其智商为85分。同时有一位从未接受过正规教育的老人测得智商也是85分。心理治疗师认为前者的智力出现了问题，而后者正常。这一判断的所遵循的原则是

- A. 中立性原则
- B. 保密性原则
- C. 标准化原则
- D. 客观性原则
- E. 综合性原则

080. 女，60岁，患丙肝多年，今日出现扑翼样震颤、昏迷症状，请问应该使用何种药物治疗

- A. 支链氨基酸
- B. 羟基化合物
- C. 芳香氨基酸
- D. 抗生素
- E. 碱性肥皂水灌肠

081. 男，61岁，胸闷乏力1月，血压150/83mmHg，颈动脉搏动，查体左室肥大，胸骨左缘第3肋间闻及递减型叹气样舒张期杂音，可触及水冲脉，股动脉枪击音和毛细血管搏动征。该患者主动脉瓣的病理变化最可能是

- A. 粘连
- B. 钙化
- C. 增厚
- D. 卷曲

E. 变硬

082. 男, 60 岁, 发现口角歪向右侧伴流涎 2 小时, 查体: 神志清楚, 言语不清, 左侧鼻唇沟消失, 闭眼而额纹存在。受累情况是

- A. 左侧面神经核受损
- B. 右侧面神经核受损
- C. 左侧面神经核上瘫
- D. 右侧面神经核上瘫
- E. 左侧面神经受损

083. 男, 55 岁, 上腹部胀痛不适 1 月, 加重伴高热呕吐 4 天。六年糖尿病史。发热就诊, 体温 39.5°C, 心率 110 次每分。无黄疸, 腹水。白细胞 $20 \times 10^9/L$, 中性粒细胞率 0.85。肝区叩击痛, 肝内 $4 \times 4.5 \times 6.5 \text{cm}$ 脓肿, 与胸膜腔相通。超声引导下穿刺, 培养革兰氏阴性杆菌, 吡啶试验和乳糖发酵试验阳性。考虑可能的感染是哪种

- A. 大肠埃希菌
- B. 痢疾杆菌
- C. 志贺氏菌
- D. 沙门菌属
- E. 脆弱拟杆菌

084. 男性 38 岁, 因骨折外伤入院, 血检 HIV 阳性, 主管医生查房时对其大声询问是否有冶游史, 患者感到愤怒, 在本案例中, 主管医生违背的医学伦理是

- A. 积极对传染病进行防治
- B. 尊重科学, 无私奉献
- C. 进行宣传教育
- D. 保密和隐私原则
- E. 对传染病进行上报和登记

085. 某心理咨询师开了一家心理咨询所, 聘请一位心理治疗师来进行兼职, 卫生部门得知后, 予以心理治疗师处罚, 请问处罚的理由是什么

- A. 未变更执业地点
- B. 擅自予以心理咨询
- C. 未征得原单位同意
- D. 未给予行政部门备案
- E. 注册地点之外的机构开展医疗活动

086. 患者, 男性, 54 岁, 慢性咳嗽、咳痰 10 年, 2 天前感冒后出现胸闷, 呼吸困难, 不能平卧, 查体体温 39°, 颈静脉怒张, 心前区可闻及 3/6 级收缩期吹风样杂音。肝颈静脉回流症(+), 双下肢凹陷性水肿, P2 亢进。造成水肿的机制不包括

- A. 抗利尿激素增多
- B. 醛固酮增多
- C. 肾小球滤过率下降
- D. 肾血流量减少
- E. 肾小球滤过分数减小

087. 男, 28 岁, 间歇性上腹痛 3 年, 饥饿时, 夜间易发作, 进餐后缓解。根据该病的发病机制, 影响该症状的主要因素是

- A. 胃酸
- B. 胃蛋白酶原
- C. 组胺
- D. 粘液
- E. 促胃液素

088. 高三男生, 18 岁, 因失恋、月考成绩下降情绪失落、伤心, 与同伴去看心理咨询师, 心理咨询师询问治疗病情后告诉了他的同伴患者病情, 同伴告诉了他的同班同学, 大家都知道了患者的病情议论纷纷, 造成患者的痛苦。该医生违反了什么原则

- A. 伦理
- B. 患者利益至上原则
- C. 尊重原则
- D. 保密原则
- E. 综合性原则

089. 男, 52 岁, 头部受伤, 诊断为硬膜下血肿海脑沟回疝, 建议手术, 患者自认为病情较轻, 拒绝手术并签字, 离院后果自负, 出院之后再次入院, 抢救无效死亡, 尸检报告显示颅内出血硬膜下血肿死亡, 在此次诊治中, 首诊医师的医学伦理原则冲突

- A. 尊重原则与公正原则
- B. 保护原则与有利原则
- C. 公正原则与有利原则
- D. 尊重原则与自保原则
- E. 有利原则与尊重原则

090. 女, 临床表现单侧乳腺肿块, 疑乳腺癌, 发生骨转移和肺转移, 需要做乳腺肿块活检, 行内分泌治疗, 哪项用以确定靶向治疗方案

- A. P25
- B. HER2
- C. ER
- D. Ki-67
- E. PR

091. 某地新生儿出生身高 55.1cm, 标准差 2.2, 6 岁儿童身高 119.5cm, 标准差 4.3, 比较离散趋势应用

- A. 标准差
- B. 变异系数
- C. 四分位数间距
- D. 极差
- E. 离均差平方和

092. 为了验证黄热病通过蚊虫叮咬传播, 研究组让叮咬过黄热病患者的蚊子叮咬两名研究组成员, 其中一名成员因感染黄热病死亡, 研究组继续招募劳工进行实验, 本案例中, 研究组违反了人的生物医学伦理中的

- A. 伦理审查
- B. 依法赔偿

- C. 免费赔偿
- D. 控制风险
- E. 特殊保护

093. 男, 38 岁, 某钢铁厂煤炉车间平车工, 工作期间头痛, 头晕, 面色潮红, 大量出汗, 脉搏加速, 38°C, 首要救助措施

- A. 按压人中
- B. 灌注清凉饮料
- C. 酒精擦浴
- D. 静脉注射氯丙嗪
- E. 脱离工作环境

094. 某校内一女学生感到最近心情低落, 表情淡漠, 有厌食自杀想法, 主动去找心理医生, 该医生给予的评估下列哪种最合适

- A. WISC
- B. EPQ
- C. MMPI
- D. 16-PF
- E. SDS

095. 患儿, 男, 1 岁, 既往肩难产史。头颈部左偏, 面向左侧, 颈向右侧, 导致该现象的肌肉是

- A. 前斜角肌
- B. 后斜角肌
- C. 胸锁乳突肌
- D. 颈阔肌
- E. 斜方肌

096. 6 岁男童, 进食蚕豆后出现恶心、乏力, 酱油色尿, 尿 RBC(-), 既往有蚕豆病病史, 发现葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏, 该酶缺乏主要导致什么物质生成减少

- A. NADPH
- B. ATP
- C. cAMP

D. NADP

E. FAD

097. 某孕妇，妊娠 26 周，患有高血压，今近日突发腹痛，阴道流血，查体：皮肤瘀斑，血小板 $60 \times 10^9/L$ ，无法凝血，请问机制不包括下列哪项

- A. 单核巨噬细胞吞噬
- B. 血小板大量损耗
- C. 纤维蛋白溶解产物增加
- D. 纤维蛋白原溶解增加
- E. 凝血因子消耗

098. 来工地调查传染病发病率，该工地三组人，每组人数 600 人，肠道传染病 20%，乙肝 10%，呼吸道传染病 2%，该工地传染病的患病率为

- A. 0.2
- B. 0.05
- C. 0.1
- D. 0.26
- E. 0.32

099. 研究生，晚自习后，因失恋，同时课题研究受阻，精神崩溃，生活的困扰情绪低落，有自杀念头，告知了自己的好朋友，此时应立即采取的措施是

- A. 电话心理咨询
- B. 门诊心理咨询
- C. 社会心理咨询
- D. 团体咨询
- E. 面对面心理咨询

100. 张某在接种某疫苗后发生残疾，经查该疫苗质量合格，接种过程符合规范，张某依法获得赔偿，赔偿他的机构是

- A. 省级医疗管理部门
- B. 为其接种的工作人员
- C. 为其接种的机构
- D. 疫苗上市许可持有人

E. 省级财政部门

101. 某乡 4 万人，约 1 万户，欲抽其 1/10 人口进行某病调查。随机抽取第 1 户，随后每隔 4 户抽取 1 户，抽到户的每个成员均进行调查。这种抽样方法称为

- A. 分层抽样
- B. 系统抽样
- C. 整群抽样
- D. 简单抽样
- E. 多级抽样

102. 女性患者，因腹痛，反酸来院就诊，胃镜检查提示：十二指肠前部溃疡，快速尿素酶实验阳性，关于该病的致病菌，下列说法正确的是

- A. 需联合药物治疗
- B. 革兰染色阳性
- C. 营养要求不高
- D. 厌氧菌
- E. 生化反应活跃

103. 男，35 岁，排尿烧灼样疼痛伴尿频 3 日，尿道口大量分泌物，晨起尿道口有脓痂。有不洁性生活史。查体尿道外口有大量脓性分泌物，龟头和阴茎红肿。该病原菌是

- A. 阴道毛滴虫
- B. 淋病奈瑟氏菌
- C. 白假丝酵母
- D. 梅毒螺旋体
- E. 人类支原体

104. 一单位发生食物中毒，部分职工吃过一家快餐，症状为面色潮红，胸痛，胸闷，心慌，恶心，呕吐。经询问，快餐内有“青皮红肉鱼”。请问中毒的原因为

- A. 氰苷
- B. 龙葵素

- C. 组胺
- D. 亚硝酸盐
- E. 组氨酸

105. 男, 51 岁, 父母双亡, 未婚, 发生车祸后送医就诊, 经抢救无效脑死亡, 其三个外甥与主治医生商量后决定捐献该患者心脏, 肾脏等器官, 下列说法正确的是

- A. 主治医生可自行摘取患者器官
- B. 脑死亡患者不能捐献器官
- C. 未婚患者不能捐献器官
- D. 外甥无权捐献该患者器官
- E. 器官捐献需经患者本人同意

106. 男性, 43 岁, 在工地从高处坠落昏迷, 工友送至附近医院抢救, 接诊医生全力抢救, 未及时书写病历, 抢救结束后, 接诊医生在规定时限之内据实补记病历, 请问该时限为

- A. 2 小时
- B. 4 小时
- C. 6 小时
- D. 8 小时
- E. 12 小时

107. 女婴, 8 个月, 发热, 烦躁 1 天, T 38.7℃, P 160 次/分, R 35 次/分, BP 80/62mmHg, 神差, 呼吸急促, 左肺底可闻及湿啰音, 心音低钝, 腹膨隆, 四肢皮温低, 可见大理石纹。WBC $19 \times 10^9/L$, N 0.85, X 线左下肺片状影, 请问休克类型是

- A. 心源性休克
- B. 感染性休克
- C. 神经源性休克
- D. 低血容量性休克
- E. 过敏性休克

108. 男童, 初中, 离异家庭, 住寄宿学校, 一上学就腹痛, 就医过程中症状缓

解, 查体无器质性改变, 该患者可能

- A. 精神性疾病
- B. 感染性疾病
- C. 神经性疾病
- D. 心身障碍
- E. 自身免疫性疾病

109. 男, 70 岁, 体检发现肝脏占位 1 周。既往 HbsAg 阳性 40 年, B 超发现。肝脏左叶占位, 直径 8cm, 有腹水, 血 AFP 明显增高, 肝活检增生细胞成片状, 血窦丰富, 细胞体积大, 胞浆丰富, 核大, 核仁明显, 核分裂象易见, 病理诊断

- A. 肝细胞腺瘤
- B. 肝细胞癌
- C. 胆管细胞癌
- D. 海绵状血管瘤
- E. 肝硬化

110. 男, 25 岁, 外伤输血治疗 1 小时, 出现寒战, 高热, 心悸, 气短, 酱油色尿, 尿隐血(+++), 尿红细胞(-), 发生上述临床症状的主要免疫学基础是

- A. 中性粒细胞吞噬导致红细胞破坏
- B. 补体激活导致红细胞溶解
- C. NK 细胞裂解红细胞
- D. CTL 细胞杀伤红细胞
- E. 巨噬细胞吞噬导致红细胞破坏

111. 男, 30 岁, 寒战, 高热, 咳铁锈色痰 3 天, 加重 1 天, 查体右下肺可闻及湿罗音, 痰培养: 肺炎链球菌(+), 影像学提示右肺下野大片致密阴影。右肺病灶处肺泡腔内的主要成分是

- A. 浆液和红细胞
- B. 中性粒细胞和纤维素
- C. 纤维素和红细胞
- D. 浆液和巨噬细胞
- E. 淋巴细胞和纤维素

112. 男, 20 岁, 在某社区卫生服务中心住院治疗几日, 因病情未好转, 要求转入上级医疗机构继续治疗, 在办理转院手续时, 患者以未得到有效治疗为由, 拒绝支付全部医疗费用, 仅同意支付药费和护理费, 下列对该案例的分析表述正确的是

- A. 以疗效支付是患者的正当权利
- B. 给付医疗费是患者应尽的义务
- C. 社区医院应减少患者部分费用
- D. 患者对服务不满意可拒绝支付
- E. 医院应当按患者经济水平收费

113. 女, 36 岁, 发作性喘息, 呼吸困难多年, 再发加重 1 小时, 既往氨茶碱可缓解, 查体: 精神萎靡, 体温 37.1°C, 脉搏: 128 次/分, R36 次/分, 鼻翼煽动, 双肺呼吸音粗, 可闻及广泛哮鸣音, 参与该病的物质有

- A. IL1
- B. IL2
- C. IL10
- D. IL4
- E. IL12

114. 某志愿者在社区宣传戒烟活动, 与陈某沟通, 陈某 34 岁, 吸烟 15 年, 每天 20 支, 他说认识戒烟的各种危害, 但是不觉得吸烟会对自己造成伤害, 根据“5R”法, 我们应该进一步选择什么

- A. 相关性
- B. 益处
- C. 反复
- D. 障碍
- E. 风险

115. 某社区为早期发现血吸虫患者, 对 600 名 5~65 岁的自然人群进行粪便收集, 采用一种简便、快速的方法进行检测, 对阳性人群再进行确诊检查, 这种方法是

- A. 筛检
- B. 研究
- C. 抽查
- D. 调查
- E. 确诊

116. 女性, 55 岁, 一小时前服用农药“乐果”, 半小时后出现腹痛, 恶心, 呕吐, 昏迷, 呼吸呕吐有大蒜味, 还有的表现为

- A. 骨骼肌震颤
- B. 瞳孔扩大
- C. 出汗减少
- D. 气道分泌物减少
- E. 唾液分泌减少

117. 男, 75 岁, 咳嗽、咳痰 1 月, 入院检查, 发现右肺门靠上一 5cm×4cm 大小肿物, 边界不清, 该肿物最可能压迫的部位是

- A. 副半奇静脉
- B. 右头臂静脉
- C. 右锁骨下静脉
- D. 半奇静脉
- E. 奇静脉

118. 女性, 33 岁, 外阴瘙痒, 刺痛伴灼热感 3 天, 发热 1 天, 停经 30 周 G1P0, 妇科检查: 外阴散在 10 余直径 0.2~0.5cm 疱疹, 部分破溃呈脓疱, 最可能感染病原体及潜伏部位

- A. HSV-1 骶神经节
- B. HSV-2 骶神经节
- C. VZV 脊髓后根神经节
- D. HSV-2 三叉神经节
- E. HSV-1 三叉神经节

119. 女, 30 岁, 发现怀孕后到县妇幼保健院做孕检, 接诊医生检查后发现该患者合并妊娠严重并发症, 现在首诊医生依法提供的医学行为是

- A. 基因治疗
- B. 终止妊娠
- C. 给出指导意见并完善相关检查
- D. 指导妊娠和胎儿保健
- E. 产前诊断

120. 某患者因职业伤害到医院进行职业病诊断，经过诊疗后该患者所患疾病被认定为职业病，该医疗机构为其出具了正规职业病诊断证明。请问谁有权在职业病诊断证明上签字？

- A. 医务科科长
- B. 该医院医务部负责人
- C. 科主任
- D. 该病人诊断医生且具有职业病诊断资格的人
- E. 该病人诊断医生及病人

121. 某研究员，研究某地 500 名八岁儿童的体重跟身高的关系，所用的统计图为

- A. 直方图
- B. 直条图
- C. 散点图
- D. 线图
- E. 圆图

122. 女，48 岁，在体检时发现 HBsAg 阳性，平时无不适，检查无异常，穿刺活检，肝细胞质不透明，可见肝内颗粒状小体，这种颗粒状小体被称为

- A. 毛玻璃样肝细胞
- B. 气球样变肝细胞
- C. 嗜酸性样肝细胞
- D. 嗜酸性小体
- E. 点状坏死肝细胞

123. 某男，20 岁，3 月 1 日，与正在发热的母亲进餐，3 月 3 日母亲被确诊为新冠肺炎患者，对男子采取的措施是

- A. 自我健康检测

- B. 给予口服预防药物
- C. 隔离治疗
- D. 隔离观察
- E. 注射丙种球蛋白

124. 男，65 岁，排尿延长、夜尿增多 2 年余，加重 3 月，排尿细碎、无力，盆腔 B 超：前列腺增大，突入膀胱。该病变的部位位于

- A. 前列腺周围带
- B. 前列腺移行区
- C. 射精管
- D. 尿道
- E. 纤维肌层

125. 男，56 岁。突发患者右上腹痛 1 天，曾有胆囊泥沙样结石，现影像学肝内外胆管未见明显异常，胆囊肿大明显，最可能的梗阻部位是

- A. 肝左管
- B. 肝右管
- C. 胆囊管
- D. 胆总管
- E. 肝总管

126. 男，28 岁，因间质性肾炎。需要进行肾脏移植，其兄自愿捐赠，体检后肾脏符合移植标准，但左肾功能较右肾功能稍差，其主治医师评估后将其左肾移植给患者，主治医师决策依据的原则是

- A. 自愿
- B. 患者健康至上
- C. 唯一性
- D. 保护供者
- E. 知情同意

127. 女，26 岁，妊娠 25 周，I 型糖尿病，孕检未检测血糖。现恶心呕吐昏迷， $\text{pH}7.18$ ， PaCO_2 20mmHg，导致患者酸中毒的原因

- A. 尿酸增加
- B. 乳酸增加
- C. 丙酮酸增加
- D. 酮体增加
- E. 转氨酶增加

128. 儿童，查体：毛发银白色，毛发稀疏，皮肤白，瞳孔色浅，请问该患儿缺乏哪种酶

- A. 组氨酸脱羧酶
- B. 半胱氨酸蛋白酶
- C. 色氨酸羟化酶
- D. 酪氨酸酶
- E. 苯丙氨酸羟化酶

129. 某化工厂因意外事故出现氮氧化合物泄漏，造成楼下居民咳嗽、胸闷、面色发红，治疗转运过程中，最应该预防居民出现的意外是

- A. 窒息
- B. 肺气肿
- C. 休克
- D. 急性中毒性肺水肿
- E. 相关题干与选项请同学们在评论区讨论补充

130. 婴儿，五月龄，足月顺产。近日来，夜间出汗，烦躁不安。体检发现枕秃。颅骨体检触及乒乓球触感，该婴儿最有可能缺乏的维生素是

- A. 维生素 A
- B. 铁
- C. 维生素 C
- D. 维生素 D
- E. 锌

131. 男性，36 岁，婚后 2 年无子，有性生活，未避孕。既往有睾丸外伤史，免疫学检查出精液抗精子抗体(+)。问抗精子抗体产生的机制是

- A. 抗原抗体交叉反应

- B. B 细胞克隆抗体
- C. 隐蔽性抗原释放
- D. 表位抗原扩展
- E. 自身抗原反应

132. 某医师欲开办诊所，在申请诊所程序的过程中租借李某医师诊所的《医疗机构职业许可证》，因雇佣的护士操作不当致使一名患者死亡，那么李某出借许可证的行为需要承担的法律

- A. 罚款
- B. 警告
- C. 吊销执业证
- D. 训诫
- E. 暂扣许可证

133. 男，28 岁。潜水后四肢肌肉及关节疼痛三天。三天前潜水时发现呼吸器故障。立刻快速上升出水。随即出现眩晕定向力障碍，恶心呕吐等症状，休息及吸氧后症状缓解，但持续性四肢肌肉痉挛、抽搐疼痛及关节痛。该患者疼痛的最可能原因是

- A. 慢性炎症细胞浸润
- B. 应激性溃疡
- C. 局部组织凝固性坏死
- D. 血液中二氧化碳浓度升高
- E. 血管腔内气泡栓塞

134. 工地工人，从 3 楼跌下，由 120 转上级医院治疗一路上脑海中不断浮现坠落时的情形并情绪激动不断大声描述，这种记忆属于

- A. 机械识记
- B. 有意识记
- C. 无意识记
- D. 逻辑识记
- E. 创伤性应激

135. 男性，15 岁，发现多饮，多尿，多食 1 月余，血压 130/80mmHg，尿糖

++++, 患者多尿的原因是

- A. 肾小管内液体渗透压增高
- B. 肾滤过率降低
- C. 抗利尿激素减少
- D. 醛固酮增多
- E. 抗利尿激素增多

136. 女, 42 岁, 孕 39+2 周, 患 I 型糖尿病 5 年, 宫高腹围及 B 超估算胎儿体重 4500 克, 巨大胎儿的原因为

- A. 高胰岛素促进蛋白和脂肪合成, 抑制脂肪分解
- B. 高胰岛素促进蛋白合成, 促脂肪分解
- C. 高胰岛素促进蛋白和脂肪合成, 促进脂肪分解
- D. 高胰岛素促进蛋白和脂肪合成, 促蛋白分解
- E. 高胰岛素促脂肪合成, 蛋白质分解

137. 女, 43 岁, 甲状腺肿大 30 年, 近 3 年自觉压迫气管, 2~3 度肿大, 行手术治疗, 术后病理显示大小结节, 细胞大小不一, 上皮扁平, 滤泡细胞内充满胶质, 最可能的诊断为

- A. 甲状腺乳头状癌
- B. 甲状腺滤泡性腺瘤
- C. 单纯性甲状腺肿
- D. 桥本氏甲状腺炎
- E. 甲状腺髓样癌

138. 爱因斯坦说“在我的思维结构中, 书面的或口头的文字似乎不起任何作用, 作为思维元素的心理的东西是一些记号和有一定明晰程度的意向, 由我随意的再生和组合”。这体现了思维种类是

- A. 发散思维
- B. 动作思维
- C. 形象思维
- D. 抽象思维
- E. 聚合思维

139. 患者男, 30 岁, 肾移植术后一年, 服用泼尼松和他克莫司治疗, 发热, 查 WBC $6.5 \times 10^9/L$, N $5 \times 10^9/L$, L $0.8 \times 10^9/L$, 巨细胞病毒 DNA 阳性。

患者容易被感染是因为

- A. 补体功能缺陷
- B. B 细胞被抑制
- C. 中性粒细胞亢进
- D. T 细胞被抑制
- E. 巨噬细胞被抑制

140. 男, 工地外伤, 多根多处肋骨骨折, 呼吸时可见胸廓反常呼吸运动, 现场急救最佳处理措施

- A. 厚敷料加压包扎
- B. 胸腔穿刺术
- C. 胸腔闭式引流术
- D. 胸廓固定
- E. 镇痛, 对症处理

141. 男, 70 岁。乏力、腰痛半个月。既往体健。查体: 轻度贫血貌, 第 2~4 腰部压痛。实验室检查 Hb $50g/L$, WBC $5.6 \times 10^9/L$, Plt $156 \times 10^9/L$ 。血清总蛋白 $108g/L$, 白蛋白 $30g/L$, 血肌酐 $187 \mu mol/L$ 。骨髓细胞学检查示骨髓中异常浆细胞占 0.45。腰椎 X 线片示第 2 腰椎压缩性骨折。为进一步明确诊断, 下一步最需要做的检查是

- A. 血清 $\beta 2$ 微球蛋白测定
- B. 尿本周蛋白测定
- C. 尿常规
- D. 血清钙测定
- E. 血清 M 蛋白及免疫球蛋白

A3/A4 型选择题

(142-1~142-2 题共用题干)

男, 25 岁, 过量饮酒后, 被同桌酒友送到医院, 在未支付医疗费的情况下, 匆忙离开医院, 医院无法联系到患者的

家人。此时，患者血压下降，面色苍白，皮肤湿冷，瞳孔散大。经首诊医师初步判断，为急性酒精中毒，经全力抢救后，患者已经转危为安了。

142-1. 需要遵循的急诊抢救原则是

- A. 分秒必争的抢救患者
- B. 满足心理需求
- C. 遵从社会公益
- D. 患者家属知情同意
- E. 团结协作

142-2. 此时的医疗模式是

- A. 共同参与型
- B. 主动-被动型
- C. 主动合作型
- D. 指导参与型
- E. 指导合作型

(144-1~144-3 题共用题干)

一高中女生 18 岁，因乳房刺痛来医院就诊，诊室内除了一个女医生外还有一个男医学生，当询问病情时女生犹豫不回答，女医生在让男医学生回避后再次耐心询问。

144-1. 女医生让男医学生回避后才对患者进行问诊和查体是实现了伦理学中的哪项原则

- A. 不伤害原则
- B. 尊重原则
- C. 有利原则
- D. 公正原则
- E. 保密原则

144-2. 一高中女生 18 岁，因乳房刺痛来医院就诊，诊室内除了一个女医生外还有一个男医学生，当询问病情时女生犹豫不回答，女医生在让男医学生回避后再次耐心询问，女医生在诊疗过程中体现了

- A. 体贴关心，充分尊重
- B. 过程耐心

- C. 心正无私，正确引导
- D. 全面系统，认真仔细
- E. 态度热情

144-3. 一高中女生 18 岁，因乳房刺痛来医院就诊，诊室内除了一个女医生外还有一个男医学生，当询问病情时女生犹豫不回答，女医生在让男医学生回避后再次耐心询问，女医生让患者实现的权利是

- A. 个人隐私权
- B. 人身自由权
- C. 知情同意权
- D. 平等就医权
- E. 自主决定权

(147-1~147-2 题共用题干)

为了解病毒性肝炎在某地区的分布情况，研究者于 2019 年 7 月进行抽样调查部分结果如下，共调查 10000，男 6000 人女 4000 人，发现患者 1000 人，女性 300 人(乙肝 200 例，丙肝 50 例，其他 50 例)，调查还发现在 600 例乙肝患者中有 300 例是 2019 年新发。

147-1. 该研究方法为

- A. 分析性
- B. 理论性研究
- C. 描述性研究
- D. 实验性研究
- E. 生态学研究

147-2. 该地区男性、女性乙肝患病率分别是

- A. 700/6000，200/10000
- B. 650/6000，无法计算
- C. 300/6000，300/1000
- D. 无法计算，200/4000
- E. 无法计算

B1 型选择题

(149-1~149-2 题共用备选答案)

2022 年临床执业历年真题

- A. 1 年
- B. 2 年
- C. 3 年
- D. 4 年
- E. 5 年

149-1. 医疗机构麻醉药品处方的最低保存年限是

149-2. 医疗机构第一类精神药品处方的保存年限是

第二单元

A1/A2 型选择题

001. 需要“严格管理”的传染病疾病是

- A. 鼠疫
- B. 霍乱
- C. 流行性腮腺炎
- D. 艾滋病
- E. 麻风

002. 蛋白质——能量营养不良症伴腹泻出现的临床表现中，不包括

- A. 低钾血症
- B. 低钙血症
- C. 碱中毒
- D. 低钠血症
- E. 脱水

003. 缺血性脑梗塞和出血性脑梗塞最重要的鉴别是

- A. 头疼
- B. 意识障碍
- C. 脑电图
- D. 安静时突发
- E. 颅脑 CT

004. 男，65 岁，3 月前有头部外伤史，现头痛，并逐渐出现左侧肢体无力，头颅 CT 示右顶枕新月形低密度影，最可

能的诊断是

- A. 硬膜下血肿
- B. 硬膜外血肿
- C. 脑出血
- D. 脑水肿
- E. 脑梗死

005. 与人争吵后突然倒地，首先判断

- A. 意识
- B. 呼吸
- C. 桡动脉搏动
- D. 血压
- E. 股动脉搏动

006. 再生障碍性贫血确诊的细胞学检查是

- A. 骨髓活检
- B. 骨髓细胞学检查
- C. 血常规
- D. 外周血涂片
- E. 脑脊液

007. 继发性顽固性高血压最常见于

- A. 老年人
- B. 遗传
- C. 动脉硬化
- D. 体位性高血压
- E. 肿瘤

008. 高血压合并慢性阻塞性肺疾病，血压需要控制在

- A. 140/90mmHg
- B. 150/90mmHg
- C. 130/80mmHg
- D. 140/80mmHg
- E. 130/90mmHg

009. 减轻梗阻性肥厚型心肌病的左心室流出道梗阻可以使用的药物是

- A. β 受体阻滞剂
- B. 硝酸甘油

- C. 地高辛
- D. 异丙肾上腺素
- E. 去甲肾上腺素

010. 踝关节稳定性差，易于发生损伤的体位是

- A. 跖屈位
- B. 背屈位
- C. 内翻位
- D. 外翻位
- E. 中立位

011. 髋关节前脱位最典型的临床表现是

- A. 伸直，外展，外旋畸形
- B. 屈曲，外旋，外展畸形
- C. 屈曲，内收，内旋畸形
- D. 伸直，外展，内收畸形
- E. 屈曲，内收，外旋畸形

012. 不符合肾小球源性血尿的是

- A. 可有红细胞管型
- B. 无痛
- C. 合并大量蛋白尿
- D. 变形红细胞为主
- E. 红细胞呈均一性

013. 氨茶碱舒张支气管平滑肌的作用机制是

- A. 阻断 M 受体
- B. 激动 β 受体
- C. 激动腺苷受体
- D. 抑制磷酸二酯酶
- E. 激活鸟苷酸环化酶

014. 下列符合梗阻性肥厚型心肌病的重要诊断是

- A. 一过性晕厥和黑朦不适
- B. 心电图提示左室高电压与 T 波倒置，有病理性 Q 波
- C. 感胸闷不适
- D. 超声心动图示舒张期室间隔与左室后

壁厚度之比 >1.5 ，二尖瓣前叶收缩期向前运动

E. 可闻及胸骨左缘 2~4 肋间舒张期杂音

015. 钩端螺旋体病哪一型肾衰是最主要的死亡原因

- A. 肾衰竭型
- B. 黄疸出血型
- C. 肺出血型
- D. 单纯型
- E. 脑膜脑炎型

016. 下列属于不完全性骨折的是

- A. 横形骨折
- B. 裂缝骨折
- C. 压缩性骨折
- D. 螺旋形骨折
- E. 嵌插骨折

017. 我国提倡的献血制度是

- A. 光荣献血制度
- B. 义务献血制度
- C. 强制献血制度
- D. 无偿献血制度
- E. 自愿献血制度

018. 患囊尾蚴病的原因是进食了

- A. 裂头蚴
- B. 猪带绦虫卵
- C. 猪带绦虫幼虫
- D. 牛带绦虫幼虫
- E. 牛带绦虫卵

019. 下列选项中，不属于肿瘤靶向药物控制的是

- A. 甲氨蝶呤
- B. 全反式维 A 酸
- C. HER-2
- D. 硼替佐米
- E. 利妥昔单抗

020. 烧伤后铜绿假单胞菌感染，抗生素治疗首选

- A. 红霉素
- B. 青霉素
- C. 美西律
- D. 甲氧苄啶
- E. 头孢他啶

021. 下尿路梗阻最严重的并发症是

- A. 尿路结石
- B. 尿路感染
- C. 尿路积水
- D. 肾衰竭
- E. 尿外渗

022. 下列选项中，不具有内分泌功能的细胞是

- A. 肾上腺髓质细胞
- B. 甲状旁腺主细胞
- C. 胰腺导管细胞
- D. 甲状腺滤泡上皮细胞
- E. 睾丸间质细胞

023. 感染性心内膜炎合并心衰最常损伤的部位是

- A. 室间隔内侧壁
- B. 二尖瓣
- C. 三尖瓣
- D. 肺动脉瓣
- E. 主动脉瓣

024. 关于运动系统慢性损伤，不正确的是

- A. 生理性或结构性异常，应力均匀
- B. 操作技术不熟练
- C. 长期慢性损伤
- D. 超越人体局部代偿
- E. 急性损伤后未得到正确的康复

025. 对于甲状腺破坏所导致的甲状腺毒症，下列实验室检查正确的是

- A. 甲状腺肿大
- B. 血 T₃、T₄ ↑，甲状腺摄 131I 率明显升高
- C. 血 T₃、T₄ ↑，甲状腺摄 131I 率明显降低
- D. TSH 明显降低
- E. TgAb 与 TPOAb 明显升高

026. 哪种疾病外周血中性粒细胞碱性磷酸酶积分常呈阴性结果

- A. 骨髓纤维化
- B. 细菌性肺炎
- C. 慢性髓系白血病
- D. 急性淋巴细胞白血病
- E. 类白血病反应

027. 成人心肺复苏的顺序是

- A. ABC
- B. ACB
- C. CAB
- D. CBA
- E. BAC

028. 诊断休克失代偿期必备的条件是

- A. 脉率 >90 次/分
- B. 收缩压 <90mmHg
- C. 脉压 <20mmHg
- D. 谵妄
- E. 四肢末梢皮肤湿冷

029. 以一级动力学消除的某药物，其半衰期为 8h，若按照恒定剂量每隔一个半衰期给药，达到稳态血药浓度所需的时间为

- A. 10 小时
- B. 20 小时
- C. 40 小时
- D. 50 小时
- E. 60 小时

030. 下列属于稳定型(劳力性)心绞痛症

状的是

- A. 开始运动时心前区疼痛，行走 5 分钟后缓解
- B. 搬重物感心前区针刺样疼痛，伴呼吸困难
- C. 骑自行车上坡时感心前区疼痛，休息 5 分钟自行缓解
- D. 夜间呼吸困难，坐位缓解
- E. 休息时，突发心前区针扎样刺痛，持续半小时左右，服用硝酸甘油后缓解

031. 高血压伴低血钾应首先考虑

- A. 皮质醇增多症
- B. 原发性醛固酮增多症
- C. 嗜铬细胞瘤
- D. 肾实质性高血压
- E. 肾动脉狭窄

032. 如何鉴别中枢性尿崩和肾性尿崩

- A. 查血浆浓度和尿渗透压
- B. 查尿渗透压和尿钠
- C. 禁饮水实验
- D. 加压素实验
- E. 测定尿渗透压和比重

033. 不稳定型心绞痛与急性非 ST 段抬高型心肌梗死的鉴别

- A. 超声心动图
- B. ST 段抬高
- C. 冠状动脉造影
- D. 持续时间
- E. 肌钙蛋白

034. 患者一氧化碳中毒，被人发现时处于昏迷状态，主要损伤的脏器为

- A. 胃肠
- B. 肝
- C. 肺
- D. 肾
- E. 脑

035. 最容易发生深静脉血栓的肾病类型是

- A. 系膜增生性肾病
- B. 膜性肾病
- C. 微小病变性肾病
- D. 膜增生性肾病
- E. 局灶节段性肾小球硬化

036. 男，74 岁，争吵中起病，血压 80/60mmHg，双肺湿啰音，咳泡沫痰，无双下肢水肿，患者最可能的诊断是

- A. 急性左心衰
- B. 急性右心衰
- C. 全心衰
- D. 慢性心衰
- E. 支气管扩张

037. 女，89 岁，坠落伤，T12 压缩 1/3~3/4，保守治疗一月未见好转，下一步治疗

- A. 前位椎体置换
- B. 经皮胸背段支架固定
- C. 经皮穿刺椎体成形术
- D. 切开复位钢钉固定
- E. 继续卧床制动

038. 男性，73 岁，多年高血压，糖尿病病史，主动脉瓣第二听诊区可闻及舒张期吹风样递减型杂音，瓣膜病应为

- A. 退行性
- B. 风湿性
- C. 先天性
- D. 感染性
- E. 自身免疫性

039. 患者因胸痛来院就诊，既往有上感史，心电图检查提示：除 aVR 外，多导联 ST 段弓背向下型抬高。听诊：心前区摩擦音，抓刮样粗糙音，最可能的诊断为

- A. 感染性心内膜炎

- B. 急性心梗
- C. 急性心包炎
- D. 主动脉夹层
- E. 心肌梗死后综合征

040. 8 岁儿童受伤后右手掌着地，右肘部肿胀，肘后三角正常，骨皮质不连续，右手指皮肤苍白发凉，损伤的部位是

- A. 正中神经损伤
- B. 缺血性肌挛缩
- C. 肱动脉损伤
- D. 骨筋膜室综合征
- E. 桡神经损伤

041. 男性，62 岁，尿频尿急尿痛，伴尿道内不适 1 年余，近日晨起排尿终末可见尿道口滴白，会阴部胀痛，下腹按压痛、无反跳痛。患者最可能的诊断为

- A. 慢性前列腺炎
- B. 泌尿系结核
- C. 膀胱炎
- D. 肾癌
- E. 膀胱结石

042. 男，50 岁。出现冻结肩，活动受限，以下处理哪一个是错的

- A. 理疗
- B. 肩关节固定
- C. 热敷
- D. 消炎
- E. 锻炼

043. 男，41 岁，高热一个月，肝区疼痛半年。超声检查发现肝区多发小结节，大小 1~2cm。血常规 WBC $13.4 \times 10^9/L$ ，N 0.83，肝穿刺见黄白相间条索状物，可见脓细胞和脓球，质软。该患者可能的诊断是

- A. 慢性肝炎导致肝硬化
- B. 肝脓肿

- C. 亚急性重症肝炎
- D. 肝细胞癌
- E. 肝胆管细胞癌

044. 男，56 岁，突发胸闷心悸 3 小时，血压 80/50mmHg，心率 200 次/min，查体：心律齐，四肢湿冷，心电图示宽大 QRS 波，心动过速，需立即进行的处理是

- A. 静脉注射胺碘酮
- B. 静脉注射利多卡因
- C. 静脉注射西地兰
- D. 静脉注射维拉帕米
- E. 同步直流电复律

045. 患者急性阑尾炎手术，医生术后发现手上有伤口，患者血化验示抗 HIV(+)，请问医生需要处理的是

- A. 抗生素治疗
- B. 免疫球蛋白治疗
- C. 抗病毒药治疗
- D. 输液
- E. 观察

046. 男，45 岁，2 天前饮用啤酒后出现右足疼痛，第一跖趾关节红、肿、热、痛，功能受限，触痛明显。既往痛风、高脂血症，肾功能不全，入院后见局部发红，查尿酸 624 $\mu\text{mol/L}$ ，当前应予以的治疗是

- A. 复方倍他米松注射液
- B. 秋水仙碱
- C. 甲氨蝶呤
- D. 苯溴马隆
- E. 非布司他

047. 男，35 岁，右下肢疼痛 1 年，抬高右下肢 75°，一分钟后下肢皮肤苍白，再让其下肢垂于床沿，大约 1 分钟后，下肢皮肤颜色恢复正常。该检查结果示

- A. Buerger 实验阳性
- B. TrendenBurg 实验阳性
- C. Lasegue 实验阳性
- D. Perthes 实验阳性
- E. Pratt 实验阳性

048. 中年男性，口唇疱疹，发热，头痛，神经系统症状，脑脊液检查提示淋巴细胞升高，蛋白轻度升高，糖含量正。考虑诊断为

- A. 结核性脑膜炎
- B. 单纯疱疹病毒性脑炎
- C. 化脓性脑膜炎
- D. 中毒性脑膜炎
- E. 乙型脑炎

049. 男性，75 岁，左侧腹股沟肿块 3 天，绞痛 2 天，查体左侧腹股沟可触及包块，呈半球形，按压可还纳，后又复出，诊断是

- A. 腹股沟斜疝
- B. 股疝
- C. 腹股沟直疝
- D. 切口疝
- E. 脂肪瘤

050. 男性，31 岁，一周前上呼吸道感染，受凉后出现低热，胸段脊椎痛，胸段下瘫痪，最可能的诊断是

- A. 急性脊髓炎
- B. 脊髓压迫症
- C. 周期性瘫痪
- D. 重症肌无力
- E. 放射性脊髓病

051. 男，40 岁，突发心脏骤停，经心肺复苏后，呼吸逐渐恢复，血压 85/60mmhg，有休克，心率 34 次/分，首选治疗用药为

- A. 肾上腺素
- B. 去甲肾上腺素

- C. 异丙肾上腺素
- D. 多巴胺
- E. 阿托品

052. 男，35 岁，风湿性心脏病及感染性心内膜炎病史五年，无发热，无活动下胸闷、夜间阵发性呼吸困难、上下肢水肿。患者近期需要拔牙，应该进行的处置是

- A. 无需用药，择期手术
- B. 术前抗风湿治疗三个月
- C. 术前三个月行瓣膜置换手术
- D. 术前口服阿莫西林
- E. 术前加强强心、利尿、扩血管治疗

053. 患者男，45 岁，腰椎挫伤后出现排尿困难 10 年。加重伴排尿中断，间断血尿 1 年。中断症状在改变体位后可继续排尿，首选的治疗措施是

- A. 经尿道膀胱肿瘤内切术
- B. 经尿道前列腺切除术
- C. 经尿道膀胱结石碎石术
- D. 抗结核治疗
- E. 经尿道腺性膀胱炎电切术

054. 男，65 岁，发现高血压数年，最高血压 190/100mmHg，平日血压可控制在收缩压 150~160mmHg，舒张压 90~100mmHg，平时吸烟喝酒，血脂高，有糖尿病史 20 年，应为高血压几级

- A. 高血压 2 级，很高危
- B. 高血压 3 级，很高危
- C. 高血压 1 级，很高危
- D. 高血压 2 级
- E. 高血压

055. 男，20 岁，腹泻 1 天，呈水样便，无腹痛、无里急后重，心率 110 次/分，血压 85/45mmHg，其他检查正常，此时的处理为

- A. 口服补液

- B. 快速静脉补液
- C. 糖皮质激素治疗
- D. 缓慢静脉补液治疗
- E. 观察

056. 男孩 4 岁，1 小时摔倒后右肩部疼痛，查体头向右侧偏斜，右肩下沉，右侧上肢活动障碍，皮肤出现淤血，Dugas 征阴性。最可能诊断是

- A. 锁骨骨折
- B. 正中神经损伤
- C. 桡骨头半脱位
- D. 肘关节脱位
- E. 肩关节脱位

057. 八岁男孩，干骺端可见一个骨性突起，表面光滑，无骨膜反应。最可能的诊断为

- A. 骨肉瘤
- B. 骨巨细胞瘤
- C. 骨软骨瘤
- D. 骨囊肿
- E. 骨软骨肉瘤

058. 女，40 岁，反复膀胱刺激征伴低热 1 年，尿常规 PH5.5，蛋白微量，WBC 20~30，RBC 20~30，血沉增高，CT 示双肾斑片状钙化，最可能诊断。

- A. 肾肿瘤
- B. 肾结核
- C. 肾结石合并感染
- D. 输尿管结石
- E. 尿路感染

059. 男，47 岁，尿频尿急伴发热 1 年，再发 4 天，既往肾结石病史 4 年，查体体温 39.7℃，右肾区叩击痛，尿常规比重 1.008，WBC++，RBC 阴性，CT 示双肾颗粒固缩，下列治疗不恰当的是

- A. 多饮水，优质蛋白饮食>40g
- B. 根据肾小球滤过率调整抗生素

- C. 联合应用 3 种抗生素
- D. 抗生素应足量足疗程
- E. 抗生素延长使用 2 周~4 周

060. 男，12 岁，外出玩耍时摔伤膝盖，当晚出现寒战、高热，短暂谵妄，查体：T 38.7℃，左膝局部肿胀、疼痛明显、浮髌试验阳性。实验室检查：血 WBC $14.0 \times 10^7/L$ ，N 0.85，ESR 80mm/h，X 线检查未见明显异常。该患者最可能的诊断为

- A. 急性化脓性关节炎
- B. 软骨肉瘤
- C. 膝关节结核
- D. 急性骨髓炎
- E. 类风湿关节炎

061. 男，66 岁，双手震颤，行动迟缓一年，查体，面具脸，静止时手有搓丸样震颤，手臂齿轮样强直，迈步前动作迟缓，能改善其症状的药物作用机制是升高脑内

- A. 多巴胺水平
- B. 去甲肾上腺素水平
- C. GABA 水平
- D. 乙酰胆碱水平
- E. 5-HT 水平

062. 男性，62 岁，持续胸痛 4 小时。心电图：II、III、aVF 导联弓背向上抬高。查体：心率 35 次/分，血压 60~90mmHg，心律齐。该患者出现心跳过缓的原因为

- A. 三度房室传导阻滞
- B. 右束支传导阻滞
- C. 二度一型传导阻滞
- D. 房颤
- E. 左束支传导阻滞

063. 男性 40 岁，反复肾结石 4 年，最近肾区疼痛，全骨疼痛，口渴，夜尿增

多，体温 36.5℃，心率 80，呼吸 18 次/分，血压 120/80mmHg，肺部听诊清，最有意义的检查

- A. TSH
- B. PTH
- C. ACTH
- D. GH
- E. FSH

064. 女，35 岁，头晕 3 年，夜尿增多 1 年，查体，T36.5℃，P80 次/分，R18 次/分，BP170/100mmhg，BMI 22kg/m²。体格检查正常，血钾 2.8mmol/L，最有助于诊断的实验室检查是

- A. 血浆肾素，醛固酮
- B. 生长激素
- C. 甲状腺激素
- D. 血浆 ACTH，皮质醇
- E. 血浆儿茶酚胺

065. 男，25 岁，1 小时前重物砸伤右前臂，诊断为尺桡骨双骨折，手法复位管型石膏固定术后 X 线复位满意，此后疼痛不能缓解且持续加重，查石膏牢固，右手部皮肤感觉减退，手指主动活动受限，被动牵拉疼痛加重，首先应给予处理措施

- A. 应用消肿止痛药
- B. 立即松绑石膏观察
- C. 抬高患肢促进血液回流
- D. 切开减张术
- E. 继续观察

066. 男性，56 岁，下肢水肿 1 年，查体，PT11s，APTT56s，体内缺乏的凝血因子为

- A. FVII
- B. FV
- C. FX
- D. FVIII
- E. FII

067. 男，75 岁，尿流变细排尿困难 2 年，尿失禁半年，超声前列腺增生，膀胱余尿 500 毫升，患者尿失禁的类型是

- A. 急迫性尿失禁
- B. 充溢性尿失禁
- C. 真性尿失禁
- D. 混合性尿失禁
- E. 压力性尿失禁

068. 男，40 岁，突发心脏骤停，经心肺复苏后血压 85/55mmHg，心率 34 次/分，应首选什么药物

- A. 利多卡因
- B. 胺碘酮
- C. 阿托品
- D. 西地兰
- E. 多巴酚丁胺

069. 男，72 岁，1 小时前睡眠时突发胸痛呼吸困难，伴出汗。救护车到后心电图检查 II、III、avf 导联 ST 段弓背向上抬高 0.3mv。查体体温 36.5℃，心率正常，血压 115/75mmHg，去往医院途中症状缓解。复测心电图 II、III、avf 导联 ST 恢复到等电位线。入院后反复复查肌钙蛋白正常。考虑诊断为

- A. 变异型心绞痛
- B. 急性下壁心肌梗死
- C. 急性心包炎
- D. 劳力性心绞痛
- E. 不稳定型心绞痛

070. 男，26 岁，水肿少尿一周。一月前上呼吸道感染史。查体：BP150/90mmHg，尿蛋白(++)，RBC100~150/HP，血 Hb:100g/L，血肌酐 456，B 超双肾体积增大，最可能的病理

- A. 膜性肾病
- B. 膜增生性肾小球肾炎

- C. 局灶节段性肾小球肾炎
- D. 系膜增生性肾小球肾炎
- E. 新月体性肾小球肾炎

071. 女, 20 岁, 眼睑水肿 3 个月, 尿常规 RBC20~30/HP, 尿蛋白(++), 尿相差显微镜: 可见棘球红细胞, 血肌酐 60 μ mol/L, 考虑疾病为

- A. 肾小管疾病
- B. 肾小球疾病
- C. 肾静脉疾病
- D. 肾动脉疾病
- E. 肾间质疾病

072. 男, 45 岁, 血压 80/70mmHg, 突发胸痛, 心电图 V1~V3 导联 ST 段向上抬高 0.3~0.5mv, 该患者诊断为

- A. 急性前壁心肌梗塞
- B. 急性下壁心肌梗死
- C. 急性后壁心肌梗死
- D. 急性前间壁心肌梗塞
- E. 急性侧壁心肌梗塞

073. 女, 40 岁, 心悸, 多汗, 消瘦 2 年, 症状加重伴咽痛发热 1 周, 恶心、呕吐、腹泻 1 天。查体: T39.8 $^{\circ}$, 大汗淋漓, 甲状腺弥漫性 II 度肿大, 可闻及血管杂音。对于该患者, 以下治疗方法不正确的是

- A. 抗甲状腺药物
- B. 碘剂
- C. 阿司匹林降温
- D. 抗生素
- E. 糖皮质激素

074. 患儿, 男, 12 岁, 踢足球摔伤左膝盖, 左膝盖疼痛, 浮髌实验(+), 抽屉实验(-), Lachman 实验(+), McMurray 实验(-), 该患者损伤的韧带为

- A. 内侧副韧带损伤

- B. 外侧副韧带损伤
- C. 髌骨骨折
- D. 交叉韧带损伤
- E. 半月板损伤

075. 女性, 20 岁。发热乏力两周, 既往月经增多 2 年, 入院后查血常规: RBC 2.6×10^{12} /L, WBC 1.8×10^9 /L, PLT 25×10^9 /L, ret 0.004, Hb 80g/L, MCV70, 该患者不可能出现的症状是

- A. 皮肤干燥
- B. 共济失调和行动不稳
- C. 烦躁易怒
- D. 异食癖
- E. 口腔炎

076. 11 岁小孩无诱因出现右膝关节肿胀疼痛不能动, 主动被动运动均受限, 浮髌试验阳性, 关节腔内分层抽出浑浊液体送检培养, 最可能是哪种细菌

- A. 结核杆菌
- B. 乙型脑炎病毒
- C. 金黄色葡萄球菌
- D. 大肠杆菌
- E. 溶血性链球菌

077. 老年人心梗冠脉支架术, 当时造影满意, 术后 1 月出现反复低热, 胸痛、伴心前区摩擦音, 抓刮样粗糙音, 最可能的诊断

- A. 心力衰竭
- B. 胸膜炎
- C. 心脏破裂
- D. 心肌梗死后综合征
- E. 结核性心包炎

078. 男, 4 岁, 右侧阴囊肿大, 软, 透光实验阳性, 平卧后可消失。最可能的诊断是

- A. 附睾囊肿
- B. 附睾结核

- C. 交通性鞘膜积液
- D. 睾丸鞘膜积液
- E. 睾丸肿瘤

079. 女, 32 岁, 恶心, 头晕, 呕吐, 脑膜刺激征阳性, T 38.9℃, HIV 抗体阳性, WBC $15 \times 10^9/L$ 。脑脊液细胞数 $200 \sim 300 \times 10^6$, 墨汁染色(+). 患者的治疗应为

- A. 伊曲康唑
- B. 氟康唑
- C. 恩替卡韦
- D. 卡泊芬净
- E. 制霉菌素

080. 男, 56, 右侧颈部淋巴结肿大 3 月, 发热 1 月。T 38.8℃, 双侧腹股沟淋巴结肿大, 颈部淋巴结活检提示弥漫大 B 细胞淋巴瘤。该患者的临床分期为

- A. II 期 B
- B. III 期 B
- C. III 期 A
- D. II 期 A
- E. IV 期 A

081. 男性, 75 岁, 腹胀、消瘦 2 个月。查体: 全身浅表淋巴结未触及, 脾肋缘下 5cm, 质硬, 实验室检查: Hb 110g/L, WBC $55.7 \times 10^9/L$, Plt $443 \times 10^9/L$, 染色体 t(9; 22)(q34; q11), 最可能的诊断是

- A. 骨髓纤维化
- B. 急性髓性白血病
- C. 慢性髓性白血病
- D. 慢性淋巴细胞白血病
- E. 急性淋巴细胞白血病

082. 男, 70 岁。乏力、腰痛半个月。既往体健。查体: 轻度贫血貌, 第 2~4 腰部压痛。实验室检查: Hb 50g/L, WBC $5.6 \times 10^9/L$, Plt $156 \times 10^9/L$ 。血

清总蛋白 108g/L, 白蛋白 30g/L, 血肌酐 $187 \mu mol/L$ 。骨髓细胞学检查示骨髓中异常浆细胞占 0.45。腰椎 X 线片示第 2 腰椎压缩性骨折。为进一步明确诊断, 下一步最需要做的检查是

- A. 血清 $\beta 2$ 微球蛋白测定
- B. 尿本周蛋白测定
- C. 尿常规
- D. 血清钙测定
- E. 血清 M 蛋白及免疫球蛋白

083. 男, 82 岁, 阵发心悸两年, 再发一小时, P108 次/分, 心率不齐, S1 强弱不等, 无明显杂音, 心电图无 P 波代之以 f 波, 心室率 150 次/分, R-R 不等, 应诊断为

- A. 房性心动过速
- B. 阵发性室上性心动过速
- C. 房颤
- D. 房扑
- E. 室速

084. 女性, 74 岁, 阵发性胸痛 2 天, 加重 7 小时, 既往高血压 10 年, 血清肌钙蛋白(+), 心电图 II、III、avF, V7~V9ST 段抬高 0.1~0.2mv, 改善左心室重构需用

- A. 阿司匹林
- B. 培哚普利
- C. 辛伐他汀
- D. 硝酸异山梨酯
- E. 硝普钠

085. 男, 50 岁, 头晕、乏力 6 个月, 贫血貌, 查体: 肝脾无肿大, 血常规结果提示大细胞性贫血, Hb 87g/L, 血小板 $89 \times 10^9/L$, ret 0.02, 幼稚粒细胞 0.02, 该患者下列哪项检查结果最不可能出现异常

- A. 红细胞膜 CD55、CD59 表达低下
- B. 叶酸、维生素 B₁₂ 可正常

- C. 骨髓病理是大片网状纤维增生
- D. 骨髓造血功能低下，巨核细胞明显减少
- E. 骨髓红系粒系巨核系病态造血

086. 女，50岁，两小时前擦窗户从窗台坠落，会阴部皮肤感觉缺失，不能自主排便，双下肢感觉及运动正常，MRI示T12椎体爆裂骨折骨折，将突入椎管压迫脊髓，对其神经损伤诊断正确的是

- A. 前脊髓综合征
- B. 后脊髓综合征
- C. 胸段脊髓震荡
- D. 脊髓圆锥损伤
- E. 马尾神经损伤

087. 男，16岁，发热，腹泻伴腹痛1周，T39℃，腹泻3~4次/天。查体脾肋下3cm，移动性浊音(-)，血WBC $20 \times 10^9/L$ ，E 0.2，ALT 98U/L，粪便见虫卵，根据流行病学表述，下列不正确的是

- A. 家畜是重要的传染源
- B. 感染后获得持久性免疫
- C. 多发生在湖泽区
- D. 钉螺为唯一的中间宿主
- E. 接触疫水可感染

088. 男，24岁，一小时前工作中右小腿被机器割伤，伤口无活动性出血，右小腿及右足血运正常，右侧足背前内侧感觉障碍，最可能损伤的神经是

- A. 股神经
- B. 胫神经
- C. 腓肠神经
- D. 腓总神经
- E. 隐神经

089. 男19岁，头痛恶心呕吐，双下肢痉挛半小时，半小时前烈日下负重跑5km，查体 T38.6℃，P119/分，

BP105/68mmHg，神志清楚，颈软，全身皮肤潮湿，四肢肌张力高，最可能是

- A. 热射病
- B. 横纹肌溶解
- C. 热痉挛
- D. 蛛网膜下腔出血
- E. 热衰竭

090. 男，23岁，发热一周，右下肢疼痛，查体心肺及腹部无异常，体温36.5℃，右下肢腓肠肌肿胀，皮肤青紫，皮温正常。实验室检查PT12s(正常11~13s)，Aptt64s(正常16~40s)。该患者最可能缺乏哪个凝血因子

- A. II
- B. V
- C. VII
- D. VIII
- E. X

091. 男，20岁，发热2天，加重7h，查体血压150/100mmhg，尿常规尿蛋白(+++)，红细胞满视野。肾脏活检免疫荧光见以IgA为主的颗粒状沉积于系膜区及毛细血管袢。以下选项中与预后无关的是

- A. 高血压
- B. 蛋白尿
- C. 镜下血尿
- D. 病理活检
- E. 血肌酐

092. 女性，46岁，乏力纳差，一直素食，血液检查:Hb 74g/L，MCV 124fl，MCHC 34g/L。最可能的诊断是

- A. 巨幼细胞性贫血
- B. 再生障碍性贫血
- C. 缺铁性贫血
- D. 海洋性贫血
- E. 急性白血病

093. 男性，19 岁，肉眼血尿伴尿量减少一天，2 周前有上呼吸道感染史，查体血压 160/90mmHg，眼睑及双下肢水肿，尿常规：尿蛋白(++)，RBC 10~15/HP，WBC 5~10×10⁹/L，血常规 C3 降低。最可能的诊断是

- A. 急性肾小球肾炎
- B. 急进性肾小球肾炎
- C. 膜增生性肾小球肾炎
- D. 微小病变型肾病
- E. 肾病综合征

094. SLE 患者，服用激素，查体发现左股骨头变平，软骨下塌陷，关节间隙变窄，问病变分期

- A. I
- B. II
- C. III
- D. IV
- E. V

095. 男性，13 岁，左大腿下端疼痛，皮肤表面静脉怒张，皮温较对侧增高。X 线片见左股骨下端骨质密度减低，边界不清，伴有骨膜放射样改变。最可能的诊断是

- A. 骨软骨瘤
- B. 骨肉瘤
- C. 骨囊肿
- D. 急性骨髓炎
- E. 骨结核

096. 男，60 岁，间断胸前区压榨感及咽部不适，常试步行 200 米后，需停下休息 5 分钟，平板实验阳性。诊断为

- A. 变异型心绞痛
- B. 稳定型心绞痛
- C. 初发型心绞痛
- D. 不稳定性心绞痛
- E. 心肌梗死

097. 男，60 岁，排尿等待，尿线变细，尿频 6 个月，夜尿 2~3 次，无尿痛，尿常规正常，血清总 PSA1.7ng/ml，B 超提示前列腺体积增大，膀胱剩余尿 100ml，以下治疗能够马上缓解急性症状的是

- A. 口服 5α 还原酶抑制剂
- B. 经尿道前列腺切除
- C. 耻骨上前列腺切除
- D. 抗感染治疗
- E. 口服 α 受体拮抗剂

098. 女，32 岁，发现血脂升高 3 年，其父亲和哥哥均患有高胆固醇血症，查体双侧内眦黄色瘤，实验室检查血清胆固醇 7.5mmol/l，血清甘油三酯 1.7mmol/l，血清低密度脂蛋白胆固醇 5.1mmol/l。以下诊断正确的是

- A. 继发性高甘油三酯血症
- B. 原发性混合型高脂血症
- C. 继发性高胆固醇血症
- D. 家族性高甘油三酯血症
- E. 家族性高胆固醇血症

099. 男，42 岁，劳累性胸闷，心悸 1 年，晕厥一次，既往无高血压病史和糖尿病病史，有类似家族史，查体血压 120/80mmhg，心率 80 次/分，胸骨左缘三四肋间可闻及 4/6 级收缩期喷射样杂音，心尖部听诊区可闻及 3/6 级收缩期杂音。以下诊断正确的是

- A. 梗阻性肥厚型心肌病
- B. 扩张型心肌病
- C. 风湿性心脏瓣膜病
- D. 冠状动脉粥样硬化性心脏病
- E. 室间隔缺损

A3/A4 型选择题

(100-1~100-2 题共用题干)

患者肾衰竭五期，定期行透析治疗，每周 3 次，末次透析时间为 2 天前，出现

2022 年临床执业历年真题

胸闷不适四肢乏力伴口周发麻 2 天，心率 43 次/分。近两日进食橘子约 1kg。

100-1. 出现上述症状原因是

- A. 高钾血症
- B. 代谢性酸中毒
- C. 高磷血症
- D. 低钙血症
- E. 高钙血症

100-2. 最有效的治疗方式为

- A. 血液透析
- B. 阳离子交换树脂
- C. 注射钙剂
- D. 大量激素
- E. 利尿剂

(102-1~102-2 题共用题干)

男性，71 岁，不慎从楼梯摔下来，摔伤右髌部，既往全身情况良好。查体：右下肢短缩 3cm、外旋 85° 畸形，下肢轴向叩击痛阳性。

102-1. 该患者的骨折部位是

- A. 股骨远端
- B. 股骨颈
- C. 股骨干
- D. 股骨转子间
- E. 右髌

102-2. 最特异性体征是

- A. 有压痛
- B. 外旋 85°
- C. 右下肢短缩
- D. 叩击痛
- E. 红肿

(104-1~104-3 题共用题干)

男，20 岁。1 型糖尿病病史 10 年，平时每日 4 次胰岛素强化治疗。近 2 日发热，咽痛，食欲不振，进食少，自行停用胰岛素。晨起家属发现患者不能正确回答问题，急诊就诊，查体：T

38.5℃，精神差，轻度脱水貌。实验室检查：血钠 140mmol/L，血钾 4.5mmol/L，血糖 25mmol/L，血 pH7.25，尿酮体(+++)。

104-1. 最适合的治疗方案

- A. 恢复四次胰岛素皮下注射治疗
- B. 静脉大剂量短效胰岛素治疗
- C. 皮下胰岛素泵治疗
- D. 静脉小剂量短效胰岛素治疗
- E. 基础胰岛素皮下治疗

104-2. 最有可能有存在异常的检查指标是

- A. 胰岛素
- B. 生长激素
- C. ACTH
- D. 胰岛素抗体
- E. 胰高血糖素

104-3. 尿量恢复后，该如何进行治疗

- A. 补碱、补钾、补钠治疗
- B. 补碱、补钾治疗
- C. 补钠、补钙治疗
- D. 补碱、补钠治疗
- E. 补钾、补钠治疗

(107-1~107-3 题共用题干)

女性，72 岁，摔倒后左髌疼痛伴不能活动 3 小时，查体见左下肢缩短，外旋畸形，X 线显示左侧股骨头下骨皮质不连续，断端部分吻合。

107-1. Garden 分型是

- A. I
- B. II
- C. III
- D. IV
- E. V

107-2. 外旋畸形常见的角度

- A. 60~70
- B. 80~90

- C. 50~60
- D. 20~30
- E. 30~40

107-3. 最佳治疗方法

- A. 髋关节置换术
- B. 对症治疗, 应用非甾体药物
- C. 切开复位固定
- D. 卧床骨牵引
- E. 卧床休息

(110-1~110-3 题共用题干)

男, 82 岁, 有多年冠心病病史。夜间睡觉时突发胸闷, 端坐呼吸, 查体 R35 次/分, BP80/50mmHg, 双肺可闻及湿罗音, 心率 102 次/分, 第一心音强弱不等。

110-1. 该患者最可能的诊断是

- A. 慢性左心衰
- B. 全心衰
- C. 急性左心衰
- D. 右心衰
- E. 肺栓塞

110-2. 应对该患者立即进行什么治疗

- A. 同步直流电复律
- B. 异丙肾上腺素
- C. 静脉泵多巴酚丁胺
- D. 静脉泵多巴胺
- E. 去甲肾上腺素

110-3. 接下来该患者首选检查是

- A. X 线胸片
- B. 24 小时动态心电图
- C. 心肌核素扫描
- D. 冠脉造影
- E. 心肌灌注

(113-1~113-2 题共用题干)

女, 42 岁, 发现心脏杂音三年, 查体血压 120/70mmHg, 律齐, 双肺呼吸音

清, 未闻及干湿罗音, 律齐, 心尖部可闻及 3/6 收缩期杂音和舒张期隆隆样杂音。

113-1. 可能的诊断是

- A. 三尖瓣关闭不全伴狭窄
- B. 二尖瓣关闭不全伴狭窄
- C. 二尖瓣狭窄
- D. 三尖瓣关闭不全
- E. 二尖瓣关闭不全

113-2. 超声心动图提示二尖瓣卷曲, 瓣口面积 1.6cm², 最常见的原因是

- A. 退行性
- B. 感染性
- C. 先天性
- D. 损失性
- E. 风湿性

(115-1~115-2 题共用题干)

男孩, 10 岁, 发热 8 小时, 9 月 10 日入院, 入院前曾在外面吃烧烤, T 40℃, 呼吸 24 次/分, 血压 70/40mmHg, 查体浅昏迷, 面色苍白, 四肢湿冷, 皮肤可见“花斑”, 检验:WBC 24×10⁹/L, N 0.9。

115-1. 最可能考虑的是

- A. 伤寒
- B. 中毒性菌痢
- C. 乙脑
- D. 流脑
- E. 疟疾

115-2. 目前需要立刻处理的是

- A. 物理降温
- B. 使用糖皮质激素
- C. 使用镇静药物
- D. 使用血管活性药物
- E. 快速补液, 积极扩容

(117-1~117-2 题共用题干)

男, 10 岁, 发热皮肤黏膜出血 2 天就

诊。四肢可见出血点，肝脾不大，查血常规血红蛋白 75g/L，中性粒细胞 $1.0 \times 10^9/L$ ，血小板 $20 \times 10^9/L$ ，外周血见幼稚细胞 0.02，Ret0.02。

117-1. 患儿最可能的诊断是

- A. 骨髓增生异常综合征
- B. 再生障碍性贫血
- C. 阵发性睡眠性血红蛋白尿
- D. 巨幼细胞贫血
- E. 急性白血病

117-2. 男该患者可能出现下列哪项检查结果

- A. 中性粒细胞增多
- B. 中性粒细胞减少
- C. 血涂片可见红细胞碎片
- D. 晨起血红蛋白尿
- E. 直接抗人球蛋白阳性

(119-1~119-3 题共用题干)

患者男。48 岁。近八个月来感觉烦躁不安饥饿伴精神症状。近两个月来经常有晨起昏迷。服用糖水后清醒。发作时血糖 $1.8 \sim 2.2 \text{mmol/L}$ 。否认既往有高血压糖尿病史。急诊入院查体，呼吸 18 次/分。血压 120/80mmHg，脉搏 94 次/分。双肺听诊无干湿啰音。无异常心音。腹部平软无压痛反跳痛。

119-1. 该患者若收入院后有昏迷现象，需要进行的治疗措施是

- A. 静脉注入，50%的葡萄糖溶液
- B. 静脉注入 20%的葡萄糖溶液
- C. 口服葡萄糖溶液
- D. 静脉注入 10%的葡糖溶液
- E. 胃管饲入高碳水化合物食物

119-2. 未明确诊断，应首选的检查是

- A. ACTH
- B. 胰岛素抗体
- C. 胰岛素和 C 肽
- D. 糖耐量试验

E. 空腹血糖

119-3. 患者最可能的病因为

- A. 胰岛素瘤
- B. 二型糖尿病
- C. 胰岛素抵抗
- D. 反应性低血糖
- E. 自主神经功能紊乱

(122-1~122-2 题共用题干)

男，60 岁，发热乏力 3 天，腹胀，腹泻 2 天，查体 $T39^\circ\text{C}$ ，P120 次/分，R22 次/分，BP80/50mmHg 神志清，面部潮红，巩膜无黄染，结膜充血，双腋下可见划痕样出血点，心肺无异常，腹软，无压痛，反跳痛，肝脾肋下未触及。血常规 Hb158g/L，WBC $15 \times 10^9/L$ ，N 0.44，L0.40，异性淋巴细胞 0.15，Plt $75 \times 10^9/L$ ，尿蛋白(+++)，粪常规+

122-1. 为确诊需要进行下列哪项检查

- A. 肾活检
- B. IgM 抗体
- C. 血涂片
- D. 显微凝集试验
- E. 抗原快速检测

122-2. 下列治疗措施错误的是

- A. 静脉补充白蛋白
- B. 静脉滴注生理盐水
- C. 静脉滴注新鲜血浆
- D. 静脉滴注利巴韦林
- E. 静脉滴注阿昔洛韦

(124-1~124-2 题共用题干)

女，33 岁，产后无乳，闭经 4 年，昏迷一天。查体：体温 35 度，P90 次/分，血压 80/40，面色苍白，腋毛阴毛缺失。血 $K^+ 4.5 \text{mmol/L}$ ， $Na^+ 126.4 \text{mmol/L}$ ，血糖 3.1mmol/L 。

124-1. 该患者最可能的病因为

- A. 垂体危象
- B. 垂体卒中
- C. 低血糖昏迷
- D. 黏液性水肿
- E. Addison 病

124-2. 该患者的治疗为

- A. 降血压药
- B. 高渗葡萄糖
- C. 高渗盐水
- D. 糖皮质激素
- E. 甲状腺素

(126-1~126-2 题共用题干)

患者，女，2 米高处跌落后 2 小时，腰部着地，伤后腰痛，全程可见肉眼血尿，P90 次/分，BP110/70mmHg，查体，右腰部皮肤青紫，有压痛，腹部无压痛、反跳痛。

126-1. 该患者最可能损伤的部位是

- A. 输尿管
- B. 肾
- C. 脾
- D. 膀胱
- E. 尿道

126-2. 初期不适宜的治疗措施为

- A. 维持水电解质平衡
- B. 观察生命体征，监测血红蛋白
- C. 应用抗生素预防感染
- D. 镇静，止痛
- E. 肾动脉造影，血管栓塞止血

(128-1~128-3 题共用题干)

患者女，65 岁，近日突发呼吸困难，肺部充满湿啰音，咳粉红色泡沫痰，既往冠心病史 10 年，BP 80/50mmHg，心率 102 次/分，S3 奔马律。

128-1. 该患者最可能的诊断是

- A. 全心衰
- B. 右心衰

- C. 左心衰
- D. 肺栓塞
- E. 慢性心力衰竭急性发作

128-2. 该患者不应选择的药物是

- A. 多巴胺
- B. 异丙肾上腺素
- C. 去甲肾上腺素
- D. 氨茶碱
- E. 硝普钠

128-3. 若该患者病情控制后，为进一步明确发病原因，应该首先选择下列哪项检查

- A. 冠状动脉造影
- B. 动态心电图
- C. 动态心电图平板实验
- D. 超声心动图
- E. CT 肺动脉造影

(131-1~131-2 题共用题干)

男性，56 岁，间断性肉眼血尿 1 月余，镜下有血凝块，无腹痛、发热，无尿频、尿急、尿痛，B 超示膀胱新生物，如果 B 超提示膀胱侧壁有一 2cm 新生物，乳头状，有蒂。

131-1. 该病例适宜的治疗方式为

- A. 根治性膀胱切除
- B. 膀胱灌注
- C. 膀胱部分切除
- D. 经尿道膀胱肿瘤切除
- E. 全身化疗

131-2. 最具价值的检查是

- A. CT
- B. MRI
- C. 膀胱镜加活检
- D. 膀胱造影
- E. 腹部超声

(133-1~133-2 题共用题干)

2022 年临床执业历年真题

女，62 岁，水肿 3 个月，肾病综合征，病理示局灶节段性肾小球硬化，应用强的松 60mg/d，影像学胸片右下肺渗出，尿蛋白 2.9g/dL，RBC3~5/HP，Alb29g/L。

133-1. 此时最易发生的风险是

- A. 急性肾损伤
- B. 消化性溃疡
- C. 肺栓塞
- D. 肺部机会致病菌感染
- E. 类固醇性糖尿病

133-2. 此时应如何调整用药

- A. 糖皮质激素加环磷酰胺
- B. 糖皮质激素加环孢素
- C. 缓慢激素减量
- D. 加量激素
- E. 停用激素

B1 型选择题

(135-1~135-2 题共用备选答案)

- A. 经皮肾镜碎石取石术
- B. 输尿管镜取石术
- C. 体外冲击波碎石
- D. 肾实质切开取石术
- E. 输尿管切开取石术

135-1. 一侧肾盂结石(长径 1.5cm)，肾功能正常。超声显示双肾内未见明显积水，首要的治疗措施是

135-2. 一侧肾内结石长径 3.5cm 伴肾积水，首要的治疗方法

(137-1~137-2 题共用备选答案)

- A. 急性间质性肾炎
- B. 急性肾小管坏死
- C. 新月体型肾炎
- D. 血栓性微血管病变
- E. 急性肾炎

137-1. 血管内溶血导致的肾损伤类型是

137-2. 肺出血肾病综合征(Goodpasture)导致的肾损伤类型

(139-1~139-2 题共用备选答案)

- A. 肝颈静脉回流征阳性
- B. 颈静脉搏动
- C. 双肺底对称细湿啰音
- D. 多浆膜腔积液
- E. 下肢水肿

139-1. 右心衰特征性表现

139-2. 肺循环淤血表现

(141-1~141-2 题共用备选答案)

- A. 初期
- B. 极期
- C. 高热期
- D. 缓解期
- E. 恢复期

141-1. 伤寒患者已无发热，突感右上腹疼痛，伴压痛、反跳痛，叩诊肝浊音界消失，X 线站立位见游离气体，该患者处于哪个病程

141-2. 伤寒出现发热，相对脉缓，神智淡漠，间断出现谵妄，该患者处于哪个病程

(143-1~143-2 题共用备选答案)

- A. 轻链
- B. IgA
- C. IgE
- D. IgM
- E. IgG

143-1. 高粘滞性多发性骨髓瘤最常见的类型

143-2. 最常见的多发性骨髓瘤的类型

(145-1~145-2 题共用备选答案)

- A. 桡骨小头半脱位
- B. 孟氏骨折
- C. 盖氏骨折
- D. Colles 骨折
- E. 桡骨干骨折

145-1. 复位后需要曲腕尺偏固定的是

2022 年临床执业历年真题

145-2. 复位后不需要固定的是

(147-1~147-2 题共用备选答案)

- A. 主动脉瓣关闭不全
- B. 主动脉瓣狭窄
- C. 二尖瓣关闭不全
- D. 二尖瓣狭窄
- E. 肺动脉瓣关闭不全

147-1. 左室舒张末压 3mmHg, 肺动脉楔压 25mmHg, 这种情况见于

147-2. 动脉血压 130/50mmHg 最常见于

(149-1~149-2 题共用备选答案)

- A. 苦笑面容
- B. 满月脸
- C. 面色苍白
- D. 毛发旺盛
- E. 色素沉着

149-1. Addison 病的体征是

149-2. Sheehan 综合征的体征是

第三单元

A1/A2 型选择题

001. 关于自身免疫性疾病抗体说法错误的是

- A. RF 因子可见于多种结缔组织病和感染性疾病
- B. ANCA 可以用来诊断系统性红斑狼疮
- C. 环瓜氨酸抗体是诊断类风湿的特异性抗体
- D. 抗核抗体是结缔组织病的筛查项目
- E. dsDNA 与系统性红斑狼疮相关

002. 关于外科手术患者, 术后能量代谢错误的是

- A. 葡萄糖利用能力增加
- B. 负氮平衡
- C. 脂肪动员增加

- D. 蛋白质分解增多
- E. 机体代谢加快

003. 交通性气胸应采取的首要措施是

- A. 胸腔闭式引流
- B. 无菌纱布覆盖伤口
- C. 胸廓固定术
- D. 固定、吸氧
- E. 及时抽出胸腔气体

004. 下列哪项不是胃溃疡的病理特点

- A. 周边粘膜充血水肿
- B. 表面可有炎性渗出物
- C. 可见坏死组织
- D. 可见肉芽组织
- E. 底部可见异型细胞

005. 胃溃疡的主要发病机制是

- A. 胃黏膜屏障受损
- B. 胃黏膜免疫屏障破坏
- C. 迷走神经功能亢进
- D. 胃泌素增加
- E. 前列腺素合成减少

006. 十二指肠溃疡穿孔的好发部位是

- A. 前壁
- B. 后壁
- C. 升部
- D. 降部
- E. 水平部

007. 支气管哮喘患者 PaCO₂ 增高表明

- A. 病情好转
- B. 病情稳定
- C. 病情危重, 需要机械通气
- D. 出现呼吸性碱中毒
- E. 合并心力衰竭, 需要使用利尿剂

008. 肺脓肿形成单个空洞的主要致病菌是

- A. 结核菌

B. 真菌

C. 肺炎链球菌

D. 金黄色葡萄球菌

E. 厌氧菌

009. 急性胰腺炎患者出现 Grey-Turner 征的病理生理改变是

A. 大量炎性渗出

B. 腹腔间隔室综合征

C. 胰腺出血坏死

D. 肠麻痹

E. 急性腹膜炎

010. 乳腺癌的筛查方法是

A. 胸部正位 X 线

B. 乳腺 X 线

C. 乳腺 MRI

D. 穿刺活检

E. 胸部 CT

011. 阻塞性肺炎的缺氧机制是

A. 通气血流比例失调

B. 肺泡通气量不足

C. 氧弥散功能失调

D. 分流率增加

E. 呼吸功能增加

012. 急性呼吸窘迫综合征所致顽固性低氧血症的主要机制是

A. 限制性通气功能障碍

B. 弥散功能障碍

C. 通气/血流比例失衡

D. 分流率增加

E. 呼吸功能增加

013. 先天性巨结肠首选检查

A. X 线检查

B. CT 检查

C. 结肠镜检查

D. 腹部 B 超

E. 胃镜检查

014. 40 岁以上筛查结肠癌首选

A. 结肠镜

B. 腹部 CT

C. 粪潜血

D. 腹部 B 超

E. 腹部 MRI

015. 阑尾炎术后，提示肠道恢复蠕动的表现

A. 肛门排气

B. 压痛反跳痛消失

C. 腹胀消失

D. 有饥饿感

E. 腹痛消失

016. 小儿阑尾炎的特点正确的是

A. 可保守治疗

B. 穿孔率高

C. 右下腹压痛，肌紧张症状典型

D. 不发热、症状不明显

E. 死亡率较低

017. 根除 Hp 感染后，用 C13 法复查需要在治疗多少周后

A. 1 周

B. 2 周

C. 3 周

D. 4 周

E. 5 周

018. 胃癌术前能明确肿瘤浸润深度的检查是

A. 腹部 CT

B. X 线钡剂造影

C. 染色内镜

D. 内镜超声

E. 腹部 MIR

019. 肝癌的手术指证是

A. 肝癌局限于一侧肝叶或肝段内

B. Child-Pugh 肝功能分级属 B 级或 C 级

C. 大量腹水

D. AFP>100

E. 胆红素过高

020. 低钙血症所导致的 chvostek 征指的是

A. 手指指尖样刺痛

B. 腱反射亢进

C. 口角紧张

D. 面神经叩击阳性

E. 踝阵挛

021. 肺栓塞引起的血流动力学改变是

A. 肺血管通透性增加

B. 肺通气功能障碍

C. 动静脉血管分流

D. 肺通气血流比例失调

E. 弥散障碍

022. 关于低位肠梗阻，下列说法正确的是

A. 腹胀、腹痛不明显

B. 呕吐物多为胃内容物

C. 梗阻多位于空肠

D. 呕吐症状早

E. X 线腹透见腹部数个阶梯状含气液平面

023. 左侧甲状腺乳头状癌，伴同侧 VI 区淋巴结转移，适宜的手术方式为

A. 甲状腺全切除+左侧改良根治性颈淋巴结清扫术

B. 甲状腺左叶切除+左侧改良根治性颈淋巴结清扫术

C. 甲状腺次全切除术+左侧改良根治性颈淋巴结清扫术

D. 甲状腺左叶切除+左侧 VI 区淋巴结清扫术

E. 甲状腺左叶部分切除+左侧 VI 区淋巴

结清扫术

024. 确诊肺栓塞的辅助检查首选

A. 血 D-二聚体

B. 超声心动图

C. CT 肺动脉造影

D. 血气分析

E. 肺功能检查

025. 胆总管无扩张，胆囊增大，肝总管和肝内外胆管扩张。考虑为

A. Mirizzi 综合症

B. 胰头癌

C. 急性胆管炎

D. 肝门胆管癌

E. 肝内胆管结石

026. 肝硬化患者呕血 800ml 后不可能出现的临床表现是

A. 脾脏缩小

B. 腹水减少

C. 扑翼样震颤

D. 腹胀、腹痛

E. 嗜睡

027. 抗休克治疗时，指标情况改善与尿量增加直接相关的是

A. 微循环灌注

B. 心排血量

C. 动脉舒张压

D. 肺毛细血管楔压

E. 中心静脉压

028. 患者已经行胆囊切除术，1 天前因腹痛行十二指肠 ERCP 手术，现突发剧烈疼痛，左中上腹明显，向背部放射。考虑什么疾病

A. 急性胰腺炎

B. 消化性溃疡穿孔

C. 急性心肌梗塞

D. 急性胆管炎

E. 胆总管结石

029. 患者做诊断性胸穿时，抽取 30ml 时，突然出现面色苍白、大汗、气急，首选处理方法为

- A. 停止穿刺，卧床休息
- B. 缓慢抽
- C. 静点阿托品
- D. 糖皮质激素治疗
- E. 肾上腺素治疗

030. 患者出现食管胃底静脉曲张破裂出血，脾大，应该选择的手术方式为

- A. 贲门周围血管离断，脾切除术
- B. 脾切除术
- C. 脾-肾静脉分流术，脾切除术
- D. 门脉分流术
- E. 肝总动脉结扎术

031. 关于血栓闭塞性脉管炎，以下说法不正确的是

- A. 男性多见
- B. 发作呈对称性和间歇性
- C. 起病隐匿，进展缓慢
- D. 可发生肢体坏疽
- E. 呈游走性

032. COPD 患者的肺功能检查主要表现为

- A. 支气管舒张实验阳性
- B. 弥散功能下降
- C. FEV1/FVC 下降
- D. 残气量下降
- E. 肺总量下降

033. 胃粘膜上皮异型增生的病理改变

- A. 胃粘膜上皮和腺体被杯状细胞幽门腺细胞取代
- B. 上皮细胞增生和分化缺失
- C. 淋巴细胞，浆细胞等慢性炎症改变
- D. 腺体缺失，间质纤维化

E. 中性粒细胞浸润

034. 病人出现反酸症状，且不能完全缓解，出现吞咽困难，首选哪种检查

- A. 胃镜
- B. CT 检查
- C. 腹部 B 超
- D. 腹部平片
- E. X 线检查

035. 中年男性出现反酸、烧心、暖气 2 个月，胃镜检查食管黏膜未见明显异常，最可能的疾病是

- A. 反流性食管炎
- B. 胃溃疡
- C. 慢性胃炎
- D. 胆囊炎
- E. 消化性溃疡

036. 胰腺炎休克治疗时，下列措施错误的是

- A. 利尿
- B. 补充体液
- C. 补充电解质
- D. 去甲肾上腺素
- E. 抗感染

037. 因某种原因进行输血治疗过程中出现输血过敏休克反应，以下说法错误的是

- A. 减慢输血
- B. 停止输血
- C. 加速补液
- D. 抗过敏治疗
- E. 升压

038. 收缩压 90mmHg，神志尚清，此时失血量最可能为

- A. 400~800
- B. 800~1600
- C. >1600

D. 400~200

E. 200~100

039. 行阑尾切除术时，寻找阑尾基底部最常用的方法是

A. 从腓窝寻找

B. 用手指探查阑尾尖部

C. 沿结肠带向回盲部寻找

D. 切开盲肠外侧腹膜寻找

E. 沿盲肠外侧寻找

040. 糖尿病病人饮食为

A. 高热量、高蛋白、高维生素、低纤维素饮食

B. 控制总热量、低糖低脂、高纤维饮食

C. 低脂低热量、少盐、粗纤维饮食

D. 高蛋白、高纤维素、高铁制品饮食

E. 低热量、低盐、高纤维易消化

041. 以下关于股骨干骨折出血，处理错误的是

A. 止血带固定到手术结束

B. 结扎创面小血管止血

C. 持续牵引

D. 钢板螺钉内固定

E. 尽早进行肌肉，膝关节功能练习

042. 免疫性胃炎导致的大细胞贫血，应补充哪种营养

A. VitB₁₂

B. 叶酸

C. 维生素 C

D. 铁离子

E. 维生素 B

043. 十二指肠溃疡相关病史为

A. 幽门螺杆菌感染

B. 饮酒

C. 吸烟

D. 应激

E. 自身免疫

044. 膀胱癌 T 分期的依据是

A. 浸润深度

B. 浸润广度

C. 淋巴结转移数量

D. 侵犯周围脏器

E. 远处转移

045. 恶性胸水表现出的体征是

A. 语颤减弱

B. 叩诊呈实音

C. 肋间隙变窄

D. 呼吸运动增强

E. 呼吸音增强

046. 患者，胸闷气急 3 周，胸片示右侧大量胸腔积液，胸穿抽出血性胸水 1000ml，LDH 580U/L，考虑胸水的性质为

A. 结核性胸膜炎

B. 癌性胸腔积液

C. 肺炎伴胸腔积液

D. 自发性液气胸

E. 漏出性胸腔积液

047. 急性肾小球肾炎的致病菌

A. A 组 β 溶血性链球菌

B. B 组溶血性链球菌

C. 柯萨奇病体

D. 草绿色链球菌

E. 金黄色葡萄球菌

048. 影响伤口愈合最常见的局部因素是

A. 局部血运障碍

B. 创面范围大

C. 感染

D. 异物清除不彻底

E. 年龄

049. 男性，56 岁，大便时发现肛门有脱出肿物，排便后可自行回纳，下列分

级正确的是

- A. 1 级
- B. 2 级
- C. 3 级
- D. 4 级
- E. 5 级

050. 男性, 32 岁, 出现腹部压痛、反跳痛、肌紧张, 行腹部探查, 术中依次探查肝、脾、膈均无损伤或出血, 继续探查, 应首先探查的脏器是

- A. 胰腺
- B. 胃
- C. 直肠
- D. 十二指肠
- E. 空肠

051. 间断腹痛腹泻 3 年, 既往有肛周脓肿, 现大便 3~4 日/日, 粘液, 无脓血, 右下腹包块, 压痛, 边界不清。考虑什么病

- A. 慢性细菌性痢疾
- B. 溃疡性结肠炎
- C. 克罗恩病
- D. 结肠癌
- E. 中毒性巨结肠

052. 患者外伤, 行脾切除术后, 查体: T 36.5°C, P 128 次/分, R30 次/分, BP 88/48mmHg。动脉血气分析: PH 7.28, 氧分压 100mmHg, 二氧化碳分压 32mmHg, 碱剩余 -6, 乳酸 4mol/L, 患者属于哪一种酸碱平衡失衡

- A. 呼酸合并代碱失代偿期
- B. 呼碱合并代酸失代偿期
- C. 呼酸
- D. 呼碱
- E. 代碱

053. 毕 2 式术后 5 天, 左上腹痛, 放射至背部, 小网膜囊引流出胆汁样液体,

血淀粉酶 1500U/L, 最可能的诊断为

- A. 输出袢梗阻
- B. 吻合口梗阻
- C. 十二指肠残端破裂
- D. 急性胰腺炎
- E. 残胃癌

054. 男, 30 岁。大便带血 1 个月。查体: T36.5°C, P 80 次/分, R18 次/分, BP 120/80mmHg。直肠指检: 触及一个柔软光滑有蒂包块, 直径约 1cm, 指套带血。最可能诊断是

- A. 直肠息肉
- B. 直肠癌
- C. 直肠脱垂
- D. 血栓性外痔
- E. 肛瘘

055. 转移性右下腹痛 4 天, 上腹痛 1 天, 腹部肝脏触诊轻压痛可触及, 轻度黄染, 肝脏部位可能发生的病变是

- A. 肝脓肿
- B. 肝门静脉炎
- C. 胆总管结石
- D. 胆囊炎
- E. 阑尾炎

056. 患者外伤, 血压 90/50mmHg, 全腹压痛反跳痛, 肌紧张, 移动性浊音阳性, 首选治疗是

- A. 抗休克治疗, 急症准备手术
- B. 输血抗休克
- C. 静脉注射糖皮质激素
- D. 平卧休息
- E. 观察

057. 男, 68 岁, 发热, 干咳, 全身肌肉酸痛, 胸片显示双肺磨玻璃影, 大部分融合。患者首选的检查是

- A. 病原抗原检测
- B. 病原抗体检测

- C. 痰培养
- D. 核酸检测
- E. 血培养, 药敏

058. 男, 78 岁, 茶色尿, 大便发白, 皮肤瘙痒, 黄疸, 肝内外肝管扩张, 肝脏下缘 3cm 出可以触及无痛性肿物, 可能的疾病是

- A. 胆囊结石
- B. 胰头癌
- C. 肝内胆管癌
- D. 肝外胆管结石
- E. 胆总管癌

059. 男, 48 岁, 一小时前被机动车撞伤腹部, 诉腹痛, 程度逐渐加重。查体 T38.5℃, P90 次/分, R20 次/分, BP 100/74mmHg。痛苦貌, 腹壁完整, 全腹压痛、反跳痛、肌紧张, 以脐周为著。腹部 B 超肠间少量积液, 肝周、膈下未见明显异常。导尿时导出黄色尿液 300ml。最有价值的治疗方法为

- A. 大量补液、抗休克
- B. 紧急输血
- C. 急诊肠镜
- D. 腹腔引流
- E. 外科手术

060. 中年男性, 冠心病史, 长期口服阿司匹林, 大量饮酒后呕血 800ml, 查体上腹部轻压痛, 余无异常, 明确诊断首选辅助检查

- A. B 超
- B. X 线钡餐检查
- C. 胃镜
- D. 腹部 CT
- E. 腹部平片

061. 中年女性, 血压 150/60, 有感染病史, 心脏听诊: 心尖区收缩期吹风样和舒张期隆隆样杂音, 双下肢无水肿,

诊断为

- A. 动脉导管未闭
- B. 主动脉瓣关闭不全
- C. 主动脉瓣狭窄
- D. 二尖瓣关闭不全合并狭窄
- E. 肺动脉瓣狭窄

062. 男, 52 岁, 从高处摔落, 右胸痛 25 分钟, 心率 102bpm, 呼吸 22 次/分, 血压 110/70mmHg, 右侧胸廓完全塌陷, 肺压缩 10%, 神志清楚, 双肺未闻及干湿啰音, 最有效的治疗措施是

- A. 胸腔抽刺排气
- B. 胸腔闭式引流
- C. 建立有效的呼吸
- D. 静脉补液
- E. 镇静、止痛

063. 女性, 70 岁, 左侧腹股沟肿块三天, 绞痛两天, 查体: 左侧腹股沟压痛, 最可能的诊断为

- A. 腹股沟斜疝
- B. 直疝
- C. 股疝
- D. 腹股沟肿块
- E. 脂肪瘤

064. 男性, 32 岁, 上腹部进食后不适 6 年, X 线钡餐检查见胃窦胃小弯处龛影, 大小约 2.5cm, 龛影口部有一狭颈, 黏膜皱壁集中, 诊断最可能是

- A. 胃溃疡
- B. 胃癌
- C. 胃炎
- D. 十二指肠溃疡
- E. 胃憩室

065. 女, 56 岁。排便时肛门疼痛一天, 疼痛剧烈, 厕所纸上有鲜红色血液, 即往有便秘史, 考虑诊断为

- A. 内痔

- B. 外痔
- C. 肛裂
- D. 肛管癌
- E. 肛痿

066. 女性, 34 岁, 上腹部疼痛 3 年, 进食后可加重。今日大量进食后出现上腹部刀割样疼痛, 查体可见全腹肌紧张、压痛、反跳痛, 检查首选

- A. 立位腹部 X 线
- B. B 超
- C. CT
- D. 增强 CT
- E. 胃镜

067. 男性, 36 岁, 咳痰一月余, 痰中有血丝, 痰液分四层, 偶尔咯血 100ml, X 线无异常, 考虑诊断为

- A. 支气管扩张
- B. 肺癌
- C. 结核
- D. 支气管肺炎
- E. 肺水肿

068. 男, 78, 右下肢行走痛, 乏力 5 年, 加重 1 年, 既往高血压 10 年, 糖尿病 5 年, 查体右足背, 腘动脉消失, 右股动脉正常, 右下肢皮温下降, 右足苍白。患者考虑为

- A. 血栓闭塞性脉管炎
- B. 急性动脉栓塞
- C. 动脉硬化性闭塞症
- D. 下肢深静脉血栓
- E. 血栓性浅静脉炎

069. 男, 70 岁, 咳嗽咳痰伴痰中带血 1 月, 发热 1 周, 吸烟 40 年, 20 支/天, 有杵状指, X 线可见右肺门阴影, 为明确诊断可选择

- A. 肿瘤标志物
- B. 痰培养+药敏

- C. 经皮穿刺活检
- D. 增强 CT
- E. 痰找结核杆菌

070. 女, 36 岁, 左下腹痛, 腹泻, 大便次数 3~5 次/日, 伴黏液脓血便, 里急后重, 反复多次粪便培养, 阿米巴等均为阴性, 抗生素治疗无效, 距肛门 50cm 以下可见粘膜粗颗粒改变, 点状多发糜烂及浅溃疡, 可见黄色黏液覆盖, 治疗首选

- A. 环孢素
- B. 蒙脱石散
- C. 甲硝唑
- D. 柳氮磺吡啶
- E. 泼尼松

071. 女, 45 岁, 左手示指被鱼刺扎破 5 天, 患指红, 肿, 痛伴发热 3 天, 查体:T 38.5℃, 左手示指甲旁红肿, 有脓点, 触痛明显, 有波动感。目前最恰当处理方法是

- A. 外敷鱼石脂软膏
- B. 拔甲
- C. 切开引流
- D. 红外线理疗
- E. 应用抗生素

072. 女, 55 岁, 间断多关节肿痛 8 年, 近 3 年双腕关节活动逐渐受限, 长期服用泼尼松 10mg/d 治疗。X 线片示双手指间关节间隙狭窄, 双侧腕骨可见骨质吸收破坏, 间隙变窄, 该患者腕关节病变影像学分期为

- A. I
- B. II
- C. III
- D. IV
- E. V

073. 男, 47 岁, 咳嗽乏力, 四肢疼

痛，自行口服红霉素，未见好转，体温波动于 38℃，CT 示左下肺斑片状阴影，实验室检查支原体 IgM 阳性，请问此时应选用的抗菌药为

- A. 莫西沙星
- B. 磺胺
- C. 环丙沙星
- D. 阿奇霉素
- E. 罗红霉素

074. 男，体温高，心率快，血压 80/50mmHg，神智不清。Hb103g/L，白细胞 $20 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞 0.82。

下列治疗方法错误的是

- A. 补液抗休克
- B. 输入抗生素抗感染治疗
- C. 物理降温
- D. 输白蛋白
- E. 输血抗休克

075. 患者男，23 岁，近日来出现右眼上睑下垂，CT 示前上纵膈有一三厘米的圆影，考虑诊断为

- A. 畸胎瘤
- B. 重症肌无力
- C. 神经性肿瘤
- D. 胸腺瘤
- E. 胸骨后甲状腺瘤

076. 男，车祸，肺压缩 10%，左侧第 5 肋单根肋骨骨折。急救现场首先的处理是

- A. 胸廓外固定
- B. 镇静，止痛
- C. 吸氧观察
- D. 开胸探查
- E. 抗休克

077. 患者腹痛高热，体查腹部压痛，反跳痛，肠鸣音消失，CT 示腹部积液，腹腔穿刺，抽出黄绿色液体，请问致病

菌

- A. 肺炎克雷伯
- B. 大肠埃希菌
- C. 变形杆菌
- D. 铜绿假单胞菌
- E. 肠球菌

078. 女，35 岁，体检颈前肿块 2 个月，无明显症状，查体甲状腺左叶有一硬性肿物 $1.5 \times 1\text{cm}$ ，随吞咽活动，无压痛，颈部无肿大结节，B 超示左叶上级 $1.5 \times 1\text{cm}$ ，低回声团，血流丰富、边界不清，纵横比大于 1，实验室检查 FT3 36.46nmol/L，FT4 16.5nmol/L，TSH2.5nmol/L。最可能的诊断是

- A. 桥本甲状腺炎
- B. 甲状腺癌
- C. 甲状旁腺癌
- D. 甲状腺腺瘤
- E. 结节性甲状腺肿

079. 女，40 岁，间断咳嗽咳痰 15 年，活动时气短 5 年，间断双下肢水肿 2 年。查体颈静脉充盈，双肺呼吸音减轻，心率 90 次/分，节律齐，P2>A2，三尖瓣听诊区可闻及 2/6 级收缩期杂音，最可能的诊断为

- A. 风湿性心脏瓣膜病
- B. 房室间隔缺损
- C. 缩窄性心包炎
- D. 慢性肺源性心脏病
- E. 慢性血栓性肺动脉高压

080. 女性，34 岁，呼吸困难伴胸闷 10 个月，近 1 月加重，行 X 片可见双肺大片磨玻璃影，可见融合，血象示：白细胞升高，中性粒细胞升高，最可能的诊断为

- A. 间质性肺炎
- B. 肺癌
- C. 支扩伴感染

- D. 浸润型肺结核
- E. 病毒性肺炎

081. 女, 58 岁, 因胆红素结石合并左肝外叶萎缩, 行左肝外叶及胆囊切除, 胆总管切开取石加 T 管引流, 术后两周来院复查, 看胆总管是否残留结石, 行什么检查

- A. 腹部 b 超
- B. 经 T 管胆道造影
- C. MRCP
- D. PTC
- E. ERCP

082. 男, 30 岁, 1 周前不慎被铁钉扎进左足底, 现出现苦笑面容, 四肢肌张力高, 以下对于预防该疾病最关键措施是

- A. 观察随诊
- B. 打疫苗
- C. 彻底清创
- D. 抗生素治疗
- E. 隔离

083. 女, 26 岁, 剖宫产术后 1 周, 左下肢肿胀 5 天, 查体, 左小腿 homans 阳性, 常见因素不包括

- A. 高凝状态
- B. 妊娠
- C. 卧床
- D. 剖宫产
- E. 早日下地活动

084. 女, 20 岁, 低热干咳 1 个月, 胸痛 1 周, 查体 37.8℃, 右下肺语音震颤减弱, 叩诊实音, 最可能的诊断是

- A. 肺癌右胸腔转移
- B. 支气管扩张
- C. 气胸
- D. 结核性胸膜炎
- E. 慢阻肺

085. 女, 38 岁, 左乳 3×3 肿块, 质硬, 光滑, 边界清楚, 可推动, 无淋巴结肿大, 首选检查是

- A. 乳腺 X 线检查
- B. 乳腺导管检查
- C. 乳腺 B 超
- D. CT
- E. MRI

086. 男性, 72 岁, 贫血, 粪隐血阳性, 直肠指检未见明显异常, 肠镜见距离肛门 10 厘米处溃疡型肿块, 最佳治疗方式为

- A. Miles 手术
- B. 腹会阴联合直肠癌根治术
- C. Hartmann 手术
- D. 姑息手术
- E. 直肠低位前切除术

087. 男性, 56 岁, 上腹痛 1 月, 检查见胃角浅表溃疡, 活检示高级别上皮内瘤变, WS(+), 应首选的治疗方式为

- A. 四联疗法后 HP 复查
- B. 胃次全切+根治术
- C. 内镜下行黏膜剥离术
- D. 胃大部切除术
- E. 观察随访

088. 男, 吸烟四十余年, 喘息 5 年, 加重 3 天。咳嗽胸闷、嗜睡、烦躁, 球结膜充血, 口唇发绀。查体桶状胸, 右下腹可闻及湿啰音。动脉血气分析 pH7.25, PaCO₂ 75mmHg, PaO₂ 34mmHg, BE +3。最可能的诊断是

- A. 急性脑血管病
- B. 支气管扩张
- C. ARDS
- D. 肺性脑病
- E. 肝性脑病

089. 男, 28 岁, 发热 3 天, 查体:胸膝

位 3-6 点钟肛门红肿，触痛，无渗出物，最可能的诊断是

- A. 肛痿
- B. 直肠后间隙脓肿
- C. 肛门周围脓肿
- D. 骨盆直肠间隙脓肿
- E. 坐骨肛管间隙脓肿

090. 女，反复咳嗽多年，今日突发咯血 200 毫升，之前偶有咯血。胸片提示多发囊状改变。明确诊断的检查是

- A. 胸部 CT
- B. 支气管动脉造影
- C. 支气管镜
- D. Pet CT
- E. 磁共振

091. 女，反复咳嗽多年，今日突发咯血 200 毫升，之前偶有咯血，胸片提示多发囊状改变，病变局限于肺段，最根本的治疗方法是

- A. 静滴垂体后叶素
- B. 肺叶切除手术
- C. 抗生素治疗
- D. 支气管动脉栓塞
- E. 静滴氨甲环酸

092. 男性，36 岁，肛周反复疼痛，伴脓性分泌物半年，查体截石位肛周皮肤 5 点，7 点两处外口。挤压浓血性溢液出。首选的治疗。

- A. 硬化剂注射
- B. 抗生素治疗
- C. 温水坐浴
- D. 挂线疗法
- E. 手术切除

093. 男，48 岁，一小时前被机动车撞伤腹部，诉腹痛，程度逐渐加重。查体 T38.5℃，P90 次/分，R20 次/分，BP 100/74mmhg。痛苦貌，腹壁完整，全腹

压痛、反跳痛、肌紧张，以脐周为著。腹部 B 超肠间少量积液，肝周、膈下未见明显异常。导尿时导出黄色尿液 300ml。患者最有可能是以下

- A. 肝破裂
- B. 脾破裂
- C. 小肠破裂
- D. 肾破裂
- E. 胰腺破裂

094. 女性，42 岁，反复腹胀，乏力，纳差三年。11 周来出现发热，腹部隐痛，腹围显著增大，既往乙肝肝炎病史 15 年。查体慢性肝病面容，肝掌，腹部膨隆，弥漫性压痛，反跳痛。肝肋下未触及，脾肋下 3cm，移动性浊音阳性，白细胞 $15 \times 10^9/L$ ，NO 0.85，SCr $104 \mu mol/L$ 。BUN 6.6mmol/L。最可能腹痛的原因

- A. 自发性腹膜炎
- B. 门静脉血栓
- C. 原发性肝癌
- D. 肝肾综合征
- E. 继发性腹膜炎

095. 男，30 岁，反复咯血 6 年，多为痰中带血，偶有一次大咯血 100ml，无发热，胸部 X 线片提示多发囊状改变。为明确诊断应选择以下哪项检查

- A. 支气管造影
- B. 支气管镜
- C. 胸部高分辨 CT
- D. CT 肺动脉造影
- E. 结核菌素检查

096. 男性，29 岁，大量饮酒后呕吐鲜血一小时，量约 800ml，因冠心病长期服用阿司匹林。查体 P110 次/分，血压 92/65mmHg，神志清楚，未见肝掌，蜘蛛痣，腹软，无压痛，肝脾肋下未触及，肠鸣音 12 次，为明确诊断最有意

义的检查。

- A. 腹部 CT
- B. 上消化道 X 线钡餐造影
- C. 腹部 X 线平片
- D. 腹部 B 超
- E. 胃镜

097. 男，28 岁，因外伤脾破裂行脾切除术 1 天。查体：T36.5℃ P 128 次/分 R 30 次/分 BP 88/48mmhg。动脉血气分析：PH 7.28，PaCO₂ 32mmhg，PaO₂ 100mmhg，BE -9mmol/L，HCO₃⁻ 16mmol/L，乳酸 4mmol/L 患者属于以下哪种酸碱平衡失调类型

- A. 呼吸性酸中毒失代偿
- B. 呼吸性酸中毒合并代谢性酸中毒
- C. 呼吸性碱中毒代偿期
- D. 代谢性酸中毒失代偿
- E. 代谢性碱中毒代偿期

098. 男，58 岁，咳嗽、咳痰，痰中带血，X 线可见右肺门肿物，病理检查为鳞状细胞癌，现支气管镜提示右上叶支气管开口处可见新生肿物，首选的治疗为

- A. 肺叶切除
- B. 肺段切除
- C. 袖状切除
- D. 全肺切除
- E. 楔形切除

099. 女性患者，上腹部腹胀 4 个月，上消化道造影未见异常，此时缓解腹胀最有效的药物是

- A. 抑酸药
- B. 抗幽门螺旋杆菌药
- C. 硝酸甘油
- D. 阿司匹林
- E. 促胃动力药

100. 男，55 岁，左上腹疼痛，血压

80/55mmhg，Hb106g/L，下列处理不正确的是

- A. 广谱抗生素
- B. 维持水电解质平衡
- C. 查找病因
- D. 完善相关检查
- E. 输血

101. 男性，34 岁，腹痛，腹泻，脐周痛，便后腹痛减轻，大便不成形，无脓血有粘液，结肠镜检阴性，下列哪项有助于诊断

- A. 大便不成形
- B. 结肠镜检阴性
- C. 腹痛腹泻
- D. 无脓血有粘液
- E. 排便与疼痛缓解有关

102. 男性，56 岁，腹胀，乏力 5 年，近来自觉肝区隐痛，无饮酒史，身高 170cm，体重 88kg，腹围 105cm，胆固醇 6.17mmol/L，该患者发生这种病理改变与下列哪项无关

- A. 肝星状细胞激活
- B. 胶质细胞增生
- C. 线粒体功能障碍
- D. 脂质沉积
- E. 胰岛素抵抗

103. 女，68，左上肺肿块，糖尿病 10 年，高血压 3 年，血压 180/110mmHg，拟手术治疗，术前禁食，下列处理错误的是

- A. 降糖治疗到 5.1~11
- B. 观察病情
- C. 暂停手术
- D. 快速降压到正常
- E. 不可以快速降压到正常

104. 患者大量呕吐后，实验室检查：pH7.7，Cl⁻ 70mmol/L，K⁺

2. 5mmol/L , Na^+ 142mmol/L , 下列哪项诊断符合题意

- A. 低氯低钾, 代谢性酸中毒
- B. 低氯低钠, 呼吸性酸中毒
- C. 低氯低钾, 代谢性碱中毒
- D. 低氯低钠
- E. 低钾低钠

105. 男性, 64 岁。右季肋部胀痛 1 月余, 伴有食欲减退及乏力, 体重减轻 4kg。查体: 体温 38.2°C , 呼吸 18 次/分, 心率 84 次/分, 血压 $116/80\text{mmHg}$ 。消瘦, 慢性病容。皮肤、巩膜明显黄染, 脸结膜苍白。肝右侧肋缘下 3cm, 质硬, 表面凹凸不平, 脾肋下未触及, 移动性浊音阴性, 双下肢轻度水肿。AFP 689ng/ml 。CT 提示肝脏可见大小约 $3\times 2\text{cm}$ 低密度影, 动脉期出现环形强化影而病变内部强化不显著, 为明确诊断, 应首选的检查是

- A. 肝穿刺检查
- B. 超声检查
- C. X 线检查
- D. MRCP 检查
- E. CT 检查

106. 男, 低热, 体重减轻 5kg, 右下腹可疑肿块, 回盲部跳跃征, 盲肠及结肠短缩。考虑诊断为

- A. 肠结核
- B. 克罗恩病
- C. 溃疡性结肠炎
- D. 结肠癌
- E. 肠易激综合征

107. 男, 40 岁, 体温 39°C , 心率 96 次/分, 轻微咳嗽, 肌肉酸痛, X 片示下肺有斑片状融合影。最可能的致病菌是

- A. 金葡菌
- B. 军团菌
- C. 衣原体

- D. 肺炎链球菌
- E. 病毒性肺炎

108. 男, 36 岁。间断腹痛 1 年, 以右下腹为著伴有便秘和反复发作的口腔溃疡, 无低热、乏力及消瘦。查体: 轻度贫血貌, 皮肤巩膜无黄染, 浅表淋巴结未触及肿大, 心肺未见异常, 腹软, 右下腹可触及边界不清的包块, 大小约 $4\times 5\text{cm}$, 可移动, 压痛阳性。PPD 试验阴性。两周前因肛周脓肿行手术治疗。为了明确诊断, 首选的检查方法为

- A. X 线
- B. B 超
- C. CT
- D. 肠镜
- E. CEA

109. 女, 34 岁, 月经增多, 脱发, 实验室检查: dsDNA(+), ANCA(+), 尿蛋白(+++), 最可能的诊断是

- A. 红斑狼疮
- B. 类风湿关节炎
- C. 甲亢
- D. 干燥综合征
- E. 原发性血管炎

110. 老年患者, 全腹胀痛, 左下腹压痛, 停止排气, 既往便秘, 行 X 线检查可见

- A. 鸟嘴征
- B. 铅管征
- C. 杯口征
- D. 鹅卵石征
- E. 充盈缺损

111. 女, 28 岁, 一周前病人感觉乳房疼痛、局部红肿、发热, 查体乳腺有波动感, 应如何种治疗

- A. 切开引流
- B. 广谱抗生素

- C. 局部热敷
- D. 局部注射抗生素
- E. 促使乳汁通畅排出

112. 男, 20 岁, 看电视时突发肩胛区疼痛, 胸闷憋喘, 呼吸困难, 查体: 体型瘦高, X 线亮度增高, 肺组织压缩 40%, 其可能出现的是

- A. 患侧胸廓萎陷
- B. 患肺泡通气量/血流量 >0.8
- C. 吸气时向患侧偏
- D. 胸膜腔压力升高
- E. 患侧肺组织膨胀

113. 男性, 75 岁, 全身淋巴结无肿大, 查体: 脾肋缘下 5cm, 染色体 t(9; 22)(q34; q11), 最可能是什么疾病

- A. 骨髓纤维化
- B. 急性髓系白血病
- C. 慢性髓系白血病
- D. 慢性淋巴细胞白血病
- E. 急性淋巴细胞白血病

114. 男, 20 岁, 常伴发低热、咳嗽, X 线检查可见肺门哑铃状阴影, 判断患者可能的疾病

- A. 原发性肺结核
- B. 支气管肺癌
- C. 肺炎
- D. 肺结节病
- E. 肺气肿

A3/A4 型选择题

(115-1~115-2 题共用题干)

男, 65 岁, 既往咳嗽, 咳脓痰, 咯血 10 年, 近期发热、症状加重。痰培养出铜绿假单胞菌。

115-1. 应诊断为

- A. 支气管扩张+并发感染
- B. 肺癌

- C. 肺栓塞
- D. 肺炎链球菌肺炎
- E. COPD

115-2. 患者首选治疗为

- A. 头孢呋辛
- B. 哌拉西林/他唑巴坦
- C. 阿奇霉素
- D. 罗红霉素
- E. 诺氟沙星

(117-1~117-2 题共用题干)

男性, 68 岁, 咳嗽咳痰 3 个月, 胸痛 1 周, CT 示右上肺尖 3×2cm 肿块。

117-1. 首选辅助检查为

- A. 经胸壁穿刺活检
- B. 支气管镜检查
- C. 痰涂片
- D. 血常规
- E. 肺功能检查

117-2. 假设患者未治疗, 8 个月后, 出现呼吸困难, 侧卧不能缓解, 右侧胸部大量胸腔积液, CT 示右侧肺尖部 4×3cm 肿块, 胸椎、肋骨多发转移, 为缓解症状当前最佳治疗措施是

- A. 全身化疗
- B. 同步放化疗
- C. 胸椎放疗
- D. 局部放疗
- E. 胸腔闭式引流

(119-1~119-2 题共用题干)

55 岁农民, 稻田劳动后右小腿肿痛 4 天, 体温 38.8, 见皮疹, 4×4cm, 色鲜红, 界限清楚, 中间颜色淡。

119-1. 应诊断为

- A. 疔
- B. 丹毒
- C. 急性蜂窝组织炎
- D. 痈
- E. 气性坏疽

119-2. 错误的治疗是

- A. 红肿切开引流
- B. 抗生素治疗
- C. 硫酸镁湿敷
- D. 抬高患侧肢体
- E. 按摩理疗

(121-1~121-2 题共用题干)

男, 28 岁, 图书馆管理员, 今晨整理图书馆图书期间出现突发咳嗽, 气喘, 呼吸困难, 既往过敏性鼻炎病史, 听诊双肺散在哮鸣音。

121-1. 该患者做什么辅助检查最有意义

- A. 支气管舒张试验
- B. 胸部 X 线片
- C. 胸部高分辨 CT
- D. 超声心动图
- E. 动脉血气分析

121-2. 该患者考虑什么疾病

- A. 急性左心衰
- B. 支气管哮喘急性发作
- C. 支气管炎
- D. 急性呼吸窘迫综合征
- E. 上气道咳嗽综合征

(123-1~123-2 题共用题干)

女, 40 岁, 发现右乳肿物 1 年, 病初约花生米大小, 近半年肿物增大, 无特殊不适。查体: 右乳外上限可触及 4cm × 3cm 质硬肿物, 皮肤无粘连。右侧腋窝淋巴结可触及肿大、质硬淋巴结, 融合成团, 右侧锁骨上淋巴结未触及。乳房 X 线摄影: 右乳可见 4cm × 3cm 高密度影, 周边成毛刺状, 中央可见强回声钙化点。其余检查未见远处转移。

123-1. 该患者疾病 TNM 分期为

- A. T2N2M0
- B. T3N2M0
- C. T3N1M0
- D. T2N1M0
- E. T1N2M0

123-2. 该患者行乳房改良根治术后,

术后病理为浸润性导管癌, 淋巴结转移 4/20, ER(-), PR(-), HER2(-), 则接下来治疗应选择:

- A. 放疗
- B. 化疗
- C. 放疗+化疗
- D. 靶向治疗
- E. 内分泌治疗

(125-1~125-3 题共用题干)

男, 48 岁, 间断性腹痛 4 年, 加重 4 小时, 腹痛多于进食后 1 小时发生, 可自行缓解, 未诊治。4 小时前进食后突发剧烈疼痛, 迅速波及全腹。查体 T36.8 °, P92 次/分, R18, BP:160/80。全腹反跳痛肌紧张, 有局部压痛。

125-1. 引起腹痛的原因是

- A. 急性心肌梗死
- B. 急性胰腺炎
- C. 胃溃疡穿孔
- D. 急性冠心病
- E. 急性胃粘膜病变

125-2. 诊断该病首选检查

- A. 腹部 X 钡剂检查
- B. 腹部 B 超
- C. 胃镜
- D. 腹部 CT
- E. 立位腹平片

125-3. 该病最有效的治疗方法

- A. 迷走神经切断术
- B. 全胃切除术
- C. 胃大部切除术
- D. 穿孔修补术
- E. 抗酸+补液

(128-1~128-2 题共用题干)

患者男, 腰背部疼痛 20 天, 左侧膝关节、左下肢踝关节疼痛, 晨起明显, 活动后缓解, “4”字实验阳性, 既往有虹膜炎病史。

128-1. 有效检查是

- A. HLA-b27
- B. 类风湿因子
- C. 关节液检查
- D. 骶髂关节 X 线
- E. 抗环瓜氨酸多肽抗体

128-2. 最可能的诊断是

- A. 膝关节结核
- B. 脊柱关节炎
- C. 类风湿关节炎
- D. 滑膜炎
- E. 骨关节炎

(130-1~130-2 题共用题干)

慢性肾衰竭患者，定期血液透析，每周 3 次，近两天吃了 2kg 橘子，出现口周麻木，四肢乏力，心率 43 次/分。

130-1. 出现上述症状原因

- A. 高钾血症
- B. 代谢性酸中毒
- C. 高磷血症
- D. 低钙血症
- E. 高钙血症

130-2. 治疗最有效的是

- A. 血液透析
- B. 阳离子交换树脂
- C. 注射钙剂
- D. 大量激素
- E. 利尿剂

(132-1~132-3 题共用题干)

男性，40 岁。3 年前因胆囊结石行胆囊切除术。1 天前因皮肤、巩膜黄染行内镜逆行胰胆管造影检查，术后 2 小时患者出现上腹部剧烈疼痛，呈持续性，向肩背部放射，伴有恶心、呕吐。查体：皮肤、巩膜黄染，左上腹压痛，反跳痛可疑阳性，肝脾肋下未触及，肝浊音界存在，移动性浊音阴性，肠鸣音 2~3 次/分，双下肢无水肿。血淀粉酶 589U/L。

132-1. 该患者最可能的诊断是

- A. 急性胰腺炎
- B. 消化性溃疡穿孔
- C. 急性心肌梗塞
- D. 急性胆管炎
- E. 胆总管结石

132-2. 为明确诊断，首选的检查为

- A. 超声
- B. 胃镜
- C. CT
- D. X 线
- E. ERCP

132-3. 患者可能出现的并发症不包括

- A. 胰腺假性囊肿
- B. 肝脓肿
- C. 消化道瘘
- D. 腹腔间隔室综合征
- E. SIRS

(135-1~135-2 题共用题干)

女性 50 岁，烧伤 3 小时，体重 60kg，双小腿及双足有水泡，创面湿润，疼痛明显。

135-1. 烧伤面积为

- A. 0.2
- B. 0.19
- C. 0.13
- D. 0.21
- E. 0.3

135-2. 第一个 24 小时补液量是

- A. 4700ml
- B. 5700ml
- C. 1700ml
- D. 3700ml
- E. 2700ml

(137-1~137-2 题共用题干)

女，46 岁，5 年前因胆囊结石行胆囊切除术。4 小时前突发上腹部绞痛，以右上腹为著，随后出现发热。体温最高达 39.6℃，伴有恶心、呕吐，小便呈浓茶

色。查体：体温 39.4℃，呼吸 20 次/分，心率 96 次/分，血压 80/50mmHg，神志不清，躁动，巩膜黄染，右上腹肌紧张，有压痛和反跳痛。X 线示胆总管及肝内外胆管扩张。

137-1. 下列能反应病情危重的是

- A. 皮肤黄疸
- B. 发热
- C. 谵妄休克
- D. 腹痛
- E. 低血压

137-2. 目前治疗应选择

- A. 剖腹探查
- B. 纠正水、电解质平衡
- C. 穿刺引流
- D. 胆管切开减压
- E. 造瘘术

B1 型选择题

(139-1~139-2 题共用备选答案)

- A. 胃角溃疡合并出血
- B. 食管贲门黏膜撕裂伤
- C. 十二指肠球部溃疡出血
- D. 食管胃底静脉曲张破裂出血
- E. 胃恒径动脉破裂出血

139-1. 剧烈呕吐后呕鲜血最可能的病因

139-2. 长期大量饮酒患者上消化道出血原因

(141-1~141-2 题共用备选答案)

- A. 一侧腹痛，持续性，向会阴部放射
- B. 上腹持续性剧烈腹痛，成束带状，像腰背部放射
- C. 上腹钻顶样剧烈腹痛，阵发性加剧，间歇期完全缓解
- D. 上腹剧烈样绞痛，阵发性，像右侧肩部放射
- E. 上腹突发刀割样剧烈腹痛，迅速波及全腹

141-1. 急性坏死性胰腺炎的腹痛特点是

141-2. 胆总管结石嵌顿的腹痛特点

(143-1~143-3 题共用备选答案)

- A. 呼碱
- B. 呼酸合并代碱
- C. 代碱
- D. 呼酸合并代酸
- E. 呼酸

143-1. 肺泡通气不足容易造成的酸碱失衡是

143-2. 慢性肺源性心脏病失代偿期患者，同时合并二型呼吸衰竭，为减轻双下肢水肿，大量应用袪利尿剂，可能出现的酸碱失衡是

143-3. 慢性阻塞性肺疾病合并肝性脑病患者，气管插管机械通气后设置了较大潮气量，二氧化碳迅速降至正常范围，此时可能出现的酸碱失衡是

(146-1~146-2 题共用备选答案)

- A. Bassini 法
- B. Ferguson 法
- C. McVay 法
- D. Shouldice 法
- E. Halsted 法

146-1. 修补加强腹股沟管前壁修补最常见的手术方法是

146-2. 常用于股疝修补的手术方法是

(148-1~148-2 题共用备选答案)

- A. 血清腹水白蛋白梯度>11g/L
- B. AFP 升高
- C. ADA 升高
- D. 白细胞 $300 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞居多
- E. 找到异型细胞

148-1. 符合肝硬化门静脉高压的腹腔积液特点

148-2. 符合结核性腹膜炎的腹腔积液特点

第四单元

A1/A2 型选择题

001. 妊娠剧吐不能进食者，为预防 Wernicke 脑病，应补充的维生素是

- A. 维生素 PP
- B. 维生素 K
- C. 维生素 A
- D. 维生素 B1
- E. 维生素 B6

002. 早产儿发生低体温的原因不包括

- A. 缺乏棕色脂肪
- B. 体温调节中枢不完善
- C. 皮肤表面角化层较差
- D. 皮下脂肪薄
- E. 体表面积相对较小

003. 颅内压增高的早期表现不包括

- A. 视神经乳头水肿
- B. 喷射性呕吐
- C. 双侧瞳孔散大
- D. 头痛
- E. 高血压

004. 关于妊娠期的子宫，正确的是

- A. 妊娠 12 周后可在耻骨联合上方触及
- B. 子宫增大主要是因为肌细胞数目增多
- C. 妊娠晚期子宫轻度左旋
- D. 妊娠晚期子宫容量约 500ml
- E. 妊娠早期子宫呈对称的球形

005. 精神分裂症与预后不良有关的因素是

- A. 已婚
- B. 急性或亚急性起病
- C. 以阴性症状为主
- D. 初发时年龄晚
- E. 文化程度高

006. 腺病毒肺炎典型的临床表现是

- A. 发热、咳嗽，早期出现肺部细湿啰音
- B. 高热伴刺激性干咳
- C. 持续性发热，伴有憋喘，肺实变体征
- D. 反复发作呼气性呼吸困难
- E. 咳大量脓痰或反复咯血

007. 婴儿出生后各系统、器官的生长发育不平衡，呈先慢后快的是

- A. 免疫系统
- B. 神经系统
- C. 生殖系统
- D. 消化系统
- E. 呼吸系统

008. 关于双胎妊娠，下列错误的是

- A. 胎盘一个或两个
- B. 双胎性别一定一致
- C. 双胎指纹可不同
- D. 双胎外貌性格表型可不同
- E. 羊膜腔可两个，也可一个

009. 继发性不孕最常见的原因

- A. 阴道因素
- B. 宫体因素
- C. 宫颈因素
- D. 输卵管因素
- E. 精神因素

010. 具有支持作用的骨盆底肌肉是

- A. 肛提肌
- B. 会阴深横肌
- C. 尿道括约肌
- D. 坐骨海绵体肌
- E. 肛门外括约肌

011. 缓解偏头痛的首选药物是

- A. 尼莫地平
- B. 普萘洛尔
- C. 丙戊酸钠
- D. 阿米替林

E. 曲普坦

012. 初产妇，妊娠 42+5 周，既往月经规律，一般情况下不会出现

- A. 羊水增多
- B. 羊水粪染
- C. 胎儿生长受限
- D. 胎儿过熟
- E. 巨大胎儿

013. 精神分裂症常见的幻觉是

- A. 运动幻觉
- B. 视幻觉
- C. 听幻觉
- D. 触幻觉
- E. 嗅幻觉

014. 对有神经系统症状的营养性巨幼贫患儿，最重要的治疗措施是

- A. 口服维生素 B₁₂
- B. 肌内注射维生素 B₁₂
- C. 口服叶酸
- D. 口服葡萄糖酸钙
- E. 口服铁剂

015. 对于淋病引起的子宫颈炎治疗错误的是

- A. 常选用头孢曲松钠
- B. 同时应用抗衣原体药物
- C. 单次、大剂量治疗
- D. 性伴侣同时治疗
- E. 及时足量规范化

016. 与绝经综合征内分泌相关，不正确的是

- A. AMH 下降
- B. 孕酮下降
- C. 雌激素波动大
- D. GnRH 下降
- E. FSH 明显升高

017. 出生半年后才能打的疫苗是

- A. 乙肝
- B. 卡介苗
- C. 麻腮风
- D. 脊髓灰质炎
- E. 白百破

018. 颅前窝骨折最易损伤的脑神经是

- A. 面神经
- B. 嗅神经
- C. 视神经
- D. 听神经
- E. 动眼神经

019. 属于临产的标志是

- A. 规律渐强式宫缩
- B. 阴道流血
- C. 胎儿下降感
- D. 羊水早破
- E. 不规则宫缩

020. 患者左侧 T5 以下深感觉障碍，右侧 T7 以下痛温觉消失，病变部位是

- A. 左侧 T5 脊髓损伤
- B. 右侧 T5 脊髓损伤
- C. 左侧 T7 脊髓损伤
- D. 右侧 T7 脊髓损伤
- E. 脊髓震荡

021. 原发性三叉神经痛首选的药物是

- A. 氯硝西洋
- B. 左乙拉西坦
- C. 乙琥胺
- D. 卡马西平
- E. 托吡酯

022. 小儿，血钠 125mmol/L，血压稍下降，精神尚可，皮肤弹性差，考虑其脱水类型为

- A. 中度低渗性脱水
- B. 重度低渗性脱水

2022 年临床执业历年真题

- C. 轻度低渗性脱水
- D. 中度等渗性脱水
- E. 中度高渗性脱水

023. 糖尿病 II 型数年双下肢阵发性刺痛, 考虑周围神经病变, 行什么检查

- A. 心电图
- B. 肌电图
- C. 下肢血管彩超
- D. 腰椎 CT
- E. 磁共振

024. 卵巢分泌的激素是

- A. 催乳素
- B. 促黄体生成素
- C. 卵泡刺激素
- D. HCG
- E. 孕激素

025. 重症肌无力禁用的药物是

- A. 新斯的明
- B. 糖皮质激素
- C. 丙种球蛋白
- D. 维生素 C
- E. 氨基糖苷类抗生素

026. 传统配方口服补液盐的张力

- A. 等张
- B. 1/2 张
- C. 1/3 张
- D. 1/5 张
- E. 2/3 张

027. 不是 I 型子宫内膜癌的高危因素

- A. 高血压
- B. 糖尿病
- C. 肥胖
- D. 多产
- E. 绝经延迟

028. ICD-10 里抑郁症的标准日期至少

是多久

- A. 1 天
- B. 7 天
- C. 2 周
- D. 21 天
- E. 30 天

029. 早期佝偻病的实验室检查指标下降是

- A. 血钙
- B. 血磷
- C. 血清 25-(OH)D₃
- D. 碱性磷酸酶
- E. 甲状旁腺素

030. 婴儿前囟凹陷常见于

- A. 甲减
- B. 佝偻病
- C. 脱水
- D. 婴儿脑膜炎
- E. 病毒性脑炎

031. 婴幼儿发育最快的时期是

- A. 新生儿期
- B. 婴儿期
- C. 幼儿期
- D. 学龄前期
- E. 学龄期

032. 从左到右反流的先天性心脏病出现艾森曼格综合征, 出现的症状为

- A. 乏力, 出汗
- B. 持续性青紫
- C. 发育生长迟缓
- D. 心尖上翘
- E. 体重下降

033. 女, 42 岁, 左眼睑下垂 3 天, 突发剧烈头痛 1 小时, 伴恶心、呕吐。查体: 神情语利, 左睑下垂, 遮盖瞳孔, 左眼瞳孔扩大, 对光反射消失, 眼球处

于外展位，内收及上下视受限。该患者最可能发生的情况是

- A. 重症肌无力
- B. 短暂性脑缺血发作
- C. 蛛网膜下腔出血
- D. 脑内出血
- E. 硬膜下血肿

034. 男，43岁，三月前驾车发生交通事故其妻子死于车祸，本人受轻伤，两月来夜间反复梦见车祸现场，不敢看电视报道，不敢驾车，精神萎靡，终日酗酒，对该患者的诊断是

- A. 抑郁症
- B. 焦虑症
- C. 创伤后应激障碍
- D. 急性应激障碍
- E. 适应障碍

035. 女，35岁，人流术后闭经1年余，孕激素试验和雌孕激素序贯试验均阴性，体温监测为双相型，最可能的是

- A. 下丘脑性闭经
- B. 垂体性闭经
- C. 子宫性闭经
- D. 卵巢性闭经
- E. 大脑皮层功能失调性闭经

036. 初产妇，26岁，顺产后3天。查体：T37.8℃，P60次/分。阴道流出血性恶露，无异味。会阴切口略红，无渗出。宫底平脐，无压痛。双侧乳房胀痛。该产妇体温略高于正常的原因可能是

- A. 泌乳热
- B. 产后体温调节功能失调
- C. 会阴切口感染
- D. 急性乳腺炎
- E. 子宫内膜炎

037. 男性，55岁，大量饮酒20余年，

2天前停止饮酒，肢体粗大震颤，不认识家人，夜间吵闹，自称墙上有鬼，索要他性命，有时大吼，并伴挥拳，最可能的诊断是

- A. 酒精性痴呆
- B. 酒精性幻觉症
- C. 震颤谵妄
- D. 柯萨可夫综合征
- E. 酒精性妄想

038. 女，2岁，喂养困难，气促多汗，生长落后，查体：双肺呼吸音粗，律齐，胸骨左缘第二肋间可闻及响亮的粗糙机器音，心电图示：左室肥厚，最可能的诊断是

- A. 动脉导管未闭
- B. 房间隔缺损
- C. 室间隔缺损
- D. 法洛四联症
- E. 肺动脉狭窄

039. 男，25岁，车祸后四肢麻木无力2天。查体神志清楚，四肢肌力3级，肌张力增高。颈4以下的深浅感觉减退。最可能损伤的部位是

- A. 颈膨大以下颈髓
- B. 脑实质
- C. 胸髓
- D. 腰骶膨大
- E. 颈膨大及以上颈髓

040. 女性，1岁，间断抽搐2天，近来多汗，反复惊厥，查体：T36.5℃，可见枕秃，方颅，实验室检查血糖3.2mmol/L，钙1.7mmol/L，镁1.0mmol/L，磷1.2mmol/L。该患儿最可能的诊断

- A. 低镁血症
- B. VitD3缺乏性手足搐搦症
- C. 婴儿痉挛

D. 低血糖症

E. 甲状旁腺激素减退

041. 女，25岁，痛经3年，加重半年，不孕2年，双合诊见阴道后穹窿蓝紫色结节，双附件未扪及肿大，最可能的诊断为

A. 子宫内膜异位症

B. 子宫腺肌病

C. 盆腔炎后遗症

D. 卵巢癌转移

E. 子宫内膜癌

042. 女性，28岁，外阴瘙痒伴阴道豆腐渣样物3天，2周前人工流产后，术后发热，静滴头孢曲松10天，外阴阴道瘙痒最可能的直接原因是

A. 宫腔操作至病原体感染

B. 阴道局部黏膜潮湿

C. 术后发热阴道Ph升高

D. 流产后雌激素下降

E. 乳杆菌生长受抑制

043. 男，30岁，一年前开始在公共场合用餐时，担心有人注视自己，怕自己出丑，因此不敢再动筷子吃饭，心跳加速，手抖出汗，此后，常回避公共用餐及其他人场合，患者知道自己的害怕是不必要的，但是不能自控，最可能的诊断是

A. 躯体形式障碍

B. 精神分裂症

C. 社交焦虑障碍

D. 创伤后应激障碍

E. 强迫障碍

044. 女，36岁，乏力，头晕，月经量明显增多半年，血常规Hb46g/L，红细胞 $4.6 \times 10^9/L$ ，WBC $8.9 \times 10^9/L$ ，Plt $89 \times 10^9/L$ 。急诊输悬浮红细胞50ml时突发寒战，高热，腰痛，伴心慌气短，尿色深，呈酱油色，导致该患

者出现上述情况的原因不可能是

A. 患者存在溶血性疾病

B. 输血时血液处理不当

C. 患者尿路结石发作

D. 血型不合输血

E. 血液保存不当

045. 女孩，两岁，自幼智力运动发育迟缓，刚能独立行走。查体，身高80cm，体重10kg，眼距宽，通贯手，眼外侧上斜，明确诊断首选的检查是

A. 骨龄测定

B. 血清T₃，T₄，TSH

C. 染色体核型

D. 尿三氯化铁

E. 血氨基酸分析

046. 男婴，6个月，平时多汗，夜间惊醒哭闹，足月顺产，人工喂养，T_{36.6}°，P128/分，枕秃明显，无颅骨软化，前囟2厘米，双肺呼吸音清，心率齐，有力，各瓣膜正常，腹软，肝肋下1厘米，早期检查的结果是什么

A. 磷下降

B. 碱性磷酸酶升高

C. 钙下降

D. 长骨X线异常

E. 25(OH)D₃下降

047. 男，3岁，咳嗽间断发热半月，1月前患麻疹，预防接种不详，T_{37.6}°，P110次/分，R22次/分，双肺正常，律齐，腹软，无压痛，胸部X线右上肺片状阴影，右肺门影增浓，边缘模糊，结核菌素48~72小时红肿10mm，硬结3mm。引起该症状的原因是

A. 接种卡介苗正常阳性

B. 结核菌素失效阴性

C. 未感染结核分枝杆菌呈阳性

D. 免疫抑制导致的假阴性

E. 感染结核阳性

048. 男, 57 岁, 1 天前就餐时突然右上肢无力, 不能握拳, 20 分钟后正常, 反复 3 次, 每次 10~30 分钟缓解, BP150/90mmHg, 神经系统无阳性。最可能的诊断为

- A. 短暂性脑缺血
- B. 脑出血
- C. 脑梗死
- D. 蛛网膜下腔出血
- E. 局灶癫痫发作

049. 患者女, 16 岁, 不可自控的间断性大量饮食、情绪不稳半年, 早期大量饮食后担心发胖主动刺激咽部诱发呕吐, 后期大量进食后不用催吐亦呕吐, 体重无明显减轻, 月经不规律, 坚持上学。查体及实验室检查无阳性结果。胃镜检查示浅表性胃炎, 该患者的主要诊断是

- A. 浅表性胃炎
- B. 双相障碍
- C. 神经性呕吐
- D. 神经性厌食
- E. 神经性贪食

050. 男性, 10 岁, 诊断为肾病综合征, 使用足量泼尼松治疗 3 周, 复查尿蛋白(++~+++), 目前首选的治疗方法是

- A. 加用环磷酰胺治疗
- B. 甲泼尼龙冲击治疗
- C. 继续足量泼尼松治疗
- D. 增加泼尼松剂量继续口服
- E. 减少泼尼松剂量继续口服

051. 患者, 女, 31 岁, 阴道分泌物增多 3 天, 妇科查体阴道黏膜充血, 阴道分泌物呈稀薄脓性泡沫状, 阴道分泌物检查最可能的结果是

- A. 涂片可见芽孢和菌丝
- B. 核酸扩增实验衣原体阳性

C. 涂片见中性粒细胞内含革兰阴性双球菌

- D. 悬滴法发现阴道毛滴虫
- E. 暗视野显微镜发现螺旋体

052. 女婴, 9 月, 呕吐腹泻 2 天, 发热 1 天, 大便 5~6 次/天, 蛋花汤样, 无臭味, 无脓血, 哭有泪, 尿减少, 查体: 体温 36.5℃, 心率 128 次/分, 呼吸 30 次/分, 精神好, 前囟平坦, 皮肤弹性尚可, 腹软, 肠鸣音正常, 最可能的诊断是

- A. 轮状病毒肠炎
- B. 产毒性大肠杆菌肠炎
- C. 生理性腹泻
- D. 侵袭性大肠杆菌肠炎
- E. 真菌性肠炎

053. 女, 32 岁, 继发性痛经伴经量增多 4 年, 妇科检查子宫后位, 呈孕 10 周大小, 活动欠佳, 双附件未触及异常, 最可能诊断是

- A. 子宫肉瘤
- B. 子宫腺肌病
- C. 子宫肌瘤
- D. 子宫内膜异位症
- E. 子宫内膜炎

054. 女, 4 岁, 生长发育正常, 根据骨龄简易计算方法, 其腕部骨化中心的数目为

- A. 7
- B. 3
- C. 4
- D. 6
- E. 5

055. 女, 32 岁, 妊娠 40 周, 腹痛 8 小时, 宫缩 60s/3~4min, 枕左后位, 宫口开 3cm, S+3, 阴道可见胎头, 胎儿心率 110 次, 突发阴道流液, 胎头下方

掉出条索状物，此时正确的处理是

- A. 调转体位观察
- B. 上抬胎头，同时剖宫产
- C. 上抬胎头观察
- D. 上抬胎头静滴缩宫素
- E. 上抬胎头，同时还纳条索状物

056. 男，45 岁，右眼睑下垂伴复视 2 月，既往有蛛网膜下腔出血病史，查体，右眼外斜，瞳孔变大，对光反射阴性，增强 CT 提示，鞍区有一直径 0.5cm 圆形高密度影，无脑水肿表现。首先考虑的诊断是

- A. 鞍旁脑膜瘤
- B. 鞍叶脑脓肿
- C. 颈内动脉-后交通动脉瘤
- D. 鞍叶胶质瘤
- E. 三叉神经鞘瘤

057. 女，29 岁，结婚 3 年未避孕未孕，月经无痛，实验室检查外阴发育正常，阴道通畅。子宫大小正常，质中，无压痛，未触及包块，连续 3 年体温呈单相型，TSH 3.2 μ /l，不孕的原因为

- A. 子宫颈因素
- B. 宫颈管因素
- C. 甲状腺因素
- D. 子宫体因素
- E. 排卵功能障碍

058. 女，55 岁，间断上腹部隐痛 1 年，消瘦半年，Hb59g/l，WBC 6.8×10^9 /L，plt 160×10^9 /L，胃镜检查提示胃癌，拟行胃癌根治术，完善术前输血相关血清学检查，不包括

- A. Rh 血型鉴定
- B. ABO 血型鉴定
- C. 交叉配血试验
- D. 血小板抗体筛查
- E. 不规则抗体筛查

059. 男，27 岁，脑外伤 2 小时，伤后 2 分钟清醒，清醒后立刻给家人打电话，但无法描述受伤原因。神经检查无阳性，头颅 CT 大致正常。最可能诊断是

- A. 脑挫裂伤
- B. 脑震荡
- C. 硬膜下血肿
- D. 硬膜外血肿
- E. 脑出血

060. 产妇，腹痛 6 小时，宫口开大 4cm，宫缩 40s/6~7min，胎心 154 次/分，胎膜未破，胎儿骶左前，S+1，宫口可触及胎足，接下来的处理是？

- A. 剖宫产
- B. 静滴缩宫素
- C. 观察待自然分娩
- D. 破膜
- E. 臀位助产

061. 男性 52 岁，排尿间断性中断，阴茎头部疼痛，转换体位可缓解排尿困难，最可能的诊断是

- A. 膀胱结石
- B. 前列腺增生
- C. 尿道炎
- D. 急性细菌性膀胱炎
- E. 肾积水

062. 男，53 岁，下火车之后感觉有一场针对自己的大阴谋正在实施，原因是看到人都在往出站口跑，此现象最可能属于

- A. 原发性妄想
- B. 继发性妄想
- C. 谵妄
- D. 失神发作
- E. 错觉

063. 女，28 岁，剖宫产术后 4 个月，哺乳期月经未恢复，首选的避孕措施是

- A. 宫内节育环
- B. 口服复方避孕药
- C. 避孕套
- D. 安全期避孕
- E. 紧急避孕药

064. 女，63 岁，因卵巢肿瘤行手术治疗，术中见左卵巢囊实性肿物，内壁有质脆乳头，病理切片可见砂粒体，为进行病情监测和疗效评估，最常用的肿瘤标志物是

- A. AFP
- B. HCG
- C. CA125
- D. CA199
- E. E2

065. 女，35 岁，妊娠 22 周，腹痛两周，加重伴发热一天无阴道流血，既往子宫肌瘤病史五年查体，未触及宫缩，B 超示子宫前壁一个十厘米实性凸起，最可能诊断是

- A. 子宫肌瘤合并感染
- B. 子宫肌瘤合并肉瘤样变
- C. 子宫肌瘤合并玻璃样变
- D. 子宫肌瘤合并红色样变
- E. 子宫肌瘤合并囊性变

066. 女，16 岁，月经不规律，近半年月经量增多，无痛经，基础体温单相型，盆腔 B 超子宫及双附件阴性，最可能诊断为

- A. 子宫内膜炎
- B. 黄体功能不良
- C. 黄体萎缩不全
- D. 无排卵性子宫异常出血
- E. 子宫腺肌病

067. 25 岁女性，已婚。停经 36 天，平素月经规律。下列符合该孕妇妊娠生理状态的是

- A. 黏液镜下可见羊齿状结晶
- B. 尿妊娠试验阳性
- C. 双合诊可见黑加征
- D. 子宫增大为非孕时的 3 倍
- E. 出现严重的早孕反应

068. 女，57 岁，反复发作右侧脸颊及上唇剧痛，疼痛频繁，每次持续数秒钟，刷牙洗脸进食均可诱发，神经系统查体无异常。该患者最可能的诊断是

- A. 丛集性头痛
- B. 偏头痛
- C. 三叉神经痛
- D. 上颌窦炎
- E. 面神经麻痹

069. 女婴，1 月，出生史 42 +3 周，出生后母乳喂养，吮吸及喂养差，腹胀便秘，少哭且哭声低，体重 4.1kg，皮肤轻度黄染，脐膨隆，肌张力低。其最有可能的诊断是

- A. 先天性甲状腺功能减退症
- B. 骨软骨发育不良
- C. 黏多糖贮积病
- D. 唐氏综合征
- E. 先天性巨结肠

070. 女，52 岁，停经两年，阴道流血十天。既往有高血压，糖尿病史。查体阴道及宫颈未见异常，子宫体稍增大。检查子宫内膜厚 1.1cm，血流增强。为明确诊断，进一步的检查

- A. CA125
- B. 分段诊刮
- C. 宫颈细胞学检查
- D. 宫腔镜
- E. 阴道镜

071. 女，1 岁 8 个月。间断发热 20 天，抽搐 1 次。查体：体温 37.6℃，P120 次/分，肝肺查体未见异常，脾肋

下 2cm，腹软，颈抵抗(+)，克氏征(+)。脑脊液检查无色，白细胞 $260 \times 10^6/L$ ，中性粒细胞 0.4，淋巴细胞 0.6，糖原 1.8mmol/L，氯化物 108mmol/L，最可能的诊断是

- A. 病毒性脑膜炎
- B. 结核性脑膜炎
- C. 中毒性脑病
- D. 化脓性脑膜炎
- E. 新型隐球菌脑膜炎

072. 男，25 岁。尿道口不适 5 天，晨起尿道口可见薄层分泌物附着。发病 2 周前曾有不洁性交史。查体：尿道口轻度红肿，挤压龟头尿道口可见少许浆液性分泌物。最有可能的诊断是

- A. 淋病
- B. 生殖道衣原体感染
- C. 生殖道疱疹
- D. 软下疳
- E. 硬下疳

073. 一岁女婴，反复发热、恶心 5 天，喷射性呕吐一次，克氏征阳性，脑脊液检查 WBC: $600 \times 10^9/L$ ，N:0.8，L:0.2，蛋白 2g/l，糖 1.8mmol/l，氯化物 106mmol/l，考虑诊断为

- A. 化脓性脑膜炎
- B. 结核性脑膜炎
- C. 中毒性脑病
- D. 隐球菌性脑炎
- E. 病毒性脑炎

074. 女，10 岁，晨起眼睑水肿加重 3 天，尿液浓茶色，半月前曾患猩红热，查体 P110 次/分，BP135/90mmHg，眼睑水肿，肝肋下 1cm，压痛(+)，血肌酐 $400 \mu\text{mol/L}$ 。患者不宜使用的药物为

- A. 氢氯噻嗪
- B. 甘露醇
- C. 青霉素

- D. 呋塞米
- E. 硝苯地平

075. 女，30 岁，半年行动退化，个性多疑，自觉有敌对公司监视，家里有监视器，窃听器，把家里墙板沙发拆掉没有发现，仍觉得有人监视，觉得家人被收买，在菜里下毒，自己买方便面吃，经常自言自语，突然大笑，考虑诊断

- A. 精神分裂症
- B. 妄想障碍
- C. 强迫障碍
- D. 分离障碍
- E. 躁狂发作

076. 初产妇，妊娠 38 周。骨盆外测量耻外径 19.5cm 棘间径 25cm，骶间径 28cm，坐骨棘间径 9cm 坐骨结节间径 7.5cm。该孕妇的骨盆应诊断为

- A. 女性骨盆
- B. 漏斗骨盆
- C. 猿人骨盆
- D. 扁平骨盆
- E. 均小骨盆

077. 女，22 岁，不规则阴道流血 10 天。产后八个月，血 hCG(+)，B 超显示回声不均匀区域，胸部 X 线显示双肺中下区域棉球状阴影，首选治疗措施是

- A. 化疗
- B. 免疫治疗
- C. 中药治疗
- D. 放疗
- E. 手术治疗

078. 女，57 岁，阴道口脱出肿物 2 个月。妇科：阴道可见宫颈及部分宫体，阴道前后壁均有轻度膨出。既往有高血压，糖尿病。药物控制血压、血糖较平稳。患者适合的治疗方案是

- A. 放置宫颈托

- B. 阴道前后壁修补术及主韧带缩短术
- C. 经阴道全子宫切除及阴道前后壁修补
- D. 阴道全封闭术
- E. 宫颈部分切除及阴道前后壁修补

079. 女，25岁，争吵后右肢活动不便，言语不利两小时，病后无呕吐头痛，十年前曾患风湿热，查体，BP 120/60mmHg，神志清醒，颈软，心率绝对不齐，二尖瓣舒张期杂音，运动性失语，右侧中枢面舌瘫，右侧肌力0~2级，张力低，头颅CT未见异常，最可能的诊断为

- A. 缺血性卒中
- B. 蛛网膜下腔出血
- C. 转换障碍
- D. 低血糖
- E. 脑出血

080. 女，50岁，头痛呕吐2周，发作性抽搐3次，5年前行右乳腺癌根治术，头颅CT示左额大片低密度影，占位明显，首先考虑诊断

- A. 脑炎
- B. 脑膜瘤
- C. 脑膜炎
- D. 脑梗死
- E. 转移性脑瘤

081. 女，29岁，G1P1，足月顺产，5天前出现高热，3天前出现腹痛腹胀等。查体：T39.8℃，BP80/50mmHg，肺部湿啰音，意识模糊，全腹压痛反跳痛肌紧张，最可能的疾病是

- A. 盆腔炎
- B. 阴道炎
- C. 宫颈炎
- D. 阑尾炎
- E. 感染性休克

082. 男，52岁，刚进屋时看见一人

影，以为家人回来了，开灯一看是衣帽架，该现象是

- A. 幻觉
- B. 错觉
- C. 妄想
- D. 精神分裂
- E. 躯体障碍

083. 足月产，宫口开全，S+3，胎心率90/分，出现晚期减速，此时应采取的措施为

- A. 立刻剖宫产
- B. 观察
- C. 静滴缩宫素
- D. 硫酸镁静滴
- E. 产钳助产

084. 小儿，18个月，高热，持续抽搐15分钟，未缓解，首选的药物是

- A. 地西洋
- B. 苯妥英钠
- C. 苯巴比妥
- D. 物理降温
- E. 糖皮质激素

085. 女，1个月。出生体重3500g，呕吐1周。生后3周左右开始溢乳，逐日加重，呈喷射性呕吐，奶汁带凝块，不含胆汁。查体体重3500g，皮肤轻度黄染，前囟稍凹，心肺无异常，上腹部蠕动波，右季肋下肿块，质较硬，光滑，移动。最可能的原因是

- A. 先天性肥厚性幽门梗阻
- B. 先天性肠扭转不良
- C. 先天性巨结肠
- D. 胃扭转
- E. 十二指肠瘀滞症

086. 初孕妇，平素月经规则，现停经32周。近3周体重无明显增加，宫高23cm。B超提示羊水过少(羊水指数为

63mm)，生物物理评分未见呼吸运动。
本例的处理方案是

- A. 立即终止妊娠
- B. 待其足月后立即终止妊娠
- C. 待其自然分娩
- D. 待其 34 周立即终止妊娠
- E. 积极促胎肺成熟后终止妊娠

087. 初产妇，28 岁，足月临产，宫口全开 3 小时，宫缩 20 秒/7~8min，枕左后，S+3，胎心监护：胎心基线平稳，胎心为 150 次/分，骨盆正位。目前情况如何处理

- A. 手法逆时针 90 度旋转后产钳助产
- B. 手法顺时针 90 度旋转后等候
- C. 积极剖宫产
- D. 静滴缩宫素
- E. 密切监护，暂不做处理

088. 女，36 岁，发作性喘息，呼吸困难，再发加重 1 小时，既往氨茶碱可缓解，查体精神萎靡，体温 37.1℃，脉搏 128 次/分，RR:36 次/分，鼻翼煽动，双肺呼吸音粗，可闻及广泛哮鸣音，参与该病的物质有

- A. IL10
- B. IL4
- C. IL12
- D. IL2
- E. IL1

089. 女孩，2 岁，自幼智力运动发育迟缓，刚能独立行走查体：身高 80cm，体重 10kg，眼距宽，通贯手，眼外侧上斜，为明确诊断，首选的检查是

- A. 听力测试
- B. 胸部 X 线
- C. 染色体
- D. 肝功能
- E. b 超超声

090. 女，29 岁，痛经 3 年，镜下宫底和直肠子宫陷凹可见黑褐色出血点，可诊断为什么

- A. 盆腔结核
- B. 盆腔淤血综合征
- C. 腹膜间皮瘤
- D. 盆腔炎症后遗症
- E. 子宫内膜异位症

091. 女性，29 岁，孕 40 周。宫缩 3 小时，宫口开 6cm。破膜后突发呼吸困难，发绀，大汗淋漓，烦躁不安，数分钟后死亡。最可能的诊断为

- A. 前置胎盘
- B. 先兆流产
- C. 癫痫
- D. 羊水栓塞
- E. 先兆子宫破裂

092. 女，32 岁，最近数月一直耳闻入语声，讲“要抓他”，非常害怕，病人称：“家中有窃听器、摄像机，马路上有入跟踪，自己完全被控制了。”该患者最可能诊断为

- A. 思维散漫
- B. 被控制感
- C. 被害妄想症
- D. 错觉
- E. 关系妄想

093. 男 16 岁，近半年对他人不关心，对自己的事情也不关心，对成绩下降感觉没关系，疏于自理卫生，对老师和家长的劝说也无所谓，属于

- A. 情感低落
- B. 情感不稳
- C. 情感倒错
- D. 情感淡漠
- E. 情感矛盾

094. 初产妇，25 岁，妊娠 38 周，产科

检查:宫口开全,宫缩 40 次/分,胎心 100 次/分,羊水 III 度,正常骨盆,头先露, S=+3, 首选的治疗措施

- A. 继续观察自然分娩
- B. 静脉滴注缩宫素
- C. 产钳助产
- D. 应用镇静剂
- E. 剖宫产

095. 新生儿, 生后 15 天, 拒乳, 反应差 2 天, 黄疸 1 天, 颈部, 前胸部可见多个脓疱, 皮肤黄染呈中度, 肝脏肋下 2.5cm, 脾脏肋下 1.5cm, 可诊断为

- A. 新生儿颅内出血
- B. 新生儿败血症
- C. 新生儿核黄疸
- D. 感染性肺炎
- E. 新生儿寒冷综合征

096. 男孩, 2 岁, 出生半年之后出现口唇青紫, 活动后更加明显, 胸部 X 线片提示“靴形心”阴影, 家长发现小孩会行走后时常有下蹲动作, “下蹲”所产生的结果是

- A. 右向左分流减少
- B. 循环阻力下降
- C. 右心室压力增加
- D. 左心室压力下降
- E. 心脏前负荷增加

097. 男性, 71 岁, 行动缓慢 3 年, 近期右上肢无力, 右手震颤, 肢体肌张力上升, 呈齿轮样, 头核磁未见异常, 最可能的诊断为

- A. 动脉硬化
- B. 豆状核变性
- C. 阿尔兹海默症
- D. 帕金森
- E. 扭转痉挛

098. 女性, 40 岁, G3P1, 现在孕 18

周。既往体健, 10 年前阴道产一男婴, 现体健。有关唐氏综合征的检查, 最合适产前检查的技术是

- A. 无创性产前检查
- B. 羊膜腔穿刺术
- C. 超声了解颈项厚度 (NT)
- D. 脐带穿刺术
- E. 母体血清检查

099. 女, 18 周, 发热 1 天抽搐 1 次, 发作 15 分钟无缓解送急诊, 查体: 体温 39.5℃, 无意识, 双眼上翻, 四肢抽搐。现首选药物是

- A. 口服水合氯醛
- B. 肌注苯巴比妥
- C. 静推苯妥英钠
- D. 静推地西洋
- E. 静推硫喷妥钠

100. 女, 33 岁, G1P0, 妊娠 26+3 周, BMI 28, 空腹血糖 5.0mmol/L, 有家族糖尿病史, 下一步如何处理

- A. 行 OGTT 试验
- B. 复查空腹血糖
- C. 定期产检
- D. 查尿糖
- E. 查尿酮

101. 女, 43 岁, G3P1, 宫底在脐与剑突之间, 胎心 142 次每分, 此时羊水的主要来源是

- A. 胎儿尿液和肺
- B. 胎儿尿液和脐带
- C. 胎儿尿液和皮肤
- D. 胎儿尿液和胎膜
- E. 母体血清和胎儿尿液

A3/A4 型选择题

(102-1~102-2 题共用题干)

男, 29 岁, 2 年前腿部疼痛到医院就诊, 被告知怀疑“骨癌”, 当时出现不

语，行为怪异，摇头晃脑，但逐渐恢复正常，此后骨癌被排除。但患者每遇到不顺心的事，均有类似表现。

102-1. 该患者最有可能的诊断是

- A. 分离(转换)障碍
- B. 创伤后应激障碍
- C. 抑郁障碍
- D. 精神分裂症
- E. 急性应激障碍

102-2. 对该患者最有效的治疗方法是

- A. 物理治疗
- B. 暗示治疗
- C. 抗焦虑药物治疗
- D. 行为治疗
- E. 抗精神药物治疗

(104-1~104-2 题共用题干)

男，50岁，10个月前经领导肯定后出现心情好，自我感觉良好，认为自己能力超群。话多，主动和陌生人打招呼，说话，每天睡2~3小时也没有困倦，经治疗后好转。近1个月女儿离婚后患者心情低落，高兴不起来，话少，自责惭愧，认为自己没有给女儿找到好对象。兴趣减退，活动明显减少。睡眠减退，夜间睡眠差，早醒。有自杀观念。隔空听到人说自己无能，没用。不能正常上班。

104-1. 目前该患者最可能的诊断是

- A. 分裂情感性障碍
- B. 精神分裂症
- C. 应激相关障碍
- D. 双相障碍抑郁发作
- E. 双相障碍躁狂发作

104-2. 该患者主要的治疗措施是

- A. 抗焦虑药
- B. 抗抑郁药
- C. 镇静催眠药
- D. 心境稳定剂
- E. 抗精神药

(106-1~106-2 题共用题干)

女，53岁，3月前坐长途火车时突然出现不认识女儿，并对空气大喊“有蜘蛛”，并出现各种兴奋症状，手舞足蹈，经治疗后好转。1周前得知儿子意外死亡后，感觉总能看到儿子，感觉自责，后面还想要自杀解脱。既往有高血压五年，200/90mmHg。查定向障碍，视幻觉，思维不连贯。高血压加重时症状加重。

106-1. 应诊断为

- A. 双相障碍
- B. 精神分裂症
- C. 脑血管病引起的精神障碍
- D. 躯体疾病引起的精神障碍
- E. 急性应激障碍

106-2. 最有意义的检查是

- A. 头MRI
- B. 脑电图
- C. 脑脊液
- D. 人格测试
- E. 头颅CT

(108-1~108-2 题共用题干)

女孩，1岁，发热伴咳嗽4天，查体T38.8℃，P128次/分，R38次/分，双肺闻及固定的湿啰音，腹稍胀，肝肋下2cm，实验室检查，血WBC 13.5×10^9 /L，N0.72，L0.18。

108-1. 最可能的诊断是

- A. 支气管肺炎
- B. 支气管炎
- C. 大叶性肺炎
- D. 间质性肺炎
- E. 毛细支气管炎

108-2. 假设信息：治疗中患儿呼吸困难加重，呕吐少许咖啡样物。查体P140次/分，R46次/分，严重腹胀，肠鸣音消失，最可能发生的并发症是

- A. 感染性休克

- B. 中毒性肠麻痹
- C. 心力衰竭
- D. 脑性低钠血症
- E. 中毒性脑病

(110-1~110-3 题共用题干)

男, 31 岁。车祸致枕部着地昏迷 1 小时。查体:P60 次/分, R12 次/分, BP170/90mmhg。右侧顶枕部头皮血肿, GSC 评分 7 分, 右侧瞳孔 2mm, 对痛觉刺激无反应。左侧瞳孔 4mm, 瞳孔对光反射消失。患者左侧额颞底部弥漫挫裂伤, 血肿体积约 60ml, 致同侧脑室受压, 中线向右移位 15mm。

110-1. 可能的损伤机制是

- A. 切线性损伤
- B. 加速性损伤
- C. 减速性损伤
- D. 挥鞭伤
- E. 挤压伤

110-2. 最有价值的诊断

- A. 脑 CT
- B. 脑 MRI
- C. 脑电图
- D. 肌电图
- E. 脑血管造影

110-3. 最适宜采取的治疗措施为

- A. 绝对卧床休息
- B. 腰椎穿刺排放脑脊液
- C. 大剂量糖皮质激素
- D. 脑室外引流
- E. 急诊开颅手术

(113-1~113-2 题共用题干)

女, 40 岁, G3P1, 孕 42 周, 规律宫缩 7 小时, 宫口开 7cm, S+3, LOA, 预估胎儿体重 3500g, 胎心率正常, 体温 37.8℃, 血压 140/90mmhg, 心率正常, WBC $15.6 \times 10^9/L$ 。

113-1. 支持产妇产绒毛膜炎诊断的依据是

- A. 血压 140/90mmhg
- B. 体温 37.8 摄氏度
- C. 胎心率正常
- D. 宫口开 7cm
- E. WBC $15.6 \times 10^9/L$

113-2. 入院复测血压 150/90mmhg, 除了应用抗生素还应进行的处理是

- A. 继续观察
- B. 静滴缩宫素
- C. 静滴硫酸镁
- D. 剖宫产
- E. 口服降压药

(115-1~115-3 题共用题干)

女, 38 岁, G2P2, 接触性阴道流血半年, 妇科检查, 外阴阴道无异常, 宫颈糜烂状, 下唇略突起, 宫体正常大小, 双附件区未触及包块, 双合诊双侧宫旁无异常, TCT 检查示 HSIL, 高危型 HPV 阳性。

115-1. 首选的处理

- A. LEEP 手术
- B. 分段诊刮术
- C. 宫腔镜检查
- D. 阴道镜下宫颈活检
- E. 宫颈锥切术

115-2. 若结果示 HSIL(CIN3) 累及腺体, 6 点处为鳞状细胞癌, 局部间质浸润深度 8mm, 分期为

- A. IIA 期
- B. IA 期
- C. IIIA 期
- D. IIB 期
- E. IB 期

115-3. 最适合的手术方式

- A. 广泛性子官切除术+盆腔淋巴结切除术
- B. 宫颈锥切术
- C. 筋膜外全子宫切除术
- D. 改良广泛性子官切除术+盆腔淋巴结

切除术

E. 筋膜内全子宫切除术

(118-1~118-2 题共用题干)

女, 23, 腹痛一周, 发热 2 天, 半月前使用药物流产并清宫。检查 T38.8℃, R19 次/分, BP135/90mmHg。妇科检查, 宫颈光滑, 宫口少量流液, 子宫稍大有压痛。WBC $13.8 \times 10^9/L$, N 0.8。

118-1. 该患者最可能的诊断是什么

- A. 急性宫颈炎
- B. 急性子宫内膜炎
- C. 急性阑尾炎
- D. 急性腹膜炎
- E. 急性膀胱炎

118-2. 该患者最适宜的治疗为

- A. 中药治疗
- B. 手术治疗
- C. 抗感染治疗
- D. 输液治疗
- E. 物理降温

(120-1~120-3 题共用题干)

女婴, 10 个月, 发热咳嗽 5 天, 烦躁呕吐 2 天, 抽搐 2 次。查体 40℃, 嗜睡, 前囟隆起, 呼吸急促, 双肺闻及细湿啰音, 颈无抵抗, 双侧巴氏征阳性, 脑脊液检查, 外观浑浊, 白细胞 $800 \times 10^6/L$, NO.80, LO.20, 蛋白质 2g/L, 糖 1.8mmol/L, 氯化物 102mmol/L, 涂片找菌阴性, PPD 阴性。

120-1. 最有可能的诊断是

- A. 化脓性脑膜炎
- B. 结核性脑膜炎
- C. 中毒性脑病
- D. 热性惊厥
- E. 病毒性脑炎

120-2. 假设信息, 患儿经治疗后好转, 3 日后再次发热, 呕吐, 惊厥发作, 最可能出现的并发症是

- A. 硬膜下积液

B. 脑脓肿

C. 抗利尿激素分泌异常综合征

D. 脑室管膜炎

E. 脑水肿

120-3. 假设信息, 患儿经治疗后好转, 3 日后再次发热, 呕吐, 惊厥发作。首选检查为

- A. 肌电图
- B. MRI
- C. 心电图
- D. 头颅透光检查
- E. 硬膜下穿刺

(123-1~123-2 题共用题干)

男婴, 11 个月, 发热 4 天, 皮疹 1 天。体温波动在 39~40℃, 伴发热, 咳嗽, 声嘶。查体: 颜面, 躯干可见红色斑丘疹, 结膜充血, 口腔黏膜充血且粗糙, 可见细小白点, 双肺闻及少量干啰音。

123-1. 最有诊断价值的临床表现是

- A. 结膜充血
- B. Koplik 斑
- C. 眼鼻卡他样症状
- D. 发热
- E. 皮疹形态

123-2. 对该病治疗不正确的是

- A. 补充维生素 A
- B. 高热可给与退热药物
- C. 静脉糖皮质激素
- D. 呼吸道管理
- E. 躁狂可给与镇静药物

(125-1~125-3 题共用题干)

早产儿, 孕龄 32, 自然分娩, 出生后 2 小时出现呼吸困难, 进行加重。查体面紫, 呻吟, 三凹征阳性, 支气管声低, 未闻及啰音, 腹软, 肝下 2cm。

125-1. 最可能的诊断是

- A. 湿肺
- B. 新生儿溶血

- C. 吸入胎粪性肺炎
- D. 新生儿呼吸窘迫综合征
- E. 产程过长

125-2. X 线的表现最不可能为

- A. 白肺
- B. 颗粒状阴性
- C. 磨玻璃样影
- D. 肺大疱
- E. 支气管充气征

125-3. 该病的发病机制为

- A. 肺表面活性物质缺乏
- B. 肺炎引起
- C. 肺泡液挤出障碍
- D. 宫内缺氧
- E. 宫内窘迫

(128-1~128-2 题共用题干)

2 岁女孩，发热咳嗽 5 天，呕吐 2 天，抽搐 2 次，查体，体温 40 度，双肺闻及湿啰音，前囟膨隆，颈软，双侧巴士征(+)，脑脊液检查，浑浊，白细胞 $800 \times 10^6/L$ ，NO.8，LO.2。蛋白质 2g/L，葡萄糖 1.2mol/L，氯化物 108mmol/L。

128-1. 诊断为肺炎合并

- A. 中毒性脑膜炎
- B. 结核性脑膜炎
- C. 化脓性脑膜炎
- D. 病毒性脑炎
- E. 热性惊厥

128-2. 该患儿治疗后无明显好转，前囟膨大，发热，以下哪项操作不合适。

- A. 物理降温
- B. 静脉注射地西洋
- C. 腰穿放脑脊液
- D. 甘露醇
- E. 呋塞米

(130-1~130-3 题共用题干)

女孩，2 岁，高热四天，温度 39.0~39.8 度，使用青霉素治疗无效。

查体：多形性红斑，手足指端硬性水肿，双眼球结膜充血，颈部淋巴结肿大，口咽部黏膜弥漫性充血，口唇皲裂，舌乳头轮廓突出，血常规 WBC $14 \times 10^9/L$ ，NO.84，血小板 $200 \times 10^9/L$ ，CRP 50mg/L。

130-1. 本病最可能的诊断

- A. 猩红热
- B. 咽结合膜热
- C. 传染性单核细胞增多症
- D. 手足口病
- E. 川崎病

130-2. 对该病预后最有价值的检查

- A. X 线示心脏心影上部扩大
- B. 超声心动图示冠状动脉扩大
- C. 血沉速度快
- D. 抗 EBV-IgM 抗体阳性
- E. 抗角蛋白抗体谱

130-3. 选用什么药物治疗

- A. 青霉素
- B. 伐昔洛韦
- C. 利巴韦林
- D. 丙种球蛋白
- E. 糖皮质激素

(133-1~133-3 题共用题干)

男婴，10 个月，面色苍白 1 个月。出生以来一直母乳喂养。查体发育可，皮肤粘膜苍白，肝肋下 3cm，脾肋下 1cm。实验室检查血 Hb74g/L，RBC $2.8 \times 10^{12}/L$ 。外周血涂片：血细胞大小不等，以小细胞为主，中央淡染区扩大。

133-1. 最可能的诊断是

- A. 生理性贫血
- B. 营养性巨幼细胞性贫血
- C. 地中海贫血
- D. 缺铁性贫血
- E. 肺含铁血黄素沉着症

133-2. 最有助于诊断的检查

- A. 铁代谢

- B. 骨髓活检
- C. 血清维生素 B12 和叶酸
- D. 胸部 X 线片
- E. 血 Hb

133-3. 最主要的治疗

- A. 口服铁剂和维生素 C
- B. 合理营养, 及时添加辅食
- C. 口服维生素 B12 和叶酸
- D. 口服泼尼松
- E. 输血

(136-1~136-2 题共用题干)

女, 26 岁。停经 9 周, 阴道不规律流血 2 周, 阴道检查无异常, 子宫如孕 4 月大。超声示宫腔内充满光点和小囊状强回声。

136-1. 最可能的诊断是

- A. 葡萄胎
- B. 绒癌
- C. 双胞胎妊娠
- D. 妊娠合并子宫肌瘤
- E. 胎盘早剥

136-2. 目前最佳的处理方法是

- A. 清宫术
- B. 化疗
- C. 放疗
- D. 保胎治疗
- E. 全子宫切除术

(138-1~138-2 题共用题干)

女, 30 岁, G2P2。孕 32 周。半夜惊醒突然发现大量阴道流血。急诊至医院后少量阴道流血。查体: 腹软。P: 90 次/分。血压: 108/80mmHg。胎心: 120 次/分。

138-1. 为明确诊断, 最佳的检查

- A. 阴道检查
- B. 产科超声
- C. 双合诊
- D. CRP

E. 查血 hcg

138-2. 以下处理措施哪项是错误的

- A. 检测胎心
- B. 急诊剖腹产
- C. 输血
- D. 促胎肺成熟
- E. 预防感染

(140-1~140-2 题共用题干)

女, 35 岁, G3P1, 妊娠 42+2 周, 既往月经规律。未临产, 6 年前自然顺产一男婴, 人工流产一次, 查体 T36.8°C, P70 次/分, R14 次/分, BP 140/85mmHg。产科检查: 宫高 35cm, 腹围 98cm, 枕先露, 胎头浮, 胎心 140 次/分, 宫颈软, 宫口未开。

140-1. 核对孕周还需要问什么病史

- A. 妊娠反应出现的时间
- B. 胎儿身长
- C. 宫底高度
- D. 估计胎儿体重
- E. 停经时间

140-2. 入院复查 BP150/90mmHg, 尿蛋白阴性, 肾功能正常。NST 反应型。B 超羊水最大深度 4cm, 胎儿估重 3500g。该如何处理

- A. 口服利尿剂
- B. 静滴硫酸镁
- C. 口服降压药
- D. 口服抗生素
- E. 静滴白蛋白

B1 型选择题

(142-1~142-2 题共用备选答案)

- A. 浆液性癌
- B. 无性细胞瘤
- C. 胚胎瘤
- D. 卵黄囊瘤
- E. 未成熟畸胎瘤

142-1. 对放疗敏感的卵巢肿瘤

2022 年临床执业历年真题

142-2. 常伴 AFP 升高的卵巢肿瘤

(144-1~144-3 题共用备选答案)

- A. 猩红热
- B. 水痘
- C. 小儿急疹
- D. 手足口病
- E. 麻疹

144-1. 男孩 2 岁，低热 2 天，轻咳，食欲欠佳，皮肤瘙痒。查体胸腹部见红色斑丘疹及水疱，部分已结痂。考虑诊断为

144-2. 女孩，1 岁。发热 4 天，半天前体温降至正常后出现皮疹。查体：颈部、躯干充血性斑丘疹，结膜无充血，咽稍红，心肺查体无异常。最可能的诊断是

144-3. 女孩，9 岁。发热伴咽痛 2 天，今日全身皮肤出现鲜红色粟粒疹，疹间皮肤充血，咽部充血明显，舌质红，舌壮乳头明显突起于舌苔表面，腋下、肘窝可见帕氏线。最可能的诊断是

(147-1~147-2 题共用备选答案)

- A. 难免流产
- B. 不全流产
- C. 流产合并感染
- D. 先兆流产
- E. 稽留流产

147-1. 停经 40 天，阴道少量流血，B 超示宫内妊娠，胚胎存活，可能的诊断是

147-2. 妊娠 13 周，无不适，体查子宫耻骨联合上未扪及，胎心未闻及，B 超提示胚胎停止发育，胚胎如 8 周大小，最可能的诊断是

(149-1~149-2 题共用备选答案)

- A. 单纯疱疹病毒
- B. 人乳头状瘤病毒
- C. 麻疹病毒

D. 巨细胞病毒

E. HIV

149-1. 男，48 岁，包皮周围反复发作水疱伴痒痛 1 年，劳累后好发，可自行好转，查体可见簇集的粟米大小水疱，疱液清亮，该病的致病原为

149-2. 女，28 岁，外阴赘生物 1 个月，外阴大阴唇鸡冠状赘生物，醋酸白实验阳性，该病是由什么病毒导致

答案

第一单元

1. 答案:D

解析:急性肾损伤(AKI)可根据病因发生的解剖部位分为肾前性、肾性和肾后性三大类。肾性 AKI 的病因以肾缺血和肾毒性物质导致肾小管上皮细胞损伤最为常见,在肾性 AKI 的起始期,肾血流量下降引起肾小球滤过压下降,导致肾小管上皮细胞脱落坏死形成管型,小管液受阻,出现肾小管原尿回漏。

2. 答案:A

解析:马斯洛认为,人的需要有生理的需要、安全的需要、归属与爱的需要、尊重的需要、自我实现的需要五个等级构成。生理的需要是个体生存必不可少的需要,具有自我和种族保存的意义。

3. 答案:C

解析:分级诊疗指按照疾病的轻重缓急及治疗的难易程度进行分级,不同级别的医疗机构承担不同疾病的治疗,逐步实现从全科到专业化的医疗过程。分级诊疗制度内涵即基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动。总的原则是以人为本、群众自愿、统筹城乡、创新机制。鼓励非急症患者到基层医院首诊。

4. 答案:D

解析:医务人员之间相互协作的基础是信任。

5. 答案:C

解析:环状软骨弓平对第 6 颈椎高度,环状软骨板上缘两侧各有一构关节面。在环状软骨弓与板的交界处,两侧各有一圆形的甲关节面,环状软骨的作用是支撑呼吸道,保持其畅通,若损伤会造成喉狭窄。

6. 答案:E

解析:慢性肺源性心脏病时,肺循环阻力增加导致肺动脉高压,右心发挥其代

偿功能,以克服升高的肺动脉阻力而发生右心室肥厚。肺动脉高压早期,右心室尚能代偿,舒张末期压仍正常。随着病情的进展,特别是急性加重期,肺动脉压持续升高,超过右心室的代偿能力,右心失代偿,右心排出量下降,右心室收缩末期残留血量增加,舒张末期压增高,促使右心室扩大和右心衰竭。

7. 答案:B

解析:ABO 血型系统各种抗原的特异性决定于红细胞膜上的糖蛋白或糖脂上所含的糖链。红细胞膜上只含 A 抗原者为 A 型;只含 B 抗原者为 B 型;含有 A 与 B 两种抗原者为 AB 型;A 和 B 两种抗原均无者为 O 型。其中,A 型又分为 A₁ 和 A₂ 型,A₁ 型血所含的抗原为 A+A₁;A₂ 型血所含的抗原为 A。AB 型血分为 A₁ B 和 A₂ B,A₁ B 型血的抗原为 A+A₁ +B,A₂ B 型血的抗原为 A+B。

8. 答案:A

解析:古有扁鹊言“病有六不治”,也就是六种病人他不治。人之所病,病疾多;而医之所病,病道少。故病有六不治:骄恣不论于理,一不治也;轻身重财,二不治也;衣食不能适,三不治也;阴阳并,脏气不定,四不治也;形羸不能服药,五不治也;信巫不信医,六不治也。

9. 答案:C

解析:吸烟可以引发多种疾病,包括心脏病、脑卒中、肺癌和其他癌症,烟草燃烧所产生的一氧化碳是烟草烟雾的主要成分,CO 与血红蛋白结合,不仅降低氧合血红蛋白的数量,同时降低红细胞携氧能力,抑制血红蛋白中氧的释放,从而导致机体处于相对低氧状态,为了应对低氧,红细胞体积和数目代偿性增加,对血管造成损害,进而促进肺癌的产生。

10. 答案:B

解析:三查七对是临床和护理上的一个

名词，三查指的是操作前查、操作中查、操作后查，七对指的是查对床号、查对姓名、查对药名、查对剂量、查对时间、查对浓度、查对用法。

11. 答案:D

解析:蛋白质在高于或低于其 pI 的溶液中成为带电颗粒,在电场中能向正极或负极方向移动。这种通过蛋白质在电场中泳动而达到分离各种蛋白质的技术称为电泳。若蛋白质样品和聚丙烯酰胺凝胶系统中加入带负电荷较多的十二烷基硫酸钠(SDS),使所有蛋白质颗粒表面覆盖一层 SDS 分子,导致蛋白质分子间的电荷差异消失,此时蛋白质在电场中的泳动速率仅与蛋白质颗粒大小有关。

12. 答案:A

解析: $BMI = \text{体重}(\text{kg}) / \text{身高}^2(\text{m}^2)$, 患者的身高 180cm, 体重 72kg, 计算 $BMI = 72 / 1.8^2 \approx 22.22\text{kg}/\text{m}^2$, 属于 $18.5 \sim 24\text{kg}/\text{m}^2$, 根据我国 BMI 标准, 该患者的体质指数为正常。

13. 答案:E

解析:椎内静脉丛,位于椎管内的硬膜外隙中,自枕骨大孔至骶骨尖端连续不断,收纳椎骨、脊髓回流的静脉。椎内、外丛之间互相交通,向两侧注入椎静脉、肋间后静脉及腰静脉。上端穿硬脑膜可与硬脑膜静脉窦沟通;下端可与盆底静脉相交通。

14. 答案:C

解析:常见的嘌呤包括腺嘌呤(简写为 A)和鸟嘌呤(简写为 G), 常见的嘧啶包括尿嘧啶(简写为 U)、胸腺嘧啶(简写为 T)和胞嘧啶(简写为 C)。A、G、C 和 T 是构成 DNA 的碱基, A、G、C 和 U 是构成 RNA 的碱基。互补碱基对包括:A-T、A-U、C-G(AE 错)。其中, A-T 之间形成了两对氢键, C-G 之间形成了三对氢键, 相较于形成两对氢键的 A-T 更为稳定。

15. 答案:A

解析:卫生服务需要:是依据人们的实际

健康状况与“理想健康状态”之间存在差距而提出的对预防、医疗、保健、康复等卫生服务的客观需要。

16. 答案:B

解析:《药品管理法实施条例》第十五条规定:国家实行处方药和非处方药分类管理制度。国家根据非处方药品的安全性,将非处方药分为甲类非处方药和乙类非处方药。

17. 答案:A

解析:胃壁细胞上存在一种氢钾泵,分泌 H^+ 摄入 K^+ , 将 H^+ 分泌到胃液中。胃液中氢离子浓度远远大于胃壁细胞中氢离子浓度,故为逆浓度梯度转运,且离子泵的化学物质是 ATP 酶,可将细胞内的 ATP 水解为 ADP,并非间接利用 ATP,故胃壁细胞分泌 H^+ 的方式为原发主动转运。

18. 答案:A

解析:血小板在生理性止血过程中起到的作用有:释放缩血管物质——使受损小血管收缩。黏着、聚集——形成松软的血小板止血栓。在血液凝固中提供磷脂表面,吸附凝血因子——参与并加速血液凝固,完成生理止血。凝血块中的血小板收缩,引起血块回缩——使凝血块更加坚实。止血后——修复受损的血管内皮。其中最为主要的作用是形成止血栓,达到一期止血。

19. 答案:C

解析:胸腺非依赖性抗原(TI-Ag)在刺激 B 细胞产生抗体时不需要 T 细胞辅助,所以称为 TI-Ag。此类抗原只含有 B 细胞抗原决定基,只活化未成熟 B 细胞,诱导产生抗体仅为 IgM 类。TI-Ag 一般只引起体液免疫应答,不引起细胞免疫应答和回忆应答。如细菌的脂多糖、荚膜多糖及聚合鞭毛素等少数抗原属于此类抗原。

20. 答案:D

解析:根据《医疗机构临床用血管理办

法》规定，临时急性用血的原则有：①危及患者生命，急需输血(A对)；②所在地血站无法及时提供血液，且无法及时从其他医疗机构调剂血液，而其他医疗措施不能替代输血治疗(B对)；③具备开展交叉配血及乙型肝炎病毒表面抗原、丙型肝炎病毒抗体、艾滋病病毒抗体和梅毒螺旋体抗体的检测能力(C对)；④遵守采供血相关操作规程和技术标准(E对)。D选项：临床机构批准不属于临时急性用血的原则。故本题选D。

21. 答案:A

解析:本题中患者使用了大量腌制的腊肉和咸菜后出现消化系统症状，判断出现亚硝酸盐中毒的可能性最大，导致的缺氧类型为血液型缺氧。亚硝酸盐具有强氧化性，使正常的血红蛋白(Fe^{2+})氧化为失去携氧运输能力的高铁血红蛋白(Fe^{3+})。血液性缺氧指血红蛋白(Hb)量或质的改变，导致Hb结合的氧不易释出所引起的缺氧。

22. 答案:B

解析:暗适应是人眼在暗处对光的敏感度逐渐提高的过程。视觉敏感性即眼睛反应刺激物的感觉能力，在暗适应时，人眼的视觉感受性不断升高，相反，明适应时降低。

23. 答案:D

解析:《抗菌药物临床应用管理办法》规定，具有高级专业技术职务任职资格的医师，可授予特殊使用级抗菌药物处方权；具有中级以上专业技术职务任职资格的医师，可授予限制使用级抗菌药物处方权；具有初级专业技术职务任职资格的医师，在乡、民族乡、镇、村的医疗机构独立从事一般执业活动的执业助理医师以及乡村医生，可授予非限制使用级抗菌药物处方权。药师经培训并考核合格后，方可获得抗菌药物调剂资格。二级以上医院应当定期对医师和药

师进行抗菌药物临床应用知识和规范化管理的培训。

24. 答案:D

解析:根据《传染病卫生防治法》要求，将列为法定管理的传染病分为甲类、乙类和丙类三类。根据其暴发、流行情况和危害程度，需要列入乙类、丙类传染病的，由国务院卫生行政部门决定并予以公布。

25. 答案:C

解析:《突发事件应对法》规定，突发事件应对工作实行预防为主、预防与应急相结合的原则。《突发公共卫生事件应急条例》规定，突发事件应急工作，应当遵循预防为主、常备不懈的方针，贯彻统一领导、分级负责、反应及时、措施果断、依靠科学、加强合作的原则。

26. 答案:A

解析:正常成年人安静时，肺通气/血流比值为0.84，当比值大于0.8时，常表示肺过度通气或血流相对不足，肺血栓栓塞时，血流相对不足，故肺通气/血流比值常大于正常。

27. 答案:C

解析:酶分子中有许多化学基团，但它们并非都与酶的活性有关，其中一些与酶的活性密切相关的基团称为酶的必需基团。有些必需基团位于酶的活性中心内，有些必需基团位于酶的活性中心外。酶活性中心内的必需基团的作用是识别与结合底物和辅酶，形成酶-底物过渡态复合物；影响底物中的某些化学键的稳定性，催化底物发生化学反应，进而转变成产物。酶活性中心外的必需基团维持酶活性中心的空间构象和(或)作为调节剂的结合部位所必需。

28. 答案:B

解析:淋巴结窦性组织增生常见于癌肿引流区的淋巴结、淋巴造影后的淋巴结。传染性单核细胞增多症，组织学上

可见增生活跃的淋巴细胞主要分布在副皮质区，滤泡增大。药物过敏反应、化脓性感染、病毒接种不良反应镜下可见淋巴滤泡增生，生发中心扩大。

29. 答案:C

解析:卵巢粘液性囊腺瘤肉眼观, 肿瘤表面光滑, 由多个大小不一的囊腔组成, 腔内充满富于糖蛋白的黏稠液体。

30. 答案:B

解析:正反馈是指受控部分发出反馈信息, 其方向与控制信息一致, 可以促进或加强控制部分的活动, 常见的正反馈包括:排尿反射、排便反射、血液凝固过程、动作电位的形成、分娩过程、排卵前黄体生成素的释放。

31. 答案:E

解析:NADH 和 $FADH_2$ 通过线粒体呼吸链逐步失去电子被氧化生成水, 电子传递过程伴随着能量的逐步释放, 此释能过程驱动 ADP 磷酸化生成 ATP, 所以 NADH 和 $FADH_2$ 的氧化过程与 ADP 的磷酸化过程相偶联, 因而称之为氧化磷酸化。蛋白激酶不直接参与细胞的氧化磷酸化过程, 故不直接影响氧化磷酸化的速率 (E 对)。

32. 答案:C

解析:根据《处方管理办法》, 医疗机构应当对麻醉药品和精神药品处方进行专册登记, 加强管理。麻醉药品处方至少保存 3 年, 精神药品处方至少保存 2 年。

33. 答案:A

解析:良性前列腺增生又称结节状前列腺增生或前列腺肥大, 以前列腺上皮和间质增生为特征。以腺体增生为主的呈淡黄色, 质地较软, 切面可见大小不一的蜂窝状腔隙, 挤压可见奶白色前列腺液体流出; 以纤维平滑肌增生为主者, 色灰白, 质地较韧, 和周围正常前列腺组织界限不清。镜下可见腺体、平滑肌、纤维均增生。

34. 答案:B

解析:伤寒是由伤寒杆菌引起的急性传染病, 全身单核巨噬细胞系统细胞的增生为其病变特征, 增生活跃时巨噬细胞吞噬伤寒杆菌、红细胞和细胞碎片等, 这种巨噬细胞称为伤寒细胞, 伤寒细胞聚集成团, 形成伤寒肉芽肿, 是一种感染性肉芽肿。

35. 答案:E

解析:心理测评的参考指标是常模。常模是可比较的标准, 测试结果需要与常模进行比较, 才能得出结论, 常模相当于心理测评的“参考指标”。

36. 答案:B

解析:髋关节的囊内韧带为股骨头韧带, 股骨头韧带在关节囊里面, 起关节牢固性作用, 为滑膜所包被, 内含营养股骨头的血管。

37. 答案:B

解析:肾上腺素与受体结合后, 通过 G 蛋白(Gs)传递信号, 经过 cAMP-PKA 途径, 活化 PKA, 使多种蛋白质底物的丝氨酸/苏氨酸残基发生磷酸化, 进而发挥生物学效应。

38 答案:E

解析:兴奋-收缩耦联的基本步骤中 JSR 回摄 Ca^{2+} 这一环节:在骨骼肌, 胞质内增加的 Ca^{2+} 几乎全部经激活 LSR 膜中的钙泵而被回摄进 SR 中, 而心肌胞质内的 Ca^{2+} 大部分经 LSR 膜中的钙泵活动被回收, 尚有 10%~20%的 Ca^{2+} 则由肌膜中的 $Na^+ -Ca^{2+}$ 交换体和钙泵排至胞外。因此肌钙蛋白启动肌肉收缩过程。故选 E。

39. 答案:A

解析:公共卫生的核心功能是预防疾病、宣传健康、职业病管理。

40. 答案:D

解析:医学科研的灵魂和科研人员的良心是诚实。廉洁, 是医务人员在医疗活动中需要遵循的道德准则。同情、公

正、勤奋属于一般要求，不属于科研人员的良心。

41. 答案:D

解析:基因工程中的“转化”指外源 DNA 直接导入细菌、真菌的过程，“转染”指外源 DNA 直接导入真核细胞(酵母除外)的过程，由此可见，基因工程中的“转”指的是将目的 DNA 导入受体细胞的过程。

42. 答案:E

解析:肾母细胞瘤又称 Wilms 瘤，起源于后肾胚基组织，为儿童期肾脏最常见的恶性肿瘤，肿瘤质软，切面呈鱼肉状，灰白或灰红色，可有灶状出血、坏死或囊性变。镜下具有肾脏不同发育阶段的组织学结构，细胞成分包括间叶组织的细胞、上皮样细胞和幼稚细胞三种。

43. 答案:D

解析:临床预防—健康咨询和健康促进为主(D 对)。临床预防服务的实施原则包括:①重视危险因素收集(B 错)，②医患双方共同决策(E 错)，③注重连续性，④以健康咨询为先导(A 错)，⑤合理选择健康筛检的内容，⑥根据不同年龄阶段的人群特点开展针对性的临床预防服务。

44. 答案:A

解析:城乡居民大病保险，是在基本医疗保障的基础上，对大病患者发生的高额医疗费用给予进一步保障的一项制度性安排，可进一步放大保障效用，是基本医疗保障制度的拓展和延伸，是对基本医疗保障的有益补充。保障对象为城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗的参保(合)人。保障范围为参保(合)人患大病发生高额医疗费用的情况下，对城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗补偿后需个人负担的合规医疗费用给予保障。

45. 答案:E

解析:传染病防控中，属于切断传播途径的有:消毒、杀虫。隔离病人、医学隔离、治愈病人属于针对传染源的措施。注射疫苗属于针对易感人群的措施。

46. 答案:C

解析:临终关怀的对象是不可逆转的疾病终末期患者(包括其亲属)，特别是难以取得积极治疗效果的晚期肿瘤患者(C 对)等心身遭受痛苦折磨的患者。

47. 答案:B

解析: β_2 受体激动剂可以激动气道的 β_2 受体，舒张支气管，缓解哮喘症状， β_2 受体激动剂主要包括短效 β_2 受体激动剂和长效 β_2 受体激动剂，短效 β_2 受体激动剂包括:沙丁胺醇、特他布林，长效 β_2 受体激动剂包括:沙美特罗、福莫特罗等。

48. 答案:B

解析:呋塞米为抗高血压药，是一种磺胺类利尿剂，通过抑制远端肾小管皮质稀释段的再吸收水与电解质而发挥作用。本药可引起低钾血症，治疗期间应监测血浆钾离子水平，必要时补钾。本药还可引起低钠血症及低氯血症，甚至发生代谢性脑病(临床表现为呕吐、嗜睡、木僵、昏迷和癫痫发作等)。

49. 答案:A

解析:他汀类药物主要对 LDL-C(低密度脂蛋白)的降低作用最强，TC(胆固醇)次之(A 对)，他汀类药物或其代谢产物与底物 HMG-CoA 的化学结构相似，且对 HMG-CoA 还原酶的亲和力比 HMG-CoA 高数千倍，对该酶发生竞争性抑制作用，从而使胆固醇合成受阻。

50. 答案:D

解析:阴离子间隙(AG)是一项受到广泛重视的酸碱指标 AG 是一个计算值，指血浆中未测定的阴离子与未测定的阳离子的差值，正常机体血浆中的阳离子与阴离子总量相等，均为 151mmol/L，从

而维持电荷平衡。血浆中未测定的阳离子包括 K^+ 、 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} ，血浆中未测定的阴离子包括 Pr^- ， HPO_4^{2-} ， SO_4^{2-} 和有机酸阴离子。AG 升高时可帮助区分代谢性酸中毒的类型和诊断混合型酸碱平衡紊乱， $AG > 16 \text{ mmol/L}$ 为判断是否有 AG 增高代谢性酸中毒的界限。

51. 答案:C

解析:卫生法的形式主要包括卫生法律;卫生行政法规;地方性法规的卫生方面规范;卫生政府规章不得与法律、行政法规以及上级和同级地方性法规、自治法规相抵触等。

52. 答案:D

解析:医学心理学是心理学和医学相结合的学科,医学心理学包括了心理范围、社会范围、医学范围。

53. 答案:D

解析:急性左心衰时,缺氧和严重呼吸困难是致命的威胁,必须尽快缓解。缓解肺水肿可以用呋塞米 $20 \sim 40 \text{ mg}$ 于 2 分钟内静脉注射,4 小时后可重复 1 次(D 对)。

54. 答案:D

解析: β 肾上腺素受体阻断药能与去甲肾上腺素能神经递质或肾上腺素受体激动药竞争 β 受体,从而拮抗其 β 型拟肾上腺素作用。它对正常人休息时心脏的作用较弱,当心脏交感神经张力增高时(运动或病理状态),对心脏的抑制作用明显,主要表现为心率减慢,心肌收缩力减弱,心排出量减少,心肌耗氧量下降,血压略降。美托洛尔为 β 受体阻断剂,对 β_1 受体有选择性阻断作用,对 β_2 受体作用较弱。

55. 答案:A

解析:普萘洛尔具有较强的 β 受体阻断作用,对 β_1 和 β_2 受体的选择性很低,无内在拟交感活性。 β 受体拮抗剂对心肌收缩力、窦房结及房室结功能

均有抑制作用,并可增加气道阻力,有一定的降压作用,但在支气管哮喘时禁用,会引起呼气性呼吸困难加重。

56. 答案:A

解析: $P_2 > A_2$, 是肺动脉瓣听诊区第二心音大于主动脉瓣听诊区第二心音。一般情况下,青少年 $P_2 > A_2$, 成年人 $P_2 = A_2$, 而老年人 $P_2 < A_2$ 。肺循环阻力增高或血流量增多时,肺动脉压力增高, S_2 的肺动脉瓣部分(P_2)亢进,可向胸骨左缘第 3 肋间传导,但不向心尖传导,如肺源性心脏病、左向右分流的先天性心脏病(如房间隔缺损、室间隔缺损、动脉导管未闭等)、二尖瓣狭窄伴肺动脉高压等。病理性的 $P_2 > A_2$ 常见于肺血栓栓塞(A 对)、肺源性心脏病、肺动脉高压、室间隔缺损、二尖瓣狭窄时

57. 答案:D

解析:躯体感觉包括浅感觉和深感觉两大类,浅感觉有触-压觉、温度觉和痛觉;深感觉即本体感觉,主要包括位置觉和运动觉。浅感觉的传入纤维进入脊髓后在中央灰质后角换元,第二级神经元发出纤维经白质前连合交叉至对侧,在脊髓前外侧部

上行,形成前外侧索传入系统(D 对 C 错)。脊神经节(A 错)是在脊髓后根有一膨大部分,内含假单极神经元。位于后根入椎间孔处。为深浅感觉传入神经的第一级神经元。内侧丘系(B 错)为第二级神经元发出纤维交叉至对侧组成的。躯体深感觉(即本体感觉)和精细触-压觉的传入纤维进入脊髓后沿后索的薄束和楔束上行至延髓下方的薄束核和楔束核更换神经元(E 错)。

58. 答案:A

解析:子宫内膜癌绝大多数组织学类型为子宫内膜样腺癌(D 对)。浆液性癌(E 对):占 $1\% \sim 9\%$, 恶性程度高。粘液性癌(B 对):约占 5% , 预后较好。透明细胞

癌(C对):占不足5%,恶性程度高,易早期转移。约1/3的子宫内膜样腺癌伴有鳞状细胞分化,但不属于鳞癌。故选A。

59. 答案:B

解析:观察结局的选择最好要有公认的界定标准,如:缓解(A对)等,复发(B错,为本题正确答案)不能作为观察结局,急性淋巴细胞白血病患者用药后,无法进行判断是否复发,故而复发不适合作为本次研究的观察结局。

60. 答案:A

解析:疫苗免疫效果的评价指标包括免疫效果评价指标、流行病学效果评价指标及计划免疫管理评价指标三种。常用效果指数来评级流行病学效果(A对)。

61. 答案:D

解析:破伤风抗毒素是类毒素作用于动物后,动物所产生的免疫抗体,对破伤风外毒素有中和毒素的作用,从而达到预防和治愈效果。破伤风抗毒素主要用于预防和治疗破伤风。破伤风抗原物质刺激动物的免疫系统,多个B细胞克隆被激活,产生多克隆抗体。

62. 答案:C

解析:代谢当量(MET,也称梅脱)指身体活动时的能量消耗与安静坐姿时的能量消耗之比,即相当于安静休息时身体活动的能量代谢水平。

63. 答案:A

解析:三羧酸循环亦称柠檬酸循环,是线粒体内一系列酶促反应所构成的循环反应体系,第一个限速步骤为:乙酰CoA与草酰乙酸缩合成柠檬酸,由柠檬酸合酶催化;第二个限速步骤为:柠檬酸氧化脱羧转变为 α -酮戊二酸,由异柠檬酸脱氢酶催化;第三个限速步骤为: α -酮戊二酸氧化脱羧生成琥珀酰CoA,由 α -酮戊二酸脱氢酶复合体催化。由此得知,三羧酸循环中的关键酶有:柠檬酸合酶、异柠檬酸脱氢酶、 α -

酮戊二酸脱氢酶。

64. 答案:E

解析:衣原体在宿主细胞内才能生长繁殖,但具有独特的发育周期,可观察到两种不同的形态:一种是小而致密的颗粒结构,称为原体;另一种是大而疏松的网状结构,称为网状体。网状体又称始体,以二分裂方式繁殖,在空泡内增殖后形成许多子代原体。

65. 答案:A

解析:二级预防又称为临床前期预防(或症候前期),即在疾病的临床前期作好早期发现、早期诊断、早期治疗的“三早”预防措施。这一级的预防是通过早期发现,早期诊断而进行适当的治疗,来防止疾病临床前期或临床初期的变化,能使疾病在早期就被发现和治理,避免或减少并发症,后遗症和残疾的发生,或缩短致残的时间。这一级预防主要采取病例早期发现,开展疾病筛检,或进行某些特殊体检等方法(A对)。

66. 答案:D

解析:真核生物转录生成的RNA分子是前体RNA,也称为初级RNA转录物,几乎所有的初级RNA转录物都要经过加工,才能成为具有功能的成熟的RNA。加工主要在细胞核中进行。真核前体mRNA经首、尾修饰、剪接和编辑加工后才能成熟。在5'-端加入“帽”结构、3'-端特异位点断裂并加上多聚腺苷酸尾、前体mRNA的剪接主要是去除内含子(D对)。乙酰化修饰(A错)、磷酸化修饰(B错)、在内质网折叠(E错)均属于蛋白质翻译后的加工修饰步骤。高尔基体糖基化修饰(C错)属于糖蛋白分子的修饰步骤。

67. 答案:E

解析:肉毒梭状芽孢杆菌变质肉食品、豆制品及动物肠道中,人食用了变质的牛、羊肉类和发酵的豆、麦制品或罐头等,引起肉毒中毒。

68. 答案:C

解析:自然哲学医学模式:公元前 3 千年前后开始出现。中国传统医学中的阴阳五行学说和“六淫”、“七情”病因学说,一些中医著作中提出“天人合一”、“天人相应”的观点,古希腊医学家希波克拉底的“四体液”学说,“治病先治人”、“一是语言,二是药物”的治疗观,都是这一模式的典型代表。

69. 答案:B

解析:在进食后的一段时间内,即使在安静状态下,也会出现能量代谢率增高的现象,一般从进食后 1 小时左右开始,延续 7~8 小时。进食能刺激机体额外消耗能量的作用,称为食物的特殊动力效应。蛋白质的特殊动力效应约为 30%,糖和脂肪分别为 6%和 4%左右;混合性食物约为 10%。因此十五特殊动力最高的是蛋白质。

70. 答案:C

解析:心理治疗中,医生和患者的桥梁是医生和患者的良好关系。

71. 答案:C

解析:本题中将受试者分为两组,分别用不同方法进行测试,比较两种方法检测结果有无差别,最适用的检验方式为配对设计的 t 检验。

72. 答案:A

解析:健康促进是健康、教育、经济、政治、社会等有组织行动的组合,对环境、立法、组织、社区和个人等各个方面进行干预,从而改善人们的态度、社会和物质的健康支持性环境,提高人们的健康水平和福祉。本题中规定“吸烟者不可领奖学金,不得参与学生会”属于是学校层面对吸烟者的干预,通过一些规定,来促使吸烟者戒烟。

73. 答案:D

解析:完全随机设计,是一种将实验对象随机分配到不同处理组的单因素设计

方法。该设计只考察一个处理因素,通过对该因素不同水平组间均值的比较,推断该处理因素不同水平之间的差异是否具有统计学意义。其中总变异自由度 $V_{总}=n-1$,组间变异自由度 $V_{组间}=k-1$,组内变异自由度 $V_{组内}=n-k$ 。则该样本中, $V_{总}=30-1=29$; $V_{组间}=3-1=2$; $V_{组内}=30-3=27$ 。

74. 答案:C

解析:人体的压力感受性反射的感受器位于颈动脉窦和主动脉弓血管外膜下的感觉神经末梢。压力感受器并不直接感受血压变化,而是感受血管壁所受到的机械牵张刺激。颈动脉窦压力感受器的传入神经纤维组成窦神经,压力感受器的传入冲动到达延髓后,使交感神经紧张降低,使迷走神经紧张增强。当从卧位转为直立位时,受重力影响,血压降低,对压力感受器血管壁的牵拉刺激减低,窦神经传入冲动减少,导致交感神经传出增强,迷走传出减弱,心率升高(C对)。

75. 答案:A

解析:患者在家用煤气热水器洗澡(急性一氧化碳中毒的常见病因)时晕倒,口唇樱桃红色(急性一氧化碳中毒的典型表现),综合分析,引起该症状最可能的气体是 CO(A对)。

76. 答案:A

解析:感觉适应:当某一恒定强度的刺激持续作用于一个感受器时,其传入神经纤维上动作电位的频率会逐渐降低,嗅觉、肤觉、视觉、听觉、味觉都会在适应后感受性降低,痛觉适应较难。“入芝兰之室,久而不闻其香”说明在有花香的地方停留的久了,花香持续作用于嗅觉感受器,传入神经纤维上动作电位频率降低,导致适应后感受性降低,就觉得没有香味了,属于一种感觉适应。

77. 答案:A

解析:病例对照研究中,在回忆过去的

暴露史或既往史时，常因研究对象的记忆失真或回忆不完整，使其准确性或完整性与真实情况间存在的系统误差。回忆偏倚产生的原因：①由于调查的因素或事件发生的频率低，未给研究对象留下深刻的印象而被遗忘；②因调查的事件是很久以前发生的事情，研究对象记忆不清或已经遗忘；③因研究对象对所调查的事件或因素关心程度不同，回答问题的多少及准确性有所不同。所以为了避免产生回忆偏倚，应选取现患病例进行研究(A对)。

78. 答案:A

解析:青年男性，主诉呕吐寒战高热，每隔一日发作一次(符合疟疾典型表现)，有云南旅居史(可能有疟疾流行区生活史或蚊子叮咬史)，次日出现寒战、发热、头痛，实验室检查:白细胞值正常，红细胞及血红蛋白明显显著下降，(疟疾反复发作造成大量红细胞被破坏，可使患者出现不用程度的贫血)，综合分析，患者最可能的诊断应为疟疾。

79. 答案:D

解析:客观性原则是指对结果的解释要符合受试者的实际情况。本题中一位是大学教授、一位是未接受过正规教育的老人，同时进行智力测验，测得结果相同，结合两名患者的所受教育程度及病史，可以判断出前者智力受损，而后者智力正常，这一判断遵循的是客观性原则。

80. 答案:A

解析:老年女性患者，患有丙肝病史多年(为导致肝硬化的常见病因)，今日出现扑翼样震颤(为肝性脑病的典型症状)，后出现昏迷，初步判断，患者应为丙型肝炎病毒导致的肝硬化，并发肝性脑病(3期及以上)，肝性脑病的治疗原则有去除引发HE的诱因、维护肝脏功能、促进氨代谢清除及调节神经递

质。其中调节神经递质可用支链氨基酸制剂，可以竞争性抑制芳香族氨基酸进入大脑，减少假性神经递质的形成。

81. 答案:C

解析:老年男性患者，胸闷乏力1月(怀疑心脏病变)，颈动脉搏动(病变与血管或新室流出道有关)，查体:左室肥大、胸骨左缘第三肋间(主动脉瓣第二听诊区)舒张期叹气样杂音(初步判断为主动脉瓣病变)。触及水冲脉、股动脉枪击音、毛细血管搏动征(主动脉瓣关闭不全表现)，综合诊断，最可能为主动脉瓣关闭不全。主动脉瓣关闭不全多由风湿性心脏病所致，风湿性心脏病形成的瘢痕和收缩可使瓣叶增厚。

82. 答案:D

解析:老年男性患者，口角歪向右侧，左侧鼻唇沟消失，闭眼额纹存在，最可能的受累情况为右侧面神经核上瘫。

83. 答案:A

解析:中年男性患者，上腹部不适(考虑消化系统疾病)，高热呕吐4天、体温39.5℃，白细胞显著升高(考虑感染性疾病)，肝区叩击痛，肝内脓肿与胸膜腔相通。初步诊断为肝脓肿。脓液培养为革兰阴性杆菌，吲哚实验及乳糖发酵式样均阳性，最可能的病原菌为大肠埃希菌。

84. 答案:D

解析:在临床诊疗的问诊过程中，需要遵循的伦理要求有:举止端庄，态度和蔼，语言得当，通俗易懂，专心致志，慎言守密。本题目中患者血检HIV阳性，怀疑为艾滋病，主治医生在病房中大声询问是否有冶游史，没有做到慎言守密的医学伦理学要求。

85. 答案:E

解析:某心理咨询师开办心理咨询所(不属于医疗机构，未经过注册)，聘请心理治疗师进行兼职，该名心理治疗师属于在注册地点之外的机构开展医疗活动

86. 答案:E

解析:中年男性患者,咳嗽咳痰 10 年(有呼吸系统病史),两天前感冒后出现胸闷、呼吸困难,不能平卧(左心衰可能),心前区(二尖瓣听诊区)可闻及 3/6 级收缩期吹风样杂音(二尖瓣关闭不全),肝-颈静脉回流阳性(右心衰可能),双下肢凹陷性水肿,P2 亢进,综合分析,患者最可能的诊断为:病毒性心肌炎。患者已有心衰表现,可导致有效循环血量不足、回流障碍等,都可引起水肿。有效循环血量不足导致肾血流量减少(D 对)、醛固酮分泌增多(B 对)、抗利尿激素分泌增多(A 对)、肾小球滤过率下降(C 对)。肾小球滤过分数=肾小球滤过率/肾血浆流量,肾血浆流量下降时,肾滤过分数增加(E 错)。

87. 答案:A

解析:青年男性,间歇性饥饿痛、夜间痛,进餐后缓解(符合十二指肠溃疡的典型表现),初步诊断为十二指肠溃疡(PU),十二指肠溃疡的发病机制是致病因素引起胃酸、胃蛋白酶对胃黏膜的侵袭作用与黏膜屏障的防御能力间失去平衡,影响该病的主要因素是胃酸与胃蛋白酶、幽门螺旋杆菌、非甾体类抗炎药和黏膜异常。

88. 答案:D

解析:心理咨询师在进行心理治疗时,需要遵循信赖性原则、整体性原则、发展性原则、个性化原则、中性化原则、保密性原则。该心理咨询师在治疗后将患者病情告知了患者的同伴,导致患者不被人知道的隐私被暴露出来,对患者造成了恶劣影响,严重违反了保密性原则(D 对)。

89. 答案:E

解析:患者男性,第一次来院诊断为硬膜下血肿 海脑沟回疝,首诊医生建议手术,但患者认为病情较轻,拒绝手术

并签字,这个过程中首诊医生充分的尊重了患者的自主权。出院之后患者因硬膜下血肿二次入院,后经抢救无效死亡,在此次诊治中,首诊医师的医学伦理原则冲突是有利原则与尊重原则的冲突。初诊时医生建议患者手术治疗,是遵循了有利原则,以患者的利益为上。

在患者拒绝手术并签字

后,尊重患者的自主权,允许患者出院。体现了有利原则和尊重原则的冲突。

90. 答案:B

解析:乳腺癌靶向治疗是针对乳腺癌人类表皮生长因子受体-2 阳性表达的患者,进行的一种特殊治疗。乳腺癌组织的分子表达,包括雌激素受体、孕激素受体及人类表皮生长因子受体-2。临床上通常使用曲妥珠单抗(赫赛汀)对 HER2 表达阳性的乳腺癌患者进行靶向治疗,可以在根治性手术以后,和化疗同时或者化疗结束后开始使用,属于术后辅助治疗,目的是为了预防肿瘤复发;还可在肿瘤复发转移之后使用,一般也是联合化疗或者内分泌治疗,目的是为了控制肿瘤发展,减少肿瘤对生命的威胁,延长患者的生存期。

91. 答案:B

解析:本题中新生儿出生身高 55.1cm,6 岁儿童身高 119.5cm,两组均数相差较大,在比较两组均数相差较大的数据时,可以用变异系数进行离散趋势分析。

92. 答案:A

解析:本人体试验中,一名受试者感染黄热病死亡后,研究组并未向伦理委员会上报该不良信息,而继续招募受试者进行试验,违反了人体试验的伦理原则中的接受监督原则,即接受伦理审查。

93. 答案:E

解析:患者中年男性,钢铁厂煤炉车间工人(高热环境),工作期间头晕、头

痛、面色潮红、大量出汗、脉搏加速、体温升高(中暑表现),首要的救助措施是立即脱离高热环境。

94. 答案:E

解析:一女学生近来感到最近心情低落,表情淡漠,有厌食自杀想法,初步诊断为抑郁障碍。抑郁障碍症状有①核心症状:包括情绪低落、兴趣缺失,精力减退。②心理症状群主要有:焦虑、自罪自责、精神病性症状如幻觉和妄想,认知症状如认知扭曲、注意力和记忆力下降等;精神运动性迟缓,面部表情贫乏或缺乏表情,或激越,无目的的失控行为增多;自知力受损;③躯体症状群有:睡眠紊乱,如不易入睡、睡眠浅、早醒等。抑郁自评量表(SDS)多用于门诊病人的粗筛、情绪状态评定等,是该女学生最适合的评估。

95. 答案:C

解析:患儿既往肩难产史,可能出现产伤。产伤可发生于身体的任何部位,常见的部位有头颅、软组织、骨骼、周围神经、内脏。患儿头颈部左偏,面向左侧,颈向右侧,最可能的诊断为分娩时损伤新生儿左侧胸锁乳突肌。

96. 答案:A

解析:6岁男童进食蚕豆后出现酱油色尿,检查发现葡萄糖-6-醛酸脱氢酶缺乏,该酶缺乏主要导致NADPH生成减少。

97. 答案:A

解析:女性,妊娠26周,有高血压病史,突发腹痛、阴道流血,查体血小板显著降低,无法凝血,最可能的诊断应为胎盘早剥。妊娠期高血压疾病的孕妇,底蜕膜螺旋小动脉痉挛或硬化,引起远端毛细血管变性坏死甚至破裂出血,血液在底蜕膜和胎盘之间形成血肿,致使胎盘与子宫壁分离,导致胎盘早剥。胎盘早剥是妊娠期发生凝血功能障碍最常见的原因,大量组织凝血活酶

从剥离处的胎盘绒毛和蜕膜中释放进入母体血液循环,激活凝血系统并影响血供,导致多器官功能障碍随着促凝物质不断入血,激活纤维蛋白溶解系统,产生大量的纤维蛋白原降解产物(FDP),引起继发性纤溶亢进大量凝血因子消耗,最终导致凝血功能障碍。

98. 答案:C

解析:该工地传染病的传染病患病人数为 $600 \times (20\% + 10\% + 2\%) = 192$ 人。患病率 $= 192 \div (600 \times 3) \times 100\% = 0.1067 \times 100\% \approx 10\%$,即0.1。

99. 答案:A

解析:某研究生,因学业与恋爱方面的问题产生了自杀情绪,此时应立即拨打心理咨询热线,进行纾解和心理疏导(A对)。

100. 答案:E

解析:患者在接种合格疫苗后出现异常反应,发生残疾,应由省级财政部门进行赔偿。

101. 答案:B

解析:本题中随机抽取第一户,后每隔4户抽取一户,按照此种顺序机械的每隔4户抽取一户作为观察对象,属于系统抽样。

102. 答案:A

解析:女性患者,腹痛、反酸,胃镜提示十二指肠溃疡。十二指肠溃疡的病因主要有:高胃酸、幽门螺杆菌侵袭、长期服用非甾体类抗炎药、黏膜防御与修复异常、遗传因素等。快速尿素酶试验是将胃黏膜活检组织加入以酚红为指示剂的尿素试剂中,如果试剂由黄变红则为阳性,提示胃黏膜组织中可能有活的幽门螺杆菌。本题中快速尿素酶试验阳性,提示患者有幽门螺杆菌感染。幽门螺杆菌是一种营养要求高的微需氧菌,是革兰阴性杆菌,生化反应不活泼,不能分解糖类。幽门螺杆菌的治疗主要以

秘剂或 PPI 为基础,联合抗生素治疗。

103. 答案:B

解析:患者中年男性,有不洁性生活史(淋病危险因素),近来尿频尿痛(尿道刺激症状),尿道口大量脓性分泌物(淋病特征性表现),龟头、阴茎红肿。最可能的诊断为淋病,兵员均为淋病奈瑟氏菌。

104. 答案:C

解析:某单位员工在食用“青皮红肉鱼”后,出现了面色潮红、胸痛、胸闷、心慌、恶心、呕吐等中毒症状,最可能的诊断为组胺中毒。

105. 答案:D

解析:根据《人体器官移植条例》规定,死者生前未表示不同意捐献其人体器官,若有人体器官捐献需要的,要配偶、成年子女、父母等以书面形式共同表示同意捐献,但本题中,死者父母双亡且未婚,无配偶、成年子女及父母,故而没有直系亲属可以代替死者进行器官捐献的决定(D对)。

106. 答案:C

解析:《医疗事故处理条例》规定,因抢救急危患者,未能及时书写病历的,有关医务人员应当在抢救结束后6小时内据实补记,并加以注明。本题中接诊医生因抢救危重患者,未能及时书写病历,抢救结束后,应在6小时内据实补记病历(C对)。

107. 答案:B

解析:患儿发热烦躁,查体:体温 38.7°C (感染性休克体温 $>38^{\circ}\text{C}$ 或 $<36^{\circ}\text{C}$),P160次/分(>90 次/分),呼吸35次/分(>20 次/分),白细胞 $19\times 10^9/\text{L}$ ($>12\times 10^9/\text{L}$),四肢皮温低,可见大理石纹,X线左下肺片状影,最可能的诊断为肺炎导致的感染性休克。

108. 答案:D

解析:男初中生,离异家庭,住寄宿学校(可能存在不良心理因素),一上学就

腹痛(有明显躯体症状),就医过程中症状缓解,无器质性改变(躯体障碍可逆,并无实质性、组织性损害)。该患者最可能的诊断为心身障碍。

109. 答案:B

解析:老年男性患者,既往有乙肝病史,体检发现肝左叶占位(肝脏肿瘤可能性大),血AFP明显增高(肝癌可能)。肝活检,增生细胞呈片状,血窦丰富,体积大,胞浆丰富,核大,核仁明显。核分裂像易见,最可能的病理诊断应为肝细胞癌。

110. 答案:B

解析:青年男性,外伤输血后,出现寒战高热,心悸气短,酱油色尿,尿隐血阳性,最可能的诊断是血型不符输血后的溶血反应,发生机制为补体激活导致红细胞溶解。

111. 答案:C

解析:青年男性,高热高热,咳铁锈色痰(大叶性肺炎的典型表现),痰培养:肺炎链球菌(大叶性肺炎常见致病菌),影像学提示右肺下野大片致密影,综合分析,患者应诊断为大叶性肺炎。大叶性肺炎的主要病理变化为肺泡腔内的纤维素性炎,病变进展可分为:充血水肿期、红色肝样变期、灰色肝样变期。患者病程3天,结合临床表现,考虑处于红色肝样变期,此时镜下可见肺泡腔内充满纤维素及大量红细胞。

112. 答案:B

解析:在医疗活动中,患者应履行的主要义务有:保持和增进健康的义务:配合诊疗的义务;遵守医院规章制度;给付医疗费用的义务(B对)。

113. 答案:D

解析:中年女性,发作性喘息,既往氨茶碱可缓解(支气管哮喘可能),呼吸困难加重一小时,鼻翼煽动,可闻及广泛哮鸣音,最可能的诊断为支气管哮喘的急性发作期。支气管哮喘的发病机制有

气道免疫—炎症机制、神经调节机制及其相互作用等。外源性变应原通过吸入、食入或接触等途径进入机体后，被抗原提呈细胞内吞并激活 T 细胞。活化的辅助性 Th2 细胞产生白介素 (IL) 如 IL-4、IL-5 和 IL-13 等激活 B 淋巴细胞并合成特异性 IgE，后者结合于肥大细胞和嗜碱性粒细胞等表面的 IgE 受体，若变应原再次进入体内，可与结合在细胞表面的 IgE 交联，使该细胞合成并释放多种活性介质，导致气道平滑肌收缩、黏液分泌增加和炎症细胞浸润，产生哮喘的临床症状 (D 对)。

114. 答案:A

解析:5R 动机干预的过程是一个利弊权衡的过程，反复、全面地分析吸烟的利弊，提升戒烟的信心，从而引导吸烟者做出戒烟的选择。“5R 法”包括了①相关性(relevance):使患者认识到戒烟与他们密切相关，越个体化越好。如患者目前的健康状态或发生某种疾病的风险、家庭或周围环境、年龄、性别等。②风险(risk); ③益处(rewards); ④障碍(radbloks); ⑤反复(retiton)利用危害的，戒烟与其密切相关。

115. 答案:A

解析:在表面健康的人群中进行现况研究，发现可能患有某种疾病的人。被称为筛检。通过筛检可早期发现某病患者，实现早诊断、早治疗的二级预防的目的 (A 对)。

116. 答案:A

解析:中年女性，一小时前服用乐果(有机磷农药)，半小时后出现腹痛、恶心、呕吐、昏迷，呼吸呕吐有大蒜味，患者最可能的诊断应为有机磷农药急性中毒。有机磷急性中毒时，抑制体内乙酰胆碱酯酶活性，引起体内生理效应部位 ACh 量蓄积，出现毒蕈碱样、烟碱样和中枢神经系统等中毒症状和体征。毒蕈碱样症状又称 M 样症状。主要是副交

感神经末梢过度兴奋，类似毒蕈碱样作用。平滑肌痉挛表现为瞳孔缩小、腹痛、腹泻；括约肌松弛表现大小便失禁；腺体分泌增加表现为大汗、流泪和流涎；气道分泌物增多表现为咳嗽、气促、呼吸困难、双肺干性或湿性罗音，严重者发生肺水肿。烟碱样症状又称 N 样症状。在横纹肌神经肌肉接头处 ACh 蓄积过多，出现肌纤维颤动、全身肌强直性痉挛，也可出现肌力减退或瘫痪，呼吸肌麻痹引起呼吸衰竭或停止。交感神经节后纤维末梢释放儿茶酚胺，表现为血压增高和心律失常。中枢神经系统症状血 AChE 浓度明显降低而脑组织 AChE 活力值 >60% 时，通常不出现中毒症状和体征；脑 AChE 活力值 <60% 时，出现头晕、头痛、烦躁不安、谵妄、抽搐和昏迷，有的发生呼吸、循环衰竭死亡 (A 对)。

117. 答案:E

解析:老年男性，咳嗽咳痰 1 月，右肺门靠上的位置有一肿物，边界不清，怀疑肺癌可能，该肿物最可能压迫奇静脉 (E 对)。副半奇静脉 (A 错) 沿胸椎体左侧下行，注入半奇静脉或向右跨过脊柱前面注入奇静脉，副半奇静脉收集左侧上部的肋间后静脉的血液，不会被右侧肺门部肿瘤压迫。右头臂静脉 (B 错) 与左头臂静脉在肺门上方向下汇合成上腔静脉。右锁骨下静脉 (C 错) 在第 1 肋外侧缘续于腋静脉，向内行于腋动脉前下方，至胸锁关节后方与颈内静脉汇合成头臂静脉。半奇静脉 (D 错) 在左膈脚处起自左腰升静脉，沿胸椎体左侧上行，约达第 8 胸椎体高度经胸主动脉和食管后方向右跨越脊柱，注入奇静脉。

118. 答案:B

解析:中年女性，外阴瘙痒，有刺痛、灼热感，伴发热。外阴散在疱疹、部分破溃呈脓疱，最可能的诊断为初发型生殖器疱疹。好发于 15~45 岁性活跃期男

女。好发部位为生殖器及会阴部。女性多见于大小阴唇、阴阜、阴蒂、子宫等处。皮损为簇集或散在的小水疱，2~4天后破溃形成糜烂或浅溃疡，常伴腹股沟淋巴结肿痛、发热、头痛、乏力等全身症状。生殖器疱疹是由单纯疱疹病毒(HSV)感染泌尿生殖器引起的一种疾病，HSV有HSV-1和HSV-2两个血清型，生殖器疱疹主要为HSV-2感染。当原发性生殖器疱疹的皮损消退后，残留的病毒长期潜存于骶神经节，机体抵抗力降低或某些诱发因素作用下可使潜存病毒激活而复发(B对)。

119. 答案:C

解析:根据《母婴保健法》规定，医疗保健机构发现孕妇患有下列严重疾病或者接触物理、化学、生物等有毒有害因素，可能危及孕妇生命安全或者可能严重影响孕妇健康和胎儿正常发育的，应当对孕妇进行医学指导和下列必要的医学检查:①严重的妊娠合并症或者并发症;②严重的精神性疾病;③国务院卫生行政部门规定的严重影响生育的其他疾病。经产前诊断，有下列情形之一的，医师应当向夫妻双方说明情况，并提出终止妊娠的医学意见:①胎儿患严重遗传性疾病的;②胎儿有严重缺陷的;③因患严重疾病，继续妊娠可能危及孕妇生命安全或者严重危害孕妇健康的(C对)。

120. 答案:D

解析:《职业病诊断与鉴定管理办法》规定，职业病诊断与鉴定工作应当按照《职业病防治法》《职业病诊断与鉴定管理办法》的有关规定及国家职业病诊断标准进行，遵循科学、公正、及时、便民的原则。职业病诊断证明书应当由参与诊断的取得职业病诊断资格的执业医师签署，并经承担职业病诊断的医疗卫生机构审核盖章(D对)。

121. 答案:C

解析:研究某地500名儿童的体重和身高的关系，最适合用散点图表示，散点图可以直观的表现出两指标之间的关系。

122. 答案:D

解析:中年女性患者，HBsAg阳性，平素无不适，最可能的诊断为慢性乙型肝炎。病理检查可见肝细胞胞质不透明，内有颗粒状小体，应为嗜酸性小体。

123. 答案:D

解析:按照《中华人民共和国传染病防治法》，本题中患者母亲确诊为新冠肺炎患者，此前患者曾与目前共同就餐，属于密切接触者、按照规定应进行留检，即隔离观察。

124. 答案:B

解析:老年男性患者，排尿无力、夜尿增多，B超提示前列腺增大，向膀胱内突出，最可能的诊断为前列腺增生导致的排尿困难。前列腺增生主要发生于前列腺中央区和移行区，增生组织呈多发结节，并逐渐增大。

125. 答案:C

解析:中年男性患者，突发右上腹痛(胆囊疾病可能性大)，既往有胆囊结石病史，现行影像学检查可见胆囊肿大明显，肝内外胆管无扩张，最可能的诊断为胆囊结石梗阻导致的胆绞痛，最可能的梗阻部位是胆囊管。

126. 答案:D

解析:我国人体器官移植的伦理原则包括:(一)患者利益至上原则;(二)自愿、无偿、禁止买卖原则;(三)知情同意原则;(四)尊重和保护供体原则;(五)保密原则;(六)公平、公正、公开原则。自愿原则要求器官捐献必须由捐献者及其亲属自主决定和无偿捐献，这是保障人的基本权利和人格尊严的要求，本题中为患者的兄弟自愿捐献(A错)。患者健康至上要求必须把是否符合患者健康利益作为首要标准(B错)。

唯一性(C 错)不属于移植的伦理学原则。保护供者(D 对)要求将供体捐赠器官后可能的伤害与接受器官移植后可能的受益进行对比分析,确保风险小于受益。知情同意(E 错)要求在实施器官移植手术前,应对受者和供者进行充分的告知并取得同意。

127. 答案:D

解析:女性患者,既往有一型糖尿病,未监测血糖情况,现恶心呕吐昏迷,检查提示出现了代谢性酸中毒,最可能的原因为酮体增加(D 对)。

128. 答案:D

解析:儿童出现毛发银白色、皮肤白、瞳孔颜色欠,最可能的诊断为:白化病,缺乏酪氨酸酶。

129. 答案:D

解析:某化工厂氮氧化合物泄露,导致周围居民出现中毒症状,转运时应预防居民出现中毒性肺水肿(D 对)。

130. 答案:D

解析:患儿,五月龄,足月顺产(产伤可能性小),夜间出汗、烦躁。查体:枕秃、颅骨乒乓球触感,最可能的诊断为营养性维生素 D 缺乏性佝偻病初期。

131. 答案:C

解析:中年男性,婚后无子,有性生活,未避孕。免疫学检查出抗精子抗体,该抗体产生机制为隐蔽抗原释放。

132. 答案:C

解析:《医疗机构管理条例实施细则》规定,医疗机构转让、出借《医疗机构执业许可证》,并造成严重后果的,由县级以上人民政府卫生行政部门没收违法所得,并处罚款(属于行政处罚)、吊销许可证。

133. 答案:E

解析:青年男性,潜水时快速上升出水(迅速从高压环境进入常压环境),后出现四肢肌肉痉挛、疼痛、抽搐及关节痛。最可能的诊断为减压病,疼痛原因

最可能是血管腔内起泡栓塞。

134. 答案:C

解析:患者从楼上跌落后,在救护车中不断大声描述坠落情景,属于一种无意识记。无意识记,也叫做不随意意识记,是指事先没有预定目的,也不需要意志努力的识记,虽然没有提出明确的识记的目的和任务,也没有付出特殊的努力和采取什么特殊的措施,但是这些活动和内容情节却可能自然而然地被识记下来。

135. 答案:A

解析:青少年男性,多饮多食多尿(糖尿病可能),检查发现血压升高,尿糖++++,初步考虑为 I 型糖尿病,多数青少年病人起病急,典型三多一少症状或昏迷,症状较明显;多尿的原因为肾小管内液体渗透压增高。

136. 答案:A

解析:女性,高龄孕妇,既往有 I 型糖尿病,产前检查诊断为巨大胎儿,最可能的原因高胰岛素导致的蛋白质和脂肪合成增加、脂肪分解减少。

137. 答案:B

解析:中年女性,甲状腺肿大,压迫气管。术后病理显示结节大小不一,滤泡细胞内充满胶质,最可能的诊断应为甲状腺滤泡性腺瘤。

138. 答案:C

解析:形象思维是利用具体形象解决问题的思维,思维活动依赖具体形象和已有的表象,在个体心理发展中,它是儿童的主要思维方式,也是许多艺术家、文学家及设计师较多运用的思维方式。爱因斯坦说“作为思维元素的心理的东西是一些记号和由一定明晰程度的意向,由我随意的再生和组合”,即思维活动是依赖具象(一定明晰程度的意向)和已有的表象(一些记号)。

139. 答案:D

解析:中年男性患者,肾移植后服用泼

尼松和他克莫司治疗，近期出现巨细胞感染，最可能的原因为 T 细胞被抑制。泼尼松是一种糖皮质激素，有明显的免疫抑制作用，对一些免疫细胞，如单核/巨噬细胞、T 细胞、B 细胞有较强的抑制作用。他克莫司抑制 T 细胞的活化作用以及 T 辅助细胞依赖 B 细胞的增生作用。也会抑制如白介素-2、白介素-3 及 γ -干扰素等淋巴因子的生成与白介素-2 受体的表达(D 对)。

140. 答案:D

解析:患者多根多处肋骨骨折,有反常呼吸运动,现场急救最佳的处理措施为固定胸壁,消除反常呼吸。本题未提及是否为开放性骨折,故以固定胸廓作为首选。

141. 答案:E

解析:老年男性患者,腰痛、贫血、腰椎骨折。实验室检查提示:血清总蛋白升高(正常值 60~80g/L,白蛋白稍低(35~51g/L),血肌酐升高(44~133 μ mol/L),骨髓中异常浆细胞增多。综合分析,患者最可能的诊断为多发性骨髓瘤。骨痛为多发性骨髓瘤的主要症状,以腰骶部最多见,其次为胸部和下肢。活动或扭伤后剧痛者有病理性骨折的可能。贫血为本病的另一常见表现。部分患者可有肾功能损害。血清中出现 M 蛋白是本病的突出特点。

142-1. 答案:A

解析:急诊抢救时,急诊医生要做到:①以维护患者利益作为其主要的职业责任。②迅速、熟练地作出反应,对需要紧急医疗照护的患者无偏见或偏袒。③尊重病人的权利,努力保护患者的最佳利益。④如实地与患者沟通,并维护其接受治疗的知情同意权。⑤尊重患者的隐私。⑥同事间相处要公正诚实。

142-2. 答案:B

解析:医患关系有三种模式:主动-被动模式,适用于昏迷、休克、精神病患者

发作期、严重智力低下者以及婴幼儿等一些难以表达主观意志的患者。

144-1. 答案:B

解析:医学伦理原则包括了:①尊重原则;②不伤害原则;③有利原则;④公正原则。尊重原则要求医务人员尊重患者,知情同意、知情选择、要求保守秘密和隐私等均是尊重患者的体现。本题中女高中生因乳房刺痛来院就诊,不愿主动向异性医生诉说病情并接受异性医生的检查,这时,女医生在让男学生回避后,才对患者进行问诊和查体,体现了对女学生的尊重。

144-2. 答案:A

解析:本题中,女患者面对男学生时,不愿诉说病情,女医生充分尊重了患者的隐私,让男学生回避后才继续问诊,体现了女医生对患者的体贴与尊重。

144-3. 答案:C

解析:医疗机构执业时,应充分尊重患者的知情同意权,在施行手术、特殊检查或者特殊治疗时,应当向患者作必要的解释,征得患者同意,并取得其家属或者关系人同意及签字;无法取得患者意见时,应当取得其家属或者关系人同意及签字;无法取得患者意见又无家属或者关系人在场,或者遇到其他特殊情况时,经治医师应当提出医疗处置方案,在取得医疗机构负责人或者被授权负责人的批准后实施。

147-1. 答案:C

解析:本题为了研究病毒性肝炎在某地的分布情况,抽样调查了 10000 人,详细记录了患病人数、性别、新发病人数等,属于描述性研究中的现况研究。

147-2. 答案:D

解析:患病率=[某特定时间内一定人群中现患某病的新旧病例数/同期的平均人口数(被观察人口数)] \times k, k=100%, 1000%, 或 10000/万。由题目可知,抽样调查中,女性 4000 人,其中 200 例

乙肝患者，则该地区女性乙肝患病率=200/4000(D对)。

149-1. 答案:C

解析:《处方管理办法》:“处方由调剂处方药品的医疗机构妥善保存。普通处方、急诊处方、儿科处方保存期限为1年,医疗用毒性药品、第二类精神药品处方保存期限为2年,麻醉药品和第一类精神药品处方保存期限为3年。”

149-2. 答案:C

解析:《处方管理办法》:“处方由调剂处方药品的医疗机构妥善保存。普通处方、急诊处方、儿科处方保存期限为1年,医疗用毒性药品、第二类精神药品处方保存期限为2年,麻醉药品和第一类精神药品处方保存期限为3年。”

第二单元

1. 答案:D

解析:传染病分为甲类、乙类、丙类三类,实施分类管理。甲类包括:①鼠疫;②霍乱。为强制管理的烈性传染病,要求发现后2小时内通过传染病疫情监测信息系统上报。艾滋病属于乙类传染病,为严格管理的传染病,要求诊断后24小时内上报。流行性腮腺炎、麻风病属于丙类传染病,为监测管理传染病。

2. 答案:C

解析:蛋白质-能量营养不良时,使体内蛋白质代谢处于负平衡,以维持基础代谢。能量摄入不足时,体内脂肪大量消耗以维持生命活动的需要,由于脂肪大量消耗,故细胞外液容量增加,呈现水肿;此时ATP合成减少,钠-钾-ATP酶的运转能力减弱,钠在细胞内滞留,易出现伴随腹泻的低渗性脱水、酸中毒、低血钾、低血钠、低血钙和低镁血症,碱中毒多伴随呕吐出现。

3. 答案:E

解析:出血性脑梗死是由于脑梗死灶内的动脉自身滋养血管同时缺血,导致动

脉血管壁损伤、坏死,在此基础上如果血管腔内血栓溶解或其侧支循环开放等原因使已损伤血管血流得到恢复,则血液会从破损的血管壁漏出,引发出血性脑梗死。急诊颅脑CT平扫可准确识别绝大多数颅内出血,大面积脑梗死有脑水肿和占位效应,出血性梗死呈混杂密度。CT可以更加直观的判断出缺血性梗死与出血性梗死。

4. 答案:A

解析:老年男性,头痛、一侧肢体无力前来就诊(颅内高压症状,考虑颅脑病变),既往有头部外伤史,CT检查可见顶枕部新月形低密度影,最可能的诊断为慢性硬膜下血肿

5. 答案:A

解析:患者与人争吵后突然倒地,可能是由于情绪激动导致的急性心血管事件,此时若对患者施行急救措施,应首先判断患者是否有意识,再判断有无正常呼吸和脉搏,确立心脏骤停诊断后,立即进行心肺复苏。

6. 答案:B

解析:再生障碍性贫血,简称再障,是一种可能由不同病因和机制引起的骨髓造血功能衰竭症主要表现为骨髓造血功能低下、全血细胞减少及所致的贫血、出血、感染综合征。骨髓细胞学检查可见多部位骨髓增生重度减低,粒、红系及巨核细胞明显减少且形态大致正常,淋巴细胞及非造血细胞比例明显增高,骨髓小粒均空虚查。

7. 答案:A

解析:继发性顽固性高血压最常见于肾动脉狭窄和原发性醛固酮增多症,尤以老年人多见。

8. 答案:C

解析:2020年5月,国际高血压学会(ISH)最新发布了全球通用的《高血压实践指南》,修订各种情况的血压目标:合并慢性阻塞性肺疾病:目标血压值

< 130/80mmHg ， 老年患者
<140/90mmHg(C 对)。

9. 答案:A

解析:β受体拮抗剂是梗阻性肥厚型心肌病的一线治疗用药,可改善心室松弛,减轻左心室流出道梗阻。

10. 答案:A

解析:踝关节稳定性差,易于发生损伤的体位是跖屈位(A对)。当足部处于跖屈位时,距骨后方较窄的一侧进入关节窝,此时踝关节不稳定,容易发生损伤。

11. 答案:B

解析:髌关节前脱位少见,多发生于交通事故和高处坠落伤,髌关节处于外展、外旋位时受到轴向直接暴力。故髌关节前脱位时,最典型的临床表现为屈曲、外旋、外展畸形。髌关节后脱位时,可见屈曲、内收、内旋畸形。

12. 答案:E

解析:肾小球源性血尿产生的主要机制是肾小球基底膜断裂,红细胞通过时受血管内压力挤出,呈现变形红细胞血尿。主要特点是全程无痛性血尿,尿中无或少有凝血块,可见红细胞管型,相差显微镜检查红细胞形态不均一,变形红细胞为主,尿血细胞比容分布曲线呈非对称性。血细胞容积小于静脉红细胞分布曲线的血细胞比容峰值,常伴有蛋白尿高血压水肿等,尿白细胞,尿白蛋白比总蛋白比值在鉴别肾小球和肾小球尿中具有重要的价值。如镜下红细胞形态单一,与外周血近似,为均一型血尿,提示血尿来源于肾后,见于肾盂肾盏、输尿管、膀胱和前列腺病变。

13. 答案:D

解析:氨茶碱属于茶碱类药物,茶碱类药物可以抑制磷酸二酯酶,磷酸二酯酶具有水解细胞内第二信使(cAMP,环磷酸腺苷或cGMP,环磷酸鸟苷)的功能,降解细胞内cAMP或cGMP,从而终结这

些第二信使所传导的生化作用。茶碱类药物可以提高cAMP浓度,拮抗腺苷受体,增强呼吸肌力量以及增强气道纤毛清除功能。

14. 答案:D

解析:超声心动图是肥厚型心肌病最主要的诊断手段,心室不对称肥厚而无心室腔增大为其特征。舒张期室间隔厚度达15mm。伴有流出道梗阻的病例中还可可见二尖瓣前叶在收缩期前移(D对)。

15. 答案:B

解析:钩端螺旋体病中期可分为流感伤寒型、肺出血型、黄疸出血型、肾衰竭型、脑膜脑炎型。其中肾衰竭是黄疸出血型的主要死亡原因。

16. 答案:B

解析:不完全性骨折:指的是骨的完整性或连续性仅有部分中断,比如青枝骨折,裂缝骨折(B对)。

17. 答案:D

解析:我国提倡的献血制度是无偿献血制度。

18. 答案:B

解析:囊尾蚴病,又称囊虫病、猪囊尾蚴病,由猪带绦虫幼虫寄生于人体各组织器官所致的疾病,为较常见的人兽共患病。青壮年发病率高。人因吞食猪带绦虫卵而被感染。

19. 答案:A

解析:甲氨蝶呤为细胞毒类抗肿瘤药,化学结构与叶酸相似,对二氢叶酸还原酶具有强大而持久的抑制作用,呈竞争性抑制作用。临床上用于治疗儿童急性白血病和绒毛膜上皮癌;鞘内注射可用于中枢神经系统白血病的预防和缓解症状。不属于肿瘤靶向药物。

20. 答案:E

解析:第三代头孢菌素对铜绿假单胞菌及厌氧菌有较强作用,对β-内酰胺酶有较高的稳定性。可用于危及生命的败血症、脑膜炎、肺炎、骨髓炎及尿路严

重感染的治

疗,能有效控制严重的铜绿假单胞菌感染。

21. 答案:D

解析:下尿路梗阻时,膀胱逼尿肌代偿增生,导致膀胱内压力增高,部分肌束向壁外膨出,形成小室。失代偿期,输尿管口功能被破坏,尿液可反流回上尿路,引起双侧肾积水和肾功能障碍,严重时导致肾衰竭。

22. 答案:C

解析:胰腺导管细胞分泌胰液,属于胰腺的外分泌功能,不具有内分泌功能。

23. 答案:E

解析:感染性心内膜炎最常见的并发症为心力衰竭,主要由瓣膜关闭不全所致,主动脉瓣损害多见。

24. 答案:A

解析:造成运动系统慢性损伤的病因多样,常见原因有:①全身疾病造成的局部组织病理性紧张、痉挛;②由于环境温度变化引起局部血管痉挛,循环供给下降,局部代谢产物积聚;③长期、反复、持续地重复同一个姿势;④操作中技术不熟练、注意力不集中、姿势不正确,使局部产生异常应力;⑤身体生理结构或姿态性异常,应力分布不均;⑥急性损伤后未得到正确的康复转为慢性损伤。故选 A。

25. 答案:C

解析:甲状腺滤泡被炎症破坏,其内储存的甲状腺激素释放进入循环,形成“破坏性甲状腺毒症”;而炎症损伤引起甲状腺细胞摄碘功能减低。此时实验室检查可见血

清 T₃、T₄ 升高, TSH 降低, I 摄取率减低,是甲状腺毒症的特征性“分离现象”。

26. 答案:C

解析:中性粒细胞碱性磷酸酶(NAP)主要存在于成熟阶段的中性粒细胞,其他成

分如嗜酸、嗜碱、淋巴、单核以及巨核细胞,血小板,浆细胞等均为阴性反应。NAP 活力可反映成熟粒细胞的成熟程度和功能,随着细胞的成熟,酶的活性也逐渐增强。当中性粒细胞活化后,NAP 阳性率及积分升高。NAP 可用于慢性粒细胞白血病与类白血病反应的鉴别:慢性粒细胞白血病的 NAP 活性明显降低,积分值常为 0。类白血病反应的 NAP 活性极度增高。

27. 答案:C

解析:成人心肺复苏的顺序为 C-A-B,即“胸外按压-开放气道-人工呼吸”。

28. 答案:B

解析:休克诊断的关键是早期诊断并准确分期,①凡遇到严重损伤、大量出血、重度感染以及过敏病人和有心脏病史者,应想到并发休克的可能;②临床观察中,对于有出汗、兴奋、心率加快、脉压小或尿少等症状者,应疑有休克;③若病人出现神志淡漠、反应迟钝、皮肤苍白、呼吸浅快、收缩压降至 90mmHg 以下及尿少或无尿者,则标志病人已进入休克失代偿期。

29. 答案:C

解析:按一级动力学消除的药物,按照固定剂量、每隔一个半衰期给药,经过 4~5 个半衰期基本可达到稳态血药浓度,本题中半衰期为 8h,所以达到稳态血药浓度所需的时间为 $8 \times 4 = 32h$; $8 \times 5 = 40h$ 。达到稳态血药浓度所需时间在 32~40h 之间。

30. 答案:C

解析:稳定型心绞痛也称劳力性心绞痛。其特点为阵发性的前胸压榨性疼痛或憋闷感觉,主要位于胸骨后部,可放射至心前区和左上肢尺侧,常发生于劳力负荷增加时,持续数分钟,休息或用硝酸酯制剂后疼痛消失。

31. 答案:B

解析:原发性醛固酮增多症(原醛症),

是由于肾上腺的皮质肿瘤或增生，醛固酮分泌增多所致。原醛症是一种继发性高血压症。由于大量醛固酮促进尿钾排泄过多所致，患者血钾很低，可有肌肉无力、麻痹、软瘫，甚至吞咽和呼吸困难，心电图示低血钾表现，有时出现心律不齐。故高血压伴低血钾是应首先考虑本病，故本题答案是 B。

32. 答案:D

解析:尿崩症指精氨酸加压素(AVP)[又称抗利尿激素(ADH)]严重缺乏或部分缺乏(中枢性尿崩症);或肾脏对 AVP 不敏感(肾性尿崩症),致肾小管重吸收水的功能障碍,从而引起以多尿、烦渴、多饮与低比重尿和低渗尿为特征的一组综合征。鉴别中枢性尿崩症与肾性尿崩症的方法主要为加压素实验

33. 答案:E

解析:不稳定型心绞痛(UA)与急性非 ST 段抬高型心肌梗死(NSTEMI)的鉴别,主要依靠心脏标志物检查(心脏肌钙蛋白)。若在症状发生后的 24 小时内,肌钙蛋白(cTn)的峰值超过正常对照值的 99 个百分位需考虑 NSTEMI 的诊断。不稳定型心绞痛的诊断主要依靠临床表现以及发作时心电图 ST-T 的动态改变。

34. 答案:E

解析:CO 吸入后经肺毛细血管膜迅速弥散,与血液中红细胞的血红蛋白结合,形成稳定的 COHb。CO 与血红蛋白的亲合力比氧与血红蛋白的亲合力大。吸入较低浓度 CO 即可产生大量 COHb。COHb 不能携带氧且不易解离。COHb 与血红蛋白中的血红素部分结合,抑制其他 3 个氧结合位点释放氧至外周组织的能力,导致血红蛋白氧解离曲线左移,加重组织细胞缺氧。CO 与还原型细胞色素氧化酶二价铁结合,抑制细胞色素氧化酶活性,影响细胞呼吸和氧化过程,阻碍氧的利用。CO 中毒时,体内血管吻合支少且代谢旺盛的器官如大脑和心

脏最易遭受损害(E 对)。

35. 答案:B

解析:膜性肾病易出现大量蛋白尿,造成体内低白蛋白血症,血管内液体渗出,血液呈高凝状态,同时导致继发性肝脏合成增加,增加白蛋白的同时也增加脂蛋白的合成,出现高脂血症,也可发生高凝状态,故膜性肾病易出现深静脉血栓。

36. 答案:A

解析:老年男性患者,与人争吵中发病,查体:血压下降、肺水肿、有急性肺淤血体征,无下肢水肿,最可能的诊断为急性左心衰。

37. 答案:C

解析:老年女性患者,高处坠落导致胸 12 压缩骨折 1/3~3/4, TLICS 评分小于 3 分,推荐保守治疗,但患者保守治疗一月后未见好转,判断可能是由于老年患者骨质疏松导致的骨质疏松性压缩性骨折,临床上多选择微创手术治疗,如经皮椎体成形术或经皮椎体后凸成形术(PKP)等。

38. 答案:A

解析:老年男性患者,多年高血压、糖尿病史,查体:主动脉瓣第二听诊区可闻及舒张期吹风样递减型杂音(考虑为慢性主动脉瓣关闭不全),结合患者年龄与病史,考虑为退行性主动脉瓣病变,瓣叶钙化,导致主动脉瓣关闭不全。

39. 答案:C

解析:患者既往有上呼吸道感染病史(急性心包炎的常见病因),心电图检查可见:除 aVR 外,多导联 ST 段弓背向下抬高(急性心包炎的典型心电图表现),听诊心前区抓刮样粗噪音(心包摩擦音,为急性心包炎最具诊断价值的体征),患者最可能的诊断为急性心包炎。

40. 答案:C

解析:8 岁儿童手掌着地,右肘部肿

胀，肘后三角正常，骨皮质不连续(骨折)，最可能的诊断为伸直型肱骨髁上骨折。在肱骨髁内、前方，有肱动脉、正中神经经过。在神经血管束的浅面有坚韧的肱二头肌腱膜，后方为肱骨，一旦发生骨折，神经血管容易受到损伤。患儿手指皮肤苍白发凉，最可能是骨折近端向前移位损伤肱动脉，导致手部血运障碍。

41. 答案:A

解析:老年男性患者，尿频尿急尿痛(膀胱刺激症状)，近日可见尿道口“滴白”(慢性前列腺炎的特征表现)，会阴部、下腹部疼痛不适，无反跳痛(腹膜、腹腔脏器无炎症浸润)，综合分析，最可能的诊断应为:慢性前列腺炎。

42. 答案:B

解析:中年男性患者，出现冻结肩，冻结肩即为粘连性肩关节囊炎，也叫肩周炎。肩周炎的治疗包括:早期给予理疗、针灸、适度的推拿按摩;痛点局限时，可局部注射醋酸泼尼松龙，能明显缓解疼痛;疼痛持续、夜间难以入睡时，可短期服用非甾体抗炎药;无论病程长、短，症状轻、重，均应每日进行肩关节的主动活动，活动以不引起剧痛为限;对症状持续且重者，以上治疗无效时，在麻醉下采用手法或关节镜下松解粘连;肩外因素所致粘连性肩关节囊炎除局部治疗外，还需对原发病进行治疗。故 B 选项为正确选项。

43. 答案:B

解析:中年男性患者，高热月余(提示感染可能性大)，肝区疼痛半年(怀疑肝胆疾病)，超声检查发现肝内多发小结节，血常规显示白细胞计数和中性粒细胞百分比升高，肝穿刺见条索样物质及脓细胞和脓球，最可能的诊断应为肝脓肿。

44. 答案:E

解析:中年男性患者，突发胸闷心悸，血压低，心率高。心电图检查可见宽大 QRS 波，提示存在严重的心室早搏，心动过速，应立即采取电复律进行急救。

45. 答案:C

解析:医生在为艾滋病毒携带者进行手术后，发现手上有伤口，术中伤口很有可能接触了带有 HIV 病毒的血液，此时，医生需要行抗反转录病毒治疗，及时抑制病毒复制，降低 HIV 相关疾病的罹患率。

46. 答案:B

解析:中年男性患者，既往痛风病史、高脂血症、肾功能不全，饮用啤酒后出现急性关节炎，以第一跖趾关节为重，尿酸显著增高(高尿酸血症)，判断患者应为痛风的急性关节炎期，治疗首选秋水仙碱，治疗效果好且不良反应少，48 小时内使用效果更好。

47. 答案:A

解析:中年男性患者，右下肢疼痛一年(怀疑有供血障碍)，行 Buerger 实验:先抬高下肢 $70^{\circ}\sim 80^{\circ}$ ，正常肢体远端淡红色或稍发白，供血不足者皮肤苍白;再让其下肢垂于床沿，正常人皮肤色泽可在 10 秒内回复，超过 45 秒，或色泽不均匀者，提示动脉供血障碍。

48. 答案:B

解析:中年男性(单纯疱疹病毒性脑炎多发年龄)，口唇疱疹、发热、神经系统症状(疱疹病毒性脑炎常见症状)，脑脊液检查提示淋巴细胞增多、蛋白升高、糖含量正

常(提示病毒性疾病)。综合判断，患者最可能诊断为单纯疱疹病毒性脑炎(B 对)。

49. 答案:C

解析:老年男性，腹股沟肿块、绞痛(腹股沟疝可能性大)。查体:左侧腹股沟可触及一半球形包块，按压可还纳，松手又复出，最可能的诊断为腹股沟直疝(C

对)。

50. 答案:A

解析:中年男性,一周前上感史(急性脊髓炎诱因),后出现低热、脊椎疼痛、胸段以下瘫痪,最可能的诊断应为急性脊髓炎(A对)。

51. 答案:E

解析:中年男性,突发心脏骤停,经紧急心肺复苏之后,逐渐恢复,但患者此时血压低、有休克表现,心率缓慢,疑出现缓慢型心律失常。缓慢型心律失常的处理为阿托品 0.5mg 静脉推注,每 3~5 分钟重复,最大剂量 3mg 体外或经静脉心脏起搏(E对)。

52. 答案:D

解析:中年男性,既往风湿性心脏病及感染性心内膜炎病史 5 年,目前无任何心脏症状。患者近期需要拔牙,应注重预防感染性心内膜炎的复发。主要靶目标是口腔链球菌,推荐在操作开始前 30~60 分钟内使用 1 剂以下抗生素:阿莫西林或氨苄西林 2g,口服或静脉给药。对青霉素或氨苄西林过敏的病人可用克林霉素 600mg,口服或静脉滴注(D对)。

53. 答案:C

解析:中年男性,腰椎挫伤(有长期卧床可能)后出现排尿困难 10 年(疑有尿路结石形成)。加重伴排尿中断、间断血尿(下尿路结石可能性大),改变体位后可继续排尿,患者最可能的诊断为膀胱结石。膀胱结石的典型症状为排尿突然中断,疼痛放射至远端尿道及阴茎头部,伴排尿困难和膀胱刺激症状。小儿常用手搓拉阴茎,跑跳或改变排尿姿势后,能使疼痛缓解,继续排尿。首选的治疗措施为经尿道膀胱镜取石或碎石术。

54. 答案:B

解析:患者未使用降压药时,最高血压 190/100mmHg,属于 3 级高血压。根据

“高血压病人心血管分层标准”,临床合并症或合并糖尿病,为很高危。

55. 答案:B

解析:青年男性,水样便腹泻,血压低,疑出现低血容量性休克,此时需要快速补液治疗。中、重度失水者,需要经静脉补充,补液速度应先快后慢。

56. 答案:A

解析:患儿摔倒后右肩疼痛(疑损伤右侧肩部、颈部、上肢),查体头偏向右侧,右肩下沉,右侧上肢活动障碍(右侧肩关节、锁骨损伤可能性大),皮肤出现淤血(骨折可能),Dugas 征阴性(排除肩关节脱位),患者最可能的诊断为右侧锁骨骨折。

57. 答案:C

解析:八岁男孩,干骺端可见一表面光滑的骨性凸起,最可能的诊断为骨软骨瘤(C对)。骨软骨瘤为单发或多发,在干骺端可见从皮质突向软组织的骨性突起,其皮质和松质骨以窄小或宽广的蒂与正常骨相连,彼此髓腔相通,皮质相连续,突起表面为软骨帽。

58. 答案:B

解析:中年女性,反复膀胱刺激征(提示泌尿系统疾病),伴低热一年(有结核病可能)。尿常规呈酸性,有较多红细胞、白细胞。CT 检查可见双肾斑片状钙化,患者最可能的诊断应为肾结核(B对)。

59. 答案:C

解析:中年男性,既往尿频尿急伴发热一年(考虑有慢性泌尿系感染),再发 4 天,既往肾结石病史 4 年。查体:39.7℃(高热),肾区叩击痛,尿比重偏低(正常值 1.010~1.025)有白细胞。CT 显示双肾颗粒状固缩(炎症、高血压可能)。综合分析,患者最可能的诊断应为慢性肾盂肾炎急性发作。慢性肾盂肾炎半数以上病人可有急性肾盂肾炎病史,后出现程度不同的低热、间歇

性尿频、排尿不适、腰部酸痛及肾小管功能受损表现，如夜尿增多、低比重尿等病情持续可发展为慢性肾衰竭。急性发作时病人症状明显，类似急性肾盂肾炎。慢性肾盂肾炎治疗时，首先经验性应用抗生素，后根据药敏试验，选用有效抗生素治疗。多为单独用药或两者药物联合使用，轮流使用，极少联合应用 3 种及以上的抗生素。

60. 答案:A

解析:患儿摔伤膝盖后，迅速出现寒战、高热，短暂谵妄，查体:膝部肿胀、疼痛、浮髌试验阳性。实验室检查:白细胞升高(炎症可能)，血沉加快。最可能诊断为急性化脓性关节炎(A对)。

61. 答案:A

解析:老年男性，双手震颤、行动迟缓，查体:面具脸、搓丸样震颤、齿轮样强直，初步诊断为帕金森病。帕金森临床上以静止性震颤、运动迟缓、肌强直和姿势平衡障碍为主要特征。典型表现是拇指与示指呈“搓丸样”动作。帕金森有两大病理特征，其一是黑质致密区多巴胺能神经元及其他含色素的神经元大量变性丢失，出现临床症状时丢失至少达 50%以上。其二是在残留的神经元胞质内出现嗜酸性包涵体，即路易小体，由细胞质蛋白质所组成的玻璃样团块，其中央有致密的核心，周围有细丝状晕圈。改善帕金森症状的药物主要有复方左旋多巴，其机制是提高脑内的多巴胺水平。

62. 答案:A

解析:老年男性，持续胸痛 4 小时(考虑有心脏疾病)，心电图检查:II、III、aVF 导联弓背向上抬高(急性下壁心肌梗死的典型心电图表现)。查体:心率 35 次/分(心跳过缓)，血压低，心律齐，导致患者出现此种表现的原因最可能为三度房室传导阻滞。

63. 答案:B

解析:中年男性，反复肾结石(怀疑有钙代谢疾病)，近期骨痛，口渴、夜尿增多(怀疑有肾功能损害)，体温较低，心率较慢。初步诊断为甲状旁腺功能亢进症。甲状旁腺功能亢进主要表现为高钙血症，在泌尿系统中，最常见的症状为反复发作的肾结石，长期高血钙可影响肾小管的浓缩功能，出现多尿、夜尿、口渴等症状，可出现肾实质钙化及反复发作的肾绞痛与血尿。在骨骼系统主要表现为骨痛。诊断甲状旁腺功能亢进症最有意义的检查为血清 PTH 测定(B对)。

64. 答案:A

解析:中年女性，头晕(脑部血管疾病可能)、夜尿增多(肾脏损害)，查体:血压 170/100mmhg，血钾明显低于正常值(3.5~5.5mmol/L)，BMI 值在正常范围内。患者最可能的诊断为原发性醛固酮增多症。原醛症主要表现为高血压、低血钾，慢性失钾致肾小管上皮细胞呈空泡样变性，浓缩功能减退，伴多尿，尤其夜尿多，继发口渴、多饮。血醛固酮水平增高而肾素、血管紧张素 II 水平降低为原醛症的特征，血浆醛固酮(ng/dl)/血浆肾素活性[ng/(ml·h)]比值>30 提示原醛症可能性，>50 具有诊断意义，此为原醛症的最佳检出试验(A对)。

65. 答案:B

解析:青年男性，诊断为前臂双骨折，复位后满意(达到解剖复位，出现复位不良导致的并发症可能性小)，石膏固定后疼痛无法缓解，检查发现石膏固定牢固，手部感觉运动障碍，考虑为石膏固定过紧，压迫血管神经所致。应立即松绑石膏。

66. 答案:D

解析:中年男性，下肢水肿一年(疑有肝脏疾病)，查体 PT:11s，APTT:56s。正常 PT 值 11~13 左右，APTT 值 30~40 左

右,患者PT正常,APTT延长,最可能为外源性凝血障碍性疾病。血友病A又称FVIII缺乏症,是临床上最常见的遗传性出血性疾病,实验室检查可见PT正常、APTT延长,FVIII:C水平明显低下。

67. 答案:B

解析:老年男性,出现排尿困难2年,尿失禁半年,经检查发现前列腺增生,膀胱中有余尿,判断患者为前列腺增生导致的慢性尿潴留,患者尿失禁的类型为充盈性尿失禁(B对)。

68. 答案:C

解析:中年男性。突发心脏骤停,经心肺复苏后,血压心率仍低,应首选静脉输注阿托品(C对)。对严重心动过缓的病人,阿托品0.5mg静脉推注,每3~5分钟,重复,最大剂量3mg体外或经静脉心脏起搏。若患者出现心脏停搏,则应持续心肺复苏,肾上腺素1mg静脉推注(反复)。

69. 答案:A

解析:老年男性患者,于睡眠时突发胸痛并呼吸困难、大汗(排除劳力性心绞痛),此时心电图检查II、III、avf导联ST段弓背向上抬高,其余生命体征正常。送医途中症状得到改善,复测心电图恢复正常(心电图ST段一过性抬高),入院后反复测量肌钙蛋白正常(排除心肌梗死可能),患者最可能的诊断应为变异型心绞痛(A对)。

70. 答案:E

解析:青年男性,水肿少尿一周,血压高,尿蛋白(++)(肾小球肾炎可能),一月前有上感史(急性肾炎、急进性肾炎可能)。实验室检查发现患者血肌酐显著增高(正常值44-133 $\mu\text{mol/L}$),B超显示双肾体积增大,提示肾功能急剧恶化,综合判断患者最可能的诊断为新月体性肾小球肾炎(E对)。

71. 答案:B

解析:青年女性,眼睑水肿,有镜下血尿,初步可判断存在泌尿系统疾病,尿相差显微镜可见棘球红细胞,即成熟的红细胞表面有许多小的均一的并均匀分布的棘状突起,常见于肾小球源性血尿。正常人的肾小球滤过膜有血管内皮细胞、基底膜及足突细胞层构成,肾小球损伤时,血液中红细胞通过肾小球滤过膜,受到血管压力和滤过膜的挤压,扭曲变形,形成棘球红细胞。

72. 答案:D

解析:中年男性,血压低,突发胸痛,心电图检查可见V1-V3导联ST段弓背向上抬高,初步可以诊断为急性心肌梗死,根据患者心电图表现,可以判断患者为急性前间壁心肌梗死(D对)。

73. 答案:C

解析:中年女性,既往心悸、多汗、消瘦(高代谢表现,可能存在甲亢病史),加重伴咽痛发热一周(疑存在感染),今日出现恶心呕吐、腹泻、高热大汗等表现,甲状腺II度肿大,可闻及血管杂音,该患者最可能的诊断应为甲状腺危象。甲状腺危象多发生于较重甲亢未予治疗或治疗不充分的病人,常见诱因有感染、手术、创伤、精神刺激等。临床表现有:高热或过高热,大汗,心动过速(>140次/分),烦躁,焦虑不安,谵妄,恶心,呕吐,腹泻,严重病人可有心衰、休克及昏迷等。对于甲状腺危象的处理,主要有①针对诱因治疗。②抗甲状腺药物PTU。③碘剂。④ β 受体阻断剂。⑤糖皮质激素。⑥上述常规治疗效果不满意时,可选用腹膜透析、血液透析或血浆置换等措施迅速降低血浆甲状腺激素浓度。⑦降温:高热者予物理降温,避免用乙酰水杨酸类药物。

74. 答案:D

解析:青少年,踢足球时摔伤膝盖,浮髌试验阳性(提示膝关节肿胀),抽屉实验(-),Lachman实验(+),提示存在交

叉韧带损伤(D对)。

75. 答案:B

解析:青年女性,既往月经增多2年(慢性贫血或妇科疾病),发热乏力两周,血常规提示三系均降低,MCV70f1,属于小细胞性贫血。患者既往月经量多,需铁量增加,最可能的诊断为缺铁性贫血。组织缺铁的表现有:精神行为异常,如烦躁、易怒(C对)、注意力不集中、异食癖(D对);体力、耐力下降;易感染;儿童生长发育迟缓、智力低下;口腔炎(E对)、舌炎、舌乳头萎缩、口角皲裂、吞咽困难;毛发干枯、脱落;皮肤干燥(A对)、皱缩;指(趾)甲缺乏光泽、脆薄易裂,重者指(趾)甲变平,甚至凹下呈勺状(匙状甲)。共济失调和行动不稳常见于巨幼细胞贫血,属于大细胞性贫血(B错,为本题正确答案)。

76. 答案:C

解析:青少年,右膝关节肿胀疼痛无法活动,主被动运动均受限(提示存在右膝关节感染),浮髌试验阳性(提示关节积液较多),关节腔中分层抽出浑浊液体,患者最可能诊断为化脓性关节炎。化脓性关节炎常见的致病菌为金黄色葡萄球菌(C对)。

77. 答案:D

解析:老年人,心梗后行冠脉支架术,术后一月出现反复低热、胸痛(符合心肌梗死后综合征表现),心前区摩擦音,抓刮样粗糙音(提示存在心包炎、胸膜炎),最可能的诊断为心肌梗死后综合征。

78. 答案:C

解析:患儿右侧阴囊无痛肿大,透光实验阳性,可初步判断为鞘膜积液,平卧后可消失,为交通性鞘膜的典型特征(C对)。

79. 答案:B

解析:中年女性,脑膜刺激征阳性,高

热,实验室检查:HIV抗体阳性(体内存在HIV感染),白细胞偏高,脑脊液墨汁染色(+),脑脊液墨汁涂片直接镜检是诊断隐球菌脑膜炎最简便、最快速的方法,约70%的隐球菌脑膜炎患者可以获得阳性结果。患者最可能的诊断为中枢神经系统新型隐球菌病。中枢神经系统新型隐球菌病采用抗真菌药物治疗,如多烯类、三唑类、嘧啶类中的两性霉素B、氟康唑和5-氟胞嘧啶(5-FC)的单独或联合使用(B对)。

80. 答案:B

解析:中年男性,右侧淋巴结肿大伴发热,双侧腹股沟淋巴结肿大,活检提示弥漫大B细胞淋巴瘤,属于非霍奇金淋巴瘤。非霍奇金淋巴瘤临床分期与霍奇金淋巴瘤相同,该患者横隔上下两区域同时受侵犯,属于III期。且患者出现不明原因发热 $>38^{\circ}\text{C}$,全身症状分组已达B组,故该患者临床分期为III期B。

81. 答案:C

解析:老年男性患者,消瘦(消耗性疾病)2个月,查体:脾大,接近脐部,质硬,全身淋巴结未触及。实验室检查:血红蛋白正常,白细胞远超正常(正常值 $4\sim 10\times 10^9/\text{L}$),血小板稍高,细胞遗传学检查可见染色体t(9;22)(q34;q11),患者最可能的诊断为慢性髓系白血病慢性期(C对)。

82. 答案:E

解析:老年男性患者,腰痛、贫血、腰椎骨折。实验室检查提示:血清总蛋白升高(正常值 $60\sim 80\text{g/L}$,白蛋白稍低($35\sim 51\text{g/L}$),血肌酐升高($44\sim 133\mu\text{mol/L}$),骨髓中异常浆细胞增多。综合分析,患者最可能的诊断为多发性骨髓瘤。骨痛为多发性骨髓瘤的主要症状,以腰骶部最多见,其次为胸部和下肢。活动或扭伤后剧痛者有病理性骨折的可能。贫血为本病的另一常见表现。部分患者可有肾功能损害。血清中出现M蛋

白是本病的突出特点(E对)。

83. 答案:C

解析:老年男性患者,阵发心悸两年,心律不齐,第一心音强弱不等,心电图出现不规则的f波代替P波(房颤特征性心电图表现),脉率(108次/分)小于心率(150次/分),患者最可能的诊断应为房颤(C对)。

84. 答案:B

解析:老年女性患者,阵发胸痛加重,既往高血压病史,心电图提示II、III、avF, V7~V9导联抬高(可能提示存在下侧壁心肌梗死),实验室检查血清肌钙蛋白阳性,患者最可能的诊断为急性下侧壁心肌梗死。心肌梗死的治疗药物中,ACEI有助于改善恢复期心肌的重构,培哚普利为ACEI类药物(B对)。

85. 答案:A

解析:中年男性,头晕、乏力,贫血貌(慢性贫血)。查体:肝脾无肿大,血常规结果提示大细胞性贫血(排除溶血性贫血),Hb 87g/L,血小板 89×10^9 /L,网织红细胞轻微升高,幼稚粒细胞0.02,结合患者临床表现与实验室检查,初步诊断为骨髓异常增生综合征。根据患者大细胞性贫血的特征,可以排除A选项,红细胞膜CD55、CD59表达低下多见于阵发性睡眠性血红蛋白尿,属于正细胞性贫血。

86. 答案:D

解析:中年女性,高出坠落后,会阴部感觉障碍,无法自主排便(神经损伤可能)双下肢感觉运动正常。有影像学检查见T12骨折碎片压迫脊髓,患者最可能损伤脊髓圆锥(D对)。

87. 答案:B

解析:青少年,发热、腹泻腹痛,高热。脾大,血白细胞增多,ALT增高(肝功异常),粪便中有虫卵,最可能为血吸虫病。血吸虫病以湖沼区最为严重(C对),钉螺是日本血吸虫必需的唯一

中间宿主(D对),当水体中存在感染血吸虫的阳性钉螺时,便成为疫水。本病感染方式可因生产(捕鱼、种田、割湖草等)或生活(游泳戏水、洗漱、洗衣服等)而接触疫水(E对),导致感染。日本血吸虫病是人兽共患病,传染源是患者和保虫宿主。保虫宿主种类较多,主要有牛、猪、犬、羊、马、狗、猫及鼠类等(A对)。感染后有部分免疫力(B错,为本题正确答案),儿童及非流行区人群如遭受大量尾蚴感染,易发生急性血吸虫病。

88. 答案:D

解析:青年男性,右小腿割伤,无活动性出血,右小腿及右足血运正常(排除血管损伤可能),现出现右侧足背前内侧感觉障碍,最可能损伤腓总神经(D对)。

89. 答案:C

解析:青年男性,剧烈运动后出现头痛、头晕,下肢痉挛,体温较高,心率稍快,血压正常,无意识障碍,最可能的诊断为热痉挛(C对)。热痉挛常发生在剧烈活动后,大量出汗和饮用低张液体后出现头痛、头晕和肢体、腹壁肌群痛性痉挛,肢体活动受限,无明显体温升高,无神志障碍。

90. 答案:D

解析:青年男性,无诱因的发热,右下肢腓肠肌肿痛,皮肤青紫(血肿可能),实验室检查PT正常,APTT延长,患者最可能诊断为血友病A型,缺乏凝血因子VIII(D对)。

91. 答案:C

解析:青年男性,发热2天(可能有感染史),血压升高,尿蛋白(+++),红细胞满视野,免疫荧光可见以IgA为主的颗粒状沉积与系膜区和毛细血管袢,患者最可能的诊断为IgA肾病。IgA肾病起病隐匿,常表现为无症状性血尿,伴或不伴蛋白尿。有些病人起病前数小时或

数日内有上呼吸道或消化道感染等前驱症状，部分病人有高血压，免疫荧光可见系膜区 IgA 为主的颗粒样或团块样沉积，伴或不伴毛细血管祥分布，尿液检查可表现为镜下血尿或肉眼血尿，IgA 肾病的预后不良的指标包括持续难以控制的高血压和蛋白尿(尤其是蛋白尿持续>1g/d)(AB 对)；肾功能损害(E 对)；肾活检病理表现为肾小球硬化、间质纤维化和肾小管萎缩，或伴大量新月体形成(D 对)。镜下血尿不能作为 IgA 肾病的预后指标(C 错，为本题正确答案)。

92. 答案:A

解析:中年女性，完全素食者，进来乏力纳差，实验室检查 Hb:74g/L，提示存在中度贫血，MCV:124mf，MCHC:34g/L，提示贫血类型为大细胞性贫血。大细胞性贫血包括:巨幼细胞贫血、伴网织红细胞大量增生的溶血性贫血、骨髓增生异常综合征、肝疾病等。完全素食者因摄入减少导致 Vit B12 缺乏，维生素 B12 缺乏导致细胞核脱氧核糖核酸(DNA)合成障碍所致的贫血称巨幼细胞贫血(MA)，特点是呈大红细胞性贫血，故该患者最可能的诊断为巨幼细胞贫血(A 对)。

93. 答案:A

解析:青年男性(急性肾小球肾炎多发人群)，肉眼血尿伴尿少一天，2周前有上感病史。查体:血压升高，眼睑下肢水肿。实验室检查:尿蛋白弱阳性，镜下血尿，血清补体 C3 降低，患者最可能的诊断为急性肾小球肾炎(A 对)。

94. 答案:D

解析:系统性红斑狼疮患者，长期服用糖皮质激素，可能导致脂肪栓塞、血液处于高凝状态、引起血管炎、骨质疏松等骨小梁强度下降容易塌陷等，最终导致股骨头坏死。X线平片诊断股骨头坏死可分为四期。I 期(软骨下溶解期):股骨头外形完整，关节间隙正常，股骨

头负重区关节软骨下骨质中可见 1~2cm 宽的弧形透明带，构成“新月征”，此为坏死松质骨塌陷并与关节软骨分离的表现。II 期(股骨头修复期):股骨头外形完整，关节间隙正常，股骨头负重区关节软骨下骨质密度增高，周围可见点状及斑片状密度减低区及囊性改变。III 期(股骨头塌陷期):股骨头负重区的软骨下骨呈不同程度的变平和塌陷，股骨头失去了圆而光滑的外形，软骨下骨的骨密度增高。关节间隙仍保持正常宽度。Shenton 线基本保持连续。IV 期(股骨头脱位期):股骨头负重区严重塌陷，股骨头变扁平，股骨头内下方骨质一般均无塌陷。股骨头向外上方移位，Shenton 线不连续。关节间隙可以变窄，髓白外上缘常有骨赘形成，呈现继发性关节骨关节炎的表现(D 对 ABCE 错)。

95. 答案:B

解析:青少年，左股骨远端疼痛、表面皮肤颈静脉怒张，皮温高。X线可见股骨下端骨密度减低，有骨膜反应，最可能的诊断为骨肉瘤(B 对)。骨肉瘤是一种最常见的恶性骨肿瘤，好发于青少年，好发部位为股骨远端、胫骨近端和肱骨近端的干骺端。主要症状为局部疼痛，可伴有局部肿块，附近关节活动受限。局部表面皮温升高，静脉怒张。骨肉瘤骨膜反应明显，呈侵袭性发展，X线可见 Codman 三角或呈“日光射线”形态。

96. 答案:B

解析:老年男性，发作性心前区压榨性疼痛，可放射至咽部，步行 200 米需休息分钟，平板实验阳性，患者最可能的诊断应为稳定型心绞痛(B 对)。稳定型心绞痛也称劳力性心绞痛。其特点为阵发性的前胸压榨性疼痛或憋闷感觉，主要位于胸骨后部，可放射至咽部，平板试验阳性。

97. 答案:B

解析:老年男性患者,尿频、尿不尽半年,夜尿增多,无尿痛,尿常规正常(泌尿系统无感染)。血清总 PSA 1.7ng/ml(正常 PSA 0-4ng/ml),初步排除前列腺癌可能。B超提示前列腺体积增大,膀胱余尿 100ml,正常膀胱余尿在 10ml 以下,可初步诊断为前列腺增生导致的尿潴留。对症状严重、存在明显梗阻或有并发症的前列腺增生患者应选择手术治疗,首选经尿道前列腺切除术(B对)。

98. 答案:E

解析:中年女性患者,血脂升高 3 年,有家族史,查体可见双侧内眦黄色瘤,实验室检查血清胆固醇 7.5mmol/L(正常值:2.9~6.0mmol/L),血清甘油三酯 1.7mmol/L(正常值:0.22~1.65mmol/L),血清低密度脂蛋白 5.1mmol/L(正常值:2.07~3.62mmol/L)。应诊断为家族性高胆固醇血症(E对)。

99. 答案:A

解析:中年男性,劳累后胸闷,心悸。有类似家族史,无高血压和糖尿病史。胸骨左缘三四肋间(主动脉瓣第二听诊区)可闻及 4/6 级收缩期喷射样杂音(提示流出道狭窄),心尖区可闻及 3/6 级收缩期杂音(二尖瓣关闭不全),患者最可能的诊断为:梗阻性肥厚型心肌病(A对)。

100-1. 答案:A

解析:患者肾衰竭五期(尿毒症期),末次透析后,食用大量橘子(柑橘类水果富含钾元素)后出现胸闷不适、四肢乏力伴口周发麻 2 天,心率明显降低,患者最可能出现了高钾血症(A对)。

100-2. 答案:A

解析:患者肾衰竭五期(尿毒症期),末次透析后,食用大量橘子(柑橘类水果富含钾元素)后出现胸闷不适、四肢乏力伴口周发麻 2 天,心率明显降低,患

者最可能出现了高钾血症。对于肾衰竭伴急重症高钾血症者,以血液透析为最佳(A对)。

102-1. 答案:D

解析:老年男性,右髋部摔伤,查体:右下肢短缩,外旋 85° 畸形,轴向叩击痛阳性,患者最可能为股骨转子间骨折(D对)。股骨转子间骨折后可出现转子间压痛,肿胀,下肢外旋畸形明显,可达 90°,有轴向叩击痛。股骨远端骨折(A错),表现为膝关节和股骨远端部位有肿胀、畸形和压痛。

102-2. 答案:B

解析:患者诊断为股骨转子间骨折,最特异性体征是外旋 85° (B对)。压痛(A错)、红肿(E错)、叩击痛(D错)可见于多种骨折类型,不具特异性。下肢短缩(C错)除了可见于股骨转子间骨折外,股骨颈骨折也可出现下肢短缩。

104-1. 答案:D

解析:青年男性, I 型糖尿病病史 10 年,既往规律使用胰岛素强化治疗,近日自行停用胰岛素,晨起出现意识障碍、高热、脱水貌、血糖显著高于正常(3.9~6.0mmol/L),PH 弱酸性,尿酮体(+++),初步判断患者为糖尿病酮症酸中毒,治疗选用小剂量(短效)胰岛素治疗方案。

104-2. 答案:A

解析:糖尿病酮症酸中毒为最常见的糖尿病急症。以高血糖、酮症和酸中毒为主要表现,是胰岛素不足和拮抗胰岛素激素过多共同作用所致的严重代谢紊乱综合征。临床检查常见胰岛素水平降低(A对)。

104-3. 答案:E

解析:患者应尽早进行补液治疗, :先快后慢,先盐后糖,通常先使用生理盐水。DKA 患者补钾应根据尿量和血钾。本题中患者血钾正常,尿量恢复,应进行补钾(E对)。

107-1. 答案:C

解析:老年女性患者,左髌部摔伤后活动受限,查体:下肢短缩,外旋畸形。X线显示股骨头下骨折,断端部分吻合,根据 Garden 分型,属于III型(C对)。I型:不完全骨折(A错)、II型:无移位的完全骨折(B错)、III型:完全骨折,部分移位、IV型:完全骨折,完全移位(D错),无V型(E错)。

107-2. 答案:C

解析:老年女性患者,左髌部摔伤后活动受限,查体:下肢短缩,外旋畸形。X线显示股骨头下骨折,断端部分吻合,诊断为股骨颈骨折,外旋畸形常见角度为45~60°。

107-3. 答案:A

解析:老年女性患者,左髌部摔伤后活动受限,查体:下肢短缩,外旋畸形。X线显示股骨头下骨折,断端部分吻合,诊断为股骨颈骨折,最佳治疗方法为髌关节置换术(A对)。

110-1. 答案:C

解析:老年男性患者,既往有冠心病史。夜间突发胸闷、端坐呼吸,呼吸频率增加,血压低。该患者最可能的诊断为急性左心衰。急性左心衰竭急性发作或加重的心肌收缩力明显降低、心脏负荷加重,造成急性心排血量骤降、肺循环压力突然升高、周围循环阻力增加,出现急性肺淤血、肺水肿并可伴组织器官灌注不足和心源性休克的临床综合征。

110-2. 答案:A

解析:老年男性患者,既往有冠心病史。夜间突发胸闷、端坐呼吸,呼吸频率增加,血压低,该患者最可能的诊断为急性左心衰。患者第一心音强弱不等,提示可能存在房颤,心力衰竭病人存在房室、室间和(或)室内收缩不同步,进一步导致心肌收缩力降低。心脏

再同步化治疗(CRT)通过改善房室、室间和(或)室内收缩同步性增加心排量,可改善心衰症状、运动耐量,提高生活质量,减少住院率并明显降低死亡率(A对)异丙肾上腺素(B错)用于治疗心源性或感染性休克;完全性房室传导阻滞、心搏骤停。多巴酚丁胺(C错)、多巴胺(D错)、去甲肾上腺素(E错)为药物治疗,起效慢,不作为首选。

110-3. 答案:D

解析:老年男性患者,既往有冠心病史。夜间突发胸闷、端坐呼吸,呼吸频率增加,血压低,该患者最可能的诊断为急性左心衰。患者第一心音强弱不等,提示可能存在房颤。首选检查为冠脉造影(D对)。

113-1. 答案:B

解析:中年女性患者,心尖部可闻及3/6收缩期杂音和舒张期隆隆样杂音(二尖瓣关闭不全伴狭窄)。双肺呼吸音清,无干、湿啰音(初步排除肺部疾病)。最可能的诊断为二尖瓣关闭不全伴狭窄(B对CE错)。三尖瓣关闭不全常于三尖瓣听诊区(胸骨右缘第2肋间、胸骨左缘第3肋间)闻及舒张期杂音,三尖瓣狭窄可在主动脉瓣听诊区闻及收缩期杂音(AD错)。

113-2. 答案:E

解析:中年女性患者,心尖部可闻及3/6收缩期杂音和舒张期隆隆样杂音。双肺呼吸音清,无干、湿啰音。最可能的诊断为二尖瓣关闭不全伴狭窄。超声心动图提示二尖瓣卷曲,瓣口面积狭窄,提示病变在二尖瓣,二尖瓣病变最常见原因为风湿性热(E对)。

115-1. 答案:B

解析:男童,曾在外就餐,后出现高热、昏迷、面色苍白、四肢湿冷、皮肤有花斑纹。实验室检查白细胞增多,综合考虑为中毒性菌痢(B对)。中毒性菌痢为粪口传播,伏期多数为1~2天,起

病、发展快，高热可 $>40^{\circ}\text{C}$ ，迅速发生呼吸衰竭、休克或昏迷，肠道症状多不明显甚至无腹痛与腹泻。

115-2. 答案:E

解析:男童，曾在外就餐，后出现高热、昏迷、面色苍白、四肢湿冷、皮肤有花斑纹。实验室检查白细胞增多，综合考虑为中毒性菌痢。患者学第低，已出现四肢湿冷、皮肤花斑样、面色苍白，考虑为休克型，此时应立即补液、扩容，纠正休克(E对)。

117-1. 答案:A

解析:男童，发热皮肤黏膜出血，肝脾不大，实验室检查:血红蛋白低，中性粒细胞低、血小板低。外周血可见网织红细胞 0.02 (正常值 $0.005\sim 0.015$)，可见幼稚粒细胞。综合分析，该患儿最可能的诊断为骨髓增生异常综合征(A对)。骨髓增生异常综合征病人都有贫血症状，如乏力、疲倦，血象和骨髓象持续一系或多系血细胞减少:血红蛋白 $<100\text{g/L}$ 、中性粒细胞 $<1.8\times 10^9/\text{L}$ 、血小板 $<100\times 10^9/\text{L}$ 。

117-2. 答案:B

解析:男童，发热皮肤黏膜出血，肝脾不大，实验室检查:血红蛋白低，中性粒细胞低、血小板低。外周血可见网织红细胞 0.02 (正常值 $0.005\sim 0.015$)，可见幼稚粒细胞。综合分析，该患儿最可能的诊断为骨髓增生异常综合征。骨髓增生异常综合征病人都有贫血症状，如乏力、疲倦，血象和骨髓象持续一系或多系血细胞减少:血红蛋白 $<100\text{g/L}$ 、中性粒细胞 $<1.8\times 10^9/\text{L}$ 、血小板 $<100\times 10^9/\text{L}$ 。

119-1. 答案:A

解析:中年男性患者，既往烦躁、饥饿伴精神症状。近来晨起昏迷，服用糖水后清醒(低血糖可能)。发作时血糖 $1.8\sim 2.2\text{mmol/L}$ (低血糖诊断标准:发作时血糖值小于等于 2.8mmol/L)。其余

检查未见异常。综合分析，患者的表现符合 whipple 三联征 1、低血糖症状，如心慌、手抖、出汗、饥饿感幼加重、焦虑、行为改变、认知障碍等；2、发作时血糖低于 2.8mmol/L ；3、给子供糖后低血糖不适症状能立刻缓解。该患者收入院后有昏迷现象，需要静脉注入 50% 葡萄糖溶液(A对)。

119-2 答案:C

解析:中年男性患者，既往烦躁、饥饿伴精神症状。近来晨起昏迷，服用糖水后清醒(低血糖可能)。发作时血糖 $1.8\sim 2.2\text{mmol/L}$ (低血糖诊断标准:发作时血糖值小于等于 2.8mmol/L)。其余检查未见异常。综合分析，患者的表现符合 whipple 三联征。首选检查为胰岛素和C肽(C对)。

119-3 答案:A

解析:中年男性患者，既往烦躁、饥饿伴精神症状。近来晨起昏迷，服用糖水后清醒(低血糖可能)。发作时血糖 $1.8\sim 2.2\text{mmol/L}$ (低血糖诊断标准:发作时血糖值小于等于 2.8mmol/L)。其余检查未见异常。综合分析，患者的表现符合 whipple 三联征。1、低血糖症状，如心慌、手抖、出汗、饥饿感幼加重、焦虑、行为改变、认知障碍等；2、发作时血糖低于 2.8mmol/L ；3、给子供糖后低血糖不适症状能立刻缓解。患者既往无糖尿病史，最可能的病因应为胰岛素瘤(A对)。

122-1. 答案:B

解析:老年男性患者，发热乏力、腹胀腹泻，查体:体温升高，血压降低，面部潮红、结膜充血，双腋下可见划痕样出血点，无神智障碍，巩膜无黄染。实验室检查:白细胞增多，血小板减少，粪常规可见白细胞、红细胞，综合分析，患者最可能的诊断为肾综合症出血热。肾综合症出血热的特异性抗体检测:在第2病日即能检出特异性 IgM 抗体，

1:20 为阳性。IgG 抗体 1:40 阳性, 1 周后滴度上升 4 倍或以上有诊断价值(B 对)。

122-2. 答案:C

解析:老年男性患者, 发热乏力、腹胀腹泻, 查体:体温升高, 血压降低, 面部潮红、结膜充血, 双腋下可见划痕样出血点, 无神智障碍, 巩膜无黄染。实验室检查:白细胞增多, 血小板减少, 粪常规可见白细胞、红细胞, 综合分析, 患者最可能的诊断为肾综合症出血热。患者目前体温 39℃, 处于发热阶段, 同时血压降低, 处于休克期, 可早期给予抗病毒药物(利巴韦林、阿昔洛韦)(DE 对), 进行扩容补液(AB 对)。患者目前血液处于高凝状态, 不易应用含有大量凝血因子的新鲜血浆(C 错, 为本题正确答案)。

124-1. 答案:A

解析:患者产后无乳、闭经 4 年、毛发缺失(性腺功能减退), 血钠低、血压低(肾上腺功能减退), 面色苍白、低血糖、低体温, 患者最可能的诊断为垂体危象(A 对)。

124-2. 答案:B

解析:垂体危象时的处理:①纠正低血糖:立即以 50%葡萄糖溶液 40~80ml 静脉注射, 继以 5%葡萄糖氯化钠溶液持续静脉滴注, 纠正低血糖同时纠正失水; ②大剂量肾上腺皮质激素; ③纠正水和电解质紊乱:血钠严重降低的病人, 需要给予高浓度的氯化钠溶液; ④纠正休克:腺垂体功能减退症危象时低血压、休克很常见, 血容量不足、低血糖等是重要原因。经过以上治疗, 多数病人血压逐渐回升, 休克纠正而不需要用升压药。⑤其他:去除诱因, 感染是最常见、最重要的诱因, 需要根据病人的情况选择抗生素抗感染治疗; 低体温者需要用热水袋、电热毯等将病人体温回升至 35℃以上, 并在使用肾上腺皮质激素后

开始用小剂量甲状腺素治疗; 高热者需要物理和化学降温; 慎用镇静药。

126-1. 答案:B

解析:女性患者, 高处跌落后腰部着地, 查体可见腰部皮肤青紫(淤血瘀斑), 有压痛。腹部无压痛、反跳痛(初步排除腹膜刺激症), 全程肉眼血尿。患者最可能损伤的部位在肾(B 对)。

126-2. 答案:E

解析:女性患者, 高处跌落后腰部着地, 查体可见腰部皮肤青紫(淤血瘀斑), 有压痛。腹部无压痛、反跳痛(初步排除腹膜刺激症), 全程肉眼血尿。患者最可能损伤的部位在肾。肾损伤时的初期治疗包括:绝对卧床休息, 密切观察, 及时补充血容量和能量, 维持水、电解质平衡, 保持足够尿量, 必要时输血, 早期足量合理应用抗生素预防感染, 合理使用止痛、镇静剂和止血药物。肾动脉造影、血管栓塞止血多用于肾外伤后的并发症治疗中, 不作为初期治疗。故选 E。

128-1. 答案:C

解析:老年女性患者, 突发呼吸困难, 咳粉红色泡沫痰, 听诊肺部布满湿啰音(急性左心衰、肺水肿可能), 查体血压低, S3 奔马律。综合分析, 该患者最可能的诊断是急性左心衰。

128-2 答案:E

解析:老年女性患者, 突发呼吸困难, 咳粉红色泡沫痰, 听诊肺部布满湿啰音(急性左心衰、肺水肿可能), S3 奔马律。诊断为急性左心衰。该患者不能选择硝普钠作为治疗用药。硝普钠为动静脉血管扩张剂, 该患者血压低, 若使用硝普钠, 则会进一步加重患者低血压, 有休克危险。故选 E。

128-3 答案:A

解析:老年女性患者, 突发呼吸困难, 咳粉红色泡沫痰, 听诊肺部布满湿啰音(急性左心衰、肺水肿可能), S3 奔马

律。诊断为急性左心衰。患者既往冠心病史 10 年，考虑本次急性心衰由冠心病所致，冠状动脉造影为检测冠心病的金标准，可以动态观察冠状动脉血流及解剖情况，了解冠状动脉病变的性质、部位、范围、程度等。

131-1. 答案:D

解析:中年男性，间断性肉眼血尿 1 月余，无腹痛、发热(感染可能性小)，无尿频、尿急、尿痛(无膀胱刺激征)，B 超提示膀胱内侧壁有一 2cm 乳头状新生物，根据患者临床表现与影像学检查，最可能的诊断应为膀胱癌早期。血尿是膀胱癌最常见的症状。约 85% 的病人表现为间歇性无痛全程肉眼血尿，可自行减轻或停止。尿频、尿急、尿痛多为膀胱癌的晚期表现，常因肿瘤坏死、遗疡或并发感染所致。经尿道膀胱肿瘤电切术(TURBT)既是膀胱癌的重要诊断方法，同时也是主要的治疗手段。TURBT 应将肿瘤完全切除直至正常的膀胱壁肌层(D 对)。

131-2. 答案:C

解析:中年男性，间断性肉眼血尿 1 月余，无腹痛、发热(感染可能性小)，无尿频、尿急、尿痛(无膀胱刺激征)，B 超提示膀胱内侧壁有一 2cm 乳头状新生物，根据患者临床表现与影像学检查，最可能的诊断应为膀胱癌。血尿是膀胱癌最常见的症状。约 85% 的病人表现为间歇性无痛全程肉眼血尿，可自行减轻或停止。尿频、尿急、尿痛多为膀胱癌的晚期表现，常因肿瘤坏死、遗疡或并发感染所致。诊断膀胱癌最具价值的检查为膀胱镜加活检，膀胱镜下可以直接观察到肿瘤的部位、大小、数目、形态，初步估计浸润程度等，并可对肿瘤和可疑病变进行活检(C 对)。

133-1. 答案:D

解析:老年女性患者，诊断为肾病综合征，既往应用强的松治疗，线影像学显

示右下肺有渗出，疑似肺部感染，此时最易发生肺部机会致病菌感染(D 对)。

133-2. 答案:C

解析:老年女性患者，诊断为肾病综合征，既往应用强的松治疗 3 个月，现疑似出现肺部感染症状，此时应缓慢减量。

135-1. 答案:C

解析:体外冲击波碎石适应证:适用于直径 $\leq 2\text{cm}$ 的肾结石及输尿管上段结石。输尿管中下段结石治疗的成功率比输尿管镜取石低(C 对)。

135-2. 答案:A

解析:经皮肾镜碎石取石术适用于所有需手术干预的肾结石，包括完全性和不完全性鹿角结石、 $\geq 2\text{cm}$ 的肾结石、有症状的肾盏或憩室内结石、体外冲击波难以粉碎及治疗失败的结石，以及部分 L4 以上较大的输尿管上段结石(A 对)。

137-1. 答案:B

解析:血管内溶血时，若超过了结合珠蛋白的处理能力，则游离血红蛋白从肾小球滤过。滤出的血红蛋白量若超过近曲小管重吸收能力，则出现血红蛋白尿。被近曲小管上皮细胞重吸收的血红蛋白分解为卟啉、珠蛋白及铁，铁以铁蛋白或含铁血黄素的形式沉积在肾小管上皮细胞中，随上皮细胞脱落由尿液排出，形成含铁血黄素尿。由此可见，在血管内溶血时，血红蛋白分解的铁以铁蛋白或含铁血黄素的形式沉积在肾小管上皮细胞中，对肾小管上皮细胞造成损害，后随着脱落的上皮细胞一起排出(B 对)。

137-2 答案:C

解析:肺出血肾炎综合征，是一种罕见的由于炎症侵袭导致肺和肾的免疫功能损伤的疾病，主要病因为感染和遗传，会导致患者呼吸道出现异常，影响正常生活。临床表现为反复咯血、呼吸急促、血尿等，导致的肾损伤类型为新月

体肾炎(C对)。

139-1. 答案:A

解析:右心衰竭时以体循环淤血为主要表现。可有消化道症状(腹胀、食欲缺乏、恶心、呕吐等);劳力性呼吸困难;水肿:表现为始于身体低垂部位的对称性凹陷性水肿;颈静脉征(颈静脉搏动增强、充盈、怒张是右心衰时的主要体征,肝颈静脉反流征阳性则更具特征性);肝大:肝淤血肿大常伴压痛,持续慢性右心衰可致心源性肝硬化;心脏体征:除基础心脏病的相应体征外,可因右心室显著扩大而出现三尖瓣关闭不全的反流性杂音。

139-2. 答案:C

解析:肺循环淤血,导致肺毛细血管血压升高,液体渗入到肺泡腔,出现湿啰音。颈-静脉回流征阳性、颈静脉搏动、多浆膜腔积液、下肢水肿均为体循环淤血的表现。

141-1. 答案:D

解析:伤寒缓解期体温开始下降,患者仍觉虚弱,食欲开始恢复,腹胀减轻。肿大的脾脏回缩,压痛减退。本期仍有可能出现各种并发症,包括肠出血、肠穿孔等严重并发症仍可发生。肠穿孔时X线立位可见游离气体。

141-2. 答案:B

解析:伤寒极期常伴有伤寒的典型表现,肠出血与肠穿孔等并发症亦较多在本期发生。患者可出现玫瑰疹、稽留热、消化道症状、神经系统症状(患者虚弱、精神恍惚、表情淡漠、呆滞、反应迟钝、听力减退。严重者可出现谵妄、昏迷)(B对)。

143-1. 答案:B

解析:多发性骨髓瘤可分为IgG型、IgA型、轻链型、IgD型、IgM型、IgE型、双克隆可或多克隆型、不分泌型。IgA型约占MM的15%~20%,IgA易聚集

成多聚体而引起高黏滞血症(B对)。

143-2. 答案:E

解析:多发性骨髓瘤可分为IgG型、IgA型、轻链型、IgD型、IgM型、IgE型、双克隆可或多克隆型、不分泌型。其中IgG型是最常见的MM亚型,约占MM的50%左右,此型具有MM的典型临床表现(E对)。

145-1. 答案:D

解析:伸直型骨折(Colles骨折)多为腕关节处于背伸位、手掌着地、前臂旋前时受伤,以手法复位外固定治疗为主,手法复位时,充分牵引后,加大屈腕角度,纠正成角,向尺侧挤压,在屈腕、尺偏位检查骨折对位对线情况及稳定情况,并使用石膏将复位满意的前臂固定(D对)。

145-2. 答案:A

解析:桡骨小头半脱位是小儿肘关节在伸直位突然受到纵向牵拉,造成肱桡关节间隙加大,关节腔内负压增加,薄弱的环状韧带或部分关节囊嵌入桡骨小头与桡骨头之间,取消牵拉力以后,桡骨头不能回到正常解剖位置,而是向桡侧移位,形成桡骨头半脱位。桡骨头半脱位时无需麻醉即可手法复位,切复位后无需固定(A对)。

147-1. 答案:D

解析:左室舒张末压3mmHg,肺动脉楔压25mmHg,见于二尖瓣狭窄(B对)。二尖瓣狭窄时,舒张期由左心房流入左心室的血流减少,左心房内压力升高,导致肺静脉和肺毛细血管压力增加(正常肺动脉楔压6~12mmHg)。左心室内血量减少,压力减少,导致左心室舒张末期压力减小(正常左心室舒张末期压力5~6mmHg)。

147-2. 答案:A

解析:正常收缩压收缩压90~140mmHg,舒张压60~90mmHg,脉压30~40mmHg。本题中收缩压略升高,舒

张压降低，脉压增大，常见于主动脉瓣关闭不全(A对)。主动脉瓣膜关闭不全时，舒张期的血液大部分会反流回左心室，致使左心室内血液增加，主动脉内血液减少，舒张压下降。收缩期时，左心室血量增加，射入主动脉的血量增加，导致收缩压上升，脉压增大。

149-1. 答案:E

解析:Addison 病又称原发性慢性肾上腺皮质功能减退症，临床上可见全身皮肤色素明显加深，多呈弥漫性，以暴露部，经常摩擦部位和指(趾)甲根部，疤痕，乳晕，外生殖器，肛门周围，牙龈，口腔粘膜，结膜为明显(E对)。

149-2. 答案:C

解析:Sheehan 综合征(席汉综合征)是由于产后大出血，尤其是伴有长时间的失血性休克，使垂体前叶组织缺氧、变性、坏死，继而纤维化，最终导致垂体前叶功能减退，ACTH 缺乏，临床上表现为皮肤色素减退、面色苍白、乳晕色素减淡、产后无乳、闭经、继发性不孕、性欲减退、毛发脱落等症状。

第三单元

1. 答案:B

解析:ANCA 为抗中性粒细胞胞浆抗体，对血管炎的诊断有帮助，不用来诊断系统性红斑狼疮。诊断系统性红斑狼疮多用抗 dsDNA 抗体。

2. 答案:A

解析:外科手术患者，机体处于应激状态，此时机体的代谢变化为静息能量消耗增多、高血糖、蛋白质分解增强。组织器官对葡萄糖利用下降。故本题选 A。

3. 答案:B

解析:交通性气胸是开放性气胸的一种，开放性气胸的急救处理要点是:立即将开放性气胸变为闭合性气胸。使用无菌敷料如凡士林纱布、棉垫或清洁器材如塑料袋、衣物、碗杯等制作不透气的敷料

和压迫物(B对)。

4. 答案:E

解析:胃溃疡是消化性溃疡的一种类型，指发生在胃内壁的溃疡。当胃黏膜由于某种原因出现破损时，容易在该部位发生溃疡，即形成胃溃疡。典型的胃溃疡多见于胃角附近及胃窦小弯侧。多数活动性溃疡直径 <10mm，边缘较规整，周围黏膜常有充血水肿(A对)，表面覆以渗出物形成的白苔或黄苔(B对)，底部由肉芽组织构成(D对)。溃疡深者可累及胃壁肌层或浆膜层，可见坏死组织(C对)。异型细胞多见于肿瘤组织或癌前病变中(E错，为本题正确答案)。

答 5. 案:A

解析:消化性溃疡的病因和发病机制是多因素的，损伤与防御修复不足是发病机制的两方面。十二指肠溃疡以高胃酸分泌起主导作用。胃溃疡以黏膜屏障防御功能降低为主要机制。黏膜防御与修复异常胃黏膜的防御和修复功能对维持黏膜的完整性、促进溃疡愈合非常重要。防御功能受损，修复能力下降，都对溃疡的发生和转归产生影响(A对)。

6. 答案:A

解析:十二指肠溃疡穿孔好发于球部前壁。十二指肠球部前壁的管壁比较薄弱，且血液循环主要依靠胰十二指肠动脉分支和胃十二指肠动脉的分支供应，相对来说，血液循环是不丰富的，所以此部位的溃疡易发生穿孔。

7. 答案:C

解析:支气管哮喘是一种以慢性气道炎症和气道高反应性为特征的异质性疾病。主要特征包括气道慢性炎症，气道对多种刺激因素呈现的高反应性，多变的可逆性气流受限，以及随病程延长而导致的一系列气道结构的改变，即气道重构。严重哮喘发作时可出现缺氧。由于过度通气可使 PaCO₂ 下降，pH 上升，表现为呼吸性碱中毒。若病情进一步恶化，

可同时出现缺氧和 CO₂ 滞留, 表现为呼吸性酸中毒(ABD 错)。当 PaCO₂ 较前增高, 即使在正常范围内也要警惕严重气道阻塞的发生, 此时需要进行机械通气(C 对)。PaCO₂ 增高不代表合并心力衰竭无需使用利尿剂(E 错)。

8. 答案:E

解析:肺脓肿根据感染途径常分为吸入性肺脓肿、继发性肺脓肿、血源性肺脓肿。其中吸入性肺脓肿常为单发, 致病菌多为厌氧菌, 其次为需氧菌和兼性厌氧菌(肺炎球菌、金黄色葡萄菌)。

9. 答案:C

解析:Grey-Turner 征为急性坏死性胰腺炎患者的一种体征, 表现为患者的双侧或单侧腰部皮肤出现蓝-绿-棕色大片不规则淤斑。这是由于急性胰腺炎时胰酶溢出胰腺组织外, 引起出血性积液, 其内含有多种胰酶, 消化性很强。可沿腹膜后透过肌层等组织, 到达皮下组织而引起毛细血管出血所致(C 对)。

10. 答案:B

解析:乳腺癌的影像学检查方法包括:乳房 X 线摄影、超声、MRI。其中乳房 X 线摄影是常用的影像学检查方法, 广泛用于乳腺癌的普查(B 对)。

11. 答案:A

解析:慢阻肺特征性的病理生理变化是持续气流受限致肺通气功能障碍。肺气肿加重导致大量肺泡周围的毛细血管受肺泡膨胀的挤压而退化, 致使肺毛细血管大量减少, 肺泡间的血流量减少, 此时肺泡虽有通气, 但肺泡壁无血液灌注, 导致生理无效腔气量增大:也有部分肺区虽有血液灌注, 但肺泡通气不良, 不能参与气体交换, 导致功能性分流增加, 从而产生通气与血流比例失调(A 对)。

12. 答案:D

解析:急性呼吸窘迫综合征(ARDS)是指由各种肺内和肺外致病因素所导致的急

性弥漫性肺损伤和进而发展的急性呼吸衰竭。主要病理特征是炎症反应导致的肺微血管内皮及肺泡上皮受损, 肺微血管通透性增高, 肺泡腔渗出富含蛋白质的液体, 进而导致肺水肿及透明膜形成。由于肺泡膜通透性增加与肺表面活性物质减少, 引起肺间质和肺泡水肿以及小气道陷闭和肺泡萎陷不张。可引起肺顺应性降低、肺内分流增加, 造成顽固性低氧血症和呼吸窘迫(D 对)。

13. 答案:A

解析:先天性巨结肠是临床表现以便秘为主, 病变肠管神经节细胞缺如的一种消化道发育畸形。X 线检查:可见在病变肠段以上肠管扩张, 内含有气体和液性粪便一气液平面, 而在病变肠段中不含气体, 呈现一个典型的低位肠梗阻征象(A 对)。

14. 答案:C

解析:结肠癌早期症状多不明显, 易被忽视。凡 40 岁以上有以下任一表现者应列为高危人群:①I 级亲属有结直肠癌史者; ②有癌症史或肠道腺瘤或息肉史; ③大便隐血试验阳性者(C 对)。

15. 答案:A

解析:阑尾炎手术后, 肠蠕动减弱, 容易造成粘连性肠梗阻。若可闻及肠鸣音或肛门排气, 代表肠道已恢复蠕动(A 对)。

16. 答案:B

解析:小儿阑尾炎的临床特点包括:①病情发展较快且较重, 早期即出现高热、呕吐等症状(D 错):②右下腹体征不明显、不典型, 但有局部压痛和肌紧张, 是小儿阑尾炎的重要体征(C 错):③穿孔率较高, 并发症和死亡率也较高(B 对 E 错)。小儿阑尾炎的治疗原则是早期手术, 并配合输液、纠正脱水, 应用广谱抗生素等(A 错)。

17. 答案:D

解析:C13 呼气实验是一种检测是否有

幽门螺旋杆菌感染的一种方法。通过规范用药两周，在疗程结束后，需要停药四周复查。根除 Hp 感染后，用 C13 复查需要在治疗后 4 周，避免在应用 PPI 或抗生素期间出现假阴性结果(D 对)。

18. 答案:D

解析:胃癌术前能明确肿瘤浸润深度的检查是超声内镜检查(D 对)。可较准确地判断肿瘤侵犯深度,有助于区分早期和进展期胃癌,并了解有无局部淋巴结转移,可作为 CT 检查的重要补充。腹部 CT 检查可以提高胃癌临床分期的精确度(A 错)。X 线钡剂检查可能发现胃内的溃疡及隆起型病灶,分别呈龛影或充盈缺损,但难以鉴别良恶性(B 错)。染色内镜(C 错)、腹部 MRI(E 错)不作为肿瘤浸润深度的检查项目。

19. 答案:A

解析:部分肝切除是治疗肝癌首选和最有效的方法。肝切除可以通过开腹施行,也可有选择地用经腹腔镜或机器人辅助下施行。手术指证包括:病人一般情况:①较好,无明显心、肺、肾等重要脏器器质性病变;②Child-Pugh 肝功能分级属 A 级;或 B 级,经短期护肝治疗后肝功能恢复到 A 级(B 错):③有条件的医院,术前可以做 ICG 检测:④评估肝切除后残肝体积,手术后足够维持肝功能。肿瘤可切除性评估:没有肝外多处转移。①单发的微小肝癌和小肝癌;②单发的向肝外生长的大肝癌或巨大肝癌,受肿瘤破坏的肝组织少于 30%,肿瘤包膜完整,周围界限清楚:③多发肿瘤,但肿瘤结节少于 3 个,且局限在肝的一段或一叶内(A 对)。大量腹水(C 错)、胆红素过高(E 错)属于 Child3 级,不满足手术条件。AFP>100,可初步诊断为肝脏肿瘤,但不是手术的指证(D 错)。

20. 答案:D

解析:轻症状的低钙血症患者可能会出

现面神经叩击征(Chvostek 征)阳性、束臂加压试验(Trousseau 征)阳性(D 对)。以叩枕捶或手指叩击耳前,面神经腮腺处可以引起同侧面肌痉挛样收缩,重者对侧面肌肉也有抽搐。

21. 答案:D

解析:肺栓塞是以各种栓子阻塞肺动脉或其分支为其发病原因的一组疾病或临床综合征的总称,肺栓塞的病理学改变包括:血流动力学改变、气体交换障碍、肺梗死、慢性血栓栓塞性肺动脉高压。肺栓塞引起的血流动力学改变为肺通气血流比失调(D 对)。

22. 答案:E

解析:低位肠梗阻为临床常见病,发生于回肠、回盲部、大肠的梗阻(C 错),低位小肠梗阻的腹胀明显,呕吐出现晚而次数少,并可吐粪样物(ABD 错)。X 线检查有助于鉴别低位肠梗阻和高位肠梗阻,低位小肠梗阻,扩张的肠袢在腹中部,呈“阶梯状”排列,结肠梗阻时扩大的肠袢分布在腹部周围,可见结肠袋,胀气的结肠阴影在梗阻部位突然中断,盲肠胀气最显著(E 对)。

23. 答案:C

解析:患者左侧甲状腺乳头状癌,伴淋巴结转移,适宜的手术方式为甲状腺次全切除+左侧改良根治性颈淋巴结清扫术(C 对)。

24. 答案:C

解析:CT 肺动脉造影是肺动脉栓塞的一线确诊手段(C 对)。

25. 答案:A

解析:Mirizzi 综合症是特殊类型的胆囊结石,结石嵌顿在胆囊颈部或胆囊管,压迫肝总管,影像学检查可见胆囊增大、肝总管扩张、胆总管正常(A 对)。

26. 答案:B

解析:肝硬化患者呕血 800ml 后,因有效循环血量不足及低蛋白血症导致腹腔

积液增多。故本题选 B。

27. 答案:A

解析:休克的监测指标中,尿量是反映肾血液灌注情况的重要指标(A对)。

28. 答案:A

解析:患者既往有胆囊切除手术史(既往有胆道疾病,胆石症及胆道感染是记性胰腺炎的主要病因),一天前行十二指肠 ERCP 手术(手术易损伤胰腺组织,导致胰腺严重血液循环障碍,可以引起 AP)。现突发左上腹剧烈疼痛,向背部疼痛(胰腺炎特征性表现),考虑为记性胰腺炎(A对)。

29. 答案:A

解析:患者做诊断性胸腔穿刺抽液时,突然发生头晕、冷汗、心悸、面色苍白、脉细等表现,应考虑“胸膜反应”,应立即停止抽液,使病人平卧(A对 B 错)。必要时皮下注射 0.1%肾上腺素 0.5ml,密切观察病情,注意血压变化,防止休克(E错)。若过快、过多抽液可使胸腔压力骤降,发生复张后肺水肿或循环衰竭,表现为剧咳、气促、咳大量泡沫状痰,双肺满布湿罗音,X线显示肺水肿征。治疗应立即吸氧,酌情应用糖皮质激素及利尿剂(CD错)。

30. 答案:A

解析:患者出现食管胃底静脉曲张破裂出血,脾大,应施行断流术,达到止血的目的。手术操作相对简单、创伤小,对肝脏门静脉血供影响较少。断流手术中,以脾切除加贲门周围血管离断术最为常用,不仅离断了食管胃底的静脉侧支,还保存了门静脉入肝血流。此术式适合于门静脉循环中没有可供与体静脉吻合的通畅静脉,既往分流手术和其他非手术疗法失败而又不适合分流手术、及需要行预防性手术的病人(A对 CE错)。分流术:通过在门静脉系统与腔静脉系统间建立分流通道、降低门静脉压力、达到止血效果的一类手术。缺点:

术后肝脏更加缺少门静脉血供,对肝功不利,不适用于肝功能较差的病人:术后肝性脑病的发生率较高(CD错)。

31. 答案:B

解析:血栓闭塞性脉管炎(TAO)又称 Buerger 病,是血管的炎性、节段性和反复发作的慢性闭塞性疾病。多侵袭四肢中、小动静脉,以下肢多见,好发于男性青壮年(A对)。本病起病隐匿,进展缓慢(C对),主要临床表现有:①病肢怕冷,皮肤温度降低,苍白或发绀。②病肢感觉异常及疼痛,早期起因于血管壁炎症刺激末梢神经,后因动脉阻塞造成缺血性疼痛,即间歇性跛行或静息痛。③长期慢性缺血导致组织营养障碍改变。严重缺血者,病肢末端出现缺血性溃疡或坏疽(D对)。④病肢的远侧动脉搏动减弱或消失。⑤发病前或发病过程中出现复发性游走性浅静脉炎(E对)。

32. 答案:C

解析:慢性阻塞性肺疾病(COPD)简称慢阻肺,其特征是持续存在的呼吸系统症状和气流受限,肺功能检查对确定气流受限有重要意义,在吸入支气管扩张剂后,第一秒用力呼气容积(FEV₁)占用力肺活量(FVC)之比值(FEV₁/FVC) <70%表明存在持续气流受限(C对)。支气管舒张试验用于测定支气管哮喘的实验室检查方法(A错)。弥散功能下降多见于间质性肺疾病(B错)。COPD时,肺总量(TLC)功能残气量(FRC)和残气量(RV)增高,肺活量(VC)减低(E错)。

33. 答案:B

解析:胃粘膜上皮异型增生又称不典型增生,是上皮细胞过度增生和分化缺失(B对)。胃粘膜上皮和腺体被杯状细胞幽门腺细胞取代成为化生(A错)。淋巴细胞、浆细胞等慢性炎症改变是胃粘膜的炎症变化(C错)。腺体缺失、间质纤维化是萎缩的表现(D错)。中性粒细胞

提示炎症活动性(E 错)。

34. 答案:A

解析:患者出现反酸不能完全缓解(食管、胃贲门疾病),近来有吞咽困难等表现,最可能的诊断为食管癌,首选检查为胃镜(A对)。进行性吞咽困难是中晚期食管癌的典型症状,胃镜是食管癌诊断的首选方法,可直接观察病灶形态,并取活检以确诊。色素内镜、电子染色,内镜放大内镜及共聚焦激光显微内镜等可提高早期食管癌的检出率。CT检查可清晰显示食管与邻近纵隔器官的解剖关系、肿瘤外侵程度及转移病灶,有助于制订外科手术方式及放疗计划,但难以发现早期食管癌(B错)。腹部B超(C错)、腹部平片(D错)、X线检查(E错)对食管癌的检查无太大帮助。

35. 答案:A

解析:中年男性,进食后出现反流和烧心,胃镜检查食管黏膜未见明显异常(排除食管癌),最可能的诊断为反流性食管炎(A对)。反流性食管炎最常见的症状为反流和烧心,胃镜是诊断反流性食管炎最准确的方法,并能判断反流性食管炎的严重程度和有无并发症。

36. 答案:A

解析:胰腺炎产生休克症状时,大量炎症渗出、严重炎症反应及感染。此时需立即行抗休克治疗。进行液体复苏,补充体液与电解质(BC对),恢复有效循环血量及电解质平衡。当胰腺坏死>30%时,胰腺感染风险增加,可预防性静脉给予亚胺培南或美罗培南7~10天,有助于减少坏死胰腺继发感染,及时抗感染治疗(E对)。对于血容量不足所致的休克或低血压,去甲肾上腺素可作为急救时补充血容量的辅助治疗,以使血压回升暂时维持脑与冠状动脉灌注(D对)。抗休克治疗时无需利尿(A错,为本题正确答案),利尿会导致血容量进一步降低,对抗休克治疗无益处。

37. 答案:A

解析:输血过程中,出现过敏反应时,应暂时中止输血。若出现严重过敏反应,如过敏性休克时,应立即停止输血(B对A错),肌肉注射肾上腺素(E对)和(或)静脉滴注糖皮质激素(氢化可的松或地塞米松)(D对)。合并呼吸困难者应作气管插管或切开,以防窒息。加快补液,纠正休克状态(C对)。

38. 答案:B

解析:休克按照程度分可分为轻度、中度、重度。轻度休克时收缩压正常或稍升高,舒张压增高,脉压缩小。估计失血量20%以下(800ml以下)。中度休克时收缩压为90~70mmHg,脉压小,估计失血量在20%~40%(800~1600ml)左右。重度休克时收缩压在70mmHg以下或测不到,估计失血量在40%以上(1600ml以上)。本题中收缩压90mmHg,符合中度休克,估计失血量在800~1600ml(B对)。

39. 答案:C

解析:阑尾切除术时,部分病人阑尾就在切口下,容易显露。如病人阑尾暴露不明显,沿结肠带向盲肠会集点追踪,即能找到阑尾

40. 答案:B

解析:糖尿病病人需要根据病人确定合理的总能量摄入,合理、均衡地分配各种营养物质,恢复并维持理想体重。1. 合理控制总热量控制总能量摄入,体重低于理想体重者、儿童、孕妇、哺乳期妇女、伴有消耗性疾病者,能量摄入可适当增加10%~20%;肥胖者酌减,使体重逐渐恢复至理想体重的±5%左右。病人每天总能量根据年龄、身高、体重、劳动强度而定(ABE错)。糖尿病病人应选择低血糖生成指数的食物,有利于控制血糖和体重。蛋白质摄入量应占总热量的15%~20%,成年病人每日每千克理想体重0.8~1.2g(D错)。每日脂肪摄入

量占总热量的 25%~30%，其中饱和脂肪酸摄入量小于总能量的 10%，胆固醇摄入量 <300mg/d。富含膳食纤维的食品可延缓食物吸收，降低餐后血糖高峰，有利于改善糖、脂代谢紊乱，并增加饱腹感。建议我国成人膳食纤维的摄入量为 25~30g/d (B 对)。

41. 答案:A

解析:股骨干骨折出血时，用止血带固定时，需要每隔一段时间放松 1 分钟左右，以免导致股骨远端的肢体或者肌肉缺血坏死。故本题选 A。

42. 答案:A

解析:免疫性胃炎时，体内出现针对壁细胞或内因子的自身抗体时，自身免疫性的炎症反应导致壁细胞总数减少、泌酸腺萎缩、胃酸分泌降低:内因子减少可导致维生素 B₁₂ 吸收不良，出现巨幼细胞贫血。应相应补充 VitB₁₂。

43. 答案:A

解析:幽门螺旋杆菌感染是十二指肠溃疡的重要治病因素，十二指肠溃疡病人常有幽门螺旋杆菌感染病史 (A 对)。大量饮酒、长期吸烟、应激等是 PU 的常见诱因 (BCD 错)。自身免疫是一些免疫疾病和慢性胃炎的发病机制 (E 错)。

44. 答案:A

解析:膀胱癌 T 分期的依据是膀胱癌的浸润深度 (A 对)。临床上将 T_{is}、T_n、和 T₁ 期肿瘤称为非肌层浸润性膀胱癌，T₂ 及以上则称为肌层浸润性膀胱癌。淋巴结转移数量是 N 的分期依据 (C 错)。是否远处转移是 M 的分期依据 (E 错)。

45. 答案:A

解析:胸腔积液的体征与积液的多少有关。少量积液可无明显体征，或可触及胸膜摩擦感及闻及胸膜摩擦音。中至大量积液时，患侧胸廓饱满，触觉语颤减弱，局部叩诊浊音，呼吸音减低或消失。可伴有气管、纵隔向健侧移位。恶

性胸水常由恶性肿瘤引起，患者胸廓饱满，语颤减弱 (A 对)，局部叩诊浊音 (B 错)，肋间隙变宽 (C 错)，呼吸运动减弱 (D 错)，呼吸音减低或消失 (E 错)。

46. 答案:B

解析:患者右侧大量胸腔积液，穿出血性胸水 (恶性肿瘤或结核所致)，LDH 580U/L (乳酸脱氢酶大于 500U/L，多提示为恶性肿瘤或并发细菌感染)。患者的胸水性质为癌性胸腔积液。

47. 答案:A

解析:急性肾小球肾炎的致病菌主要为 β-溶血性链球菌 (A 对)。B 组溶血性链球菌是一种革兰式阳性球菌，属于一种机会性致病菌，不是急性肾小球肾炎的致病菌 (B 错)。柯萨奇病毒是病毒性心肌炎的主要致病菌 (C 错)。草绿色链球菌为甲型溶血性链球菌，一般不造成急性肾小球肾炎 (D 错)。金黄色葡萄球菌是各种化脓性感染的主要致病菌 (E 错)。

48. 答案:C

解析:影响创伤愈合的因素:主要有局部和全身两个方面。局部因素中伤口感染是最常见的原因细菌感染可损害细胞和基质，导致局部炎症持久不易消退，甚至形成化脓性病灶等 (C 对)。

49. 答案:B

解析:中年男性，肛门脱出肿物，可自行还纳。根据患者的临床表现，诊断为内痔 II 度 (B 对)。内痔的分度:I 度:便时带血、滴血或手纸带血，便后出血可自行停止，无痔脱出; II 度:排便时有痔脱出，便后可自行还纳，可伴出血; III 度:排便或久站、咳嗽劳累负重时痔脱出肛门外，需用手辅助还纳，可伴出血; V 度:痔脱出不能还纳或还纳后又脱出，可伴出血 (ACDE 错)。

50. 答案:B

解析:中年男性，腹部损伤后出现压痛、反跳痛、肌紧张 (腹膜刺激征)，怀

疑有腹内脏器损伤,应对腹腔内脏器进行探查,探查顺序为:先探查肝、脾等实质性器官,同时探查膈肌、胆囊等有无损伤:接着从胃开始,逐段探查十二指肠第一段、空肠、回肠、大肠以及其系膜,然后探查盆腔脏器,再后则切开胃结肠韧带显露网膜囊,检查胃后壁和胰腺:如有必要,最后还应切开后腹膜探查十二指肠二、三、四段(B对 ACDE 错)。

51. 答案:C

解析:患者既往肛周脓肿病史,腹泻腹痛3年,大便有粘液无脓血(排除溃疡性结肠炎,B错)。右下腹包块,压痛,边界不清,患者最可能的诊断为克罗恩病(C对)。克罗恩病常见症状有腹泻、腹痛、右下腹腹部包块,肛门周围瘘管、脓肿及肛裂等病变。

52. 答案:B

解析:患者脾切除后行动脉血气分析:PH 7.28(< 7.35),二氧化碳分压 32mmHg(正常值 35~45mmHg,提示呼吸性碱中毒),碱剩余-6(提示代谢性酸中毒),乳酸 4mol/L(正常值 $< 2\text{mol/L}$)。综合分析患者最可能为呼吸性碱中毒合并代谢性酸中毒(B对 ACDE 错)。

53. 答案:C

解析:毕 II 术后5天,患者出现左上腹痛,放射至背部(考虑为术后早期并发症),引流出胆汁样液体,血清淀粉酶 1500U/L(正常值:25~125U/L)。患者最可能诊断为:十二指肠残端破裂(C对)。

54. 答案:A

解析:中年男性,大便带血月余(高度怀疑结肠疾病)。直肠指诊:光滑柔软带蒂包块,直径约 1cm,指套带血,最可能的诊断为直肠息肉(A对)。

55. 答案:B

解析:患者转移性右下腹痛5天(急性阑

尾炎典型表现)近来,出现上腹痛,肝脏肿大压痛、皮肤黄染,肝脏部位最可能发生肝门静脉炎(B对)。肝门静脉炎是急性阑尾炎的并发症,急性阑尾炎时阑尾静脉中的感染性血栓,可沿肠系膜上静脉至门静脉,导致化脓性门静脉炎。临床表现为寒战、高热、肝大剑突下压痛轻度黄疸等。

56. 答案:A

解析:患者外伤后,血压 90/50mmHg(考虑有休克),全腹压痛、反跳痛、肌紧张、移动性浊音阳性(考虑腹部脏器破裂,腹膜刺激征),首选治疗为抗休克治疗同时急诊准备手术。

57. 答案:A

解析:老年男性患者,发热、干咳、肌肉酸痛,X线显示双肺磨玻璃影,大部分融合,最可能的诊断为病毒性肺炎。首选的检查为病原抗原检测。病毒性肺炎的确诊有赖于病原学检查,包括病毒分离、血清学检查以及病毒抗原的检测。

58. 答案:B

解析:老年男性患者,茶色尿,陶土便,黄疸(胆道梗阻表现)。肝内外胆管扩张(水平以下有梗阻或压迫),肝脏下缘 3cm 可触及无痛性肿物(考虑为肿大的胆囊)。患者最可能的诊断为胰头癌(B对)。

59. 答案:E

解析:中年男性,腹部损伤,现腹痛并逐渐加重。查体:体温升高,全腹压痛、反跳痛、肌紧张(腹膜刺激征)。超声检查可见肠周少量积液(小肠损伤可能),肝周、膈下未见明显异常(排除肝脾损伤)。患者最可能的诊断为小肠破裂,最有价值的治疗方法为外科手术(E对)。

60. 答案:C

解析:中年男性患者,既往冠心病,长期服阿司匹林(可能因急慢性胃炎出

血), 大量饮酒后呕血, 首选辅助检查为胃镜(C 对)。胃镜检查是诊断上消化道出血病因、部位和出血情况的首选方法, 它不仅能直视病变、取活检, 对于出血病灶可进行及时、准确的止血治疗。内镜检查多主张在出血后 24~48 小时内进行检查。

61. 答案:D

解析:患者, 女性, 收缩压升高, 舒张压降低, 既往有感染病史。查体:心尖区收缩期吹风样杂音(二尖瓣关闭不全), 舒张期隆隆样杂音(二尖瓣狭窄)。双下肢无水肿(排除右心衰可能)。患者诊断为二尖瓣关闭不全合并狭窄。

62. 答案:E

解析:中年男性, 高处摔落后右胸痛, 右侧胸廓完全塌陷(肋骨骨折), 肺压缩 10%, 当前最有效的治疗措施为镇静、止痛(E 对)。肺压缩 < 20% 时, 观察、对症治疗即可, 气胸可自行吸收, 无需穿刺、引流(AB 错)。患者目前无呼吸障碍, 血压未达到休克水平, 无需建立呼吸、静脉补液(CD 错)。

63. 答案:C

解析:老年女性患者, 腹股沟肿块 3 天(腹股沟疝可能), 绞痛两天(发生腹股沟疝嵌顿)。最可能的诊断为股疝(C 对)。股疝好发于 40 岁以上妇女, 易发生嵌顿。腹股沟斜疝位于腹股沟韧带上方, 股疝则位于腹股沟韧带下方, 一般不难鉴别诊断。应注意的是, 较大的股疝除疝块的一部分位于腹股沟韧带下方以外, 一部分有可能在皮下伸展至腹股沟韧带上方。用手指探查腹股沟管外环(浅环)是否扩大, 有助于两者的鉴别(A 错)。腹股沟直疝主要的临床表现为平卧时多能自行消失, 不需用手推送复位, 极少发生嵌顿(B 错)。脂肪瘤基底不固定而活动度较大, 股疝基底固定而不能被推动(E 错)。

64. 答案:A

解析:中年男性, 上腹部进食后不适(餐后痛, 考虑胃溃疡可能), X 线钡餐可见胃窦胃小弯处龛影, 有一狭颈, 粘膜皱襞集中, 最可能诊断为胃溃疡(A 对)。胃溃疡临床表现为病人有与进餐相关的节律性上腹痛, 多表现为餐后痛, 钡剂直接征象为龛影、黏膜聚集, 间接征象为局部压痛、胃大弯侧痉挛性切迹、狭窄, 十二指肠球部激惹及球部畸形等。

65. 答案:C

解析:中年女性患者, 排便时肛门剧痛, 有鲜血, 既往有便秘史, 考虑诊断为肛裂(C 对)。肛裂病人有典型的临床表现, 即疼痛、便秘和出血。排便时由于肛裂病灶内神经末梢受刺激, 立刻感到肛管烧灼样或刀割样疼痛, 称为排便时疼痛。

66. 答案:A

解析:中年女性, 上腹部疼痛 3 年, 进食后可加重(餐后痛多考虑胃溃疡)。今日突发上腹部刀割样疼痛, 全腹肌紧张、压痛、反跳痛(腹膜刺激征), 可诊断为胃溃疡穿孔, 首选检查为立位腹部 X 线(A 对), 膈下可见新月状游离气体影。B 超一般用于消化系统实质脏器、胆道的检查(B 错)。CT(C 错)、增强 CT(D 错)、胃镜(E 错)多不作为溃疡穿孔的首选检查。

67. 答案:A

解析:中年男性, 咳痰, 痰液分四层(支气管扩张痰液上层为泡沫, 中间为浑浊黏液, 下层为脓性成分, 最下层为坏死组织), 偶尔咯血, X 线无异常, 考虑诊断为支气管扩张(A 对)。

68. 答案:C

解析:老年男性, 右下肢疼痛、乏力, 查体:病侧足背、腘动脉消失, 股动脉正常, 皮温下降, 右足苍白(肢体远端缺血), 患者考虑为动脉硬化性闭塞症

(C 对)。

69. 答案:D

解析:老年男性,咳嗽咳痰、痰中带血。吸烟 40 年,20 支每天(吸烟是引起肺癌最常见的原因)。有杵状指,X 线检查可见右肺门阴影,患者最可能的诊断为肺癌。约 85%肺癌病人有吸烟史,咳嗽为肺癌的早期症状,痰血或咯血多见于中央型肺癌,肿瘤向管腔内生长者可有间歇或持续性痰中带血,部分病人还可有原发性肥大性骨关节病(杵状指)。应选择增强 CT 进行明确诊断(D 对)。

70. 答案:D

解析:中年女性,左下腹痛、腹泻(可初步排除克罗恩病,克罗恩病多为右下腹或脐周痛),伴粘液脓血便,里急后重(溃疡性结肠炎特征表现)。多次粪便培养、阿米巴等均为阴性,抗生素治疗无效(可排除感染性肠炎、阿米巴肠炎等)。镜检可见结肠黏膜粗颗粒改变、点状多发糜烂及浅溃疡、黄色黏液覆盖。结合患者临床表现与检查,初步判断为溃疡性结肠炎。溃疡性结肠炎分为活动期与缓解期。活动期按严重程度分为轻、中、重度。轻度指排便 <4 次/日,便血轻或无,脉搏正常,无发热及贫血,血沉 <20mm/h。重度指腹泻 ≥6 次/日,明显血便,体温 >37.8℃、脉搏 >90 次/分,血红蛋白 <75%正常值,血沉 >30mm/h。该患者大便次数 3~5 次/日,可诊断为轻度溃疡性结肠炎,治疗首选氨基水杨酸制剂,包括 5-氨基水杨酸制剂和柳氮磺吡啶(D 对)。

71. 答案:C

解析:中年女性,示指被鱼刺扎破 5 天,红肿热痛 3 天(炎症反应特征性表现)。查体:体温升高,示指甲旁红肿,有脓点、波动明显(提示有脓肿形成)。结合患者病史与临床表现,初步诊断为甲沟炎、已有脓肿形成。目前最恰当的

处理方式为:沿甲沟旁纵行切开引流(C 对)。

72. 答案:C

解析:中年女性,间断多关节肿痛、近年来双腕关节活动受限。X 线示手指间关节间隙狭窄、腕骨可见骨质吸收破坏(溶骨性破坏),结合临床表现与影像学诊断,该患者最肯能诊断为类风湿性关节炎。类风湿性关节炎是一种以侵蚀性、对称性多关节炎为主要临床表现的慢性、全身性自身免疫性疾病。X 线分期为关节周围软组织肿胀影、关节附近骨质疏松(I 期);关节间隙狭窄(II 期);关节面出现虫蚀样改变(III 期);关节半脱位和关节破坏后的纤维性和骨性强直(IV 期)。患者 X 线片可见关节间隙狭窄、骨质吸收破坏(可表现为虫蚀样改变),综合判断,该患者腕关节病变影像学分期为 III 期(C 对 ABDE 错)。

73. 答案:A

解析:中年男性,咳嗽、乏力、四肢疼痛,体温在 38℃波动,CT 示左下肺斑片状阴影(间质性肺炎 X 线表现),实验室检查支原体 IgM 阳性,最可能的诊断为支原体肺炎。支原体肺炎起初有数天至一周的无症状期,继而乏力、头痛、咽痛、肌肉酸痛,咳嗽明显,一般为中等度发热,X 线检查显示肺部多种形态的浸润影,呈节段性分布,以肺下野为多见。大环内酯类抗生素为首选,如红霉素、罗红霉素和阿奇霉素。本题中,患者曾自行口服红霉素,未见好转,可能对大环内酯类不敏感,可选用呼吸氟喹诺酮类,如左氧氟沙星、莫西沙星等(A 对)。

74. 答案:E

解析:患者体温高、心率加快、血压 80/50mmHg、神志不清(符合休克表现),白细胞 $20 \times 10^9/L$ (正常值 $4 \sim 10 \times 10^9/L$),中性粒细胞 0.82(0.46~0.765),综合分析,该患者

最可能诊断为感染性休克。感染性休克的治疗原则为抗休克的同时积极抗感染，治疗包括：①补充血容量：此类病人休克的治疗首先以输注平衡盐溶液为主，配合适当的胶体液(白蛋白)、血浆或全血，恢复足够的循环血量(AD对)。②控制感染：主要措施是应用抗菌药物和处理原发感染灶(B对)。③纠正酸碱平衡。④心血管活性药物的应用。⑤皮质激素治疗。⑥其他治疗：包括营养支持，对并发的DIC、重要器官功能障碍的处理等。结合患者高热表现，应辅助物理降温(C对)。患者Hb>100g/L，无需输血(E错，为本题正确答案)。

75. 答案:D

解析：青年男性，近日出现上睑下垂(交感神经受压表现)，CT示前上纵膈有一3cm圆形阴影，考虑诊断为胸腺瘤(D对)。胸腺瘤多位于前上纵膈，呈椭圆形阴影或分叶状，易压迫迷走神经，出现Horner综合征，瞳孔缩小，上睑下垂、下睑轻度上提而脸裂变小。

76. 答案:A

解析：患者车祸致第5肋单根肋骨骨折，急救现场首先的处理为胸廓外固定(A对)。闭合性单处肋骨骨折断端因有相邻完整的肋骨和肋间肌支撑，较少有助骨断端错位、活动和重叠。采用多头胸带或弹性胸带固定胸廓，可减少肋骨断端活动、减轻疼痛。

77. 答案:B

解析：患者高热、腹痛、腹部压痛、反跳痛(符合腹膜炎的临床表现)，CT提示腹部积液，穿刺出黄绿色液体(可能为胃肠道穿孔所致)，患者最可能的诊断为继发性腹膜炎。腹膜炎时，可见感染中毒症状(高热)，典型的腹膜刺激征(压痛、反跳痛、肌紧张)，听诊肠鸣音减弱，肠麻痹时肠鸣音可能完全消失。超声引导下穿刺若穿出黄绿色液体，多

提示为胃十二指肠急性穿孔所致。引起继发性腹膜炎的细菌主要是胃肠道内的常驻菌群，以大肠埃希菌最为多见，其次为厌氧拟杆菌、链球菌、变形杆菌等。一般都是混合性感染，故毒性较强(B对ACDE错)。

78. 答案:B

解析：中年女性(甲状腺疾病好发人群)，体检发现甲状腺左叶上级1.5×1cm肿物，可随吞咽上下活动，B超示边界不清、血流丰富的低回声团，纵横比>1(提示恶性可能性大)，实验室检查FT336.46nmol/L，FT416.5nmol/L(正常值12~22pmol/L)，TSH2.5nmol/L(正常值0.27~4.20)，根据该患者影像学检查及临床表现，最可能的诊断为甲状腺癌(B对)。

79. 答案:D

解析：中年女性，慢性咳嗽咳痰病史15年，近几年活动后气短、间断性下肢水肿。查体：颈静脉充盈、双肺呼吸音轻、P2>A2、三尖瓣听诊区可闻及收缩期杂音，结合患者病史及体征，判断患者为慢性肺源性心脏病代偿期

80. 答案:A

解析：中年女性，呼吸困难伴胸闷10个月(呼吸系统疾病可能性大)，近一月加重，X线片可见双肺大片磨玻璃影，可见融合(肺部炎症表现)，实验室检查可见白细胞升高、中性粒细胞升高(初步排除病毒性疾病)，患者最可能的诊断为间质性肺炎(A对)。

81. 答案:B

解析：中年女性，因结石合并肝外叶萎缩，行肝外叶及胆囊切除，胆总管切开取石加T管引流。常规行胆总管切开取石、T管引流术后应注意观察胆汁引流的量和性状；术后10~14天可行T管造影，造影后应继续引流24小时以上，再试行闭管；如胆道通畅无结石和其他病变，开腹手术可予手术后4周左右拔

管，腹腔镜手术可适当延长拔管时间。本题中患者术后两周(14天)来院复查，可行T管造影，查看有无残留结石(B对)。

82. 答案:C

解析:中年男性，铁钉扎进足底后出现苦笑面容、四肢肌张力升高，患者最可能的诊断为破伤风。破伤风是一种和创伤相关联的特异性感染，破伤风潜伏期一般为7~8天，典型症状是在肌紧张性收缩(肌强直、发硬)的基础上，阵发性强烈痉挛，相应出现的征象为，张口困难(牙关紧闭)，苦笑、颈部强直。破伤风是可以预防的。破伤风梭菌是厌氧菌，其生长繁殖必需有缺氧的环境。因此，创伤后早期彻底清创，改善局部循环，是预防破伤风发生的重要措施(C对)。

83. 答案:E

解析:青年产妇，剖宫产术后一周，出现下肢肿胀、左小腿Homans征阳性，即小腿肿胀且有深压痛，作踝关节过度背屈试验可致小腿剧痛，是下肢深静脉血栓周围型的典型表现，患者妊娠、术后多见血液高凝状态，术后卧床导致血流缓慢，易发生下肢深静脉血栓(ABCD对)。早期离床活动是预防深静脉血栓的有效措施，不属于病因(E错，为本题正确答案)。

84. 答案:D

解析:青年女性，低热干咳1个月(肺结核典型症状)，胸痛一周，右下肺语音震颤减弱，叩诊实音。语音震颤减弱常见于1、肺泡内含气量过多，如肺气肿等疾病；2、支气管阻塞、如阻塞性肺不张等；3、大量胸腔积液或气胸；4、胸膜高度增厚粘连；5、胸壁皮下气肿等。结合患者低热、干咳的临床表现，判断患者最可能为结核性胸膜炎(D对)。

85. 答案:C

解析:中年女性，左乳扪及肿块，大小3×3cm，质硬、光滑，边界清楚可推动，无淋巴结肿大，乳腺良性肿瘤可能性大，首选乳腺B超(C对)。

86. 答案:E

解析:老年男性患者，贫血、粪隐血试验阳性，肠镜见距肛门10cm处有一溃疡型肿块，初步判断为直肠癌。直肠癌的主要治疗手段包括手术、放疗和化疗，手术是直肠癌的主要治愈方法。患者肿块距肛缘10cm，即距齿状线8cm，最佳术式为Dixon手术，即直肠低位前切除术，Dixon手术一般要求癌肿距齿状线5cm以上，只要肛门外括约肌和肛提肌未受累，保证环周切缘阴性的前提下，均可行结肠-直肠低位吻合(Dixon手术)(E对)。

87. 答案:C

解析:中年男性，上腹痛一月，胃镜检查可见胃角溃疡，活检提示高级别上皮内瘤变(提示癌前病变)，WS(+)提示存在幽门螺旋杆菌感染，应首选的治疗方式为内镜下行黏膜剥离术(C对)。

88. 答案:D

解析:中年男性，吸烟40年，近来喘息加重，球结膜充血、口唇发绀。动脉血气分析:pH7.25，PaCO₂ 75mmHg，PaO₂ 34mmHg，BE +3。提示呼吸性酸中毒合并代谢性碱中毒、II型呼吸衰竭。患者已出现嗜睡、烦躁等精神症状，考虑已经出现了肺性脑病(D对)。

89. 答案:C

解析:青年男性，发热、肛门红肿、触痛、无渗出，最可能的诊断为肛门周围脓肿(C对)。肛门周围脓肿范围一般不大。主要症状为肛周持续性跳动性疼痛，全身感染性症状不明显。病变处明显红肿，有硬结和压痛，脓肿形成可有波动感，穿刺易抽出脓液。

90. 答案:A

解析:女性，反复咳嗽，偶有咳血，今

日突发咳血 200ml，胸片提示肺内多发囊状改变，根据患者的临床表现与影像学检查，初步判断为支气管扩张。支气管扩张主要症状为持续或反复的咳嗽、咳痰或咳脓痰，小动脉被侵蚀或增生的血管被破坏时可有咯血，胸部 X 线检查可见囊状支气管扩张。为明确诊断首选的检查为胸部高分辨 CT 扫描(A 对)。

91. 答案:B

解析:患者今日突发大咯血，此时最有效的治疗方法为肺叶切除术(B 对)。对反复咯血的病人，如果咯血量少，可以对症治疗或口服卡巴克洛(安络血)、云南白药。

92. 答案:E

解析:中年男性，肝周疼痛，脓性分泌物半年，查体可见截石位 5、7 点两处外口，挤压有脓性、血性分泌物溢出，患者最可能的诊断为肛瘘。肛瘘外口持续或间断流出少量脓性、血性、黏液性分泌物为主要症状。本题中查体可见两处外口，属于复杂性肛瘘，首选的治疗方法为瘘管切开术(E 对)。

93. 答案:C

解析:中年男性，腹部损伤，现腹痛并逐渐加重。查体:体温升高，全腹压痛、反跳痛、肌紧张(腹膜刺激征)。超声检查可见肠周少量积液(小肠损伤可能)，肝周、膈下未见明显异常(排除肝脾损伤)，患者最可能的诊断为小肠破裂(C 对)。

94. 答案:A

解析:中年女性患者，腹胀、乏力、纳差三年，近来出现发热、腹部隐痛、腹围增大(腹水可能)，既往乙肝病史。查体:肝掌、腹部膨隆，腹膜刺激征表现，脾大。实验室检查:白细胞升高、尿素氮升高。综合分析，患者最可能为肝硬化合并自发性腹膜炎(A 对)。患者既往肝炎病史，现出现肝掌、腹水、脾

大，提示已出现肝硬化表现，肝硬化病人容易发生感染，结合患者发热、腹膜刺激征、白细胞升高等表现，可以判断患者腹痛的原因为自发性腹膜炎

95. 答案:C

解析:中年男性，反复咯血，多为痰中带血，偶有大咯血，X 线提示肺内多发囊状改变，根据患者的临床表现与影像学检查，初步判断为支气管扩张。支气管扩张主要症状为持续或反复的咳嗽、咳痰或咳脓痰，小动脉被侵蚀或增生的血管被破坏时可有咯血，胸部 X 线检查可见囊状支气管扩张。为明确诊断首选的检查为胸部高分辨 CT(C 对)。

96. 答案:E

解析:中年男性患者，既往冠心病，长期服阿司匹林(可能因急慢性胃炎或胃溃疡导致出血)，大量饮酒后呕血，首选辅助检查为胃镜(E 对)。胃镜检查是诊断上消化道出血病因、部位和出血情况的首选方法，它不仅能直视病变、取活检，对于出血病灶可进行及时、准确的止血治疗。内镜检查多主张在出血后 24~48 小时内进行检查。

97. 答案:D

解析:青年男性，脾切除术后(可能出现电解质及酸碱平衡紊乱)，动脉血气分析:PH 7.28(正常值 7.35~7.45)，考虑为酸中毒(CE 错)。PaCO₂ 32mmHg(正常值 35~45)，PaO₂ 100mmHg，排除呼吸性酸中毒，考虑为代谢性酸中毒(AB 错)，BE -9mmol/L，HCO₃⁻ 16mmol/L，也可排除碱中毒，综合分析，患者为代谢性酸中毒失代偿期(D 对)。

98. 答案:C

解析:中老年男性，咳嗽、咳痰、痰中带血，根据检查得知为中央型肺癌，目前对肺癌主要采取以外科手术为主的综合治疗，对于癌种位于一个肺叶，但已侵及局部主支气管或中间支气管的患

者，为了保留正常的临邻近肺叶，避免做全肺切除术(D 错)，可以切除病变的肺叶及一段受累的支气管，再吻合支气管上下端，临床上称为支气管袖状肺叶切除术(C 对 ABE 错)。

99. 答案:E

解析:女性患者，上腹部饱胀 4 个月，造影未见明显异常，判断患者为功能性消化不良，且患者无其他异常症状，缓解腹胀最有效的药物为促胃动力药(E 对)。

100. 答案:E

解析:中年男性，左上腹疼痛，查体:血压 80/55mmhg(符合中度休克)，Hb 106g/L，该患者目前不应进行输血，在处理失血性休克时，若血红蛋白浓度大于 100g/L 不必输血。故本题选 E。

101. 答案:B

解析:中年男性，腹泻、腹痛、脐周通，排便与疼痛缓解有关，大便不成型，有黏液无脓血，镜检阴性，最可能的诊断为肠易激综合征。肠易激综合征的诊断标准为:在缺乏可解释症状的形态学改变和生化异常基础上(B 对)。

102. 答案:B

解析:中年男性，既往无饮酒史，腹胀乏力 5 年，近来出现肝区隐痛。查体:身高 170cm，体重 88kg，该患者 BMI 为 30；腹围 105cm，属于肥胖范畴。胆固醇 6.17mmol/L(正常值 2.34~3.38mmol/L)，考虑为非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)。NAFLD 起病隐匿，发病缓慢，常无症状。少数病人可有乏力、右上腹轻度不适、肝区隐痛或上腹胀痛等非特异症状。严重 NASH 可出现黄疸、食欲缺乏、恶心、呕吐等症状，部分病人可有肝大。NAFLD 的发病机制主要是“多重打击”学说，第一次打击主要是肥胖、2 型糖尿病、高脂血症等伴随的胰岛素抵抗，引起肝细胞内脂质过量沉积(DE 对)；第二次打击是脂质过量沉

积的肝细胞发生氧化应激和脂质过氧化，导致线粒体功能障碍、炎症因子的产生，肝星状细胞的激活，从而产生肝细胞的炎症、坏死(AC 对)；内质网应激、肝纤维化也加重疾病的进展；肠道菌群紊乱也与 NAFLD 的发生相关，如高脂饮食会减少菌群多样性，减低普氏菌属数量，增加厚壁菌门与拟杆菌门的比率，升高了肠道能量的吸收效率；此外，遗传背景、慢性心理应激、免疫功能紊乱，在 NAFLD 的发生发展中也有一定的作用(B 错，为本题正确答案)。

103. 答案:D

解析:老年女性患者，左上肺肿块拟行手术治疗，患者糖尿病史、高血压史，血压 180/110mmHg，进行手术前需做好术前准备，对于糖尿病禁食病人，需静脉输注葡萄糖加胰岛素维持血糖轻度升高状态(5.6~11.2mmol/L)(A 对)。患者血压 180/110mmHg，应观察病情，暂停手术，选用合适的降压药物，使血稳在一定水平，但不要求降至正常后才做手术(BCE 对)。

104. 答案:C

解析:患者大量呕吐后，实验室检查:PH 7.7(正常值 7.35~7.45)属于碱中毒， Cl^- 70mmol/L(正常值 96~106)， K^+ 2.5mmol/L(3.5~5.5)， Na^+ 142mmol/L，患者属于低氯低钾性碱中毒(C 对)。大量呕吐致使胃液中 H^+ 、 Cl^- 及 K^+ 丢失，肠液和胰腺的 HCO_3^- 得不到 H^+ 中和而被吸收入血，导致低氯低钾性碱中毒。患者 Na^+ 142mmol/L 属于正常范围内，故无低钠(BDE 错)。

105. 答案:A

解析:中老年男性，右季肋部胀痛(肝胆疾病可能)，食欲减退、乏力、体重迅速降低(恶性病变可能)。查体:体温升高，慢性病容、皮肤巩膜黄染，肝肋下 3cm，质硬、表面凹凸不平，双下肢轻

度水肿。膳食检查:AFP 689ng/ml (>400ng/ml, 提示肝癌可能)。CT 检查可见肝内 3×2cm 低密度影, 动脉期环形强化(血液供应丰富), 内部强化不显著。该患者最可能的诊断为肝癌, 确诊首选肝穿刺检查(A 对)。

106. 答案:A

解析:男性患者, 近来低热、体重减轻, 查体:右下腹肿块、回盲部跳跃征, 盲肠结肠短缩, 考虑诊断为肠结核(A 对)。肠结核是结核分枝杆菌引起的肠道慢性特异性感染, 常继发于肺结核, 一般见于中青年, 可有右下腹腹痛、大便习惯改变、右下腹腹部肿块, 质中、较固定、轻至中度压痛。全身症状和肠外结核表现:长期不规则低热、盗汗、消瘦、贫血和乏力, 如同时有活动性肠外结核也可呈弛张热或稽留热。

107. 答案:B

解析:中年男性患者, 咳嗽、肌肉酸痛, 体温升高, 影像学检查可见下肺部斑片状融合影, 该患者最可能的诊断为军团菌肺炎, 致病菌为军团菌(B 对)。军团菌肺炎特征性临床表现为高热、肌痛、相对缓脉, X 线可见下叶斑片浸润, 进展迅速, 无空洞。

108. 答案:D

解析:中年男性, 间断腹痛一年, 右下腹为著, 伴有便秘和反复发作的口腔溃疡, 无低热、乏力和消瘦。查体:贫血貌, 右下腹可触及 4×5cm 边界不清的肿块, 移动度好, 有压痛。PDD 实验阴性。既往有肛周脓肿手术史。患者最可能的诊断为克罗恩病。克罗恩病常见右下腹包块、压痛, 多伴有肛门周围病变, 有时肛周病变可为本病的首发症状。肠外表现以反复发作的口腔溃疡为常见表现。首选的检查为结肠镜(D 对)。

109. 答案:A

解析:中年女性, 近期月经增多、脱

发, 实验室检查可见 dsDNA(+), ANCA(+), 尿蛋白(+++), 最可能的诊断为系统性红斑狼疮活动期(A 对)。系统性红斑狼疮(SLE)是一种以致病性自身抗体和免疫复合物形成并介导器官、组织损伤的自身免疫病, 临床上常存在多系统受累表现, 血清中存在以抗核抗体为代表的多种自身抗体。SLE 临床症状多样, 早期症状往往不典型, 可有脱发、月经增多、浆膜炎、关节痛等表现, 实验室检查抗 dsDNA 抗体阳性具有特异性。

110. 答案:A

解析:老年患者, 既往便秘史(乙状结肠扭转常见病因), 现全腹胀痛、左下腹压痛, 停止排气, 患者最可能的诊断为乙状结肠扭转。乙状结肠扭转多见于乙状结肠冗长、有便秘的老年人, 以往可有数次腹痛发作经排气、排便后缓解的病史。病人有腹部持续胀痛, 左腹部显膨隆, 可见肠型。腹部压痛及肌紧张不明显。腹部 X 线平片显示马蹄状巨大的双腔充气肠祥, 圆顶向上; 立位可见两个液平面。钡剂灌肠 X 线检查见扭转部位钡剂受阻, 钡影尖端呈“鸟嘴”形(A 对)。

111. 答案:A

解析:青年女性, 自觉乳房肿痛, 查体:乳房局部红肿、发热、有波动感, 考虑为乳腺脓肿形成。脓肿形成后, 主要治疗措施是及时作脓肿切开引流(A 对)。

112. 答案:D

解析:青少年, 体型瘦长, 无诱因突发胸闷憋喘、肩胛区疼痛、呼吸困难, 查体:X 线肺内透亮度增高(气胸可能), 肺组织压缩 40%, 综合分析, 患者最可能为自发性气胸。自发性气胸好发于瘦高体型的男性青壮年, 安静休息时发生, 偶有在睡眠中发病者。大多数起病急骤, 病人突感一侧胸痛, 针刺样或刀割样, 持续时间短暂, 继之胸闷和呼吸

困难，可伴有刺激性咳嗽，系气体刺激胸膜所致。大量气胸时，胸内压增加引起纵隔向健侧移位(D对)。

113. 答案:C

解析:老年男性，脾大、全身淋巴结无肿大，染色体 t(9; 22)(q34; q11)，患者最可能为慢性髓系白血病(C对)。慢性髓系白血病(CML)，俗称慢粒，是一种发生在多能造血干细胞的恶性骨髓增殖性肿瘤，常以脾大为最显著体征，往往就医时已达脐或脐以下，质地坚实，平滑，无压痛。

114. 答案:A

解析:青年男性，低热、咳嗽(肺结核可能)，X线检查可见肺门部哑铃状阴影，患者最可能为原发性肺结核(A对)。

115-1. 答案:A

解析:中老年男性，咳嗽、咳浓痰、咯血10年(支气管扩张可能)，近来发热、症状加重，痰培养可见铜绿假单胞菌(存在感染)，应诊断为支气管扩张并发感染(A对)。支气管扩张的主要症状为持续或反复的咳嗽、咳痰或咳脓痰。痰液为黏液性、黏液脓性或脓性，若合并感染，可出现痰量增多和发热。铜绿假单胞菌是机会致病菌，常引起呼吸系统感染。

115-2. 答案:B

解析:中老年男性，咳嗽、咳脓痰、咯血10年(支气管扩张可能)，近来发热、症状加重，痰培养可见铜绿假单胞菌(存在感染)，应诊断为支气管扩张并发感染。对于存在铜绿假单胞菌感染的患者，可选择具有抗假单胞菌活性的β-内酰胺类抗生素(如头孢他啶、头孢吡啶、哌拉西林/他唑巴坦、头孢哌酮/舒巴坦)，碳青霉烯类(如亚胺培南、美罗培南)，氨基糖苷类，喹诺酮类(环丙沙星或左氧氟沙星)，可单独应用或联合应用。

117-1. 答案:A

解析:老年男性，咳嗽咳痰3个月，近来胸痛、CT提示右上肺肺尖部3×2cm肿块，可能为肺癌，因为肿块位置靠近右上肺尖，首选辅助检查为经胸壁穿刺活检(A对)。

117-2. 答案:E

解析:老年男性患者，咳嗽咳痰3个月，近来胸痛，CT提示右肺尖部3×2cm肿块，未经治疗。8个月后出现呼吸困难，右侧大量胸腔积液，肺尖部肿块增大，多发骨转移，判断该患者已出现肺癌伴骨转移，此时出现恶性胸腔积液，呼吸困难为当前急需处理的症状，应及时胸腔闭式引流(E对)。

119-1. 答案:B

解析:中年患者，在稻田劳作后小腿肿痛，体温升高，可见小腿皮疹，色鲜红，中间颜色减淡，边界清楚，最可能的诊断为丹毒(B对)。

119-2. 答案:A

解析:中年患者，在稻田劳作后小腿肿痛，体温升高，可见小腿皮疹，色鲜红，中间颜色减淡，边界清楚，最可能的诊断为丹毒。丹毒的治疗包括卧床休息，抬高患肢，局部可用50%硫酸镁液湿敷。全身应用抗菌药物，如静脉滴注青霉素、头孢菌素类敏感抗生素。红肿切开引流是感染形成脓肿时的主要治疗方式。

121-1. 答案:A

解析:青年男性，整理图书时突发咳嗽、气喘、呼吸困难，既往有过敏性鼻炎史，听诊双肺散在哮鸣音，患者最可能的诊断为支气管哮喘发作，行支气管舒张试验最有意义(A对)。

121-2. 答案:B

解析:青年男性，整理图书时(存在灰尘)突发咳嗽、气喘、呼吸困难，既往有过敏性鼻炎史，听诊双肺散在哮鸣音，患者最可能的诊断为支气管哮喘发作(B

对)。

123-1. 答案:A

解析:中年女性,右乳肿物,乳房X线摄影:右乳可见4cm×3cm高密度影,周边成毛刺状,中央可见强回声钙化点,高度怀疑乳腺癌。查体可见右侧腋窝淋巴结肿大、融合成团,右侧锁骨上淋巴结未触及,未见远处转移。根据TNM分期,患者肿瘤长径为4cm, <5cm,为T2期,淋巴结肿大、融合成团,为N2,无远处转移,为M0,故该患者的TNM分期为T2N2M0。

123-2. 答案:B

解析:患者行乳房改良根治术后,术后病理为浸润性导管癌,淋巴结转移4/20,ER(-),PR(-),HER2(-),接下来应进行化疗(B对)。乳腺癌是实体瘤中应用化疗最有效的肿瘤之一,化疗在整个治疗中占有重要地位。

125-1. 答案:C

解析:中年男性,间断性腹痛4年,多于进食后发生(胃溃疡可能性大),4小时前进食后突发剧烈腹痛,迅速波及全腹。查体:全腹反跳痛、肌紧张,局部压痛(腹膜刺激征),引起腹痛的原因为胃溃疡并发穿孔(C对)。溃疡并发穿孔病人多有溃疡病史,病人突发上腹部剧痛,呈“刀割样”,腹痛迅速波及全腹。病人面色苍白、出冷汗。常伴有恶心、呕吐。查体可见穿孔处压痛最重,腹肌紧张呈“板状腹”,反跳痛明显。

125-2. 答案:E

解析:中年男性,间断性腹痛4年,多于进食后发生(胃溃疡可能性大),4小时前进食后突发剧烈腹痛,迅速波及全腹。查体:全腹反跳痛、肌紧张,局部压痛(腹膜刺激征),引起腹痛的原因为胃溃疡并发穿孔。诊断首选立位腹平片(E对),可见隔下新月状游离气体影,可以确定诊断。急性溃疡穿孔时禁用X线钡剂造影(A错)。腹部B超、腹部CT

多用于腹部实质脏器的检查,不用于溃疡穿孔首选(BD错)。胃镜可以证实胃溃疡,但对胃溃疡穿孔意义不大(C错)。

125-3. 答案:C

解析:中年男性,间断性腹痛4年,多于进食后发生(胃溃疡可能性大),4小时前进食后突发剧烈腹痛,迅速波及全腹。查体:全腹反跳痛、肌紧张,局部压痛(腹膜刺激征),引起腹痛的原因为胃溃疡并发穿孔,最有效的治疗方法为胃大部切除术,可以一次性解决穿孔和溃疡两个问题。

128-1. 答案:D

解析:男性患者,腰背部疼痛、左膝关节、踝关节疼痛、晨起明显,活动后缓解。“4”字试验阳性,既往有虹膜炎病史,该患者最可能诊断为强制性脊柱炎。强直性脊柱炎首发症状常为下腰痛伴晨僵,症状在夜间休息或久坐时较重,活动后可以减轻。30%左右的病人可出现反复发作的葡萄膜炎或虹膜炎。强直性脊柱炎无特异性实验室检查指标,RF阴性,亚洲普通人群HLA-B27阳性率仅4%~8%(AB错)。关节液检查无特异性,通畅不作为首选(C错)。抗环瓜氨酸多肽抗体对诊断类风湿关节炎价值较高(E错)。

128-2. 答案:B

解析:男性患者,腰背部疼痛、左膝关节、踝关节疼痛、晨起明显,活动后缓解。“4”字试验阳性,既往有虹膜炎病史,该患者最可能诊断为强制性脊柱炎。强直性脊柱炎首发症状常为下腰痛伴晨僵,症状在夜间休息或久坐时较重,活动后可以减轻。30%左右的病人可出现反复发作的葡萄膜炎或虹膜炎。强直性脊柱炎属于脊柱关节炎(B对)。

130-1. 答案:A

解析:患者肾衰竭五期(尿毒症期),末次透析后,食用大量橘子(柑橘类水果

富含钾元素)后出现胸闷不适、四肢乏力伴口周发麻 2 天, 心率明显降低, 患者最可能出现了低钾血症(A 对)。肾衰竭时, 肾脏排钾能力下降, 易出现高钾血症; 尤其当钾摄入过多时, 更易出现高钾血症。高钾血症时肌肉轻度震颤、手足感觉异常、肢体软弱无力。高钾血症可以引起窦性心动过缓、房室传导阻滞或快速性心律失常。轻度代谢性酸中毒可无明显症状。重症病人可有疲乏、眩晕、嗜睡, 感觉迟钝或烦躁。最明显的表现是呼吸加快加深, 典型者称为 Kussmaul 呼吸(B 错)。高磷血症并不产生特殊临床症状, 高磷常继发性低钙血症, 病人可因为低钙引起抽搐、心律失常、低血压等临床症状, 低钙血症时神经肌肉兴奋性升高, 出现口周和指(趾)尖麻木及针刺感、手足抽搐、腱反射亢进、Chvostek 征阳性, 精神症状表现为烦躁不安、抑郁及认知能力减退。低钙对心血管的影响主要为传导阻滞等心律失常, 严重时可能出现室颤、心力衰竭(CD 错)。高钙血症常无特异性症状, 血钙浓度进一步增高尤其是合并甲状旁腺功能亢进病人, 可出现疲乏无力、精神不集中、失眠、抑郁、腱反射迟钝、肌力下降等, 严重者可出现神志不清甚至昏迷。恶心、呕吐、便秘在高钙血症病人中十分常见(E 错)。

130-2. 答案:A

解析:患者肾衰竭五期(尿毒症期), 末次透析后, 食用大量橘子(柑橘类水果富含钾元素)后出现胸闷不适、四肢乏力伴口周发麻 2 天, 心率明显降低, 患者最可能出现了低钾血症。对于肾衰竭伴急重症高钾血症者, 以血液透析为最佳(A 对)。透析疗法是最快速有效的降低血钾方法, 有血液透析和腹膜透析两种, 前者对钾的清除速度明显快于后者, 可用于上述治疗仍无法降低血钾浓度或者严重高钾血症病人。阳离子交换

树脂可用降钾树脂 15g 口服, 每日 2~3 次, 无法口服病人可灌肠, 可从消化道排出钾离子, 但不是最有效的措施(B 错)。注射钙剂可以促进钾离子转入细胞内, 但并非最有效方法(C 错)。排钾利尿剂可促进钾的排出, 但对肾衰竭患者效果差(E 错)。大量激素对排钾无帮助(D 错)。

132-1. 答案:A

解析:中年男性, 既往有胆囊结石病史, 行胆囊切除术。1 天前因皮肤、巩膜黄染行内镜逆行性胆管造影检查, 术后出现上腹持续性剧痛、向肩背部放射, 伴有恶心呕吐。查体:皮肤巩膜黄染、左上腹压痛, 肝脾不大, 肝浊音界存在。实验室检查:血淀粉酶 589U/L(正常值 25~125U/L)。患者最可能的诊断为急性胰腺炎(A 对)。

132-2. 答案:C

解析:患者诊断为急性胰腺炎。明确诊断的首选影像学检查为 CT(C 对)。CT 扫描是最具诊断价值的影像学检查。不仅能诊断急性胰腺炎, 而且能鉴别是否合并胰腺组织坏死。在胰腺弥漫性肿大的基础上出现质地不均、液化和蜂窝状低密度区, 则可诊断为胰腺坏死。

132-3. 答案:B

解析:患者诊断为急性胰腺炎。急性胰腺炎的并发症包括:局部并发症 ①急性胰周液体积聚(APFC); ②胰腺假性囊肿(PPC); ③急性坏死物积聚(ANC); ④包裹性坏死(WON); ⑤其他, 包括胸腔积液、胃流出道梗阻、消化道瘘、腹腔或消化道出血、脾静脉或门静脉血栓形成等。2. 全身并发症 包括 SIRS、脓毒症(sepsis)、多器官功能障碍综合征(MODS)及腹腔间隔室综合征等。

135-1. 答案:B

解析:中年女性, 烧伤双小腿、双足, 根据中国新九分法, 判断患者的烧伤面积为 13%+6%=19%(B 对)。其中, 成年女

性双足占 6%、双小腿占 13%。

135-2. 答案:D

解析:中年女性,烧伤双小腿、及双足,烧伤面积为 19%。创面湿润、有水泡,属于 II 度烧伤,已达中度烧伤。根据烧伤休克补液原则,伤后第 1 个 24 小时补液量:成人每 1%I 度、I 度烧伤面积每千克体重补充电解质液 1ml 和胶体液 0.5ml(电解质与胶体比例为 2:1),另加基础水分 2000ml。则该患者第一个 24 小时需要补充的体液量为 $19 \times 60 \times 1.5 + 2000 = 3710$,最接近 D 选项 3700ml(D 对)。

137-1. 答案:C

解析:中年女性,既往胆囊结石,行胆囊切除术治疗。今日突发右上腹绞痛、高热、血压降低、神志不清、巩膜黄染、腹膜炎征象。X 线提示胆总管及肝内外胆管扩张,该患者最可能为急性梗阻性化脓性胆管炎。急性梗阻性化脓性胆管炎典型表现为腹痛、寒战高热和黄疸,称为夏科三联症,如结石嵌顿未解除,炎症进一步加重,病人可出现谵妄、淡漠或昏迷以及血压下降等。在夏科三联症基础上出现神志障碍、休克则称为雷诺五联症,是一种非常危险的情况,需急诊胆道减压引流治疗,否则病人可在短期内死亡(C 对),黄疸、发热、腹痛属于一般临床表现(ABD 错)。

137-2. 答案:D

解析:中年女性,既往胆囊结石,行胆囊切除术治疗。今日突发右上腹绞痛、高热、血压降低、神志不清、巩膜黄染、腹膜炎征象。X 线提示胆总管及肝内外胆管扩张,该患者最可能为急性梗阻性化脓性胆管炎。治疗原则是立即解除胆道梗阻并引流。只有使胆道压力降低,才有可能中止胆汁或细菌向血液的反流,阻断病情的恶化。胆道减压主要为抢救病人生命,主要为胆总管切开减压、T 管引流(D 对)。

139-1. 答案:B

解析:剧烈呕吐后继而呕鲜血,应考虑食管贲门黏膜撕裂综合征(B 对)。胃角溃疡合并出血多为餐后痛,轻者表现为大便隐血阳性、黑便,重者出现大出血、表现为呕血或暗红色血便。慢性腹痛在出血后常减轻(A 错)。十二指肠球部溃疡出血多为饥饿痛、夜间痛,进食可缓解(C 错)。食管胃底静脉曲张破裂出现多见于肝硬化门脉高压症患者(D 错)。胃恒径动脉破裂出血以间歇性反复性呕血或柏油便为主要症状,起病突然,无明显征兆(E 错)。

139-2. 答案:D

解析:长期大量饮酒可导致酒精性肝硬化,肝硬化失代偿期可因门静脉高压导致侧支循环形成,食管胃底静脉曲张,食用粗糙食物或饮酒导致食管胃底静脉曲张脉发生破裂出血(D 对)。胃角溃疡合并出血多为餐后痛,轻者表现为大便隐血阳性、黑便,重者出现大出血、表现为呕血或暗红色血便。

141-1. 答案:B

解析:急性坏死性胰腺炎的腹痛常于饱餐和饮酒后突然发作,腹痛剧烈,多位于左上腹,向左肩及左腰背部放射。胆源性者腹痛始发于右上腹,逐渐向左侧转移。病变累及全胰时,疼痛范围较宽并呈束带状向腰背部放射(B 对)。

141-2. 答案:D

解析:胆总管结石嵌顿的腹痛发生在剑突下或右上腹,多为绞痛,呈阵发性发作,或为持续性疼痛阵发性加剧,可向,右肩或背部放射(D 对)。一侧腹痛,持续性,向会阴部放射常见于输尿管结石(A 错)。上腹持续性剧烈腹痛,成束带状,像腰背部放射见于急性坏死性胰腺炎(B 错)。上腹钻顶样剧烈腹痛,阵发性加剧,间歇期完全缓解见于胆道蛔虫症(C 错)。上腹突发刀割样剧烈腹痛,迅速波及全腹常见于消化性溃

疡穿孔(E 错)。

143-1. 答案:E

解析:肺泡通气不足时,少会引起 PAO_2 下降和 $PACO_2$ 上升,从而发生缺氧和 CO_2 潴留,导致呼吸性酸中毒(E 对)。呼吸性碱中毒多见于肺泡过度通气时(A 错)。代谢性碱中毒常见于剧烈呕吐、长时间胃肠减压或碱性物质摄入过度(BC 错)。代谢性酸中毒常见于严重腹泻、肠痿、胰痿、肾脏排酸保碱功能障碍、组织低灌注时(D 错)。

143-2. 答案:B

解析:慢性肺源性心脏病失代偿期合并二型呼吸衰竭,此时患者低氧血症与高碳酸血症并存,为呼吸性酸中毒。应用袢利尿剂,可抑制髓袢对 Cl^- 的主动重吸收和 Na^+ 的被动重吸收,促进远曲小管和集合管细胞分泌 H^+ 及 K^+ 增加, H^+ 经肾大量丢失,使 HCO_3^- 重吸收增加,造成代谢性碱中毒。两种情况同时存在,可能出现呼吸性酸中毒合并代谢性碱中毒。

143-3. 答案:A

解析:慢性阻塞性肺疾病合并肝性脑病,考虑存在高碳酸血症,气管插管时潮气量设置过大,通气过度,二氧化碳分压迅速降至正常,但缺氧未改善,可引起呼吸性碱中毒。

146-1. 答案:B

解析:Ferguson 法是在精索前方将腹内斜肌下缘和联合腱缝至腹股沟韧带上,目的是消灭腹内斜肌弓状下缘与腹股沟韧带之间的空隙。适用于腹横筋膜无显著缺损、腹股沟管后壁尚健全的病例,是修补加强腹股沟管前壁修补最常见的手术方法(B 对)。Bassini 法(A 错)、McVay 法(C 错)、Shouldice 法(D 错)、Halsted 法(E 错)为加强或修补腹股沟管后壁的方法。

146-2. 答案:C

解析:股疝“最常用的手术是 McVay 修

补法。此法不仅能加强腹股沟管后壁而用于修补腹股沟疝,同时还能堵住股环而用于修补股疝(C 对)。Bassini 法(A 错)、Shouldice 法(D 错)、Halsted 法(E 错)为加强或修补腹股沟管后壁的方法。Ferguson 法为修补加强腹股沟管前壁修补最常见的手术方法(B 错)。

148-1. 答案:A

解析:肝硬化门脉高压时,腹腔内脏血管床静水压增高,组织液回吸收减少而漏入腹腔,形成腹腔积液,没有感染的肝硬化腹腔积液,通常为漏出液;合并自发性腹膜炎,腹腔积液可呈典型渗出液或介于渗、漏出液之间。血清腹腔积液清蛋白梯度(SAAG) $>11g$ 时,提示门静脉高压所致腹腔积液的可能性大(A 对)。AFP 升高(B 错)、腹水中找到异型细胞(E 错)多见于肿瘤所致腹水。ADA 升高提示右结核性腹膜炎(C 错)。白细胞 $300 \times 10^9/L$,中性粒细胞居多,提示为细菌感染导致的腹膜炎(D 错)。

148-2. 答案:C

解析:结核性腹膜炎多为渗出液,实验室检查:比重一般超过 1.018,蛋白质定性试验阳性,定量在 $30g/L$ 以上,白细胞计数超过 $500 \times 10^9/L$,以淋巴细胞或单核细胞为主,结核性腹膜炎的腹腔积液腺苷脱氨酶(ADA)活性常增高(C 对)。血清腹水白蛋白梯度 $>11g/L$ 提示门静脉高压所致腹腔积液的可能性大(A 错)。AFP 升高(B 错)、腹水中找到异型细胞(E 错)多见于肿瘤所致腹水。白细胞 $300 \times 10^9/L$,中性粒细胞居多,提示为细菌感染导致的腹膜炎(D 错)。

第四单元

1. 答案:D

解析:妊娠剧吐可引起一系列严重并发症,除较为常见的脱水、电解质紊乱和代谢性酸中毒外,还可诱发 Wernicke 脑病。Wernicke 脑病是维生素 B1 缺乏

导致的严重神经系统并发症。妊娠剧吐不能进食者，维生素 B1 缺乏，进而使得丙酮酸脱氢酶活性下降，丙酮酸不能完全进入三羧酸循环彻底氧化，组织供能受到影响。妊娠

剧吐不能进食者，为预防 Wernicke 脑病，应补充维生素 B1 (D 对)。

2. 答案:E

解析:早产儿体温调节中枢功能尚不完善(B 对)，皮下脂肪薄(D 对)，体表面积相对较大(E 错，为本题正确答案)，皮肤表皮角化层差(C 对)，易散热；寒冷时无寒战反应而靠棕色脂肪化学产热，缺乏棕色脂肪时，产热减少(A 对)。生后环境温度显著低于宫内温度，散热增加，产热减少，易发生低体温。

3. 答案:C

解析:颅内压增高的初期症状，主要包括头痛、呕吐和视神经乳头水肿，称为颅内压增高“三主征”，可以其中一项为首发症状(ABD 对)。颅内压升高时，交感神经受到刺激，交感神经兴奋后，心率增加，血管收缩，导致血压升高(E 对)。颅内压进一步升高，压迫颅内神经，导致双侧瞳孔散大，属于颅内压增高的晚期表现(C 错，为本题正确答案)。

4. 答案:A

解析:妊娠 12 周末，手测宫底高度在耻骨联合上 2~3 横指(A 对)。妊娠期子宫增大主要是由于肌细胞肥大、延长，也有少量肌细胞数目增加及结缔组织增生(B 错)。妊娠晚期子宫轻度右旋，与乙状结肠占据在盆位左侧有关(C 错)。妊娠足月时，子宫容量约 5000ml，是非孕期的 500~1000 倍(D 错)。妊娠早期子宫略呈球形且不对称，受精卵着床部位的子宫壁明显突出(E 错)。

5. 答案:C

解析:精神分裂症预后良好的因素包括:

女性，已婚(A 错)，初发年龄较大(D 错)，急性或亚急性起病(B 错)，病前性格开朗、人际关系好、职业功能水平高(E 错)，以阳性症状为主症，症状表现中情感症状成分较多，家庭社会支持多，家庭情感表达适度，治疗及时、系统，维持服药依从性好等。与之相反则预后不良，以阴性症状为主是精神分裂症预后不良的因素之一(C 对)。

6. 答案:C

解析:腺病毒肺炎的特征性临床症状包括:①发热:可达 39℃ 以上，呈稽留热或弛张热，热程长，可持续 2~3 周;②中毒症状重:面色苍白或发灰，精神不振，嗜睡与烦躁交替;③呼吸道症状:咳嗽频繁，呈阵发性喘憋，轻重不等的呼吸困难和发绀(BDE 错);④消化系统症状:腹泻、呕吐和消化道出血;⑤可因脑水肿而致嗜睡、昏迷或惊厥发作。体格检查发现:①肺部啰音出现较迟，多于高热 3~7 天后才出现，肺部病变融合时可出现实变体征(A 错);②肝脾增大，由于单核-吞噬细胞系统反应较强所致;③麻疹样皮疹;④出现心率加速、心音低钝等心肌炎、心力衰竭表现;亦可有脑膜刺激征等中枢神经系统体征(C 对)。

7. 答案:C

解析:婴儿出生后各系统、器官的生长发育不平衡，神经系统发育较早;淋巴系统先快后慢，在儿童期迅速生长，于青春期前达高峰，以后逐渐下降;生殖系统发育较晚，在 12~16 岁后迅速生长。

8. 答案:B

解析:双胞胎妊娠，可分为双卵双胞胎或单卵双胞胎。其中双卵双胞胎是两个卵子分别受精形成的双胞胎妊娠。两个卵子分别受精形成两个受精卵，各自的遗传基因不完全相同，故形成的两个胎儿有区别，如血型、性别不同或相同，指纹、外

貌、性格类型等多种表型不同(CD 对 B 错)。胎盘多为两个,也可融合成一个(A 对),但血液循环各自独立。胎盘胎儿面有两个羊膜腔,中间隔有两层羊膜、两层绒毛膜(E 对)。本题正确答案为 B。

9. 答案:D

解析:继发性不孕是指女性以前有过妊娠,而后连续 1 年未避孕未孕。我国女性继发性不孕最常见的原因:输卵管因素(D 对)。阴道因素(A 错)、宫体因素(B 错)、宫颈因素(C 错)、精神因素(E 错)等均为继发性不孕的原因,但最常见为输卵管因素。

10. 答案:A

解析:具有支持作用的骨盆底肌肉为肛提肌(A 对)。骨盆底中层肌肉包括筋膜、会阴深横肌和尿道括约肌。会阴深横肌,自坐骨结节的内侧面伸展至中心腱处。(B 错)。尿道括约肌的功能为环绕尿道,控制排尿(C 错)。骨盆底的外层包括会阴浅筋膜及其深面的 3 对肌肉及一括约肌组成(球海绵体肌、坐骨海绵体肌、会阴浅横肌、肛门外括约肌)。坐骨海绵体肌始于坐骨结节内侧,沿坐骨升支及耻骨降支前行,向上止于阴蒂海绵体(阴蒂脚处)(D 错)。肛门外括约肌为围绕肛门的环形肌束,前端汇合于中心腱(E 错)。

11. 答案:E

解析:偏头痛的治疗目的是减轻或终止头痛发作,缓解伴发症状,预防头痛复发。治疗药物包括缓解类药物和预防类药物,发作期通常应在症状起始时立即服药。治疗药物包括非特异性止痛药如非甾体类抗炎药(NSAIDs)和阿片类药物,特异性药物如麦角类制剂和曲普坦类药物。麦角类制剂可选用麦角胺、双氢麦角胺;曲普坦类包括舒马曲普坦、那拉曲普坦、利扎曲普坦、佐米曲普坦、阿莫曲普坦(E 对)。预防类药物包

括 β 肾上腺素能受体阻滞剂:普萘洛尔(B 错)、美托洛尔;钙离子拮抗剂:氟桂利嗪、维拉帕米;抗癫痫药:丙戊酸(C 错)、加巴喷丁、托吡酯;抗抑郁药:阿米替林(D 错);5-HT 受体拮抗剂:苯噻啶。尼莫地平多用于预防血管性头痛的发作(A 错)。

12. 答案:A

解析:初产妇,妊娠 42+5 周,属于过期妊娠。平时月经周期规则,妊娠达到或超过 42 周(≥ 294 日)尚未分娩者,称为过期妊娠。过期妊娠时可出现:胎盘功能正常、胎盘功能减退、羊水迅速减少(A 错,为本题正确答案)、羊水粪染率增高(B 对)、胎儿正常生长、巨大胎儿(E 对)、胎儿过熟综合征(D 对)、胎儿生长受限(C 对)等表现。

13. 答案:C

解析:精神分裂症的阳性症状包括幻觉、妄想及言语和行为的紊乱(瓦解症状)。其中幻觉包括幻听、幻视、幻嗅、幻味、幻触,以幻听最常见(C 对)。幻听可以是非言语性的,如虫鸣鸟叫,机器的隆隆声或音乐声等;也可以是言语性的,如听到有人在喊自己的名字,或听到某人或某些人的交谈秽语或议论,或听到来自神灵或外星人的讲话一般来说,在意识清晰状态下出现持续的评论性、争论性或命令性幻听常指向精神分裂症。幻听还可以以思维鸣响的方式表现出来,即患者所进行的思考,都被自己的声音读出来。

14. 答案:B

解析:营养性巨幼细胞贫血是由于维生素 B₁₂ 和(或)叶酸缺乏所致的一种大细胞性贫血。主要临床特点是贫血、神经精神症状、红细胞的胞体变大、骨髓中出现巨幼红细胞、用维生素 B₁₂ 和(或)叶酸治疗有效。当有神经系统受累表现时,可予每日 1mg,连续肌内注射 2 周以上;由于维生素 B₁₂ 吸收缺陷

所致的患者，每月肌内注射 1mg，长期应用。

15. 答案:C

解析:淋病是由淋病奈瑟菌(简称淋菌)引起的以泌尿生殖系统化脓性感染为主要表现的性传播疾病，主要通过性接触传播，故治疗时需要性伴侣同时治疗(D对)。

16. 答案:D

解析:绝经综合征指妇女绝经前后出现性激素波动或减少所致的一系列躯体及精神心理症状。绝经综合征能的内分泌相关变化有:雌激素水平波动大;孕酮分泌减少;总体雄激素水平下降;绝经过渡期 FSH 水平升高、LH 在正常范围; GnRH 分泌增加、与 LH 分泌相平衡;抑制素水平下降;抗米勒管激素(AMH)水平下降(D错,为本题正确答案)。

17. 答案:C

解析:出生半年以后需要接种的疫苗为麻腮风疫苗(C对)。麻腮风三联疫苗可用于预防麻疹、流行性腮腺炎、风疹三种儿童常见的急性呼吸道传染病。适用于出生 8 月龄以上,麻疹、腮腺炎和风疹易感的婴幼儿。乙肝疫苗(A错)、卡介苗(B错)出生时即需接种第一针。脊髓灰质炎疫苗需在出生后 2-3 个月时接种第一针(D错)。百白破疫苗需在出生 3 个月时接种第一针(E错)。

18. 答案:B

解析:颅前窝骨折最易损伤嗅神经(B对)。颞骨岩部骨折常发生面神经和听神经损伤(AD错),如骨折位于中线处,可累及视神经、动眼神经、滑车神经、三叉神经和展神经(CE错)。

19. 答案:A

解析:临产(labor)的重要标志为有规律且逐渐增强的子宫收缩,持续 30 秒或以上,间歇 5~6 分钟,同时伴随进行性宫颈管消失、宫口扩张和胎先露部下降

(A对)。阴道流血(见红)、胎儿下降感、不规则宫缩属于先兆临产的表现(BCE错)。羊水早破是早产的征兆,如果在子宫没有出现规律性收缩以及阴道见红的情况下就发生了羊水破裂,也就是说胎膜在临产前破裂了,这种情况被称为羊水早破,它是产科常见的一种并发症(D错)。

20. 答案:A

解析:患者左侧 T5 以下深感觉障碍、右侧 T7 以下痛温觉消失,考虑为脊髓半切综合征,主要特点是病变节段以下同侧上运动神经元性瘫痪、深感觉障碍、精细触觉障碍及血管舒缩功能障碍,对侧痛温觉障碍。对侧传导束性感觉障碍平面较脊髓损害节段水平低,故患者病变部位在左侧 T5。脊髓震荡与脑震荡相似,是最轻微的脊髓损伤。一般在受到外力损伤之后,立即出现的短暂神经功能的异常,且神经功能的异常是可逆的。

21. 答案:D

解析:原发性三叉神经痛表现为三叉神经分布区内短暂的反复发作性剧痛。首选药物治疗,无效或失效时选用其他疗法。药物治疗首选卡马西平(D对),有效率可达 70%~80%。首次剂量 0.1g,2 次/日,每日增加 0.1g,至疼痛控制为止,最大剂量不超过 1.0g/d。

22. 答案:A

解析:患儿学钠 125mmol/L(<130mmol/L),属于低渗性脱水(DE错)。血压稍下降、精神尚可、皮肤弹性差,考虑为中度缺水,故该患儿的脱水类型为中毒低渗性脱水(A对)。重度脱水时,患儿可有心率增快;脉搏减弱;血压降低;皮肤灌注减少,可出现花纹;前囟凹陷;皮肤弹性差;黏膜干燥;无泪少尿,严重者可有昏迷(B错)。轻度脱水患儿皮肤弹性正常,血压正常(C错)。

23. 答案:B

解析: II 型糖尿病多年, 现双下肢阵发性刺痛, 考虑为糖尿病并发远端对称性多发性神经病变, 以手足远端感觉运动神经受累最多见。通常为对称性, 典型者呈手套或袜套式分布; 下肢较上肢严重, 先出现肢端感觉异常, 可伴痛觉过敏、疼痛; 后期感觉丧失, 可伴运动神经受累, 手足小肌群萎缩, 出现感觉性共济失调及神经性关节炎。应行电生理检查(B 对), 可早期发现感觉和运动神经传导速度减慢。心电图多用于诊断心脏疾病(A 错)。下肢血管彩超可用来检查下肢深静脉血栓、狭窄等(C 错)。腰椎 CT 主要观察腰椎是否有侧弯、错位、滑移、椎间盘突出、腰椎骨折等症状(D 错)。磁共振对检测 24. 颅内疾病有较好效果(E 错)。

答案:E

解析: 卵巢分泌的激素包括: 雌激素、孕激素(E 对)、雄激素。孕激素是由卵巢黄体细胞分泌的一种类固醇激素, 包括孕酮、 20α -羟孕酮、 17α -羟孕酮, 其中孕酮的生物活性最强。催乳素是一种由垂体前叶腺嗜酸细胞分泌的蛋白质激素。主要作用为促进乳腺发育生长, 刺激并维持泌乳(A 错)。促黄体生成素是腺垂体细胞分泌的一种糖蛋白类促性腺激素, 可促进胆固醇在性腺细胞内转化为性激素(B 错)。卵泡刺激素又叫做促卵泡生成素(FSH)是由垂体分泌的一种可以促进卵泡生长, 发育, 成熟的激素(C 错)。HCG 是由胎盘的滋养层细胞分泌的一种糖蛋白(D 错)。

25. 答案:E

解析: 重症肌无力是一种神经-肌肉接头传递功能障碍的获得性自身免疫性疾病。主要由于神经-肌肉接头突触后膜上 AChR 受损引起。临床主要表现为部分或全身骨骼肌无力和极易疲劳, 活动后症状加重, 经休息和胆碱酯酶抑制剂

治疗后症状减轻。重症肌无力时禁用和慎用药物有: 氨基糖苷类抗生素、新霉素、多黏菌素、巴龙霉素等可加重神经-肌肉接头传递障碍; 奎宁、奎尼丁等药物可以降低肌膜兴奋性; 另外吗啡、地西洋、苯巴比妥、苯妥英钠、普萘洛尔等药物也应禁用或慎用(E 对)。新斯的明属于胆碱酯酶抑制剂, 为治疗重症肌无力药物(A 错)。糖皮质激素可抑制自身免疫反应, 减少 AChR 抗体的生成(B 错)。丙种球蛋白可以干扰 AChR 抗体与 AChR 的结合从而保护 AChR 不被抗体阻断(C 错)。重症肌无力时可适当补充维

生素 C, 增强自身的免疫力, 还可减少肌肉、毛细血管、胸腺、运动终板、微小静脉发生细胞浸润(D 错)。

26. 答案:E

解析: 传统配方的口服补液盐为氯化钠 3.5g、碳酸氢钠 2.5g、氯化钾 1.5g、无水葡萄糖 20g, 用饮用水稀释至 1L 供口服。为 2/3 张电解质溶液(E 对)。

27. 答案:D

解析: 子宫内膜癌是发生于子宫内膜的一组上皮性恶性肿瘤, 以来源于子宫内膜腺体的腺癌最常见。为女性生殖道三大恶性肿瘤之一, 通常将子宫内膜癌分为两种类型, I 型是雌激素依赖型, I 型子宫内膜癌是非雌激素依赖型。I 型是雌激素依赖型患者较年轻, 常伴有肥胖(C 对)、高血压(A 对)、糖尿病(B 对)、不孕或不育及绝经延迟(E 对), 或伴有无排卵性疾病、功能性卵巢肿瘤、长期服用单一雌激素或他莫昔芬等病史(D 错, 为本题正确答案)。

28. 答案:C

解析: ICD-10 是《国际疾病与分类第 10 版》, 诊断抑郁发作时, 一般要求病程持续至少 2 周, 并且存在具有临床意义的痛苦或社会功能的受损(C 对 ABDE 错)。

29. 答案:C

解析:早期佝偻病的实验室检查最典型的表现是血清 25-(OH)D₃ 下降(C对)。佝偻病初期 PTH 升高(E错),一过性血钙下降,血磷降低,碱性磷酸酶正常或稍高(D错)。但血清 25-(OH)D₃ 下降是最典型的表现。

30. 答案:C

解析:婴儿前囟凹陷常见于脱水时(C对)。甲减时前囟延迟闭合(A错),佝偻病缺乏维生素 D,使前囟增大、延迟闭合(B错),婴儿脑膜炎、病毒性脑炎使颅内压升高,前囟隆起(DE错)。

31. 答案:B

解析:婴幼儿发育最快的时期是婴儿期(B对)。第1年为生后的第一个生长高峰;第2年以后生长速度逐渐减慢,至青春期生长速度又加快,出现第二个生长高峰。婴儿期为自出生到1周岁之前,婴儿期的体格生长十分迅速,需大量各种营养素满足其生长的需要。

32. 答案:B

解析:艾森曼格综合征是一组先天性心脏病发展的后果。房、室间隔缺损、动脉导管未闭等先天性心脏病,可由原来的左向右分流,由于进行性肺动脉高压发展至器质性肺动脉阻塞性病变,出现右向左分流,皮肤粘膜从无青紫发展至有青紫时,既称为艾森曼格综合征(B对)。乏力、出汗(A错)、发育生长迟缓(C错)、体重下降(E错)不具有特征性。心尖上翘多见于法洛四联症(D错)。

33. 答案:C

解析:中年女性,左眼睑下垂3天(可能有颅内神经压迫),突发剧烈头痛、伴恶心呕吐。查体:神志清楚,左眼睑下垂、瞳孔扩大、对光反射消失、眼球处于外展位,内收及上下视受限。该患者最可能诊断为蛛网膜下腔出血(C对)。

34. 答案:C

解析:中年男性,3月前发生车祸至妻子死亡,后频频出现与车祸相关的梦境,回避与“汽车”“车祸”相关的场景,精神萎靡,终日酗酒,该患者最可能的诊断为创伤后应激障碍(C对)。创伤后应激障碍(PTSD),是由于受到异乎寻常的威胁性、灾难性心理创伤,导致延迟出现和长期持续的精神障碍。

35. 答案:C

解析:中年女性,既往有人工流产手术史。术后闭经一年,行孕激素试验和雌孕激素序贯试验均为阴性,体温监测为双相型,说明存在排卵。该患者的闭经类型最可能为子宫性闭经(C对)。

36. 答案:A

解析:青年初产妇,顺产后3天,体温略升高,37.8℃,脉搏正常,血性恶露、无异味,会阴切口无渗出,乳房胀痛,该产妇体温略升高的原因为泌乳热(A对)。泌乳热为产后3~4日出现乳房血管、淋巴管极度充盈,乳房胀大,体温升高。

37. 答案:C

解析:中年男性,既往饮酒史,2天前断酒,出现肢体粗大震颤、不识亲人、知觉异常,情绪越激、大喊大叫,最可能的诊断为酒精戒断反应中的震颤谵妄(C对)。震颤谵妄表现为突然断酒,大约在48小时后出现震颤谵妄,表现为意识模糊,分不清东西南北,不识亲人,不知时间,有大量的知觉异常。

38. 答案:A

解析:2岁女婴,喂养困难,气促、多汗、生长落后,查体:胸骨左缘第二肋间(肺动脉瓣听诊区)可闻及响亮的粗糙机器音,左室肥厚,最可能的诊断是动脉导管未闭(A对)。动脉导管未闭(PDA)为小儿先天性心脏病常见类型之一,导管粗大者在婴幼儿期即可有咳嗽、气急、喂养困难、体重,不增、生长发育落后等,分流量大者可有前区突出、

鸡胸等现象。

39. 答案:E

解析:青年男性,车祸后四肢麻木无力,肌力3级(肢体可抵抗重力,但不能抵抗阻力),神志清楚,肌张力增高。颈4以下深浅感觉减退,患者最可能损伤部位为颈膨大及以上颈髓(E对)。

40. 答案:B

解析:一岁女童,间断抽搐2天,多汗、反复惊厥。查体:体温正常,枕秃、方颅(维生素D缺乏性佝偻病特征表现)。实验室检查可见:血糖略低,血钙略低,血镁略高,血磷稍低,患者最可能的诊断为VitD3缺乏性手足搐搦症(B对)。

41. 答案:A

解析:育龄期女性,痛经3年加重半年,不孕2年,双合诊可见阴道后穹窿蓝紫色结节,双附件未扪及肿大,患者最可能的诊断为子宫内膜异位症(A对)。

42. 答案:E

解析:青年女性,2周前人工流产手术史,术后发热,静滴头孢曲松进行治疗(第3代头孢菌素,属于广谱抗菌药),近3天出现外阴瘙痒伴阴道豆腐渣样物3天。该患者最可能的诊断为外阴阴道假丝酵母菌病,外阴瘙痒的直接原因为乳杆菌生长受抑制(E对)。

43. 答案:C

解析:中年男性,在公共场合用餐时,害怕自己出丑,遭到别人嘲笑,出现拘束、紧张表现,此后回避在公共场合用餐。患者能意识到这种紧张和恐惧是不合理的,但无法自控,仍设法回避。最可能的诊断为社交焦虑障碍(C对)。

44. 答案:C

解析:中年女性,出现贫血表现,急诊输悬浮红细胞50ml,突发寒战高热、心慌气短,酱油色尿,判断患者可能出

现了溶血反应。急性输血相关性溶血指在输血中或输血后数分钟至数小时内发生的溶血,常出现高热、寒战、心悸、气短、腰背痛、血红蛋白尿甚至无尿、急性肾衰竭和DIC表现等,严重者可导致死亡。该类溶血的原因有:①供、受血者血型不合(D对);②血液保存、运输或处理不当(BE对);③受血者患溶血性疾病等(A对)。尿路结石发作常无寒战高热,且多与输血无关(C错,为本题正确答案)。

45. 答案:C

解析:两岁女童,智力发育迟缓,两岁才可独立行走,查体:身高80cm(正常儿童约89cm)、体重10kg(正常儿童约12kg)。眼距宽、通贯手、眼外侧上斜。根据患者表现,疑诊断为唐氏综合征。明确诊断首选染色体核型分析(C对)。

46. 答案:E

解析:6月龄男婴,多汗、夜间惊醒、哭闹(神经兴奋性增高表现)。枕秃明显,颅骨软化消失,前囟大于正常(正常婴儿6个月时前囟开始闭合),心肺检查未见异常,肝稍大。综合分析,患者最可能诊断为营养性维生素D缺乏性佝偻病,早期检查结果25(OH)D₃下降(E对)。

47. 答案:D

解析:3岁男童,咳嗽、间断发热半月,既往麻疹病史,接种史不详。查体:体温升高,X线提示右上肺片状阴影,肺门影,边缘模糊。结核菌素试验48~72小时红肿10mm,硬结3mm。结核菌素试验硬结平均直径不足5mm为阴性(E错),根据患者X线和临床表现提示患儿为结核病,出现结核菌素阴性的原因应为免疫抑制导致的假阴性(D对)。

48. 答案:A

解析:中老年男性(TIA好发人群),就餐时突发右上肢无力,无法握拳,20

分钟后缓解，反复多次。神经系统检查无异常，最可能的诊断为短暂性脑缺血(A对)。短暂性脑缺血发作(TIA)是由于局部脑或视网膜缺血引起的短暂性神经功能缺损，临床症状一般不超过1小时，最长不超过24小时，且无责任病灶的证据。好发于中老年人，男性多于女性，患者多伴有高血压、动脉粥样硬化、糖尿病或高血脂等脑血管病危险因素。发病突然，局部脑或视网膜功能障碍历时短暂，最长不超过24小时，不留后遗症。

49. 答案:E

解析:青春期女性，大量饮食不可自控，早期常自我引吐试图抵消食物的发胖作用，体重无明显减轻，月经不规律，无器质性病变，胃镜检查可见浅表性胃炎。该患者最主要的诊断为神经性贪食(E对)。神经性贪食患者常反复出现发作性大量进食，有难以控制的进食欲望，吃到难以忍受的腹胀为止。患者往往过分关注自己的体重和体型，存在担心发胖的恐惧心理。在发作期间，为避免体重增加，常反复采用不适当的代偿行为包括自我诱发呕吐、滥用泻药、间歇进食、使用厌食剂等。

50. 答案:C

解析:10岁男童，诊断为肾病综合征，对于肾病综合征的治疗方法，目前采用的有短程疗法与、中程疗法。短程疗法:泼尼松 $2\text{mg}/(\text{kg}\cdot\text{d})$ (按身高标准体重，下同)，最大量 $60\text{mg}/\text{d}$ ，分次服用，共4周。4周后不管效果如何，均改为泼尼松 $1.5\text{mg}/\text{kg}$ 隔日晨顿服，共4周，全疗程共8周，然后骤然停药。短程疗法易复发，国内少用。中、长程疗法:可用于各种类型的肾病综合征。先以泼尼松 $2\text{mg}/(\text{kg}\cdot\text{d})$ ，最大量 $60\text{mg}/\text{d}$ ，分次服用。若4周内尿蛋白转阴，则自转阴后至少巩固2周方始减量，以后改为隔日 $2\text{mg}/\text{kg}$ 早餐后顿

服，继续用4周，以后每2~4周总量中减 $2.5\sim 5\text{mg}$ ，直至停药。疗程必须达6个月(中程疗法)。开始治疗后4周尿蛋白未转阴者可继续服至尿蛋白阴转后2周一般不超过8周。以后再改为隔日 $2\text{mg}/\text{kg}$ 早餐后顿服，继续用4周，以后每2~4周减量一次，直至停药，疗程9个月(长程疗法)。患儿已使用足量泼尼松治疗3周，不论以短程疗法还是中程疗法，均需治疗4周后再行观察，故目前该患儿应继续应用足量泼尼松治疗(C对 ABDE错)。

51. 答案:D

解析:青年女性，阴道稀薄泡沫状分泌物，黏膜充血，患者最可能的诊断为滴虫阴道炎，阴道分泌物检查最可能的结果为悬滴法发现阴道毛滴虫(D对)。

52. 答案:A

解析:9月龄女婴，呕吐、腹泻、发热，蛋花汤样大便、次数多、无臭味、无脓血，患儿有轻微脱水表现，最可能的诊断为轮状病毒肠炎(A对)。

53. 答案:B

解析:中年女性，继发痛经伴月经增多4年，妇科检查可见子宫增大，呈孕10周大小，活动欠佳，双附件未触及异常，患者最可能的诊断为子宫腺肌病(B对)。当子宫内膜腺体及间质侵入子宫肌层时，称子宫腺肌病，主要症状是经量过多、经期延长和逐渐加重的进行性痛经，疼痛位于下腹正中，常于经前1周开始，直至月经结束。有35%患者无典型症状，子宫腺肌病患者中月经过多发生率为40%~50%，表现为连续数个月经周期中月经量增多，一般大于 80ml ，并影响女性身体、心理、社会和经济等方面的生活质量。妇科检查子宫呈均匀增大或有局限性结节隆起，质硬且有压痛，经期压痛更甚。

54. 答案:E

解析:骨龄简易计算方法为:腕部骨化中

心的数目=年龄+1。故 4 岁女童的腕部骨化中心的数目为 4+1=5 (E 对)。

55. 答案:B

解析:临产妇,妊娠 40 周,宫口开 3cm,未开全,阴道可见胎头,突发阴道流液,胎头下方掉出条索状物,考虑为脐带脱垂。此时胎儿状态尚可,应争取尽快娩出胎儿,对于宫口尚未开全的产妇,应立即采取头低臀高位,将胎先露部上推,应用抑制子宫收缩的药物,以缓解或减轻脐带受压;严密监测胎心,同时尽快行剖宫产术 (B 对 ACDE 错)。

56. 答案:C

解析:患者中年男性,既往有蛛网膜下腔出血病史,提示颅内动脉瘤存在可能性大,出现右眼睑下垂伴复视 2 个月、查体右眼球外斜位、右侧瞳孔散大、对光反射消失等动眼神经麻痹表现提示动眼神经受压或病损,增强 CT 检查显示鞍旁右侧有一直径约 0.5cm 圆形高密度影,周围无脑水肿征提示该高密度影非脑出血引起,而是动脉瘤所致。综上,考虑诊断为右侧颈内动脉后交通动

57. 答案:E

解析:育龄期女性,不孕,月经无痛,实验室检查及阴道、子宫检查未见异常。连续 3 年体温呈单相型, TSH3.2 μ /l (正常值 2-10 μ /L)。患者不孕的原因为排卵功能障碍 (E 对)。无排卵性基础体温呈单相型。子宫颈因素导致的不孕包括宫颈松弛和宫颈病变等 (AB 错)。本题中 TSH 正常,故排除甲状腺因素 (C 错)。子宫体因素导致不孕的原因有子宫黏膜下肌瘤、体积较大影响宫腔形态的肌壁间肌瘤、子宫腺肌症、宫腔粘连和子宫内膜息肉等 (D 错)。

58. 答案:D

解析:中年女性,上腹隐痛、贫血表现,诊断为胃癌,拟行胃癌根治术。完

善术前输血相关血清学检查包括:Rh 血型鉴定、ABO 血型鉴定、交叉配血试验、不规则抗体筛查 (ABCE 对)。血小板抗体筛查适用于反复输血的病人,反复输血可刺激机体产生血小板抗体,可能导致血小板输注无效,故反复输血的患者,术前输血相关血清学检查应包括血小板抗体筛查 (D 错,为本题正确答案)。

59. 答案:B

解析:青年男性,脑外伤后出现短暂的意识丧失,2 分钟后即清醒。意识恢复后,对受伤当时的情况不能记忆,无法描述。神经检查与 CT 检查未见明显异常,最可能的诊断为脑震荡 (B 对)。脑震荡伤后立即出现短暂的意识丧失,持续数秒至数分钟,一般不超过半小时。有的仅表现为瞬间意识混乱或恍惚,并无昏迷。意识恢复后,对受伤当时和伤前近期的情况不能记忆,即逆行性遗忘。神经系统检查无明显阳性体征。腰椎穿刺检查,发现颅内压和脑脊液都在正常范围。CT 检查颅内无异常。脑挫裂伤最突出的症状是意识障碍,还可有头痛、恶心、呕吐等表现 (A 错)。硬膜下血肿、硬膜外血肿多有意识障碍和颅内压增高等表现,CT 检查可见明显高密度影 (CD 错)。脑出血通常在活动和情绪激动时发病,出血前多无预兆,半数患者出现头痛并很剧烈,常见呕吐,出血后血压明显升高,临床症状常在数分钟至数小时达到高峰,临床症状体征因出血部位及出血量不同而异,基底核,丘脑与内囊出血引起轻偏瘫是常见的早期症状;少数病例出现痫性发作,常为局灶性;重症者迅速转入意识模糊或昏迷 (E 错)。

60. 答案:A

解析:临产妇,宫口开大 4cm,宫缩 40s/6-7min,胎心 154 次/分,胎膜未破,胎儿骶左前, S+1,宫口可触及胎

足,表明胎儿目前处于不完全臀先露,符合择期剖宫产手术指征(骨盆狭窄、瘢痕子宫、胎儿体重大于 3500g、胎儿生长受限、胎儿窘迫、胎头仰伸位、有难产史、妊娠合并症、脐带先露、完全和不完全臀先露),接下来应进行剖宫产(A 对 C 错)。静滴缩宫素(B 错)、破膜(D 错)、臀位助产(E 错)均不适用于不完全臀先露。

61. 答案:A

解析:中年男性,排尿间断,伴阴茎头部疼痛,改变体位后可继续排尿,最可能的诊断为膀胱结石(A 对)。老年男性多有良性前列腺增生,可导致继发性膀胱结石。膀胱结石的典型症状为排尿突然中断,疼痛放射至远端尿道及阴茎头部,伴排尿困难和膀胱刺激症状。跑跳或改变排尿姿势后,能使疼痛缓解,继续排尿。前列腺增生最常见的早期症状为尿频,夜间更为明显。随着病情发展,梗阻加重,残余尿量增多,膀胱有效容量减少,尿频逐渐加重(B 错)。尿道炎多表现为尿频、尿痛、尿急和血尿,急性期男性可有尿道分泌物,初始为黏液性,后多有量脓性分泌物(C 错)。急性细菌性膀胱炎发病突然,有尿痛、尿频、尿急,严重者数分钟排尿一次,且不分昼夜。排空后仍有尿不尽感。病人常诉排尿时尿道有烧灼感,甚至不敢排尿。常见终末血尿,有时为全程血尿,甚至有血块排出。可有急迫性尿失禁(D 错)。肾积水伴有上尿路急性梗阻时,常常出现肾绞痛、恶心、呕吐、血尿及肾区压痛等。伴有上尿路慢性梗阻由于发展常较缓慢,症状不明显或仅有腰部隐痛不适,当发展成巨大肾积水时,腹部可出现肿块;伴有下尿路梗阻时,主要表现为排尿困难和膀胱排空障碍,甚至出现尿潴留,而引起肾积水出现的症状常较晚,临床多表现为不同程度的肾功能损害(E 错)。

62. 答案:A

解析:中年男性,下火车时看到人都在往出站口跑,认为有一场针对自己的大阴谋正在实施,这两种现象之间并无关联,也不能用患者既往经历加以解释,此现象最可能属于原发性妄想(A 对)。原发性妄想是没有发生基础的妄想。表现为内容不可理解,不能用既往经历、当前处境及其他心理活动等加以解释。

63. 答案:C

解析:育龄期女性,剖宫产术后 4 个月,处于哺乳期,月经未恢复。此时首选的避孕措施为避孕套(C 对)。哺乳期避孕的原则是不影响乳汁质量和婴儿健康,首选阴茎套避孕。宫内节育环(A 错)也可使用,但不作为首选。哺乳期不宜使用雌、孕激素复合避孕药或避孕针以及安全期避孕(BDE 错)。

64. 答案:C

解析:中老年女性,因卵巢肿瘤行手术治疗,术中病理肿物呈囊实性、内有乳头、切片可见砂粒体,考虑为卵巢上皮性肿瘤。为进行病情监测和疗效评估,最常用的肿瘤标志物是 CA125(C 对)。80%患者的血清 CA125 水平升高,但近半数的早期病例并不升高,不单独用于早期诊断,更多用于病情监测和疗效评估。AFP 高,不单独用于早期诊断,更多用于病情监测和疗效评估。②血清 AFP:对卵巢卵黄囊瘤有特异性诊断价值。卵巢未成熟畸胎瘤、混合性无性细胞瘤中含卵黄囊成分者,AFP 也可升高。③血清 hCG:对非妊娠性绒癌有特异性。④性激素:卵巢颗粒细胞瘤、卵泡膜细胞瘤产生较高水平雌激素,而浆液性、黏液性囊腺瘤或勃勒纳瘤有时也可分泌一定量雌激素。⑤血清 HE4:与 CA125 联合应用来判断盆腔肿块的良、恶性。血清 AFP:对卵巢卵黄囊瘤有特异性诊断价值。卵巢未成熟畸胎瘤、混合性无性细胞瘤中含卵黄囊成分者,

AFP 也可升高(A 错)。血清 hCG:对非妊娠性绒癌有特异性(B 错)。CA199:作为胰腺癌、结直肠癌等疾病的肿瘤标志物(D 错)。E2(雌二醇):卵巢颗粒细胞瘤、卵泡膜细胞瘤产生较高水平雌激素,而浆液性、黏液性囊腺瘤或勃勒肿瘤有时也可分泌一定量雌激素(E 错)。

65. 答案:D

解析:中年女性,妊娠 22 周,既往子宫肌瘤病史。现腹痛、发热,无阴道流血。B 超提示子宫前壁有一 10cm 左右实性凸起,考略我子宫肌瘤合并红色样变。子宫肌瘤是女性生殖器最常见的良性肿瘤,由平滑肌及结缔组织组成。肌瘤失去原有的典型结构被称为肌瘤变性,常见的肌瘤变性有①玻璃样变:又称透明变性,最常见。肌瘤剖面漩涡状结构消失,由均匀透明样物质取代。镜下见病变区肌细胞消失,为均匀透明无结构区(C 错)。②囊性变:肌瘤内出现大小不等的囊腔,其间有结缔组织相隔,数个囊腔也可融合成大囊腔,腔内含清亮无色液体,也可凝固成胶冻状。镜下见囊腔为玻璃样变的肌瘤组织构成,内壁无上皮覆盖(E 错)。③红色变:多见于妊娠期或产褥期,为肌瘤的一种特殊类型坏死,发生机制不清,可能与肌瘤内小血管退行性变引起血栓及溶血、血红蛋白渗入肌纤维间有关。患者可有剧烈腹痛伴恶心、呕吐、发热,白细胞计数升高,检查发现肌瘤增大、压痛(D 对)。④肉瘤样变:较少见,多见于绝经后子宫肌瘤伴疼痛和出血的患者。肌瘤恶变后,组织变软且脆,切面灰黄色,似生鱼肉状,与周围组织界限不清。镜下见平滑肌细胞增生活跃,排列紊乱,漩涡状结构消失,细胞有异型性,核分裂像易见,并可出现肿瘤细胞凝固性坏死(B 错)。⑤钙化:多见于蒂部细小、血供不足的浆膜下肌瘤以及绝经后妇女的肌瘤。子宫肌瘤合并感染

时,可有不规则阴道流血或血样脓性排液(A 错)。

66. 答案:D

解析:青少年女性,月经不规律、月经量增多,无痛经,基础体温单相型。盆腔 B 超检查未见明显异常,该患者最可能诊断为无排卵性子官异常出血(D 对)。无排卵性 AUB 常见于青春期,多数不排卵女性表现为月经紊乱,即失去正常周期和出血自限性,出血间隔长短不一,基础体温测定是诊断无排卵性异常子宫出血最常用的手段,无排卵性基础体温呈单相型。

67. 答案:B

解析:育龄期女性,既往月经规律,现停经 36 天,高度怀疑妊娠,符合该孕妇妊娠生理状态的是尿妊娠试验阳性(B 对)。尿妊娠试验一般在女性月经推迟十天以后或者性生活 14 天后可得到阳性结果。

68. 答案:C

解析:中年女性,反复发作的右侧脸颊、上唇疼痛,每次持续数秒钟,刷牙洗脸均可诱发。神经系统检查未见明显异常,该患者最可能的诊断为三叉神经痛(C 对)。三叉神经痛发作时表现为以面颊上下颌及舌部明显的剧烈电击样、针刺样、刀割样或撕裂样疼痛,持续数秒或 1~2 分钟,突发突止,间歇期完全正常。患者口角、鼻翼颊部或舌部为敏感区,轻触可诱发,神经系统体查一般无阳性体征。丛集性头痛平均发病年龄约为 25 岁,以男性多见,约头痛突然发生,无先兆症状,几乎发生于每日同一时间,常在晚上发作,使患者从睡眠中痛醒。头痛位于一侧眶周、眶上、眼球后和(或)颞部,呈尖锐、爆炸样、非搏动性剧痛。头痛持续 15 分钟至 3 小时不等(A 错)。偏头痛表现为反复发作的一侧或双侧额颞部疼痛,呈搏动性,疼痛持续时伴颈肌收缩可使症状复杂

化。常伴有恶心、呕吐、畏光、畏声、出汗、全身不适、头皮触痛等症状(B错)。上颌窦炎症状与鼻炎类似。主要临床表现为鼻塞、流涕、面颊部疼痛或嗅觉减退症状,常伴有畏寒、发热、食欲减退、便秘及周身不适等,严重者可累及骨质和周围组织邻近器官,引起严重并发症(D错)。面神经麻痹主要表现为病灶对侧下部面肌瘫痪,周围性面神经麻痹主要表现为病灶同侧上部及下部面肌瘫痪。不同的病因有其特征性的伴随症状(E错)。

69. 答案:A

解析:1月龄女婴,出生史42+3周,属于过期产,生后吮吸差、喂养差,腹胀便秘,少哭,哭声弱,体重高于正常。查体:皮肤轻度黄染,脐膨隆,肌张力降低。最有可能的诊断为先天性甲状腺功能减退症(A对)。先天性甲状腺功能减退症患儿常为过期产,出生体重常大于第90百分位,生后常有腹胀,便秘,脐疝,易被误诊为先天性巨结肠;生理性黄疸期延长;对外界反应低下,肌张力低,吮奶差,呼吸慢,哭声低且少。骨软骨发育不良多有生长迟缓、身材矮小等表现(B错)。黏多糖贮积病表现为体格发育障碍、智力发育落后,是一种遗传性疾病(C错)。唐氏综合征主要特征为智能落后、特殊面容(表情呆滞。睑裂小、眼距宽、双眼外眦上斜)等和生长发育迟缓,并可伴有多种畸形(D错)。先天性巨结肠主要表现为:胎便排出延缓、顽固性便秘和腹胀;呕吐、营养不良和发育迟缓;直肠指检:直肠壶腹部空虚,拔指后由于近端肠管内积存大量粪便,可排出恶臭气体及大便(E错)。

70. 答案:B

解析:中老年女性,停经2年,出现阴道流血10天。既往有高血压、糖尿病病史。查体:子宫颈稍大、内膜厚

1.1cm(绝经期子宫内膜厚度一般小于0.4cm属于正常),血流增强,综合分析,患者最可能诊断为子宫内膜癌。子宫内膜癌是发生于子宫内膜的一组上皮性恶性肿瘤,主要表现为绝经后阴道流血,子宫内膜增厚,晚期宫体可增大。诊断性刮宫是子宫内膜癌常用而有价值的诊断方法。常行分段诊刮,以同时了解宫腔和宫颈的情况(B对)。

71. 答案:B

解析:婴幼儿,间断低热20天,抽搐一次。查体:脾大,腹软,脑膜刺激征阳性(脑膜炎可能性大)。脑脊液检查:无色、白细胞 $260 \times 10^6/L$,中性粒细胞0.4,淋巴细胞0.6,糖原 $1.8mmol/L$ (正常值为 $2.8 \sim 4.5mmol/L$),氯化物 $108mmol/L$ (正常值 $117 \sim 127$),患者最可能的诊断为结核性脑膜炎(B对)。

72. 答案:B

解析:青年男性,既往不洁性交史,尿道口不适,晨起可见薄层分泌物附着。查体:尿道口红肿,挤压可见少许分泌物。患者最有可能诊断为生殖道衣原体感染(B对)。生殖道衣原体感染临床表现与淋病类似但程度较轻。常见症状为尿道刺痒、刺痛或烧灼感。体检可见尿道口轻度红肿,尿道分泌物呈浆液性,量少,有些患者晨起时会发现尿道口有少量分泌物结成痂封住尿道口(糊口现象)或内裤被污染(B对)。

73. 答案:A

解析:一岁女婴,反复发热、恶心、喷射性呕吐,查体:克氏征阳性,提示有脑膜刺激征。脑脊液检查:蛋白 $2g/L$ (正常值 $0.15 \sim 0.45g/L$),WBC: $600 \times 10^9/L$ (正常值 $4 \sim 10 \times 10^9/L$),以中性粒细胞为主。糖 $1.8mmol/L$ (正常值为 $2.8 \sim 4.5mmol/L$),氯化物 $106mmol/L$ (正常值 $117 \sim 127$),考虑诊断为化脓性脑膜炎(A对)。化脓性脑膜

炎常见:感染中毒及急性脑功能障碍症状、颅内压增高表现、脑膜刺激征。脑脊液检查:白细胞总数显著增多, $\geq 1000 \times 10^6/L$, 分类以中性粒细胞为主。

74. 答案:B

解析:10岁女童,晨起眼睑水肿,尿液浓茶色。半月前猩红热病史(链球菌前驱感染),查体:血压升高,肝大有压痛,血肌酐 $400 \mu\text{mol/L}$ (儿童血肌酐正常 $24.9 \mu\text{mol/L} \sim 69.7 \mu\text{mol/L}$),患儿最可能的诊断为急性肾炎,且已出现肾功能损害。患者不宜使用甘露醇。故本题选B。

75. 答案:A

解析:中年女性,近半年行动退化(精神分裂前驱变化),自觉有人监视自己、有人要害自己。经常自言自语、突然大笑,考虑诊断为精神分裂症(A对)。精神分裂症最常见的前驱期症状可有:①情绪改变:抑郁,焦虑,情绪波动,易激惹等。②认知改变:出现一些古怪或异常的观念和想法等。③对自身和外界的感知改变。④行为改变:如社交退缩或丧失兴趣,多疑敏感,职业功能水平下降。⑤躯体改变等。普遍公认的阳性症状包括幻觉、妄想及言语和行为的紊乱(瓦解症状)。其中妄想多以被害、关系、嫉妒、钟情、非血统、宗教和躯体妄想多见,患者出现的被害妄想符合精神分裂的表现。妄想性障碍是以长期持续性、系统性妄想为最主要临床特征的一组精神障碍。患者除了妄想症状外,少有其他精神病症状,其人格和智能通常可保持完整,在不涉及妄想的情况下,情感、言语和行为基本正常(B错)。强迫障碍是一种以反复出现的强迫观念、强迫冲动或强迫行为等为主要临床表现的精神疾病。多数患者认为这些观念和行为没有必要或不正常,违反了自己的意愿,无法摆脱,为此感到焦虑和痛苦(C错)。分离障碍是一类复杂

的心理-生理紊乱过程,患者非自主地、间断地丧失部分或全部心理-生理功能的整合能力,在感知觉、记忆、情感、行为、自我(身份)意识及环境意识等方面的失整合,即所谓的分离状态(D错)。躁狂发作的主要原发症状为心境或情感高涨。最特征的表现是患者自我感觉十分良好,情绪高涨,整日兴高采烈,不知疲倦,常自觉非常愉快,具有感染力(E错)。

76. 答案:B

解析:本题主要考查骨盆径线。概耻外径反映骨盆人口前后径,正常值为 $18 \sim 20\text{cm}$, 髂棘间径正常值为 $23 \sim 26\text{cm}$, 髂嵴间径正常值为 $25 \sim 28\text{cm}$, 均反映人口的横径。坐骨棘间径反映中骨盆横径,正常值为 10cm 。坐骨结节间径正常值为 $8.5 \sim 9.5\text{cm}$, 反映出口的横径。本题骨盆人口在正常范围内,但中骨盆和出口均小于正常值,此为漏斗骨盆的典型表现。

77. 答案:A

解析:育龄期女性,产后8个月,不规则阴道流血。查血 $\text{hcg} 40000\text{u/L}$, B超提示不均匀回声,胸部X线显示双肺中下野棉球状阴影,患者最肯能的诊断为绒癌。常见临床表现为:在葡萄胎排空、流产或足月产后,有持续的不规则阴道流血,一般无腹痛,血 hCG 呈高水平状态,绒癌伴有肺转移时,典型的X线征象为棉球状或团块状阴影,转移灶以右侧肺及中下部较为多见。绒癌的治疗原则为采用以化疗为主、手术和放疗为辅的综合治疗(A对BCDE错)。常用的化疗药物有甲氨蝶呤(MTX)、放线菌素-D(Act-D)、氟尿嘧啶(5-FU)、环磷酰胺((CTX)、长春新碱(VCR)、依托泊昔(VP-16)等。低危患者选择单一药物化疗,高危患者选择联合化疗。

78. 答案:C

解析:中老年女性,阴道口脱出肿物2

月。妇科检查:阴道可见宫颈及宫体(Ⅱ度脱出),阴道前后壁均有轻度膨出,患者既往高血压、糖尿病,经药物控制良好,最合适的治疗方案为经阴道全子宫切除及阴道前后壁修补(C对)。患者年龄偏大,无生育要求,可行子宫全切术。阴道前后壁修补术,主要针对筋膜修补,为Ⅱ水平重建。子宫颈托是一种支持子宫和阴道壁并使其维持在阴道内而不脱出的工具。有支撑型和填充型。以下情况尤其适用于子宫托治疗:患者全身状况不适宜做手术;妊娠期和产后;膨出面溃疡手术前促进溃疡面的愈合(A错)。阴道全封闭术。该手术将阴道前后壁分别剥离长方形黏膜面,然后将阴道前后壁剥离创面相对缝合完全封闭阴道。术后失去性交功能,故仅适用于年老体弱不能耐受较大手术者(D错)。对于年轻宫颈延长子宫脱垂患者可行曼氏手术(Manchester手术):包括阴道前后壁修补、主韧带缩短及宫颈部分切除术(BE错)。

79. 答案:A

解析:青年女性,既往风湿热病史,与人争吵后,右侧肢体活动不便,言语不利。查体:神志清醒,无颈强直,心率绝对不齐(房颤可能),二尖瓣舒张期听诊杂音,运动型失语,右侧中枢面舌瘫,右侧肌力0~2级,肌张力减低。影像学检查未见异常,该患者最可能的诊断为心源性脑栓塞导致的缺血性卒中。

80. 答案:E

解析:中年女性,头痛、呕吐2周,发作性抽搐3次。既往行乳腺癌根治术,头部CT提示左额叶大片低密度影,占位明显,考虑最可能的诊断为转移性脑瘤。

81. 答案:E

解析:青年女性,足月顺产,产后出现高热、腹胀、腹痛等。查体:体温39.8℃,血压80/50mmHg,肺部湿啰

音,意识模糊(休克表现),腹膜刺激征,患者最可能发生了产褥感染。结合患者高热、休克等表现,最可能的诊断为感染性休克。

82. 答案:B

解析:中年男性,在光线暗淡的环境中将衣帽架看错成人影,属于错觉(B对)。错觉是对客观事物歪曲的知觉。错觉可见于正常人,如在光线暗淡的环境中看错物体,在恐惧、紧张和期待等心理状态下产生错听等,但正常人的错觉经过验证后可以认识到自己的错误并加以纠正。幻觉是没有现实刺激作用于感觉器官时出现的知觉体验,是一种虚幻的知觉(A错)。妄想是在病态推理和判断基础上形成的一种病理性的歪曲的信念。其特征包括:①妄想内容与事实不符,缺乏客观现实基础,但患者仍坚信不移;②妄想内容涉及患者本人,且与个人具有利害关系;③妄想内容具有个体独特性,是个体的心理现象,并非集体信念;④妄想内容与患者的文化背景和经历有关,且通常有浓厚的时代色彩(C错)。精神分裂存在以下五个症状维度(亚症状群):幻觉、妄想症状群;阴性症状群;瓦解症状群;焦虑抑郁症状群及激越症状群(D错)。躯体障碍是一类精神障碍,特征为患者长时间担心或坚信自己得了某种躯体疾病。这类患者会反复强调自身的身体出现了各种不舒服,感到焦虑并不断就医、检查,对于无异常的检查结果或医生告知其没有身体疾病,表示怀疑(E错)。

83. 答案:E

解析:足月产, S+3,胎心率90次/分(胎心率基线<110次/分),且出现晚期减速,即已出现Ⅲ类电子胎心监护图形,提示胎儿缺氧严重,出现急性胎儿窘迫。应尽快终止妊娠:根据产程进展,决定分娩方式。1)Ⅰ类电子胎心监护图形,但宫口未开全或预计短期内无

法阴道分娩，应立即行剖宫产。2) 宫口开全: 骨盆各径线正常者，胎头双顶径已达坐骨棘平面以下，一旦诊断为胎儿窘迫，应尽快行阴道助产术结束分娩。患者宫口开全，应选用产钳助产(E 对 ABCD 错)。

84. 答案:A

解析: 18 个月患儿，高热、持续抽搐 15 分钟，未缓解，属于复杂型热性惊厥，此时的首选药物为地西洋(A 对)。复杂性惊厥的间断临时预防原则: 在发热早期及时口服或直肠应用地西洋，剂量为每次 0.3mg/kg，可每间隔 8 小时应用 1 次，最多连续应用 3 次。苯妥英钠多用于惊厥持续状态、地西洋治疗无效时(B 错)。苯巴比妥适用于新生儿惊厥，本题中患儿已 18 个月，应选用地西洋(C 错)。

85. 答案:A

解析: 一月龄女婴，生后 3 周左右开始溢乳，逐渐加重，呈喷射性呕吐，奶汁带凝块，不含胆汁。查体: 体重较出生时无增长，皮肤轻度黄染，前囟稍凹陷。上腹部可见胃蠕动波，右季肋下肿块，质硬、光滑、活动度好。该患儿最可能诊断为先天性肥厚型幽门梗阻(A 对)。先天性肥厚性幽门狭窄是由于幽门环肌增生肥厚，使幽门管腔狭窄而引起的上消化道不完全梗阻性疾病。典型症状和体征为无胆汁的喷射性呕吐、胃蠕动波和右上腹肿块。呕吐物为带凝块的奶汁，部分患儿可有黄疸表现，在喂奶时或呕吐前容易见到胃蠕动波，右上腹肿块为本病特有体征。先天性肠扭转不良多表现为出生后有正常胎粪排出，生后 3~5 天出现间歇性呕吐，呕吐物含有胆汁。十二指肠梗阻多为不完全性，发生时上腹膨隆，有时可见胃蠕动波，剧烈呕吐后即平坦萎陷。梗阻常反复发生，时轻时重。病儿有消瘦、脱水、体重下降。发生肠扭转时，主要表现为阵

发性腹痛和频繁呕吐。轻度扭转可因改变体位等自动复位缓解，如不能复位而扭转加重，肠管坏死后出现全腹膨隆，满腹压痛，腹肌紧张，血便及严重中毒、休克等症状(B 错)。先天性巨结肠患儿生后 24~48 小时内多无胎便或仅有少量胎便排出，可于生后 2~3 天出现低位肠梗阻症状。以后即有顽固性便秘，3~7 天甚至 1~2 周排便 1 次。严重者发展成不灌肠不排便(C 错)。胃扭转多在出生后数周即可发现，喂奶几分钟后即可发生吐奶，少数患儿会呈喷射状，呕吐物多为奶汁或乳凝块，不含胆汁，若移动患儿吐奶会更明显，腹部有轻微胀气(D 错)。十二指肠瘀滞症典型表现为上腹部疼痛、憋胀、恶心，呕吐胆汁样物等，部分患者可出现消瘦等症状(E 错)。

86. 答案:E

解析: 正常情况下孕 32 周宫高为 29cm，而本例连续 3 周宫高均为 23cm，同时 B 超提示羊水过少，可初步诊断为胎儿生长受限。FGR 一般在孕 34 周左右考虑终止妊娠，如孕周未达 34 周者，应当积极促胎肺成熟后再终止妊娠。

87. 答案:A

解析: 初产妇，足月临产，宫口开全，已达第二产程，宫缩乏力，枕左后位，胎头已达坐骨棘平面下 3cm。胎心基线平稳，胎心 150 次/分，骨盆正位。目前产妇处于第二产程、宫缩乏力、S+3，无宫内窘迫，应先徒手将枕后位转至枕前位，胎儿此时为枕左后，要逆时针旋转 90°，转至枕左前位(B 错)后进行阴道助产(E 错)。剖宫产适用于第二产程延长而胎头双顶径仍在坐骨棘以上或，或伴胎儿窘迫时(C 错)。

88. 答案:B

解析: 中年女性，发作性喘息，既往氨茶碱可缓解(支气管哮喘可能)，呼吸困

难加重一小时，鼻翼煽动，可闻及广泛哮鸣音，最可能的诊断为支气管哮喘的急性发作期。支气管哮喘的发病机制有气道免疫-炎症机制、神经调节机制及其相互作用等。外源性变应原通过吸入、食入或接触等途径进入机体后，被抗原提呈细胞内吞并激活 T 细胞。活化的辅助性 Th2 细胞产生白介素(IL)如 IL-4、IL-5 和 IL-13 等激活 B 淋巴细胞并合成特异性 IgE，后者结合于肥大细胞和嗜碱性粒细胞等表面的 IgE 受体，若变应原再次进入体内，可与结合在细胞表面的 IgE 交联，使该细胞合成并释放多种活性介质，导致气道平滑肌收缩、黏液分泌增加和炎症细胞浸润，产生哮喘的临床症状(B 对)。

89. 答案:C

解析:两岁女童，智力发育迟缓，两岁才可独立行走，查体:身高 80cm(正常儿童约 89cm)、体重 10kg(正常儿童约 12kg)。眼距宽、通贯手、眼外侧上斜。根据患者表现，疑诊断为唐氏综合征。明确诊断首选染色体核型分析(C 对)。

90. 答案:E

解析:育龄期女性，痛经 3 年，镜检宫底和直肠子宫陷凹可见黑褐色出血点，最可能诊断为子宫内膜异位症(E 对)。

91. 答案:D

解析:女性，孕 40 周，宫缩 3 小时，宫口开 6cm，破膜后突发呼吸困难、发绀、大汗淋漓、烦躁不安，数分钟后死亡，最可能的诊断为羊水栓塞(D 对)。

92. 答案:C

解析:病人最近数月一直耳闻入语声，讲“要抓他”，非常害怕，“家中有窃听器、摄像机，马路上有入跟踪，自己完全被控制了(患者坚信自己被某些人监视、迫害)，可诊断为被害妄想(C 对)。思维散漫(A 错)指思维的连贯性障碍，即联想概念之间缺乏必要的联

系。关系妄想(E 错)患者认为周围环境中所发生的与自己无关的事情均与自己有关。错觉(D 错)是对客观事物歪曲的知觉。被控制感(B 错)患者感到自己的思想、情感或意志行为受到某种外界力量的控制而身不由己。

93. 答案:D

解析:青少年，近半年对周围发生的事情都不关心，对于自身相关的事情也不感兴趣，属于情感淡漠(D 对)。情感淡漠是指对外界刺激缺乏相应的情感反应，缺乏内心体验。表现为面部表情呆板，对周围发生的事物漠不关心，即使对与自身有密切利害关系的事情也如此。多见于晚期精神分裂症。情感低落是负性情感活动的明显增强。表现为忧愁、苦闷、唉声叹气、暗自落泪等，有时感到前途灰暗，没有希望，严重时因悲观绝望而出现自杀企图及行为。多见于抑郁发作(A 错)。情感不稳是情感活动的稳定性障碍，表现为患者的情感反应极易发生变化，从一个极端波动至另一极端，显得喜怒无常，变化莫测。多见于脑器质性损害所致的精神障碍(B 错)。情感倒错是情感表现与其内心体验或处境明显不相协调，甚至截然相反。多见于精神分裂症(C 错)。情感矛盾指患者在同一时间对同一人或事物产生两种截然不同的情感反应，但患者并不感到这两种情感的矛盾和对立，没有痛苦和不安，多见于精神分裂症(E 错)。

94. 答案:C

解析:初产妇，妊娠 38 周，宫口开全，宫缩 40 次/分，胎心 100 次/分(低于 110，考虑出现胎儿宫内窘迫)，羊水Ⅲ度，正常骨盆，头先露，胎头已达坐骨棘平面下 3cm，考虑存在羊水胎粪污染导致急性胎儿窘迫，需立即采取措施改善胎儿缺氧状态(A 错)。包括改变孕妇体位、吸氧、停止缩宫素使用、抑制宫

缩、纠正孕妇低血压等措施(B 错), 此时骨盆各径线正常, 胎头双顶径已达坐骨棘平面以下, 应尽快行阴道助产术结束分娩(C 对)。剖宫产适用于 III 类电子胎心监护图形, 但宫口未开全或预计短期内无法阴道分娩者(E 错)。

95. 答案: B

解析: 新生儿, 生后 15 天, 拒乳, 反应差, 黄疸。肝脾肿大, 颈部、前胸可见多个脓疱, 最可能的诊断为新生儿败血症(B 对)。新生儿败血症是指病原体侵入新生儿血液循环并生长、繁殖、产生毒素而引起的全身性炎症反应。出现以下表现时应高度怀疑败血症: ①黄疸; ②肝脾大; ③出血倾向; ④休克; ⑤其他: 呕吐、腹胀、中毒性肠麻痹、呼吸窘迫或暂停、青紫; ⑥可合并肺炎、脑膜炎、坏死性小肠结肠炎、化脓性关节炎、肝脓肿和骨髓炎等。

96. 答案: A

解析: 2 岁男童, 出生半年后口唇青紫, 活动后明显, X 线“靴型心”, 常有蹲踞症状, 该患儿最可能的诊断为法洛四联症, 患儿多有蹲踞症状, 每于行走、游戏时, 常主动下蹲片刻。蹲踞时下肢屈曲, 使静脉回心血量减少, 减轻了心脏负荷, 同时下肢动脉受压, 体循环阻力增加, 使右向左分流量减少, 缺氧症状暂时得以缓解(2 岁男童, 出生半年后口唇青紫, 活动后明显, X 线“靴型心”, 常有蹲踞症状, 该患儿最可能的诊断为法洛四联症, 患儿多有蹲踞症状, 每于行走、游戏时, 常主动下蹲片刻。蹲踞时下肢屈曲, 使静脉回心血量减少, 减轻了心脏负荷, 同时下肢动脉受压, 体循环阻力增加, 使右向左分流量减少, 缺氧症状暂时得以缓解。

97. 答案: D

解析: 老年男性, 行动缓慢 3 年, 近期右手震颤、肌张力上升, 呈“齿轮样强直”, 头颅核磁未见明显异常, 最可能

的诊断是帕金森(D 对)。帕金森病(PD), 又名震颤麻痹, 是一种常见于中老年的神经系统变性疾病, 临床上以静止性震颤、运动迟缓、肌强直和姿势平衡障碍为主要特征。运动症状常始于一侧上肢, 逐渐累及同侧下肢, 再波及对侧上肢及下肢, 呈“N”型进展。

98. 答案: A

解析: 高龄产妇, 孕 18 周, 孕 3 产 1, 10 年前顺产一健康男婴, 目前最合适的唐氏综合征检查方式为无创性产前检查(A 对)。无创性产前检查也称为无创产前 DNA 检测, 不会增加胎儿的丢失率, 且相对血清生化筛查, 敏感性和特异性高, 对于单胎 21-三体综合征的检出率高达 99% 以上, 且假阳性率低。

99. 答案: D

解析: 新生儿, 发热一天伴抽搐一次, 发作已达 15 分钟。急诊查体: 体温 39.5℃, 意识丧失, 双眼上翻, 四肢抽搐。应诊断为惊厥。首选药物为地西泮静注。每次 0.3~0.5mg/kg(单剂最大剂量 10mg) 静注(每分钟 1~2mg、新生儿 0.2mg), 如发作持续, 必要时 10~15 分钟后可重复一次(D 对)。

100. 答案: A

解析: 初产妇, 妊娠 26+3 周, BMI 28, 属于肥胖范畴, 家族糖尿病史, 该孕妇具有妊娠期糖尿病的高危因素(年龄>35 岁、妊娠前超重或肥胖、糖耐量异常史、多囊卵巢综合征、糖尿病家族史、不明原因的死胎、死产、流产史、巨大胎儿分娩史、胎儿畸形和羊水过多史、GDM 史、妊娠期发现胎儿大于孕周、羊水过多; 反复外阴阴道假丝酵母菌病者), 应在妊娠 24~28 周时, 首先检查空腹血糖(FPG)。FPG>5.1mmol/L, 可以直接诊断为 GDM, 本题中患者空腹血糖 5.0mmol/L, 下一步应行 75g OGTT。空腹及服糖后 1 小时、2 小时的血糖值分别低于 5.1mmol/L, 10.0mmol/L,

8. 5mmol/L。任何一点血糖值达到或超过上述标准即诊断为 GDM。

101. 答案:A

解析:高龄产妇, G3P1, 宫底在脐与剑突之间, 根据子宫高度, 判断该孕妇处于妊娠 32 周末, 此时属于妊娠晚期, 羊水来源主要是婴儿尿液与胎肺(A 对)。脐带、胎儿皮肤可参与羊水的形成, 但量少, 不是主要来源(BC 错)。妊娠早期的羊水主要来自母体血清经胎膜进入羊膜腔的透析液(DE 错)。

102-1. 答案:A

解析:青年男性, 因腿部疼痛被疑诊为“骨癌”, 当时即出现不语、举止怪异、运动障碍, 后逐渐恢复, 可排除器质病变。后“骨癌”被排除, 但患者每遇到不顺心的事情时, 仍有此种神经系统损伤表现, 该患者最可能的诊断为分离(转换)障碍(A 对)。分离转换障碍的诊断要点为:患者在起病前常常有明确的心理社会因素、神经系统检查体征与患者症状表现不匹配, 体征常常按照患者对神经系统的理解呈现, 如则头部受伤出现左侧肢体瘫痪, 失明者直接对光反射正常, 失声者声带运动正常等、对神经系统症状相关的神经电生理、神经影像检查无异常发现。

102-2. 答案:B

解析:青年男性, 因腿部疼痛被疑诊为“骨癌”, 当时即出现不语、举止怪异、运动障碍, 后逐渐恢复, 可排除器质病变。后“骨癌”被排除, 但患者每遇到不顺心的事情时, 仍有此种神经系统损伤表现, 该患者最可能的诊断为分离(转换)障碍。暗示治疗对患者分离性神经症状有较好的疗效, 可分为觉醒时暗示(也称直接暗示)和催眠暗示两种(B 对)。对患者伴随的其他症状如失眠、抑郁、焦虑等, 可用精神药物给予对症治疗(CE 错)。

104-1. 答案:D

解析:中年男性, 10 个月前被领导表扬后, 出现情绪高涨、思维奔逸、活动增多、睡眠需求减少等表现, 符合躁狂的表现, 经治疗后好转。近 1 个月因女儿离婚, 导致情绪低落、自责自罪、兴趣减退、睡眠障碍、自杀观念, 符合抑郁发作的表现。目前该患者的诊断为双向障碍抑郁发作。

104-2. 答案:D

解析:中年男性, 10 个月前被领导表扬后, 出现情绪高涨、思维奔逸、活动增多、睡眠需求减少等表现, 符合躁狂的表现, 经治疗后好转。近 1 个月因女儿离婚, 导致情绪低落、自责自罪、兴趣减退、睡眠障碍、自杀观念, 符合抑郁发作的表现。目前该患者的诊断为双向障碍抑郁发作。双向抑郁发作时首选心境稳定剂(D 对), 碳酸锂治疗双相抑郁有效, 而且不会导致转相或诱发快速循环发作。故双相抑郁的急性期治疗可单独使用足量锂盐。

106-1. 答案:C

解析:中年女性, 3 月前坐火车时突然出现不认识女儿、出现幻觉、兴奋症状, 行为异常, 经治疗后好转。1 周前, 感觉能看到去世的儿子, 自责自罪, 有自杀倾向。患者既往高血压病史, 查体 200/90mmHg, 存在定向障碍、视幻觉、思维不连贯, 病情随着血压升高而加重, 该患者最可能的诊断为脑血管病引起的精神障碍(C 对)。

106-2. 答案:A

解析:中年女性, 3 月前坐火车时突然出现不认识女儿、出现幻觉、兴奋症状, 行为异常, 经治疗后好转。1 周前, 感觉能看到去世的儿子, 自责自罪, 有自杀倾向。患者既往高血压病史, 查体 200/90mmHg, 存在定向障碍、视幻觉、思维不连贯, 病情随着血压升高而加重, 该患者最可能的诊断为脑血管病引起的精神障碍。头颅 MRI 对

白质病变、腔隙性梗死等小血管病较 CT 更敏感。故最有意义的检查为敏感 (A 对 E 错)。脑电图在癫痫的诊断和治疗中具有重要的作用 (B 错)。脑脊液检查多用于诊断脑膜炎 (C 错)。人格测试多用于人格障碍的诊断与排查 (D 错)。

108-1. 答案:A

解析:一岁女童,发热伴咳嗽 4 天。查体:38.8℃,双肺固定湿啰音,腹胀,肝稍大。实验室检查:白细胞升高,以中性粒细胞为主,最可能的诊断为支气管肺炎 (A 对)。支气管肺炎常见于 2 岁以下的婴幼儿,起病多数较急,发病前数日多先有上呼吸道感染,主要临床表现为发热、咳嗽、气促、肺部固定中细湿啰音。

108-2. 答案:B

解析:一岁女童,发热伴咳嗽 4 天。查体:38.8℃,双肺固定湿啰音,腹胀,肝稍大。实验室检查:白细胞升高,以中性粒细胞为主,最可能的诊断为支气管肺炎。现治疗中,患儿呼吸困难加重、呕吐少许咖啡样物(上消化道出血),脉搏、呼吸加速,严重腹胀、肠鸣音消失,最可能为重症肺炎导致的中毒性肠麻痹 (B 对)。中毒性肠麻痹表现为频繁呕吐、严重腹胀、呼吸困难加重,听诊肠鸣音消失。重症患儿还可呕吐咖啡样物,大便潜血阳性或柏油样便。

110-1. 答案:C

解析:中年男性,车祸致枕部着地,昏迷 1 小时,右侧顶枕部血肿、左侧额颞部挫裂伤,判断为减速性损伤 (C 对)。减速性损伤:运动着的头部,突然撞在静止的物体后引起的损伤,称为减速性损伤,例如坠落或跌倒时头部被物体阻挡停止运动。此类损伤发生于着力部位,以及着力部位对侧的脑组织及血管,即对冲伤。

110-2. 答案:A

解析:中年男性,车祸致枕部着地,昏迷 1 小时。查体:呼吸频率略低,右侧顶枕部头皮血肿,格拉斯哥昏迷指数为 7(3~8 分,为重型,表示昏迷)。两侧瞳孔不等大,右侧瞳孔对刺激无反应,左侧瞳孔散大,对光反射消失(可能为中脑损伤)。左侧额颞部弥漫挫裂伤,血肿体积 60ml,同侧脑室受压,脑中线向右侧移位,目前患者最有价指的诊断为脑 CT,能清楚地显示脑挫裂伤的部位、范围和程度,是目前最常用的检查手段。脑挫裂伤的典型 CT 表现为局部脑组织内有高低密度混杂影,点片状高密度影为出血灶,低密度影则为水肿区。CT 扫描还可了解脑室受压、中线结构移位等情况。MRI 检查时间较长,一般很少用于急性颅脑损伤的诊断。

110-3. 答案:E

解析:中年男性,车祸致枕部着地,昏迷 1 小时。查体:呼吸频率略低,右侧顶枕部头皮血肿,格拉斯哥昏迷指数为 7(3~8 分,为重型,表示昏迷)。两侧瞳孔不等大,右侧瞳孔对刺激无反应,左侧瞳孔散大,对光反射消失(可能为中脑损伤)。左侧额颞部弥漫挫裂伤,血肿体积 60ml (>20ml),同侧脑室受压,脑中线向右侧移位,最适宜采用的治疗措施为急诊开颅手术 (E 对),清除血肿,妥善止血,降低颅内压。非手术治疗适用于伤后无明显意识障碍,病情稳定,CT 扫描所示幕上血肿量 <30ml,小脑幕下血肿量 <10ml,中线结构移位 <1.0cm 者 (ABCD 错)。

113-1. 答案:E

解析:高龄孕妇,孕 42 周,规律宫缩 7 小时,宫口开 7cm,胎头已下降至坐骨棘水平下 3cm,左枕前位,胎心率正常。孕妇体温升高、血压稍高、白细胞明显升高,提示存在绒毛膜羊膜炎。绒毛膜羊膜炎的临床表现:①母体体温 >38℃;②阴道分泌物异味;③胎心

率增快(胎心率基线>160 次/分)或母体心率增快(心率>100 次/分);④母体外周血白细胞计数>15x10⁹/L;⑤子宫呈激惹状态、宫体有压痛。母体体温升高的同时伴有上述②~⑤任何一项表现可诊断绒毛膜羊膜炎。

113-2. 答案:B

解析:高龄经产妇,孕 42 周,已属于过期妊娠,规律宫缩 7 小时,宫口开 7cm,已达活跃期,胎头下降至坐骨棘下 3cm,左枕前位。预估胎儿体重 3500g,胎心率正常。产妇体温升高,血压升高,白细胞升高,合并有绒毛膜羊膜炎,此时应尽快助产。对于足月胎膜早破合并绒毛膜羊膜炎。随着破膜时间延长,宫内感染风险增加,破膜超过 12 小时应预防性应用抗生素,同时尽量避免频繁阴道检查。本题中无胎儿窘迫征象,且无胎位异常,故不选择剖宫产(D 错)。宜在破膜后 2~12 小时内积极引产。对宫颈成熟的孕妇,首选缩宫素引产(B 对)。

115-1. 答案:D

解析:中年女性, G2P2, 接触性阴道出血半年。妇科检查:宫颈糜烂改变,下唇凸起。宫体与附件无明显改变, TCT(宫颈细胞学检查)检查提示 HSIL(高度鳞状上皮内瘤变),高危 HPV 阳性,高度怀疑宫颈癌。下一步处理为行阴道镜下宫颈活检(D 对)。

115-2. 答案:E

解析:中年女性, G2P2, 接触性阴道出血半年。妇科检查:宫颈糜烂改变,下唇凸起。宫体与附件无明显改变, TCT(宫颈细胞学检查)检查提示 HSIL(高度鳞状上皮内瘤变),高危 HPV 阳性,高度怀疑宫颈癌。宫颈活检显示累及腺体,6 点处为鳞状细胞癌,局部间质浸润深度 8mm,根据子宫颈癌临床分期(FIGO, 2009),该患者的分期为 IB 期。IIA 期为肿瘤侵犯阴道上 2/3,

无明显宫旁浸润(A 错)。IA 期为镜下浸润癌,浸润深度 <5.0mm(B 错)。IIIA 期肿瘤累及阴道下 1/3,没有扩展到骨盆壁(C 错)。IIB 期有明显宫旁浸润,但未达到盆壁(D 错)。

115-3. 答案:A

解析:宫颈癌采用手术和放疗为主、化疗为辅的综合治疗。手术方式的选择应根据肿瘤分期而有所不同,对于 IB 期的患者,应采用广泛性子宫颈切除术及盆腔淋巴结切除术(A 对)。

118-1. 答案:B

解析:青年女性,腹痛、发热,宫口少量流液,既往流产清空史。查体:体温升高,血压稍高。妇科检查:宫颈光滑,宫口流液,子宫压痛。实验室检查:白细胞升高,中性粒细胞为主,该患者最可能的诊断为急性子宫内膜炎(B 对)。子宫内膜炎多因流产、产褥感染、子宫腔内安放避孕器、子宫颈扩张等原因导致病原体侵入子宫内膜,扩散至整个内膜层,引发急性炎症病延伸累及子宫壁表浅肌层,临床表现主要为发热、下腹隐痛、脓性阴道分泌物等。

118-2. 答案:C

解析:青年女性,腹痛、发热,宫口少量流液,既往流产清空史。查体:体温升高,血压稍高。妇科检查:宫颈光滑,宫口流液,子宫压痛。实验室检查:白细胞升高,中性粒细胞为主,该患者最可能的诊断为急性子宫内膜炎。盆腔炎性疾病的治疗,主要以抗生素治疗为主(C 对),必要时手术治疗(B 错)。中药治疗(A 错)、输液治疗(D 错)、物理降温(E 错)均为盆腔炎性疾病的治疗方法,但最适宜的治疗为抗感染治疗,可清除病原体,改善症状及体征,减少后遗症。经恰当的抗生素积极治疗,绝大多数盆腔炎性疾病能彻底治愈。

120-1. 答案:A

解析:10 月龄女婴,发热咳嗽 5 天、呕

吐烦躁 2 天，抽搐 2 次。查体： 40°C 、前囟膨隆、颈无抵抗、巴氏征阳性（锥体束损害）、双肺闻及细湿啰音。脑脊液检查：外观浑浊、白细胞 $800 \times 10^6/\text{L}$ （正常值： $0 \sim 10 \times 10^6/\text{L}$ ）、中性粒细胞为主、蛋白质 $2\text{g}/\text{L}$ （正常 $0.2 \sim 0.4$ ），糖 $1.8\text{mmol}/\text{L}$ （正常 $2.8 \sim 4.5$ ），氯化物 $102\text{mmol}/\text{L}$ （正常值 $117 \sim 127$ ），涂片未见结核杆菌、PDD 试验阴性（排除结核性脑膜炎），患者最可能的诊断为化脓性脑膜炎（A 对）。化脓性脑膜炎又称急性细菌性脑膜炎，典型临床表现为感染中毒及急性脑功能障碍症状、颅内压增高表现、脑膜刺激征，脑脊液检查可见白细胞升高，以中性粒细胞为主，糖含量明显降低。结核性脑膜炎以淋巴细胞增多为主，涂片或培养可发现抗酸杆菌（B 错）。中毒性脑病（C 错）、热性惊厥（D 错）、病毒性脑炎（E 错）脑脊液检查糖、氯化物正常。

120-2. 答案:A

解析:10 月龄女婴，发热咳嗽 5 天、呕吐烦躁 2 天，抽搐 2 次。查体： 40°C 、前囟膨隆、颈无抵抗、巴氏征阳性（锥体束损害）、双肺闻及细湿啰音。脑脊液检查：外观浑浊、白细胞 $800 \times 10^6/\text{L}$ （正常值： $0 \sim 10 \times 10^6/\text{L}$ ）、中性粒细胞为主、蛋白质 $2\text{g}/\text{L}$ （正常 $0.2 \sim 0.4$ ），糖 $1.8\text{mmol}/\text{L}$ （正常 $2.8 \sim 4.5$ ），氯化物 $102\text{mmol}/\text{L}$ （正常值 $117 \sim 127$ ），涂片未见结核杆菌、PDD 试验阴性（排除结核性脑膜炎），患者最可能的诊断为化脓性脑膜炎。化脓性脑膜炎的并发症包括硬脑膜下积液、脑室管膜炎、抗利尿激素异常分泌综合征、脑积水和各种神经功能障碍。凡经化脓性脑膜炎有效治疗 $48 \sim 72$ 小时后脑脊液有好转，但体温不退或体温下降后再升高；或一般症状好转后又出现意识障碍、惊厥、前囟隆起或颅压增高等症状，首先应怀疑硬脑膜下积液的可能性（A 对）。

120-3. 答案:D

解析:10 月龄女婴，发热咳嗽 5 天、呕吐烦躁 2 天，抽搐 2 次。查体： 40°C 、前囟膨隆、颈无抵抗、巴氏征阳性（锥体束损害）、双肺闻及细湿啰音。脑脊液检查：外观浑浊、白细胞 $800 \times 10^6/\text{L}$ （正常值： $0 \sim 10 \times 10^6/\text{L}$ ）、中性粒细胞为主、蛋白质 $2\text{g}/\text{L}$ （正常 $0.2 \sim 0.4$ ），糖 $1.8\text{mmol}/\text{L}$ （正常 $2.8 \sim 4.5$ ），氯化物 $102\text{mmol}/\text{L}$ （正常值 $117 \sim 127$ ），涂片未见结核杆菌、PDD 试验阴性（排除结核性脑膜炎），诊断为化脓性脑膜炎。经治疗后好转，3 日后再次发热、呕吐、惊厥发作，诊断为硬膜下积液，首选检查应为头颅透光试验或 CT（D 对）。确诊首选为硬膜下穿刺（E 错）。

123-1. 答案:B

解析:11 月龄男婴，发热、出疹，查体：体温波动在 $39 \sim 40^{\circ}\text{C}$ ，颜面、躯干可见红色斑丘疹，结膜充血、口腔黏膜充血可见细小白点（口腔麻疹黏膜斑），双肺可闻及少量干啰音。该患儿最可能的诊断为麻疹，临床上以发热、上呼吸道感染、结膜炎、口腔麻疹黏膜斑（柯氏斑，Koplik's spots）、全身斑丘疹及疹退后遗留色素沉着伴糠麸样脱屑为特征。最具诊断价值的临床表现为 Koplik 斑。

123-2. 答案:C

解析:11 月龄男婴，发热、出疹，查体：体温波动在 $39 \sim 40^{\circ}\text{C}$ ，颜面、躯干可见红色斑丘疹，结膜充血、口腔黏膜充血可见细小白点（口腔麻疹黏膜斑），双肺可闻及少量干啰音。该患儿最可能的诊断为麻疹。麻疹的治疗主要为对症治疗、加强护理和预防并发症。1. 一般治疗：卧床休息，保持室内适当的温度、湿度和空气流通，避免强光刺激。注意皮肤和眼、鼻、口腔清洁（D 对）。鼓励多饮水，给予易消化和营养丰富的食物。2. 对症治疗：高热时可酌情使用退

热剂, 但应避免急骤退热, 特别是在出疹期(B 对)。烦躁可适当给予镇静剂(E 对)。频繁剧咳可用镇咳剂或雾化吸入。WHO 推荐给予麻疹患儿补充大剂量维生素 A, 20 万~40 万单位, 每日一次口服, 连服 2 剂可减少并发症的发生, 有利于疾病的恢复(A 对)。3. 并发症的治疗: 有并发症者给予相应治疗。继发细菌感染可给予抗生素。糖皮质激素可抑制免疫功能, 麻疹患者易并发呼吸系统感染, 使用糖皮质激素会加重感染(C 错, 为本题正确答案)。

125-1. 答案:D

解析: 早产儿, 孕龄 32 周(孕龄小, 肺表面活性物质合成及分泌量低, 新生儿呼吸窘迫综合征发生率高), 自然分娩后 2 小时出现呼吸困难, 进行性加重。查体: 面色青紫、呻吟、三凹征、支气管声低。该新生儿最可能的诊断为新生儿呼吸窘迫综合征(D 对)。新生儿呼吸窘迫综合征(RDS)是因肺表面活性物质(PS)缺乏所致, 以生后不久出现呼吸窘迫并进行性加重为特征的临床综合征。胎龄越小, PS 合成及分泌量也越低, RDS 的发生率越高。胎龄 <30 周的早产儿, RDS 发生率高达 70%以上, 胎龄 >36 周的早产儿, RDS 发生率仅为 1%~5%。EDS 多见于早产儿, 生后不久(一般 6 小时内)出现呼吸窘迫, 并呈进行性加重。主要表现为呼吸急促(>60 次/分)、呼气呻吟、青紫、鼻扇及吸气性三凹征, 严重时表现为呼吸浅表, 呼吸节律不整、呼吸暂停及四肢松弛。湿肺多见于足月儿或剖宫产儿, 是由于肺内液体吸收及清除延迟所致, 为自限性疾病。生后数小时内出现呼吸增快(>60~80 次/分), 但一般状态及反应较好(A 错)。新生儿溶血大多数 Rh 溶血病患儿生后 24 小时内出现黄疸并迅速加重, 而多数 ABO 溶血病在第 2~3 天出现(B 错)。吸入胎粪性肺炎常见于足月

儿或过期产儿, 多有宫内窘迫史和(或)出生窒息史。患儿皮肤、脐带和指、趾甲床留有胎粪污染的痕迹; 口、鼻腔吸引物中含有胎粪(C 错)。产程过长可导致胎儿头部血肿、胎儿死亡、胎儿缺氧、胎儿宫内窘迫、新生儿窒息等疾病(E 错)。

125-2. 答案:D

解析: 早产儿, 孕龄 32 周(孕龄小, 肺表面活性物质合成及分泌量低, 新生儿呼吸窘迫综合征发生率高), 自然分娩后 2 小时出现呼吸困难, 进行性加重。查体: 面色青紫、呻吟、三凹征、支气管声低。该新生儿最可能的诊断为新生儿呼吸窘迫综合征。新生儿呼吸窘迫综合征的 X 线表现具有特征性表现: ①两肺呈普遍性的透过度降低, 可见弥漫性均匀一致的细颗粒网状影, 即毛玻璃样改变(BC 对); ②在弥漫性不张肺泡(白色)的背景下, 可见清晰充气的树枝状支气管(黑色)影, 即支气管充气征(E 对); ③双肺野均呈白色, 肺肝界及肺心界均消失, 即白肺(A 对)。肺大疱可见于先天支气管或肺发育不良或肺气肿时(D 错, 为本题正确答案)。

125-3. 答案:A

解析: 早产儿, 孕龄 32 周(孕龄小, 肺表面活性物质合成及分泌量低, 新生儿呼吸窘迫综合征发生率高), 自然分娩后 2 小时出现呼吸困难, 进行性加重。查体: 面色青紫、呻吟、三凹征、支气管声低。该新生儿最可能的诊断为新生儿呼吸窘迫综合征。发病机制为肺表面活性物质含量减少, 使肺泡表面张力增加, 呼气末 FRC 降低, 肺泡趋于萎陷(A 对 BCDE 错)。

128-1. 答案:C

解析: 2 岁女童, 发热咳嗽 5 天、呕吐 2 天, 抽搐 2 次。查体: 40℃、前凶膨隆、颈软、巴氏征阳性(锥体束损害)、双肺闻及细湿啰音。脑脊液检查: 外观

浑浊、白细胞 $800 \times 10^6/L$ (正常值: $0 \sim 10 \times 10^6/L$)、中性粒细胞为主、蛋白质 $2g/L$ (正常 $0.2 \sim 0.4$)，糖 $1.2mmol/L$ (正常 $2.8 \sim 4.5$)，氯化物 $108mmol/L$ (正常值 $117 \sim 127$)，患者最可能的诊断为肺炎合并化脓性脑膜炎。

128-2. 答案:C

解析:患者最可能的诊断为肺炎合并化脓性脑膜炎。经治疗后无明显好转，前囟膨大、发热，提示颅内压增高，对于颅内压升高的患儿，在未有效降低颅内压之前，腰椎穿刺有诱发脑疝的危险(C 错，为本题正确答案)。患儿发热，可进行物理降温，作为辅助治疗(A 对)。静脉注射地西泮可控制惊厥发作(B 对)。甘露醇(D 对)、呋塞米(E 对)可降低颅内压。

130-1. 答案:E

解析:2 岁女童，高热 $39 \sim 39.8^\circ C$ ，抗生素治疗无效。查体:皮肤多形性红斑，手足指端硬性水肿，球结膜水肿，颈部淋巴结肿大，口咽黏膜弥漫性充血，口唇皲裂，舌乳头轮廓突出(草莓舌)。实验室检查:白细胞升高，以中性粒细胞为主，血小板正常(正常值 $100 \sim 300 \times 10^9/L$)，CRP(C 反应蛋白) $50mg/L$ (正常值 $5 \sim 10mg$ ，新生儿 $0.1 \sim 0.6mg/L$) 升高，患儿最可能的诊断为川崎病。

130-2. 答案:B

解析:川崎病患者多见冠状动脉损害，如冠状动脉扩张或冠状动脉瘤形成。超声心动图是本病最重要的辅助检查手段。超声心动图示冠状动脉扩大提示预后不良(B 对)。

130-3. 答案:D

解析:治疗可选用阿司匹林每日 $30 \sim 50mg/kg$ ，分 2~3 次服用；发病早期(10 天以内)应用免疫球蛋白(IVIG)，可迅速退热，预防冠状动脉病变发生(D 对)。部分患儿对 IVIG 输注后无效，可重复使用 1 次，或选择使用糖皮质激素

(E 错)。伐昔洛韦、利巴韦林为抗病毒药物(BC 错)。青霉素为抗菌类药物(A 错)。川崎病致病因素尚未明确，故不选用抗菌药及抗病毒药。

133-1. 答案:D

解析:10 月龄男婴，出生以来母乳喂养，未添加辅食(铁摄入量不足)。查体:面色苍白，肝脾大。实验室检查:血细胞以小细胞为主，中央淡染区扩大。最可能的诊断为缺铁性贫血(D 对)。

133-2. 答案:A

解析:有关铁代谢的生化检查有确诊意义(A 对)。骨髓活检便于做出病理诊断，对再生障碍性贫血、骨髓异常增生症的诊断具有重要意义(B 错)。血清维生素 B12 和叶酸对营养性巨幼细胞贫血具有诊断意义(C 错)。胸部 X 线片对贫血的诊断无意义(D 错)。血 Hb 检查缺乏特异性，各型的贫血均可有血 Hb 改变(E 错)。

133-3. 答案:A

解析:最主要的治疗为口服铁剂和维生素 C(A 对)。铁剂是治疗缺铁性贫血的特效药，若无特殊原因，应采用口服给药；二价铁盐容易吸收，故临床均选用二价铁盐制剂。维生素 C 具有还原性，可以促进铁剂在胃肠道的吸收。

136-1. 答案:A

解析:孕龄期女性，停经 9 周，阴道不规则流血 2 周，子宫如孕 4 月大(子宫大于停经月份)，超声提示宫腔内充满光点和小囊状强回声(落雪征)。最可能的诊断为葡萄胎(A 对)。

136-2. 答案:A

解析:葡萄胎诊断一经成立，应及时清宫(A 对 D 错)。化疗为主、手术和放疗为辅的综合治疗多用于侵蚀性葡萄胎及绒癌，对于葡萄胎患者，不常规推荐预防性化疗(BC 错)。全子宫切除术极少应用，除非患者合并其他需要切除子宫的指征，绝经

前妇女应保留两侧卵巢。当子宫小于妊娠 14 周大小时可直接切除子宫 (E 错)。

138-1. 答案:B

解析:经产妇,孕 32 周,夜间突发大量阴道流血。胎心率 120 次/分。患者疑诊为前置胎盘,患者生育史 G2P2,提示曾有双胎妊娠,属于前置胎盘的高危因素,前置胎盘典型症状为妊娠晚期或临产后发生无诱因、无痛性反复阴道流血。超声检查可清楚显示子宫壁、胎盘、胎先露部及宫颈的位置,有助于确定前置胎盘类型。阴道超声检查能更准确地确定胎盘边缘和宫颈内口的关系,准确性明显高于腹部超声检查,故对怀疑胎盘位置异常的患者均推荐阴道超声检查。

138-2. 答案:B

解析:经产妇,孕 32 周,夜间突发大量阴道流血。胎心率 120 次/分,生育史 G2P2,提示曾有双胎妊娠,属于前置胎盘的高危因素,前置胎盘典型症状为妊娠晚期或临产后发生无诱因、无痛性反复阴道流血,故患者最可能的诊断为前置胎盘。前置胎盘的治疗原则是抑制宫缩、纠正贫血、预防感染和适时终止妊娠。期待疗法适用于妊娠 <36 周、胎儿存活、一般情况良好、阴道流血量少、无需紧急分娩的孕妇。患者目前情况良好,胎儿胎心率正常,可采用期待疗法。期待疗法包括:一般处理、纠正贫血、止血、糖皮质激素 (ACDE 对)。前置胎盘终止妊娠的指征包括:①出血量大甚至休克,为挽救孕妇生命,无需考虑胎儿情况,应立即终止妊娠;②出现胎儿窘迫等产科指征时,胎儿已可存活,可行急诊手术;③临产后诊断的前置胎盘,出血量较多,估计短时间内不能分娩者,也应终止妊娠;④无临床症状的前置胎盘根据类型决定分娩时机 (B 错,为本题正确答案)。

140-1. 答案:E

解析:预产期 (EDC) 推算方法是按末次月经 (LMP) 第一日算起,月份减 3 或加 9,日数加 7,故本题中询问停经时间有助于核对孕周 (E 对)。妊娠早期超声检测胎儿头臂长 (CRL) 是估计孕周最准确的指标 (B 错)。妊娠反应出现的时间不准确,且个体差异较大 (A 错)。

答案:C

140-2. 解析:高龄产妇,妊娠 42+2 周,未临产,属于过期产。入院检查血压较之前升高,150/90mmHg,尿蛋白阴性,肾功能正常。NST 反应型 (胎心监护正常),B 超羊水最大深度 4cm (正常值 2-8 之间),胎儿估重 3500g。目前孕妇血压升高,已超过 150mmHg,建议降压治疗 (C 对)。该患者蛋白尿阴性,且肾功能正常,不属于子痫前期,并无抽搐,故不选解痉药 (B 错)。为防止血液浓缩、有效循环血量减少和高凝倾向,妊娠期一般不使用利尿剂降压 (A 错)。抗生素用于合并感染 (D 错)。静滴白蛋白多用于肝脏疾病、水肿时 (E 错)。

142-1. 答案:B

解析:无性细胞瘤对放疗敏感 (B 对)。浆液性癌可见 CA125 增高 (A 错)。胚胎瘤组织学上分为精上皮瘤、胎儿性癌、畸胎瘤、卵黄囊癌、绒毛癌、未分化母细胞瘤等 (C 错)。卵黄囊瘤特异性 AFP 升高 (D 错)。未成熟畸胎瘤存在恶性程度逆转现象 (E 错)。

142-2. 答案:D

解析:卵黄囊瘤特异性 AFP 升高 (D 对)。浆液性癌可见 CA125 增高 (A 错)。胚胎瘤组织学上分为精上皮瘤、胎儿性癌、畸胎瘤、卵黄囊癌、绒毛癌、未分化母细胞瘤等 (C 错)。未成熟畸胎瘤存在恶性程度逆转现象 (E 错)。

144-1. 答案:B

解析:2 岁男童,低热、咳嗽、食欲欠佳、皮肤瘙痒。胸腹部可见斑疹、丘

疹、疱疹和结痂同时存在(“四世同堂”),为水痘的典型临床表现。考虑诊断为水痘(B对)。

144-2. 答案:C

解析:1岁女童,发热、热退后出现皮疹(热退疹出),查体:颈部、躯干充血性斑丘疹,结膜无充血,最可能的诊断为小儿急疹(C对)。猩红热临床表现有发热,咽痛,头痛,呕吐、杨梅舌,环口苍白圈,颈部淋巴结肿大等。

144-3. 答案:A

解析:9岁小儿,发热伴咽痛,皮肤出现鲜红色粟粒疹,舌质红,舌壮乳头明显突起于舌苔表面(杨梅舌),腋下、肘窝可见帕氏线,为猩红热的特征性表现(A对)。

147-1. 答案:D

解析:停经40天(妊娠<6周),阴道少量流血,无妊娠物排出,胚胎存活,属于先兆流产(D对)。

147-2. 答案:E

解析:妊娠13周,耻骨联合上未扪及子宫,正常妊娠13周,宫底应达到耻骨联合上2~3横指以上,本题中提示子宫小于孕周,胎心未闻及,B超提示胚胎停止发育,如8周大小,最可能的诊断为稽留流产(E对)。

149-1. 答案:A

解析:中年男性,包皮周围反复发作水疱伴痒痛1年,劳累后好发,可自愈。查体见簇集的粟米大小水疱,疱液清亮,该患者最可能的诊断为生殖器疱疹,致病原为单纯疱疹病毒(A对)。

149-2. 答案:B

解析:青年女性,外阴鸡冠状赘生物。醋酸白试验阳性,诊断为尖锐湿疣,致病原为人乳头状瘤病毒(B对)。

第一单元

A1/A2 型选择题

1. 女, 26 岁, 多饮, 多尿, 易饥, 体重下降 6 个月, 检查: 空腹血糖 14.2mmol/L, HbA1c8.6%, 空腹血清胰岛素 7U/L(参考值 10~20mU/L), 尿糖(+++). 该患者体内可能存在的代谢变化是

- A. 糖原合成增加
- B. 三羧酸循环增加
- C. 组织用糖减少
- D. 葡萄糖分解增多
- E. 糖异生减少

2. 某高校心理健康教育中心欲对抑郁高危学生进行定量评估, 选用

- A. 神经心理学检测
- B. 艾森克人格问卷(EPQ)
- C. 90 项症状自评量表(Scl-90)
- D. 抑郁自评量表(SDS)
- E. 焦虑自评量表(SAS)

3. 在活体的心脏和血管内, 血液发生凝固或血液中某些有形成分析出、凝集形成的物质为

- A. 凝血
- B. 血栓
- C. 栓塞
- D. 血小板
- E. 栓子

4. 某村卫生室反映, 该村一些人工喂养的婴儿相继出现以紫绀为表现的缺氧症状, 检查发现是血液中高铁血红蛋白增高, 发生的原因是

- A. 室内燃烧当地产的劣质煤
- B. 使用含双酚 A 的塑料奶瓶
- C. 饮用水中含过量的甲基汞
- D. 饮用的奶制品受有机氯农药污染

E. 饮用水中硝酸盐过量

5. 一名医生接待了一位患者, 看了其 CT 结果及检验学结果, 并结合患者症状, 给出患者患有肺癌的结论。该思维过程属于

- A. 聚合思维
- B. 逻辑思维
- C. 发散思维
- D. 创新思维
- E. 抽象思维

6. 现状调查可以调查的指标是

- A. 罹患率
- B. 患病率
- C. 发病率
- D. 死亡率
- E. 续发率

7. 有权保存医师处方签名或有关签章的机构

- A. 医师注册地的监督管理部门
- B. 医师注册的执业机构
- C. 医师执业地的卫生行政部门
- D. 省级卫生管理部门
- E. 医师所在科室

8. 痛风相关的代谢过程

- A. 甘油三酯代谢途径
- B. 嘌呤核苷酸代谢途径
- C. 嘧啶核苷酸代谢途径
- D. 氨基酸代谢
- E. 糖原代谢途径

9. 心脏电活动中传导速度最快的是

- A. 窦房结细胞
- B. 心房肌细胞
- C. 心室肌细胞
- D. 房室结
- E. 浦肯野纤维

2023 年临床执业历年真题

10. 氯氟羟对环境的危害是

- A. 对大自然植被造成破坏
- B. 对臭氧层的破坏
- C. 酸雨
- D. 破坏生态平衡
- E. 产生温室效应

11. 某来访者因经常与人发生冲突到心理门诊就诊，经心理医生了解，发现其与人交往过程中，往往只考虑自己的快乐，不顾及“现实标准”，根据精神分析理论，该来访者人格结构中占据优势地位的是

- A. 主体自我
- B. 本我
- C. 超我
- D. 自我
- E. 客体自我

12. 储存并传递遗传信息的核酸分子是

- A. DNA
- B. tRNA
- C. mRNA
- D. rRNA
- E. hnRNA

13. 医生在抢救生命垂危的患者时需要使用特殊级抗菌药物，下列什么是正确的

- A. 立即使用
- B. 科主任书面同意
- C. 家属知情同意
- D. 院长书面同意
- E. 不能使用

14. 以下为劣药的情形是

- A. 以非药品冒充
- B. 变质
- C. 药品成分与国家规定的成分不符的
- D. 表明的功能范围超出药品的治疗范围

E. 超出有效期

15. 男，50岁，突发头晕、恶心、黑便1天，胃溃疡病史5年，高血压病史10年，入院BP85/55mmHg，最不可能的是

- A. 心迷走神经紧张性下降
- B. 孤束核神经元兴奋性冲动下降
- C. 交感缩血管神经兴奋性增高
- D. 颈动脉窦感觉传入冲动下降
- E. 副交感神经舒血管紧张性下降

16. 患者男，50岁，因高脂血症进行低脂饮食，近日自觉视觉感受力下降，应补充以下哪种食物

- A. 面包
- B. 绿豆
- C. 胡萝卜
- D. 冬瓜
- E. 苹果

17. 香烟中容易上瘾的物质

- A. 二氧化碳
- B. 尼古丁
- C. 一氧化碳
- D. 一氧化氮
- E. 焦油

18. 女性，每次喝牛奶后，出现腹痛，腹胀，腹泻症状，检查怀疑是酶的缺乏，应改用下面哪种牛奶

- A. 复合奶
- B. 脱脂奶粉
- C. 酸奶
- D. 调制奶粉
- E. 炼奶

19. 疫情防控是哪个部门发布

- A. 省级三甲医院
- B. 卫生管理部门
- C. 省级疫情防控中心

2023 年临床执业历年真题

- D. 方舱医院
- E. 国务院

20. 在动物实验中，为了获取活体小鼠血液，实验室人员直接剪掉实验小白鼠的头部，按压残余肢体，使其剩余血液从颈部大动脉流出。该实验室人员违背的原则为

- A. 给予实验室动物良好的生存环境
- B. 给予实验动物充足的生活保障
- C. 最大程度减轻受实验动物的痛苦
- D. 尽量使用实验材料替代活体动物实验
- E. 减少实验动物不必要数量

21. 用某药治疗尿道感染 84 例，治疗后痊愈 46 例，显效 17 例，改善 12 例，无效 9 例。该资料类型属于

- A. 离散型定量资料
- B. 二分类资料
- C. 无序多分类资料
- D. 连续型定量资料
- E. 有序多分类资料

22. 患者高脂血症坚持长期低脂饮食，近期发现适应暗环境时间延长，应该建议补充

- A. 维生素 D 缺乏
- B. 维生素 A 缺乏
- C. 维生素 B12 缺乏
- D. 维生素 C 缺乏
- E. 维生素 E 缺乏

23. 处方在特殊情况下可以延长有效期，但有效期最长不得超过

- A. 2 天
- B. 3 天
- C. 5 天
- D. 7 天
- E. 10 天

24. 男，64 岁，上腹痛 5 小时，既往胆囊多发结石，T:38.5℃，P:100 次/分，血压:85/60mmHg，查体:上腹压痛，肌紧张，皮肤巩膜黄染。超声提示:胆总管上段扩张，下段显示不清，结石可能嵌顿的位置是

- A. 肝左管
- B. 胆囊管
- C. 胆总管
- D. 肝总管
- E. 肝右管

25. 确定传染病人隔离期长短的主要依据是

- A. 传染期
- B. 恢复期
- C. 临床症状期
- D. 病毒携带期
- E. 潜伏期

26. 糖尿病患者遵从医嘱服药的强化因素是

- A. 能方便地就医、取药
- B. 在按医嘱服药后血糖得到有效控制
- C. 经济条件足以支付较高的医药费
- D. 对治疗糖尿病采取积极态度
- E. 知晓服药能有效控制血糖

27. 男，11 岁，因发生车祸，临床诊断脑死亡。患者父母极其伤心，但接受器官捐献的观点，要求与受体者见面，并为之认为亲戚。器官捐献医师坚持拒绝其见面，患者父母遂放弃了捐献。本案例中，体现的医学伦理是

- A. 供者的尊严与保护
- B. 患者健康利益至上
- C. 无偿与非商业化
- D. 知情同意
- E. 保密

28. 躯干四肢的浅感觉传导通路的第 3

2023 年临床执业历年真题

级神经元胞体位于背侧丘脑的

- A. 腹前核
- B. 腹外侧核
- C. 腹后外侧核
- D. 腹后内侧核
- E. 丘脑内侧核

29. 以下哪类属于乙类传染病

- A. 鼠疫
- B. 霍乱
- C. 艾滋病
- D. 流行性腮腺炎
- E. 风疹

30. 艾滋病晚期的淋巴病理改变是

- A. 淋巴滤泡增生
- B. 淋巴细胞消失殆尽
- C. 大片坏死
- D. 肉芽肿形成
- E. 分泌浆细胞

31. 男, 45 岁, 因车祸导致脊髓胸段受损。2 个月后, 患者最有可能出现的排尿障碍是

- A. 尿频
- B. 多尿
- C. 尿失禁
- D. 膀胱颈痉挛
- E. 无张力膀胱

32. 男, 76 岁, 尿频、尿急、夜尿增多, 排尿困难两个月, 病变累及结构为

- A. 前列腺囊
- B. 前列腺外周区
- C. 前列腺纤维肌性基质
- D. 前列腺中央区
- E. 前列腺移行区

33. 肝细胞癌的特异性标志物是

- A. AFP

B. CA125

C. CA199

D. PSA

E. CEA

34. 男 55 岁, 甲状腺癌颈部淋巴结清扫术后, 出现左肩下垂, 左上肢上举受限, 术后可能损伤的神经是

- A. 膈神经
- B. 迷走神经
- C. 副神经
- D. 枕小神经
- E. 耳大神经

35. 鸟型分枝杆菌的特点

- A. 细胞壁有磷壁酸
- B. 属于艾滋病人机会致病菌
- C. 药物治疗效果差
- D. 生长速度较快
- E. 抗酸染色阴性

36. 男, 67 岁, 1 小时前被银环蛇咬伤, 随后出现四肢无力, 呼吸困难, 眼睑下垂, 查体见皮肤局部有 2 个齿痕, 针尖大小, 与之相关的神经-肌肉接头处的乙酰胆碱变化为

- A. 在间隙弥漫受阻
- B. 与受体结合受阻
- C. 合成受阻
- D. 释放受阻
- E. 降解受阻

37. HIV 感染的主要细胞

- A. 树突状
- B. T 细胞
- C. CD4+T 细胞
- D. B 淋巴细胞
- E. CD8+T 淋巴细胞

38. 药物发生导致患者死亡的多长时间上报

2023 年临床执业历年真题

- A. 立即
- B. 3 天
- C. 5 天
- D. 15 天
- E. 30 天

39. 某化工厂工人，在一次事故中出现恶心、呕吐、震颤等急诊住院，查体：皮肤黏膜呈樱桃红色，呼出气中有苦杏仁味，疑为急性职业中毒，最可能是

- A. 一氧化碳
- B. 硫化氢
- C. 砷化氢
- D. 苯胺
- E. 氰化物

40. 男性，20 岁，发热、颈部淋巴结肿大伴疼痛 1 月余就诊于我院，体检发现双侧颈部及腹股沟淋巴结肿大，B 超显示左侧淋巴结肿大，最大 3 cm，淋巴活检提示淋巴结边缘融合，破坏，免疫提示 CD20 阳性，淋巴结的组织类型是

- A. 间变性大细胞淋巴瘤
- B. 滤泡淋巴结
- C. 套细胞淋巴瘤
- D. 弥漫性大 B 淋巴细胞瘤
- E. 霍奇金淋巴瘤

41. 调查我国北方某地 1998 到 2017 年该地 2 型糖尿病患病率，了解 20 年该地 2 型糖尿病患病率变化情况，制成统计图需选用

- A. 直条图
- B. 散点图
- C. 直方图
- D. 线图
- E. 圆图

42. 急性喉阻塞时与建立暂时通气通道有关的膜是

- A. 甲状舌骨膜
- B. 方形膜
- C. 膜壁
- D. 会厌软骨膜
- E. 环甲正中韧带

43. 某研究者采取随机单盲试验，对比甲药和乙药对轻中度原发性高血压患者的降压疗效，在此实验中，不知道试验分组情况的最可能

- A. 实验设计人员
- B. 统计分析人员
- C. 接收治疗的患者
- D. 实施治疗的医生
- E. 测量血压的护士

44. 婴儿，18 个月，逗之不笑，中性粒细胞分叶， $MCV > 100f1$ ，MCH 升高，缺乏以下哪种物质

- A. 铁
- B. 维生素 A
- C. 维生素 K
- D. 蛋白质
- E. 维生素 B₁₂

45. 医疗机构与医疗保险机构中，各个医疗机构在实际中年总预算值支付的方式是什么

- A. 年度预算制
- B. 按病种支付
- C. 协商预算制
- D. 按实际支付
- E. 总额预算制

46. 病例对照研究资料进行分层分析的目的是

- A. 控制选择偏移
- B. 控制信息偏移
- C. 控制混杂偏倚
- D. 控制回忆偏倚
- E. 控制无应答偏倚

47. 有 115 名孕妇，先将 70 名孕妇服用催产素，另外 65 名不服用催产素，对比他们所生胎儿的畸形率，这种调查叫做

- A. 横向研究
- B. 实验试验
- C. 现况研究
- D. 队列研究
- E. 病例对照研究

48. 呼吸链抑制剂鱼藤酮可以抑制电子传递，其抑制对象是

- A. 复合体 I
- B. 复合体 II
- C. 复合体 III
- D. 复合体 IV
- E. 复合体 V

49. 女性，30 岁，孕期 34 周，突发持续腹部疼痛伴阴道流血 2 小时，查体：体温 36.2℃，P:120 次/分，R:26 次/分，血压:80/60mmhg，神志清，四肢湿冷，眼球及四肢多发瘀点瘀斑，检查:Hb70，RBC: 2.7×10^{12} /L，Plt: 85×10^9 /L，Fg:1.48g/L，D-二聚体:10.8mg/L，外周血有裂细胞，B超显示盆腔和子宫内膜之间有界限不清楚的低密度回声影，以下对血压有影响，对血压的影响不正确的是

- A. 激肽酶增加导致外周阻力减少
- B. 微血栓导致回心血量减少
- C. 补体激活导致外周阻力减少
- D. 裂细胞增多导致冠状动脉收缩
- E. 前负荷减少导致心排出血量减少

50. 患者女，43 岁，干咳、发热 1 月，伴低热、乏力、盗汗、食欲差、体重减轻。查体:37.8℃、R:14 次/分，双肺呼吸音清，未闻及干湿啰音。痰培养:找到结核杆菌。PPD 实验:强阳性。

胸部 X 线:双上肺渗出、纤维化，右上肺有一直径约 1.5cm 空洞。问肺组织损伤有关的免疫机制

- A. III 型超敏反应
- B. IV 型超敏反应
- C. II 型超敏反应
- D. I 型超敏反应
- E. 肺结核杆菌直接破坏

51. 为提升某山区产妇住院分娩率，某县建立产妇住院分娩绿色通道，该措施属于

- A. 调整卫生服务方向
- B. 创造支持环境
- C. 加强社区行动
- D. 发展个人健康技能
- E. 制定促进健康的公共政策

52. 男，18 岁，左下肢跛行 15 年。查体左侧内翻马蹄足，胫前肌有轻度肌收缩，但不能产生关节运动，其肌力为

- A. 0 级
- B. 1 级
- C. 2 级
- D. 3 级
- E. 4 级

53. 男性，25 岁，高热，咳嗽，呼吸困难 2 天，胸部 X 片提示大片实变影，和呼吸困难有关的是

- A. 胸廓顺应性下降
- B. 胸廓弹性阻力下降
- C. 肺弹性阻力增加
- D. 肺泡表面张力下降
- E. 气道狭窄

54. 王某和其朋友外出聚餐，点了扬州肴肉、金枪鱼、泡菜、四季豆和蕈类食物，用餐十分钟左右王某和其朋友均出现头痛，胸闷，心率加快，全身

2023 年临床执业历年真题

不适，头部颈部胸部出现潮红，伴有灼热和刺痛，其中一位朋友哮喘发作，出现呼吸困难，分析其发生主要原因是

- A. 氰类食物中毒
- B. 组胺中毒
- C. 毒蕈中毒
- D. 四季豆中毒
- E. 亚硝酸盐中毒

55. 男，25 岁，割草伤及脚背，草药治疗十天无效，查体：T38.0℃，P72 次/分，R24 次/分，足部红肿，脚背皮下组织有捻发感，与周围组织分界不清。于医院治疗，病理示弥漫性中性粒细胞浸润，该病变可能是

- A. 纤维素性炎
- B. 浆液性炎
- C. 脓肿
- D. 坏疽
- E. 蜂窝织炎

56. 一老人因为牙口不好，经常以大米粥，稀饭等为主食，也经常食用肉类、蛋类，但经常出现便秘，考虑老人便秘的原因为

- A. 蔬菜进食过少
- B. 以谷类食物为主
- C. 肉类进食过少
- D. 豆制品进食过多
- E. 以面食为主食

57. 不属于危险三角区的静脉血供是

- A. 内眦静脉
- B. 眼上静脉
- C. 眼下静脉
- D. 颞浅静脉
- E. 面深静脉

58. 抑郁自评量表是

- A. SDS

- B. SAS
- C. MHT
- D. BDI
- E. HAMA

59. 小脑损伤不可能发生的是

- A. 柔软性麻痹
- B. 肌张力下降
- C. 意向性震颤
- D. 位置性眼震颤
- E. 共济失调

60. 2017 年某市卫生局开创评选“先进科室”，共评选出 30 个“优秀先进科室”，在这个良好环境下各医院均争做“先进科室”，在这个案例中体现的心理促进因素是

- A. 舆论扬抑，以境育人
- B. 案例分析，以理服人
- C. 技术过关，实力至上
- D. 以典为先，以形感人
- E. 知识教育，以德育人

61. 班级中十多位孩子患手足口病，情况通报至该县卫生部门，经上一级政府决定应采取的措施是

- A. 停课
- B. 对此次疫情进行疫情调查
- C. 对学校班级进行疫点消毒
- D. 对学校进行封锁
- E. 安排公安配合医院进行隔离

62. 胰岛素降糖的主要机制

- A. 促进糖异生
- B. 促进肌肉、脂肪、蛋白质对葡萄糖的吸收
- C. 抑制大脑对近端肾小管对葡萄糖的吸收
- D. 抑制肝糖原、肌糖原的合成
- E. 抑制葡萄糖的分解

2023 年临床执业历年真题

63. 描述一组数据频数分布的统计方法为

- A. 线图
- B. 直方图
- C. 箱式图
- D. 圆图
- E. 散点图

64. 选取 117 名孕妇进行试验研究, 其中 60 名孕妇给与药物治疗, 57 名孕妇不给与药物治疗, 观察新生儿是否出现新生儿黄疸, 从而判断药物治疗与新生儿黄疸的联系。此种研究方法为

- A. 病例对照研究
- B. 病因分析
- C. 现况研究
- D. 临床实验研究
- E. 队列研究

65. 医疗机构执业许可证校验时间为三年的是

- A. 诊所
- B. 三级医院
- C. 村卫生室
- D. 门诊部
- E. 社区服务中心

66. 要分析甲乙两地钩虫病患率, 已知男性患病率高于女性, 甲地男性比女性多, 乙地女性比男性多, 计算方法正确的是

- A. 先对性别进行标准化后再计算
- B. 分性别进行比较
- C. 无法比较
- D. 卡方检验
- E. Z 检验

67. 在医疗活动中, 医生依照相关法规使用“特殊干涉权”的做法符合医学伦理中的

- A. 保密
- B. 公正
- C. 有利
- D. 允许
- E. 尊重

68. 男, 32 岁。高热伴乏力, 腹胀 10 天。查体:T40.4℃, P86 次/分。神志淡漠, 胸壁可见淡红色小丘疹。右下腹压痛, 无反跳痛。肝肋下 2cm, 脾肋下 2cm, 质软, 无压痛。肥达氏实验 H 1:320, O 1:160, 外斐式实验 OX 191:80, 最可能感染的病原体是

- A. 伤寒沙门菌
- B. 普氏立克次体
- C. 汉坦病毒
- D. 钩端螺旋体
- E. 痢疾志贺菌

69. 女, 6 岁, 头痛, 呕吐, 发热。入院两日后, 嗜睡, 昏迷, 几日后死亡。尸检发现脑白质和灰白质交界处多发呈白色半透明针尖大小空泡状液化性坏死, 脑脊膜血管充血、水肿。该疾病可能的诊断是

- A. 多发性脑血栓
- B. 多发性脑缺血
- C. 流行性乙型脑炎
- D. 流行性脑脊髓膜炎
- E. 脓毒血症

70. 一男士, 发现其妻子出轨, 第二天双下肢不能行走, 医院各项检查正常, 用明尼苏达测验, 其中明显升高的指标为

- A. 病态偏执型
- B. 躁狂型
- C. 抑郁型
- D. 疑病、癔症
- E. 固执型

2023 年临床执业历年真题

71. 医生开立麻醉药品、一类精神药品处方必须符合的法定的资格

- A. 具备开立麻醉药品、一类精神药品处方资格
- B. 参加麻醉药品、一类精神药品的省级培训班
- C. 取得执业医师资格
- D. 具备开立麻醉药品、一类精神药品的临床经验
- E. 取得麻醉药品、一类精神药品的印鉴卡

72. 以下不属于慢性非传染性疾病防控伦理要求的是

- A. 积极开展卫生监测和报告
- B. 加强职业病健康教育
- C. 促进人形成健康的生活方式
- D. 依法开展卫生监督和管理
- E. 动员全社会力量积极遏制疫情

73. 不能作为诊断职业病需要综合分析的因素

- A. 职业的危险因素
- B. 辅助检查结果
- C. 职业病危险因素接触史
- D. 既往职业病史
- E. 地区的职业病发病率

74. 某患者长期使用免疫抑制剂，在医院最可能患的感染是

- A. 带菌感染
- B. 外源性感染
- C. 交叉感染
- D. 内源性感染
- E. 疫区感染

75. 胰体尾癌最常见的转移途径是

- A. 经血行转移至腰椎
- B. 经淋巴转移至腹膜后淋巴结
- C. 经门静脉转移至肝脏
- D. 种植转移至腹膜

E. 经血行转移至肺

76. FSH 作用于睾丸的细胞是

- A. 间质细胞
- B. 支持细胞
- C. 精原细胞
- D. 生精细胞
- E. 精母细胞

77. 下列不属于影响医患沟通障碍的是

- A. 尽量不使用专业术语
- B. 医务人员的优越感
- C. 医务人员技术的缺乏
- D. 患者的信任度不够
- E. 医务人员的防御与保护措施

78. 血站采血前不需要检测的是

- A. 乙肝
- B. 甲肝
- C. 艾滋
- D. 丙肝
- E. 梅毒

79. 某地区对 500 名沙门氏菌感染患者的感染情况进行调查，情况如下表所示，最能反映该地区沙门氏菌时长平均情况的是

- A. 几何平均数
- B. 平均数
- C. 中位数
- D. P75
- E. 标准差

80. 解剖性分流最可能见于

- A. 阻塞性肺气肿
- B. 慢性支气管炎
- C. 支气管哮喘
- D. 支气管扩张
- E. 肺栓塞

81. 蛋白质变性不会导致性质变化的是

2023 年临床执业历年真题

- A. 生物学活性丧失
- B. 结晶能力增加
- C. 溶解度降低
- D. 黏度增加
- E. 易被蛋白酶水解

82. 美国在“行为研究”中选取 300 名健康老年男性雇员，跟踪随访 10 年得出 A 型人格是心血管疾病原因的结论，此研究方法是

- A. 前瞻性研究
- B. 试验性研究
- C. 回顾性研究
- D. 预期性研究
- E. 观察性研究

83. 女，50 岁，腹痛停止排气排便，腹股沟韧带下可触及一半圆形肿块，触之疼痛，该肿块内侧组织结构为

- A. 髂耻弓
- B. 股静脉
- C. 子宫圆韧带
- D. 腹股沟韧带
- E. 腔隙韧带

84. 苯妥英钠的不良反应该不包括

- A. 共济失调
- B. 牙龈损害
- C. 肾损害
- D. 过敏反应
- E. 贫血

85. 以下是二级预防的是

- A. 监测环境中的有害气体
- B. 通过血糖筛查糖尿病患者
- C. 缓解患者心绞痛患者疼痛
- D. 开展健康教育
- E. 吸烟者开始戒烟

86. 一烧伤患者，来门诊换药，质疑医生专业能力，说为什么不将两种药一

起用，医生耐心解释道其中一种药会使另一种药的药效减弱，不能一起用。该过程体现了医师用药过程中的原则是

- A. 节约费用，公正分配
- B. 严守法规
- C. 合理配伍，适时调整
- D. 合理用药，细致观察
- E. 对症下药，因人施治

87. 临床问诊过程中，医生无精打采、反复询问，患者在诉说病情时漫无边际乱说，请问医生违背了什么原则

- A. 全神贯注，语言得当
- B. 耐心倾听，正确引导
- C. 举止端庄，态度热情
- D. 全面系统，认真细致
- E. 关心体贴，减少痛苦

88. 某位研究者拟研究冠心病的影响因素，对于抽样数据和对照数据的来源，不正确的是

- A. 国家机构来源的数据
- B. 大型医疗机构的数据
- C. 社区医疗机构的数据
- D. 不同地区和国家来源的数据
- E. 选择新发的病例

89. 小肠的特有运动形式是

- A. 容受性舒张
- B. 袋状往返运动
- C. 蠕动
- D. 紧张性收缩
- E. 分节运动

90. 女性，32 岁，双下肢水肿，关节痛，尿蛋白(+++)，抗 dsDNA(+)，ANCA1:1000，与该患者最相关的免疫物是

- A. IgA
- B. IgE

2023 年临床执业历年真题

- C. 免疫复合物
- D. 免疫分子
- E. IgD

91. 消化道出血导致的肝性脑病的神经机制

- A. 苯乙胺代谢增强
- B. 谷氨酸胺代谢增强
- C. 乙酰胆碱合成增多
- D. 锰透过血脑屏障进脑
- E. γ -氨基丁酸分解增多

92. 某医院进行了医院管理制度、接诊转诊过程、心理咨询、健康体检等新型管理，保证了对医务人员的关心、关注、公平。上述措施

- A. 有利于患者诊疗和公平治疗
- B. 有利于构建和谐医患沟通
- C. 有利于医学科学的发展
- D. 有利于医学保健科室的利用
- E. 有利于医务人员技术的提升

93. 女性 28 岁，G1P0，阴道不规则流血 1 月余，加重 1 周。有咳嗽咳痰，胸闷，气紧症状。子宫孕 14 周。子宫大小正常，形态不均匀。宫刮诊断提示：有两种滋养细胞，无间质。肺部检查提示：肺内多个结节。考虑以下哪种疾病

- A. 侵袭性葡萄胎伴肺转移
- B. 肺结核伴子宫转移
- C. 绒癌伴肺转移
- D. 肺癌伴子宫转移
- E. 子宫内膜癌伴肺转移

94. 根据应激源的定义，所有应激源包含的共同心理组分是

- A. 应激的认知评价
- B. 应激的人格特征
- C. 应激的社会支持
- D. 应激的应对方式

E. 被觉察到的威胁

95. 男性，52 岁，反复上腹部不适多年，经胃镜检查拟诊为胃溃疡，经抗溃疡药物治疗好转不明显。后经医师询问，自诉压力大或心情紧张时加重。给予的治疗是

- A. 予抗精神分裂症药物治疗
- B. 心理疗法
- C. 电休克治疗
- D. 予镇静药物治疗
- E. 加大抗溃疡药物

96. 属于中枢免疫器官的是

- A. 骨髓
- B. 阑尾
- C. 淋巴结
- D. 脾脏
- E. 扁桃体

97. 以下需要被强制就医的情况是

- A. 冠心病患者
- B. 糖尿病患者
- C. 有暴力行为的患者
- D. 婴幼儿发烧患者
- E. 老年痴呆患者

98. 某市 2006 年，对中小学视力调查中发现学生用眼不规范及视力下降的情况，决定开展眼保健操及用眼规范宣传，设置实验组与对照组，实验组进行眼保健操及用眼宣传，对照组不进行干预。此研究方式为

- A. 社区干预实验
- B. 预防干预措施
- C. 个体试验
- D. 对照研究
- E. 队列研究

99. 女，28 岁，外阴瘙痒 1 周，无发热。妇科检查：外阴可见豆腐渣样分泌

2023 年临床执业历年真题

物。引起该病的病原体特点不包括

- A. 可在沙氏培养基中生长
- B. 为单细胞微生物
- C. 可引起内部脏器感染
- D. 为机会致病菌
- E. 为革兰氏染色阴性菌

100. 属于营养必需氨基酸的是

- A. 丝氨酸
- B. 甘氨酸
- C. 苯丙氨酸
- D. 脯氨酸
- E. 谷氨酸

101. 女, 28 岁, G1P0, 停经 9 周, 超声宫内妊娠正常, 早孕反应正常, 既往体健, BMI:20.8, 父亲 2 型糖尿病病史。妊娠 25 周诊断 GDM, 无血糖不良的指征, 如何处理

- A. 口服降糖药
- B. 口服降脂药
- C. 医学营养治疗
- D. 胰岛素皮下注射
- E. 每日高强度运动 60 分钟

102. 男性, 70 岁, 食管癌手术后 5 天, 发热 38.6°C, B 超示右侧胸腔包裹性积液, 胸膜腔穿刺抽出粉红色液伴恶臭味, 胸膜腔镜检革兰氏阴性杆菌, 细菌培养常规细菌阴性。请问是什么感染

- A. 肺炎链球菌
- B. 脆弱拟杆菌
- C. 金黄色葡萄球菌
- D. 双歧杆菌
- E. 产气荚膜梭菌

103. 小叶性肺炎的主要渗出物是

- A. 浆液
- B. 纤维素
- C. 中性粒细胞

- D. 淋巴细胞
- E. 嗜酸性粒细胞

104. 1 岁小儿, 出生时左前额部有一扁平红色突起, 不痛不痒, 持续增大, 符合组织学改变

- A. 红细胞渗出
- B. 脂肪瘤
- C. 梭形细胞排列
- D. 毛细血管瘤
- E. 脑膜炎改变

105. 实施脑死亡标准的直接伦理目的

- A. 减轻家属身心痛苦
- B. 节约医疗卫生资源
- C. 促进人体器官移植
- D. 维护死者尊严
- E. 尊重患者权利

106. 患者最近经常生闷气, 抑郁, 焦虑, 有自杀倾向, 患者母亲带患者入院检查, 确诊为抑郁症, 劝说入院治疗, 患者拒绝, 下列哪项措施对

- A. 强制入院
- B. 自愿住院
- C. 检查评估
- D. 重复诊断
- E. 暂不处理

107. 最常见的传染病同源爆发的传播途径是

- A. 节肢动物
- B. 呼吸道
- C. 垂直传播
- D. 食物
- E. 接触传播

108. 黄曲霉毒素毒性急性损伤

- A. 肝脏
- B. 肾脏
- C. 脾脏

2023 年临床执业历年真题

- D. 大脑
- E. 卵巢

109. 男, 30 岁, 间歇腹痛 2 年, 再发 2 周, 黑便 1 周, 伴乏力, 活动后气促, 胃溃疡病史 5 年。查体 P112 次/分, 结膜苍白, 腹软, 无按压痛, 肠鸣音 6 次/分。以下最可能出现的血常规检查是

- A. 平均红细胞容积 45%
- B. 红细胞计数 $5 \times 10^{12}/L$
- C. 红细胞体积 104fl
- D. Hb60g/L
- E. 红细胞体积分布宽度减小

110. 属于人和动物共患的最常见病毒形态

- A. 球形
- B. 砖性
- C. 线条性
- D. 蝌蚪形
- E. 弹状

111. 男, 60 岁, 1 小时前下楼时不慎摔倒, 右踝部扭伤, 肿胀疼痛无法行走。查体: 右踝部肿胀, 压痛, X 线片未见骨折, 最可能损伤的结构是

- A. 胫骨前肌腱
- B. 胫骨后肌腱
- C. 分歧韧带
- D. 外侧韧带
- E. 三角韧带

112. 酮症酸中毒时血液中浓度增加的分子是

- A. 乳酸
- B. 丙酮酸
- C. 乙酰乙酸
- D. 甘油三酯
- E. 尿酸

113. 男, 30 岁, 受凉后出现鼻痒, 喷嚏, 流涕, 干咳, 严重时出现呼吸困难, 查体: 呼气性呼吸困难, 双肺广泛哮鸣音, 与该患者症状有关的细胞因子是

- A. IL-2
- B. IL-4
- C. IL-6
- D. IL-8
- E. IL-10

114. 某医生对某地区 1160 名群众进行糖尿病病人筛查, 共发现 140 名糖尿病患者, 对这些人进行空腹血糖检测, 以空腹血糖 ≥ 6.1 为阳性, 结果如表格: 病人: 阳性: 124, 阴性: 16; 非病人: 阳性: 324, 阴性: 696, 问筛查试验的阳性检测率是多少有病 无病空腹血糖

阳性	124	324	468	空腹血糖	阴性
	16	696	712	合计	140 1020
					1160

- A. 87/89
- B. 27/85
- C. 31/112
- D. 124/140
- E. 58/85

115. 下列属于镇静催眠药过量的常见表现是

- A. 恶心呕吐
- B. 多语、多汗
- C. 意识障碍
- D. 耳鸣头昏
- E. 焦虑不安

116. 国家选择一定范围地区的艾滋病流行情况, 通过针对该地区总人群艾滋病流行情况高危人群(性工作者、吸毒人员)进行统一的方式和方法的调查方法, 该统计方法属于

- A. 死因监测

2023 年临床执业历年真题

- B. 被动监测
- C. 症状监测
- D. 哨点监测
- E. 行为学监测

117. 女, 45 岁, 月经量增多, 延长 2 年, 心悸, 头晕 2 个月, 查体: 子宫如孕 14 周大小, 子宫多发肌瘤, 最大者 $8 \times 7 \times 6\text{cm}$, 血常规: $\text{Hb}71\text{g/L}$, $\text{WBC}2.45 \times 10^{12}/\text{L}$, $\text{PaO}_2 82.3\text{mmHg}$, $\text{PaCO}_2 37.6\text{mmHg}$, 问患者血氧变化

- A. 动脉血氧饱和度下降
- B. 动脉血氧分压下降
- C. 动脉血氧含量下降
- D. 动静脉氧分压差增大
- E. 氧离曲线左移

118. 女性, 70 岁, 呕吐两天, 一天 5~6 次, 腹泻一天, 一天 10 余次, 尿量减少 1 天, 查体: 36.5°C , 心率 110 次/分, 脉搏 26 次/分, 血压 $85/60\text{mmHg}$ 。神情淡漠, 口腔黏膜苍白, 尿量 $300\text{ml}/24\text{h}$ 。心率 110 次/分, 心率齐, 造成血压改变的原因是

- A. 血管运动系统兴奋
- B. 有效循环血量减少
- C. 儿茶酚胺分泌增加
- D. 微静脉扩张
- E. 回心血量减少

119. 某男, 52 岁, 2 型糖尿病, BMI 值为 $32\text{kg}/\text{m}^2$, 腰围 90cm , 下列适合该男子的运动方式是

- A. 跳绳
- B. 游泳
- C. 举重
- D. 拔河
- E. 长跑

120. 男, 45 岁, 因阑尾穿孔于某医院接受手术治疗, 术后医师发现腹腔内

有纱布遗留, 依法进行上报, 根据《医疗事故处理规定》, 需要向患者进行报告的主体是

- A. 科室负责人
- B. 医院院长
- C. 医院办公室
- D. 卫生行政部门
- E. 医院服务监督部门

121. 能够为人 CD8^+ T 细胞提呈抗原肽的分子是

- A. CD4
- B. HLA-I
- C. B γ
- D. HLA-II
- E. CD1

122. 男婴, 出生后 4h 出现巩膜黄染, 神志欠佳。其母亲有流产史, A 型血, Rh 阴性, 其父亲 B 型血, Rh 阳性, 跟该患儿表现相关的表现的抗体是

- A. IgM
- B. IgE
- C. IgG
- D. IgD
- E. IgA

123. 女性, 22 岁, 睡眠差, 食欲增加, 体重增加半年。伴有月经不规律, 经期延长。血压 $140/90\text{mmHg}$ 。查体: 满月脸、水牛背、向心性肥胖。该患者可能会出现血液检查结果是

- A. 脂肪酸水平下降
- B. 血钠下降
- C. 血钾下降
- D. 红细胞量下降
- E. 血糖水平下降

124. 2~7 岁儿童年龄 X 与平均体重 Y(kg) 的关系可表示为 $Y=7+2X$, 则以下正确的是

2023 年临床执业历年真题

- A. 11 岁儿童平均体重为 29kg
- B. 0 岁儿童的平均体重为 7kg
- C. 5 岁儿童平均体重为 17kg
- D. 6 岁比 5 岁平均体重多 7kg
- E. 1 岁到 2 岁增长 2kg

125. 小儿 6 岁，自幼发现心脏杂音，查体：胸骨左缘第二肋间连续机器响杂音。请问该患者的血流动力学变化

- A. 主动脉血全心周期流向肺动脉，左向右分流在全程持续向肺动脉分流，左向右分流
- B. 主动脉血在收缩期向肺动脉分流，左向右分流
- C. 主动脉血在舒张期向肺动脉分流，左向右分流
- D. 左室在收缩期向右室分流，左向右分流
- E. 右室在舒张期向左室分流，右向左分流

126. 健康教育干预主要作用于影响健康分类中的

- A. 卫生服务因素
- B. 环境因素
- C. 遗传因素
- D. 生物因素
- E. 行为与生活方式因素

127. 女婴，10 个月，面色苍白 3 个月。纯母乳喂养，未添加辅食。近来出现食欲下降。查体：P125 次分，面色苍白，肝肋下 3cm，脾肋下 1cm。血红蛋白 87g/L。外周血涂片：红细胞大小不等，以小为主，中央淡染区扩大。该女童合成血红素直接需要的的氨基酸是

- A. 色氨酸
- B. 甘氨酸
- C. 缬氨酸
- D. 酪氨酸
- E. 异亮氨酸

128. 行主动脉和肺动脉手术，应从哪个部位进行血流阻断

- A. 心包斜窦
- B. 心包前下窦
- C. 腔静脉窦
- D. 冠状窦
- E. 心包横窦

129. 男，50 岁，体检发现甲状腺右叶结节，形状不规则，降钙素 500pg/ml。B 超检查结果提示：1.2×0.8cm，形欠规则，界不清，血流丰富。组织类型为

- A. 癌呈团巢状，间质大量淀粉样沉积
- B. 癌呈巢状结构，间质大量淋巴细胞
- C. 癌呈滤泡状，间质大量纤维素
- D. 癌细胞呈沟状
- E. 癌呈索状，大量钙化

A3/A4 型选择题

(130~132 题共用题干)

男性，68 岁，因急性心肌梗死入院治疗，3 周后，患者除活动后偶尔出现心前区不适外其他症状未再出现，实验室检查数据正常，经治医生对患者简单告知后动员患者提前出院。1 月后，患者因频发心绞痛到该院急诊科就诊，5 个小时后因室颤死亡。患者家属认为患者死亡是因为之前住院时医生让提前出院有关，遂与医院发生纠纷，并要求进行尸检。

130. 患者家属对当时主治医师要求提前出院决定有异议，认为该行为造成患者死亡，下列说法哪项符合医学伦理

- A. 主治医师应该与患者家属充分沟通解释当时要求提前出院的原因和状况
- B. 患者家属无权质疑主治医师当时的决策
- C. 医院应对主治医师进行问责调查

2023 年临床执业历年真题

- D. 患者可以在医院闹事
- E. 主治医生应该患者的死亡负责

131. 与该患者疾病发生密切相关的行为类型是

- A. X 行为类型
- B. B 行为类型
- C. C 行为类型
- D. A 行为类型
- E. H 行为类型

132. 患者家属要求对患者进行尸体解剖, 有冰冻条件, 尸体解剖最长延长至几天

- A. 患者死亡后 3 日
- B. 患者死亡后 7 日
- C. 患者近亲属签署同意后 48h
- D. 患者死亡后 48h
- E. 患者近亲属签署同意后 3 日

(133~134 题共用题干)

一孕妇得知自己怀孕很开心, 但出于工作原因并且自己想再奋斗, 打算人工流产, 但丈夫和婆婆都不同意, 孕妇很犹豫。

133. 孕妇面临何种形式的冲突

- A. 双趋冲突
- B. 双避冲突
- C. 趋避冲突
- D. 双重趋避冲突
- E. 多重趋避冲突

134. 有权利决定做人工流产手术的人是

- A. 孕妇
- B. 主治医生
- C. 丈夫
- D. 婆婆
- E. 孕妇和丈夫

(135~137 题共用题干)

某市随机抽取 206 名成年男性和 201 名成年女性, 了解其 HBsAg 携带情况, 其中男性阳性人数为 33 人, 阳性率为 16.02%, 女性阳性人数 22 人, 阳性率 10.94%, 已知全省男性 HBsAg 阳性携带率为 17.3%。

135. 问: 比较男女性别携带率, $p > 0.05$ 。按照 $\alpha = 0.05$ 标准, 下列结论正确的是

- A. 男女性别携带率差异具有统计学意义
- B. 男性携带率 $>$ 女性。
- C. 男性携带率 $<$ 女性。
- D. 男性携带率 = 女性。
- E. 尚不能认为男女携带率不同。

136. 若该市男性 HBsAg 携带率与全省男性 HBsAg 阳性携带率比较得 $P > 0.05$, 则该市男性样本率与全省男性样本率的不同取决于

- A. 样本数太大
- B. 系统误差的影响
- C. 计算误差的影响
- D. 总体不同
- E. 抽样误差的影响

137. 用 Z 检验比较两率, 下列说法正确的是

- A. P 越大, 越有理由说明两个总体率不同
- B. P 越小, 越说明两样本率差别越小
- C. P 越小, 越有理由说明两总体率不相同
- D. P 越大, 越有理由说明两个样本率不同
- E. P 越小, 越有理由说明两个样本率不同

(138~140 题共用题干)

男, 28 岁。婚前到某医疗保健机构进行婚检。经检查, 医疗保健机构为其

2023 年临床执业历年真题

出具了婚前医学检查证明，其中列明了患者目前所患疾病，并将该信息通知其女友知晓，引发男方强烈不满。

138. 从医学心理学角度分析，该男士觉得未满足的需求是

- A. 生存需求
- B. 交往的需求
- C. 接纳的需求
- D. 尊重的需求
- E. 自我实现的需求

139. 本案例中，接诊医师违反的主要医师道德义务是

- A. 为患者进行健康教育
- B. 保护患者的隐私
- C. 遵循医学科学规律
- D. 医疗文书规范书写
- E. 遵守操作规范

140. 证明单上不应列出的疾病为

- A. 医学上不建议结婚的疾病
- B. 在传染期内的特定传染病
- C. 发病中的精神疾病
- D. 对生育有严重影响的遗传性疾病
- E. 自限性的传染病

B1 型选择题

(141~142 题共用备选答案)

- A. 脾脏
- B. 骨髓
- C. 淋巴结
- D. 阑尾
- E. 扁桃体

141. 下列属于中枢性免疫器官的是

142. 属于免疫系统的免疫器官

(143~144 题共用备选答案)

- A. 脑
- B. 肾
- C. 肝

D. 肠

E. 心

143. 下列脏器中，梗死灶呈地图状改变的是

144. 下列脏器中，贫血性梗死灶成椎体改变的是

(145~146 题共用备选答案)

- A. 肥大细胞
- B. 嗜酸性粒细胞
- C. 中性粒细胞
- D. 巨噬细胞
- E. 淋巴细胞

145. 寄生虫感染时，浸润的炎症细胞主要是

146. COPD 气道炎症最主要的效应细胞是

(147~148 题共用备选答案)

- A. 真菌
- B. 衣原体
- C. 支原体
- D. 病毒
- E. 立克次体

147. 无细胞壁的原核细胞型微生物是

148. 具有典型细胞核和完整细胞器的微生物

(149~150 题共用备选答案)

- A. 维生素 PP
- B. 维生素 B1
- C. 维生素 C
- D. 维生素 A
- E. 维生素 B12

149. 属于脂溶性维生素的是

150. 女性素食主义者长期大量食用碾磨过分精白的米和面粉容易缺乏

第二单元

A1/A2 型选择题

1. 男，72 岁。糖尿病多年，一直长期服用阿卡波糖，长期胰岛素，瑞格列奈，格列本脲，罗格列酮等药物，空腹血糖 5.2mmol/L，餐后两小时 6.5mmol/L，双下肢水肿，射血分数 42%，如果现在要停药的话，停哪一种药

- A. 阿卡波糖
- B. 长期胰岛素
- C. 瑞格列奈
- D. 格列本脲
- E. 罗格列酮

2. 一男子偶有头痛胸闷，多次自测血压 170/110mmHg 左右，就医按指导控制饮食、运动后仍控制不佳，测血压 160/95mmHg，心率 150 次/分，双侧肾动脉 B 超无狭窄。应采取的治疗是

- A. 口服氢氯噻嗪
- B. 继续观察半年
- C. 口服比索洛尔
- D. 症状出现时舌下含服托那普利
- E. 口服硝苯地平

3. 女，70 岁，突发心悸两小时，伴头晕乏力出冷汗，BP80/50mmHg，心脏无扩大，心率 180 次/分，心率绝对不齐，第一心音强弱不等，各瓣膜听诊未闻及病理性杂音，最合适的治疗是

- A. 胺碘酮静注
- B. 临时心脏起搏
- C. 同步电复律
- D. 美托洛尔静注
- E. 电除颤

4. 前列腺癌确诊的方法

- A. 血清前列腺特异性抗原测定 (PSA)
- B. 直肠指检
- C. 经直肠 B 超引导下前列腺穿刺+活检
- D. 盆腔 CT
- E. 盆腔 MRI

5. 女，28 岁，酱油色尿 3 天。查体：无双侧肾区叩击痛，为明确诊断，接下来应做的检查是

- A. 尿隐血是试验
- B. 尿三杯试验
- C. 尿沉渣镜检
- D. 尿常规
- E. 尿胆原

6. 男性，28 岁，发热 2 周，最高温度 39.6℃，伴腹痛、腹泻，稀便 3-4 次/天。查体：一个月前下河游泳下肢一过性皮炎，肝肋下 2cm，有压痛，脾肋下可触及，WBC 15.7×10^9 ，NO.42，EO.4，可选以下哪种药物进行治疗

- A. 阿苯达唑
- B. 多西环素
- C. 吡喹酮
- D. 左氧氟沙星
- E. 甲硝唑

7. 男性，16 岁，参加 1500 米长跑后出现头晕，乏力，尿蛋白(++)，休息 1 天后症状消失，尿蛋白(-)，最可能的情况是

- A. 组织性蛋白尿
- B. 分泌性蛋白尿
- C. 肾小管性蛋白尿
- D. 功能性蛋白尿
- E. 溢出性蛋白尿

8. 支气管哮喘长期维持治疗

- A. 吸入短效 β_2 受体激动剂
- B. 吸入长效 β_2 受体激动剂
- C. 口服短效 β_2 受体激动剂

2023 年临床执业历年真题

- D. 吸入糖皮质激素
- E. 色甘酸钠

9. 男, 61 岁, 反复咳嗽咳痰 3 月, 痰中带血丝, 近 1 周出现腰背部疼痛, 夜间疼痛明显, L3-5 椎体及周围间隙叩击痛, 直腿抬高试验及“4”字实验(-), MRI 显示 L3、L5 及 S1 间隙有异常, 椎间隙无狭窄。该患者最有可能诊断为

- A. 腰椎结核
- B. 腰椎间盘突出症
- C. 腰椎管狭窄症
- D. 腰椎转移瘤
- E. 腰椎肿瘤

10. 男, 18 岁, 右踝扭伤 2 小时, 右踝肿胀, 外踝前方轻压痛, 关节稳定性可, X 线未见骨折移位, 早期治疗不恰当的是

- A. 局部按摩
- B. 休息, 减少行走
- C. 弹力绷带适当固定
- D. 冷敷
- E. 右下肢抬高

11. 化学药品 A 适应症为原发性高血压, 现拟用 B 药进行人体生物等效性研究, 口服给药剂量 0.5mg, A 药与 B 药的曲线下面积(AUC)分别为 27.2ng/h/ml 和 23.3ng/h/ml, 上面关于 A 药与 B 药的生物利用度描述正确的是

- A. A 药与 B 药, 不具有生物等效性
- B. A 药的绝对生物利用度是 54%
- C. B 药的绝对生物利用度是 46%
- D. B 药对 A 药的相对生物利用度为 86%
- E. A 药对 B 药的相对生物利用度为 117%

12. 男性, 22 岁。2 周前发热病史, 心悸、乏力 3 天。查体: 心率 100 次/分,

无不齐, 心脏超声未见明显异常。最可能的诊断是

- A. 扩张型心肌病
- B. 肥厚型心肌病
- C. 急性病毒性心肌炎
- D. 冠心病
- E. 急性心肌梗死

13. 有关咳嗽变异型哮喘说法正确的是

- A. 常在午后发生或加重
- B. 抗哮喘治疗无效
- C. 以干咳为主
- D. 支气管激发实验阴性
- E. 常发生感染, 抗生素治疗有效

14. 甲状腺滤泡旁细胞分泌降钙素的作用是

- A. 促进细胞内的氧化作用
- B. 维持糖和蛋白质的代谢
- C. 促进机体的发育
- D. 抑制骨骼对钙的吸收
- E. 促进机体各系统和器官的生理

15. 女, 30 岁。月经增多, 心肺正常, Hb86g/L, PaO₂ 82.3mmHg, PaCO₂ 37.6mmHg, pH7.43。血氧容量降低的原因是

- A. 二氧化碳下降
- B. 红细胞内 2-3-DPG 下降
- C. 体温下降
- D. pH 下降
- E. 血红蛋白下降

16. 评价肾小球滤过率最常用的指标是

- A. 血肌酐
- B. 血尿素
- C. 菊粉清除率
- D. 内生肌酐清除率
- E. eGFR

17. 股骨头的营养动脉不包括

2023 年临床执业历年真题

- A. 旋髂深动脉
- B. 股骨干滋养动脉升支
- C. 旋股外侧动脉分支
- D. 小凹动脉
- E. 旋股内侧动脉分支

18. 女性，57 岁。左手拇指晨起僵硬伴疼痛 3 年，近半年出现该处的肿胀及活动受限，左手手指及指掌可触及硬性结节，被动活动患指可出现伴疼痛的弹响。临床诊断最可能是

- A. 骨关节炎
- B. 关节内游离
- C. 类风湿性关节炎
- D. 风湿性关节炎
- E. 狭窄性腱鞘炎

19. 男性，27 岁，腹泻、呕吐 1 天。7 月 13 日就诊，一天前稀水样便 10 次，呕吐 1 次，查体：T37.5℃，P110 次/分，R24 次/分，BP90/52mmHg，WBC8 × 10⁹/L，N0.78，为快速临床诊断，应立即进行的检查是

- A. 血生化检查
- B. 粪常规及涂片
- C. 血培养及药敏
- D. 粪动力及制动试验
- E. 粪培养及药敏

20. 男，22 岁，修理水泵时绞伤右手，查体：右手掌侧可见不规则伤口，出血不止，2-5 指远端皮肤苍白，感觉减退，指间关节屈曲受限，行清创，肌腱神经血管吻合术。术后处理正确的是

- A. 患肢制动，弹力绷带固定
- B. 局部冰敷，预防血肿形成
- C. 包扎时指蹼间隔开，露出指尖
- D. 石膏固定手指于伸直位
- E. 鼓励患者早期活动手指

21. 下列有关蛋白尿的说法错误的是

- A. 尿中 β₂ 微球蛋白为肾小管性蛋白尿
- B. 尿蛋白大于 3.5g 每天为大量蛋白尿
- C. 尿中出现 IgG 为肾小管性蛋白尿
- D. 含本周蛋白的为溢出性蛋白尿
- E. 肾小球性蛋白尿以白蛋白为主

22. 男性，68 岁，发热，头痛腰痛，腹泻三天，少尿 300ml 一天，查体：体温 38.5℃，心率 116 次/分，呼吸 24 次/分，面部充血，眼睑水肿，软腭有出血点，血常规 Hb134g/L，WBC14 × 10⁹/L，N0.84，粪常规及镜检：WBC 5/HP，为明确诊断，应当首选检查

- A. 血涂片
- B. 血培养
- C. 汉坦病毒抗体
- D. 钩端螺旋体抗体
- E. EB 病毒抗体

23. 男，65 岁，胸痛 3 小时，感胸闷心悸，伴恶心、呕吐、大汗，口服硝酸甘油不缓解，查体：心率 40 次/分，大炮音。冠脉造影示右冠严重堵塞。下列可能出现的心律失常是

- A. 三度房室传导阻滞
- B. 二度窦房传导阻滞
- C. 一度房室传导阻滞
- D. 一度窦房传导阻滞
- E. 二度房室传导阻滞

24. 高血压眼底病变 IV 期的表现是

- A. 视网膜静脉交叉
- B. 视盘水肿
- C. 视网膜动脉反光增强
- D. 视网膜棉絮状渗出
- E. 视网膜动脉变细

25. 男，52 岁。体检时心脏听诊发现心尖区收缩期中期喀喇音，闻及 3/6

2023 年临床执业历年真题

级收缩中晚期吹风样杂音，X 线显示心影正常。拟诊断为

- A. 二尖瓣脱垂
- B. 二尖瓣关闭不全
- C. 二尖瓣狭窄
- D. 主动脉关闭不全
- E. 主动脉狭窄

26. 女 17 岁，疲劳无力，心烦易怒，怕热多汗，体重下降 5kg，月经量减少，经期缩短，查体 P100 次/分，BP140/70mmHg，手有颤动，甲状腺有弥漫性肿大，无触痛。该患者最可能的诊断是

- A. 糖尿病
- B. 单纯性甲状腺肿
- C. Graves 病
- D. 自主神经紊乱
- E. 缺铁性贫血

27. 肾小球疾病临床分类不包括

- A. 急性肾小球肾炎
- B. 急进性肾小球肾炎
- C. 无症状血尿蛋白尿
- D. IgA 肾病
- E. 肾病综合征

28. 对于运动系统慢性损伤非甾体抗炎药使用，下列说法正确的是

- A. 为了减轻肝功能损害可联合使用吲哚美辛和阿司匹林
- B. 局灶浅表性病变可使用非甾体抗炎药口服液
- C. 为了减轻胃肠功能损害可使用 COX1 抑制剂
- D. 非甾体抗炎药可多种合用，加强疗效
- E. 短期最低有效药物剂量

29. 支气管哮喘早期发作时的血气改变是

- A. pH 值上升，PaO₂ 下降，PaCO₂ 下降
- B. pH 值上升，PaO₂ 下降，PaCO₂ 上升
- C. pH 值下降，PaO₂ 下降，PaCO₂ 下降
- D. pH 值下降，PaO₂ 下降，PaCO₂ 上升
- E. pH 值正常，PaO₂ 下降，PaCO₂ 上升

30. 男，65 岁。腹泻一周，心悸 2 天。既往有高血压、房颤病史。口服华法林，培哚普利，硝酸酯类，地高辛治疗。急诊心电图：频繁室性期前收缩，短阵室性心动过速。如果想探究患者病情转变的原因，应选择哪项检查

- A. 地高辛浓度测定
- B. 凝血时间测定
- C. D-二聚体测定
- D. 心肌坏死标志物测定
- E. 脑钠肽

31. 女，50 岁，活动后胸闷 1 年，夜间阵发性呼吸困难 4 天。查体：BP130/80mmHg，P2>A2，心尖部可闻及舒张期隆隆样杂音，该患者最易出现的心律失常是

- A. 三度房室传导阻滞
- B. 室上性心动过速
- C. 心房颤动
- D. 室性心动过速
- E. 心房扑动

32. 患者，女，70 岁。反复双膝关节疼痛 10 年，逐渐加重 2 年，活动时关节有弹响。体检：双膝关节骨摩擦音(+)，但无明显红肿及压痛。最可能的诊断是

- A. 骨关节炎
- B. 类风湿关节炎
- C. 反应性关节炎

2023 年临床执业历年真题

- D. 强直性脊柱炎
- E. 系统性红斑狼疮

33. 伸直型肱骨髁上骨折最常见于

- A. 中年男性
- B. 儿童
- C. 中年女性
- D. 老年男性
- E. 老年女性

34. 治疗室上性心动过速的药物首选

- A. 胺碘酮
- B. 利多卡因
- C. 腺苷
- D. 美托洛尔
- E. 维拉帕米

35. 骨筋膜室综合征的晚期并发症是

- A. 肾衰竭
- B. 缺血性骨坏死
- C. 缺血性肌挛缩
- D. 肺栓塞
- E. 损伤性骨化

36. 男，48 岁，因急性心梗后入住 ICU，出现心率增快，多次发房颤室颤室速后电复律电除颤抢救成功。形成电风暴的原因是

- A. 副交感系统激动
- B. 交感神经兴奋
- C. 迷走神经兴奋
- D. 中枢神经系统抑制
- E. 迷走神经系统抑制

37. 女，27 岁，尿频尿急尿痛 2 天，右肾区叩痛阳性，尿沉渣检查，RBC5-10/HP，WBC50-60/HP，最可能的诊断是

- A. 急性膀胱炎
- B. 急性肾盂肾炎
- C. 急性肾小球肾炎

- D. 急性间质性肾炎
- E. 急进性肾小球肾炎

38. 患者男，2 天前因心梗入院，1 天前突发喘憋和咳粉红色泡沫痰，不能平卧。查体：血压 90/60mmHg，在心尖部可闻及 3/6 收缩期杂音，双肺底可闻及大小不等的水泡音及哮鸣音。该患者喘憋是由于

- A. 心肌梗死后综合征
- B. 乳头肌断裂
- C. 肺部感染
- D. 肺栓塞
- E. 心室膨胀瘤

39. 女，31 岁，反复尿频尿痛一年，使用抗生素治疗无效，下列尿常规中最可能的是

- A. 尿呈酸性，有脓细胞，无细菌生长
- B. 尿呈中性，有脓细胞，有细菌生长
- C. 尿呈酸性，有脓细胞，有细菌生长
- D. 尿呈碱性，有脓细胞，无细菌生长
- E. 尿呈碱性，有脓细胞，有细菌生长

40. 男，62 岁，既往陈旧性心肌梗死，PCI 术后 3 年，2 年半前开始出现活动后心累，夜间阵发性呼吸困难，间断双下肢水肿，口服利尿药治疗有效。心脏超声示：左室扩大，左室前壁节段性运动减弱，LVEF35%，近期开始出现阵发性房颤，推荐使用的药物不包括

- A. 地高辛
- B. 普罗帕酮
- C. 普萘洛尔
- D. 比索洛尔
- E. 胺碘酮

41. 女，66 岁，发热伴尿急、尿频、尿痛 3 天。既往糖尿病病史 10 年。查体：左肾区叩击痛(+)，尿沉渣镜检：RBC3~5/HP，WBC 满视野。清洁中

2023 年临床执业历年真题

段尿细菌定量培养:大肠埃希菌 10^6 cfu/ml, 应首选

- A. 抗生素治疗 1 周
- B. 抗生素治疗 2 周
- C. 不使用抗生素治疗
- D. 抗生素治疗 3 天
- E. 单剂量抗生素

42. 高血压伴双侧肾动脉狭窄, 禁用下列哪项药物

- A. 缬沙坦
- B. 地尔硫草
- C. 美托洛尔
- D. 洋地黄
- E. 呋塞米

43. 关于成人心肺复苏, 下列错误的是

- A. 胸外按压与人工呼吸的比例 30:2
- B. 行心肺复苏前先人工呼吸 2 次
- C. 胸骨按压深度至少 5cm
- D. 胸外按压是人工循环
- E. 按压频率至少 100 次/分

44. 男, 66 岁。发作性胸痛 1 小时。在问病史过程中突然跌倒, 对呼唤和推搡无反应。此时应立即采取的措施是

- A. 送抢救室
- B. 做心脏彩超
- C. 触诊大动脉
- D. 做心电图
- E. 查看瞳孔

45. 以无痛性肉眼血尿为主要临床表现的是

- A. 膀胱肿瘤
- B. 肾结核
- C. 肾囊肿
- D. 上尿路结石
- E. 肾盂肾炎

46. 一男性发热伴咽痛三天, 颈部腹股沟淋巴结肿大, 肝脾大, 服用扑热息痛治疗后, 查血常规显示中心粒细胞中毒现象, 白细胞 $1.0 \times 10^9/L$, 中性粒细胞绝对值 $0.4 \times 10^9/L$, 红细胞, 血小板正常, 诊断为

- A. 传染性单核细胞增多症
- B. 粒细胞缺乏症
- C. 低增生性白血病
- D. 嗜酸细胞增多症
- E. 骨髓异常增生综合征

47. 肺动脉高压的诊断标准是

- A. 静息状态下右心导管测量平均肺动脉压 $\geq 25\text{mmHg}$
- B. 静息状态下右心导管测量平均肺动脉压 $\geq 30\text{mmHg}$
- C. 静息状态下超声心动测量平均肺动脉压 $\geq 25\text{mmHg}$
- D. 静息状态下超声心动测量平均肺动脉压 $\geq 30\text{mmHg}$
- E. 静息状态下超声心动测量收缩期肺动脉压 $\geq 25\text{mmHg}$

48. 风湿性心脏瓣膜病二尖瓣狭窄最常并发的心律失常

- A. 窦性心动过速
- B. 室性期前收缩
- C. 窦性心动过缓
- D. 房室传导阻滞
- E. 心房纤颤

49. 缺铁性贫血中最常见的是

- A. 慢性胃炎
- B. 慢性溶血
- C. 慢性感染
- D. 慢性肝炎
- E. 慢性失血

50. 中年男性, 急性广泛前壁心肌梗死入院。第 3 天, 患者气促加重, BP

2023 年临床执业历年真题

76/50mmHg，中心静脉压 25cmH₂O，P130 次/分，双中下肺可闻及湿啰音。

治疗选用

- A. 硝酸甘油
- B. 呋塞米
- C. 去甲肾上腺素
- D. 肾上腺素
- E. 洋地黄

51. 男，68 岁，胸痛 3 年，位于胸骨后，凌晨发作，数分钟后可自行缓解，发作时心电图提示 V₁ ~ V₃ 导联抬高 0.3mv，后复测心电图为正常，该患者为

- A. 中间综合征
- B. 初发型心绞痛
- C. 变异型心绞痛
- D. 恶化型心绞痛
- E. 劳累型心绞痛

52. 治疗泌尿生殖道感染的药物是

- A. 乙胺丁醇
- B. 华法林
- C. 环丙沙星
- D. 普萘洛尔
- E. 阿托品

53. Addison 病的主要治疗方式为

- A. 糖皮质激素替代治疗
- B. 盐皮质激素替代治疗
- C. 手术治疗
- D. 对症治疗
- E. 静脉输注糖皮质激素

54. 小剂量可以增加肾动脉血流量的是

- A. 去甲肾上腺素
- B. 肾上腺素
- C. 异丙肾上腺素
- D. 多巴胺
- E. 氨茶碱

55. 男，58 岁，突发胸痛 2 小时，呈持续性撕裂样疼痛，向肩背部和腰部放射。既往有高脂血症和高血压 5 年，未规范治疗。查体，左上肢血压 140/85，右上肢 180/105，心率 102 次/分，以下哪种检查诊断

- A. 主动脉 CTA
- B. 胸部 X 线
- C. 心电图
- D. 超声心动图
- E. 冠状动脉造影

56. 女，35 岁。脸变圆、向心性肥胖 2 年，皮肤紫纹半年。最可能的诊断是

- A. 特发性醛固酮增多症
- B. 肾上腺皮质功能减退症
- C. 单纯性肥胖
- D. 糖尿病
- E. 库欣综合征

57. 女，58 岁，因腹痛到诊所就诊，诊断为肠胃炎，输液后自行回家。回家后突发胸痛倒地而亡，尸检发现心包积液 200ml，其最可能的病理变化是

- A. 心肌间大量淋巴细胞浸润
- B. 心肌纤维增粗肥大
- C. 心肌间可见肉芽肿形成
- D. 心肌间广泛纤维化
- E. 心脏破裂

58. 二尖瓣狭窄大咯血原因是

- A. 支气管静脉破裂
- B. 支气管动脉破裂
- C. 肺毛细血管破裂
- D. 肺淤血
- E. 肺栓塞

59. 男，65 岁，腰痛数年，直腿抬高试验(+)，加强试验(-)。查体:左拇指背伸无力。最可能的原因是

2023 年临床执业历年真题

- A. L4-L5, L5 神经根受压
- B. L3-L4, L4 神经根受压
- C. L2-L3, L3 神经根受压
- D. S1-S2, S2 神经根受压
- E. L5-S1, S1 神经根受压

60. 我国正常血压标准是

- A. 低于 130/85mmHg
- B. 低于 140/90mmHg
- C. 低于 150/90mmHg
- D. 低于 139/89mmHg
- E. 低于 120/80mmHg

61. 女性, 62 岁, 确诊糖尿病多年, 胰岛素 30R, 早 18 单位, 晚 16 单位, 餐前半小时给药。晚餐后两小时血糖 6.7mmol/L, 晚上感饥饿, 头晕, 第二天空腹血糖 10.2mmol/L, 为了降低空腹血糖, 应该调整的是

- A. 加用二甲双胍
- B. 减少晚餐前胰岛素用量
- C. 增加早餐前胰岛素用量
- D. 减少晚餐量
- E. 晚餐后运动

62. 男, 61 岁, 摔倒致左臀部着地 5 小时, 左髋部疼痛肿胀, 活动障碍, 查体: 左下肢外旋 60°, 较健侧缩短 2cm, 左侧腹股沟区压痛阳性, 左侧大转子叩击痛阳性, 考虑为诊断为下列哪种疾病

- A. 髋关节前脱位
- B. 股骨干骨折
- C. 股骨颈骨折
- D. 股骨转子间骨折
- E. 髋关节后脱位

63. 甲状腺癌颈部淋巴结最小的清扫范围是

- A. VI
- B. II

- C. III
- D. IV
- E. V

64. 患者女性, 19 岁, 因甲状腺肿大就诊, 查甲状腺 II 度肿大, 无结节, TSH 在正常范围, 甲状腺功能正常, 可能的诊断是

- A. 甲状腺功能亢进
- B. 单纯性甲状腺肿
- C. 慢性甲状腺炎
- D. 亚急性甲状腺炎
- E. 甲状腺功能减退

65. 糖尿病患者遵从医嘱服药的强化因素是

- A. 经济条件足以支付较高的医药费
- B. 在按医嘱服药后血糖得到有效控制
- C. 能方便地就医、取药
- D. 对治疗高血糖采取积极态度
- E. 知晓服药能有效控制血糖

66. 女性, 尿频、尿急尿痛伴肉眼血尿 1 天, 既往体健。查体无异常。亚硝酸阳性, 尿沉渣检查提示红白细胞满视野, 抗生素疗程一般为多少天

- A. 14 天
- B. 3 天
- C. 5 天
- D. 7 天
- E. 10 天

67. 有研究员的单盲的实验中, 针对甲类, 乙类药物对轻中度原发性高血压降压疗效, 对分组不了解的是

- A. 研究员
- B. 统计人员
- C. 患者本人
- D. 患者家属
- E. 测血压的护理人员

2023 年临床执业历年真题

68. 女，40 岁，因甲亢药物治疗 2 年未控制，改用¹³¹I 治疗。¹³¹I 治疗 2 天后突感高热、心悸，伴恶心呕吐。查体：T40℃，呼吸急促，大汗淋漓，P160 次/分，律齐。最可能的诊断是

- A. 甲亢复发
- B. 甲状腺危象
- C. 感染中毒性休克
- D. 神经中枢系统感染
- E. 放射性甲状腺炎

69. 男，29 岁，2 型糖尿病，BMI 32kg/m²，腹围 90cm，医生建议锻炼，其最适合的锻炼方式

- A. 游泳
- B. 跳绳
- C. 跑步
- D. 举重
- E. 拔河

70. 锁骨骨折不需要手术的是

- A. 锁骨中部 2/3 对位
- B. 锁骨远端伴喙突韧带损伤
- C. 不能耐受八字绷带包扎
- D. 开放性损伤后三小时
- E. 陈旧性骨折不愈合

71. 女性，54 岁，心悸气短十年，加重伴大咯血一天，查体：颈静脉怒张，双肺可闻及湿啰音，心率 120 次/分钟，心律不齐，第一心音亢进可听见开瓣音，P₂ 亢进，心尖部舒张期隆隆样杂音，双下肢轻度水肿，心电图示心房颤动伴快心室率，胸部 x 线片示心影呈梨形心。应首选治疗药物是

- A. β 受体拮抗剂
- B. 利尿剂
- C. 普罗帕酮
- D. 美西律
- E. 西地兰

72. 女，65 岁，糖尿病 12 年，视物模糊 3 月。眼底检查：眼底微血管瘤，少量出血伴棉絮状软性渗出。患者糖尿病视网膜病变分期是

- A. IV 期
- B. II 期
- C. III 期
- D. I 期
- E. V 期

73. 男，23 岁，高处摔下后右手着地，伤后右前臂畸形，活动受限。查体：右前臂畸形，肿胀，桡骨中下 1/3 交界处可触及骨擦感，腕部可触及异常凸起的尺骨远端，未及尺骨摩擦感，最可能的诊断是

- A. Smith 骨折
- B. Monteggia 骨折
- C. Colles 骨折
- D. Barton 骨折
- E. Galeazzi 骨折

74. 女，22 岁，睡眠差，食欲差，体重增加半年月经不规律，伴经期延长。查体：BP140/90mmHg，满月脸，向心性肥胖，腹部及大腿内侧可见紫纹。该患者实验室检查最有可能异常的结果是

- A. 脂肪酸水平下降
- B. 血钠水平下降
- C. 血钾水平下降
- D. 红细胞数量减少
- E. 血糖水平下降

75. 碱性尿液中常见的结石类型

- A. 草酸盐结石
- B. 尿酸结石
- C. 胱氨酸结石
- D. 磷酸盐结石
- E. 黄嘌呤结石

2023 年临床执业历年真题

76. 肺通气的原动力是

- A. 胸内压的变化
- B. 肺主动舒缩
- C. 外界环境与肺内压力差
- D. 呼吸肌的舒缩
- E. 肺泡表面活性物质的作用

77. 男, 68 岁。陈旧性前壁心肌梗死 5 年, 劳累后心悸、气短 3 年, 双下肢水肿半年, 近 1 周气短加重, 体力活动明显受限, 从事一般家务活动即感喘憋, 入院时心电图与 2 月前相比无变化, 该患者的心功能分级为

- A. NYHA 分级 I 级
- B. Killip 分级 II 级
- C. NYHA 分级 II 级
- D. NYHA 分级 III 级
- E. NYHA 分级 IV 级。

78. 慢性阻塞性肺疾病最核心的特征是

- A. 长期大量吸烟史
- B. 气流持续受限
- C. 受季节相关的症状反复发作
- D. 慢性咳嗽、咳痰症状
- E. 小气道功能障碍

79. 患者男, 50 岁, 1 年来心慌胸闷气短, 近 1 月来加重, 入院后查体, R120 次/分, 心音低钝, 遥远, Ewart 征阳性, 超声提示室间隔不同步, 下列最可能的治疗措施是

- A. 球囊扩张
- B. 心包穿刺术
- C. 手术治疗
- D. 静脉注射呋塞米
- E. 静脉注射胺碘酮

80. 女, 59 岁。因高热、腹泻静脉点滴庆大霉素治疗, 5 天后出现恶心、呕吐、伴少尿。查血白细胞总数及分类正常, 尿比重 1.010, 蛋白(+), 红

细胞 0~2/HP, 白细胞 3~5/HP。血肌酐 320 μ mol/L, 尿素氮 17mmol/L, 尿钠 100mmol/L。该患者肾功能减退最可能的原因是

- A. 急性肾小管坏死
- B. 急性肾小球肾炎
- C. 肾前性氮质血症
- D. 急进性肾小球肾炎
- E. 急性间质性肾炎

81. 男, 40 岁, 股骨干骨折入院, 入院次日突然出现呼吸困难, 继而昏迷, 广泛皮下出血点, 血压 80/60mmHg, 应考虑为

- A. 脂肪栓塞
- B. 骨筋膜室综合征
- C. 骨折端再发严重移位
- D. 感染
- E. 大血管破裂

82. 对于明确肺结核是否有传染性最有帮助的事

- A. 结核菌素试验
- B. 痰涂片抗酸染色
- C. γ -干扰素释放试验
- D. 胸部 CT
- E. 抗结核抗体

83. 与急性肾小球肾炎感染有关的细菌是

- A. 肺炎链球菌
- B. A 组 β 溶血性链球菌
- C. B 组 β 溶血性链球菌
- D. 金黄色葡萄球菌
- E. 草绿色链球菌

84. 确诊甲状旁腺亢进, 可以用下列哪项检查

- A. 纵隔 CT
- B. 颈部 CT
- C. 颈部 99mTcMIBI

2023 年临床执业历年真题

D. 颈部超声

E. 颈部 MRI

85. 导致抗利尿激素分泌异常的肺癌类型是

- A. 大细胞癌
- B. 小细胞癌
- C. 肉瘤样癌
- D. 腺癌
- E. 鳞癌

86. 男，外伤，24 小时后到院检查，血压 150/100mmHg，体温 37.8℃，骨盆分离试验阳性，问病人发热的主要原因

- A. 泌尿系感染
- B. 休克
- C. 肺炎
- D. 肺栓塞
- E. 骨血肿吸收热

87. 女性患者，血压 190/110，B 超提示左肾动脉狭窄 55%，右肾动脉狭窄 50%，可能是什么原因导致血压升高

- A. 激活交感神经系统
- B. 激活肾素-血管紧张素-醛固酮系统
- C. 激活激肽系统
- D. 血管加压素升高
- E. 心房利钠肽升高

88. 男性患者，高处坠落，腰背挫伤，双下肢弛缓瘫痪，来院急诊。查体：腰部不能活动，双侧腹股沟以下感觉、运动及反射消失。X 线检查未见明显异常。1 天后其双下肢功能逐渐恢复。该患者的脊髓伤可能是

- A. 脊髓横断损伤
- B. 脊髓半切综合征
- C. 脊髓空洞症
- D. 脊髓震荡
- E. 马尾综合征

89. 女性，62 岁，左腰痛伴发热 5 天，最高体温 39.2℃，抗生素治疗体温无明显下降，左肾区叩击痛，心率 102 次/分，血压 110/75mmHg。血常规：白细胞 $15.3 \times 10^9/L$ ，NO.85，尿沉渣：白细胞满视野，RBC 3-5/HP。泌尿 CT 平扫：左肾扩张积水，左输尿管上段 1.2cm 结石，下一步治疗措施是

- A. 体外冲击波碎石
- B. 输尿管镜取石
- C. 尿道逆行置管术
- D. 膀胱输尿管镜取石
- E. 经皮肾镜取石

90. 男，50 岁，发作性胸痛 1 月，常于凌晨 3 点左右发作，白天活动无特殊不适，Holter 提示胸部导联 ST 段抬高，症状休息后缓解，多次查 cTn 正常，冠脉 CTA 提示前降支轻度狭窄。患者长期治疗最佳的是什么

- A. 尼可地尔
- B. 曲美他嗪
- C. 美托洛尔
- D. 卡托普利
- E. 地尔硫草

91. 男，45 岁，跑步中跌倒，左肩着地，局部疼痛 1 小时，查体：左肩肿胀，未见方肩畸形，无弹性固定，Dugas 征阴性，X 线片示左肱骨外科颈骨质不连续，大结节移位 1.5cm，请问该骨折类型是

- A. Neer 一部分骨折
- B. Neer 二部分骨折
- C. Neer 三部分骨折
- D. Neer 四部分骨折
- E. 肩关节脱位

92. 急性心肌梗死行 PCI 手术治疗的抗血小板药物用量用法

2023 年临床执业历年真题

- A. 阿司匹林 300mg+氯吡格雷 450mg
- B. 阿司匹林 100mg+氯吡格雷 300mg
- C. 阿司匹林 100mg+氯吡格雷 600mg
- D. 阿司匹林 300mg+氯吡格雷 300mg
- E. 阿司匹林 300mg+氯吡格雷 600mg

93. 女, 16 岁, 随旅行团到边远地区旅游, 晚饭后发生腹痛, 腹泻, 一天腹泻 4 次, 于当地卫生院治疗后好转, 第二天烈日下阳光照射后皮肤出现红斑, 瘙痒。可能是什么治疗药物的不良反应

- A. 庆大霉素
- B. 头孢他啶
- C. 盐酸小檗碱
- D. 氧氟沙星
- E. 阿奇霉素

94. 大量心包积液的典型体征是

- A. 奇脉
- B. 心音遥远
- C. 颈静脉怒张
- D. 低血压
- E. 口唇发绀

95. 女, 32 岁, 怕冷, 嗜睡两个月余。查体: 脉搏 56 次/分, 眼睑水肿, 甲状腺弥漫性肿大, 质地韧。最可能的甲状腺功能表现是

- A. TT3 正常, TT4 正常, TSH 减少
- B. TT3 下降, TT4 下降, TSH 增加
- C. TT3 增加, TT4 增加, TSH 减少
- D. TT3 增加, TT4 增加, TSH 增加
- E. TT3 正常, TT4 正常, TSH 增加

96. 不具有内分泌功能的细胞是

- A. 胰腺导管细胞
- B. 甲状腺细胞
- C. 肾上腺髓质细胞
- D. 甲状旁腺细胞
- E. 胃黏膜 G 细胞

97. 桡神经深支受损表现

- A. 虎口感觉障碍
- B. 垂腕
- C. 尺侧一个半手指感觉缺失
- D. 不能对掌
- E. 手掌桡侧 3 个半手指掌面感觉障碍

98. 男, 18 岁, 因“感冒”后自行服用抗菌药物半小时后突然出汗、面色苍白。查体: 血压 40/20mmHg, 神志不清, 面色苍白, 脉搏细速, 四肢冰冷, 发绀, 该患者首要治疗措施是

- A. 地塞米松静滴
- B. 肾上腺素肌肉注射
- C. 多巴胺静滴
- D. 观察
- E. 吸氧、心电监护

99. 女性, 30 岁, 间断右腹痛 1 周, 加重伴尿频、尿急 1 天。查体: 右肾区叩击痛阳性, 检查: 尿 RBC(++), 右肾积水, 集合系统 1.0cm, 考虑尿路结石, 结石可能在

- A. 肾小管和肾盂交界处
- B. 肾盂输尿管口
- C. 输尿管下段
- D. 肾结石
- E. 膀胱壁内

A3/A4 型选择题

(100~101 题共用题干)

女性 20 岁, 口干、多饮, 多尿半月。每日尿量 7-8L。尿常规提示: 血糖: 4.8ml/l, 比重: 1.007。禁水试验后尿量无明显减少。测量渗透压, 血浆渗透压 305mosm/L, 尿液渗透压: 200mosm/L。静脉注射垂体后叶素后, 尿量明显减少, 测渗透压: 血浆: 300mosm/L。尿渗透压: 550mosm/L。

100. 考虑以下哪种疾病

2023 年临床执业历年真题

- A. 完全中枢性尿崩症
- B. 完全肾性尿崩症
- C. 部分中枢性尿崩症
- D. 部分肾性尿崩症
- E. 神经性烦渴

101. 应首选药物

- A. 氯丙嗪
- B. 氯磺苯胺
- C. 氢氯噻嗪
- D. 去氨加压素
- E. 卡马西平

(102~103 题共用题干)

男性，42 岁。腹胀伴乏力 2 天。突发胸痛 5 小时。既往高脂血症病史 2 年，未治疗。查体：P:68 次/分，Bp120/78mmhg，心肺腹未见异常。血 cTnT:0.83mg/fl，D-DIMER:0.3g/l，心电图 I、av1、V₅-V₆ 导联 ST 段压低 0.2mv。

102. 请问目前考虑什么诊断

- A. 急性肺动脉梗死
- B. 急性心肌梗死
- C. 主动脉夹层
- D. 急性心肌炎
- E. 急性心包炎

103. 为进一步明确诊断应进行什么检查

- A. 超声心动图
- B. 冠状动脉造影
- C. 肺动脉 CTA
- D. 主动脉 CTA
- E. 心脏核磁共振

(104~105 题共用题干)

患者肾衰竭五期，定期行透析治疗，每周 3 次，未次透析时间为 2 天前，出现胸闷不适，四肢乏力伴口周发麻 2 天，心率 43 次/分。近两日进食橘

子约 1kg。

104. 出现上述症状原因

- A. 高钾血症
- B. 高磷血症
- C. 代谢性酸中毒
- D. 低钙血症
- E. 高钙血症

105. 治疗最有效的是

- A. 血液透析
- B. 阳离子交换树脂
- C. 注射钙剂
- D. 大量激素
- E. 利尿剂

(106~107 题共用题干)

男，22 岁，全身进行性水肿 10 天，既往体健。查体：BP:120/80mmhg，双下肢及颜面部凹陷性水肿。实验室检查：血浆白蛋白 20g/L；尿蛋白:4.8g/d；尿沉渣检测：RBC:8~10/HP；血 Cr73 μmol/L；血胆固醇:8.2mmo/L。

106. 可能考虑的诊断：

- A. 急性肾小球肾炎
- B. 肾病综合征
- C. 急性间质性肾炎
- D. 慢性肾小球肾炎
- E. 急进性肾小球肾炎

107. 下列治疗措施中，错误的是

- A. 低分子肝素抗凝
- B. 静脉补充大量白蛋白
- C. 利尿治疗
- D. 限制盐摄入
- E. 根据肾活检病理决定下一步治疗措施

(108~109 题共用题干)

男，56 岁，体检发现空腹血糖 8mmol/L，餐后 2 小时血糖 18mmol/L，血清甘油三酯 4.5mmol/L，低密度脂

2023 年临床执业历年真题

蛋白 3.1mmol/L, 半年来体重下降 5kg, 查体 BP160/100mmHg, BMI30, 心肺腹查体无阳性发现。

108. 该患者降低血脂首选的药物是

- A. 贝特类
- B. 维生素
- C. 烟酸类
- D. 他汀类
- E. 树脂类

109. 首选的降血糖药物是

- A. 瑞格列奈
- B. 阿卡波糖
- C. 二甲双胍
- D. 格列喹酮
- E. 罗格列酮

(110~111 题共用题干)

女, 75 岁, 因胃癌晚期合并幽门梗阻行胃肠减压。近 5 天来引出胃液约 900ml/d, 每日给予葡萄糖盐水 1500ml。查体: T37.3°C, P 108 次/分, R15 次/分, BP102/60mmHg。动脉血气分析: pH7.56, HCO₃-46mmol/L, BE+7mmol/L。

110. 进一步治疗措施不正确的是

- A. 中心静脉补充稀释盐酸溶液
- B. 择机行姑息性胃肠短路手术
- C. 静脉滴注 NaHCO₃ 溶液
- D. 尿量超过 40ml/h 补充离子
- E. 每 4-6h 监测血气分析和电解质

111. 该患者最可能合并的酸碱平衡失调是

- A. 呼吸性碱中毒
- B. 呼吸酸中毒
- C. 代谢性酸中毒
- D. 代谢性碱中毒
- E. 混合性酸中毒

(112~113 题共用题干)

女, 16 岁, 心慌、多汗 2 年, 体重下降 5kg, 大便次数增加, 3-4 次/日, 不成形, 月经 2-3 月一次, 量少。查体:P:100 次/分, 血压 120/80mmHg, 无突眼, 甲状腺 I 度肿大。实验室检查:TT3:8.6mmol/L, TT4:220mmol/L, TSH 小于 0.001。

112. 下列哪项有助于病因诊断

- A. FT3
- B. TRAb
- C. TgAb
- D. TPOAb
- E. Tg

113. 该患者所患疾病

- A. 桥本氏甲状腺炎
- B. 亚急性甲状腺炎
- C. 弥漫性毒性甲状腺肿
- D. 单纯性甲状腺肿
- E. 甲状腺癌

(114~115 题共用题干)

男, 40 岁, 水肿, 少尿 2 周, 血压 160/100mmHg, 肌酐 300 μmol/L, 尿蛋白 2g/d, 镜下红细胞 20-30/HP, 病理检查肾小球呈新月体征, 免疫荧光有线型分布。

114. 诊断为

- A. 急进性肾小球肾炎 I 型
- B. 急进性肾小球肾炎 II 型
- C. 急进性肾小球肾炎 III 型
- D. 肾病综合征
- E. 急性肾小球肾炎

115. 治疗首选

- A. 血浆置换
- B. 泼尼松
- C. 泼尼松+免疫抑制剂
- D. 血液透析
- E. 泼尼松+细胞毒药物

2023 年临床执业历年真题

(116~118 题共用题干)

儿童, 7 岁, 左膝疼痛 3 天, 寒战高热 1 天, 查体: T 39.5°C, 左侧股骨下段近关节处肿胀疼痛, 查体明显压痛, 浮髌试验阴性。实验室检查: 血 WBC 22×10⁹/L, NO. 86。

116. 最可能的诊断是

- A. 化脓性关节炎
- B. 骨巨细胞瘤
- C. 骨肉瘤
- D. 急性血源性骨髓炎
- E. 膝关节结核

117. 早期诊断最有价值的检查方法是

- A. 局部脓肿分层穿刺
- B. 核素骨显像
- C. CT
- D. 超声
- E. 关节镜

118. 治疗首选的抗生素

- A. 三代头孢
- B. 青霉素
- C. 氧氟沙星
- D. 庆大霉素
- E. 克林霉素

(119~120 题共用题干)

男, 22 岁, 2 小时前骑自行车不慎摔倒骑跨在车梁上, 会阴部肿胀痛, 尿道口滴血。查体: 生命体征稳定, 会阴部肿胀, 可见瘀斑。急诊用 16 号导尿管可插入尿道膀胱, 导出清亮液体。

119. 最可能的诊断是

- A. 尿道膜部挫伤
- B. 尿道球部损伤
- C. 尿道海绵体损伤
- D. 前列腺损伤
- E. 膀胱破裂

120. 下一步处理的方法

- A. 留置尿管 24 小时后手术
- B. 立即手术
- C. 留置尿管 24 小时后拔出, 让其自由排尿
- D. 留置尿管 2 周, 拔管后尿道扩张
- E. 留置尿管尿管 72 小时后拔出, 每周扩张尿道一次

(121~122 题共用题干)

男, 35 岁, 低热 1 月余, 咳嗽, 痰中带血 3 天。2 年前患胸膜炎, 经治疗后好转。胸片: 左肺不规则阴影, 左侧肋膈角变钝。血 WBC 8.0×10⁹/L, NO. 78, ESR 30mm/h。

121. 为明确治疗方案, 需重点了解的情况是

- A. 胸膜炎治疗情况
- B. 青霉素过敏史
- C. 家族遗传史
- D. 体重变化情况
- E. 此前健康体检情况

122. 为明确诊断首选检查

- A. 胸部 CT
- B. 痰涂片抗酸染色
- C. 支气管镜
- D. γ -干扰素释放实验
- E. 血清肿瘤标志物

(123~124 题共用题干)

女, 65 岁, 近日突发呼吸困难, 咳粉红色泡沫痰, 既往冠心病史 10 年, 查体: 血压 150/85mmHg, 心率 102 次/分, S₃ 奔马律, 肝颈静脉回流征阳性, 两肺下叶湿性罗音。

123. 最可能的诊断为

- A. 全心衰
- B. 右心衰
- C. 左心衰
- D. 严重心血管病变
- E. 肺部感染

124. 为明确病因, 首选检查是

- A. 冠状动脉造影
- B. 动态心电图
- C. 动态心电图平板实验
- D. 超声心动图
- E. CT 肺动脉造影

(125~126 题共用题干)

患者 45 岁, 胸闷气短数年, 2 日前开始出现憋喘、咯血, 咳粉红色痰, 心电图示房颤, 心超显示, 左心房内径 56mm, 二尖瓣口面积 1.0cm², 成墙垛样改变。

125. 考虑诊断为

- A. 急性肺栓塞
- B. 急性心肌梗死
- C. 支气管扩张
- D. 二尖瓣狭窄
- E. 二尖瓣关闭不全

126. 下列治疗不正确的是

- A. 利尿剂
- B. 球囊扩张术
- C. 阿司匹林抗血小板
- D. 硝酸酯扩冠脉
- E. 洋地黄

(127~128 题共用题干)

男, 61 岁, 反复咳嗽咳痰十年, 劳力性气促五年, 发热三天, 意识不清半小时。吸烟 43 年, 30 只/日, 查体: BP96/76mmHg, SpO₂ 87%, 浅昏迷状态, 球结膜水肿, 颈软无抵抗, 双肺呼吸音低, 双下肺可闻及湿罗音, 剑突下可触及心脏搏动, 心率 110 次/分, 律齐, 各瓣膜听诊区未闻及杂音, 双下肢中度水肿, 病理征阴性。

127. 导致该患者意识不清最可能的原因是

- A. 急性脑血管病

- B. 心力衰竭
- C. 肺血栓栓塞症
- D. 肺性脑病
- E. 颅内感染

128. 目前最主要的治疗措施

- A. 高流量面罩吸氧
- B. 面罩吸氧
- C. 机械通气
- D. 高流量氧气湿润治疗
- E. 鼻导管低流量吸氧

(129~130 题共用题干)

女, 16 岁, 胸痛 3 个月, 血压 115/90mmHg, 呼吸 20 次/分, 右肺呼吸音稍低, 余未见异常。查 X 线发现右侧胸部椭圆形肿物, 肺肋隔角尖锐。CT 显示左前纵隔巨大肿物, 边缘清晰, 光整, 密度不均, 伴有液性暗区及高密度钙化影, 将纵隔、心脏推向左侧。其余未见异常

129. 考虑诊断是

- A. 前纵隔畸胎瘤
- B. 肺错构瘤
- C. 肺癌
- D. 前纵隔淋巴瘤
- E. 纵膈结核

130. 治疗首选

- A. 手术
- B. 化疗
- C. 放疗
- D. 密切观察
- E. 介入栓塞

(131~132 题共用题干)

64 岁男性, 进行性右侧睾丸肿大一年, 无疼痛, 行走不便。查体: 睾丸 6×5×4cm, 无压痛, 右侧睾丸及附睾未触及, 透光试验阳性, 平卧后不变。

131. 诊断为

2023 年临床执业历年真题

- A. 睾丸鞘膜积液
- B. 睾丸肿瘤
- C. 精索鞘膜积液
- D. 腹股沟斜疝
- E. 交通性鞘膜积液

132. 首选的治疗

- A. 右侧斜疝修补
- B. 右侧鞘膜翻转
- C. 右侧睾丸切除
- D. 右侧阴囊穿刺
- E. 观察

(133~134 题共用题干)

男, 45 岁, 反复发作性干咳伴胸闷 5 年, 多于春季发病, 无发热, 咯血及夜间阵发性呼吸困难, 胸片检查无异常, 抗生素治疗不佳, 无高血压病史。

133. 为明确诊断, 首选的检查是

- A. 胸部 X 线
- B. 胸部 CT
- C. 心脏彩超
- D. 支气管镜检查
- E. 支气管激发试验

134. 反应病情加重的表现是

- A. 脉压增加
- B. 呼气相延长
- C. 呼吸性酸中毒
- D. 胸腹矛盾运动
- E. 烦躁不安

B1 型选择题

(135~136 题共用备选答案)

- A. 高血压急症
- B. 高血压亚急症
- C. 顽固高血压
- D. 高血压危象
- E. 恶性高血压

135. 男, 37 岁, 血压升高 5 年余, 平素血压 160-180/100-120mmHg, 未诊

治。体型肥胖, 有打鼾史。半年前开始在医生的指导下进行低脂饮食控制和药物治疗, 硝苯地平缓释片 60mg 每日一次, 厄贝沙坦片每次 150mg, 每日两次, 托拉塞米 5mg, 经过三个月的治疗, 血压控制在 150-160/90-100mmHg, 该患者为

136. 男, 56 岁, 血压升高 3 年, 呼吸困难 1 周, 加重 1 天。患者 1 周前无明显诱因出现活动时喘憋, 1 天前出现呼吸困难, 端坐呼吸, 伴大汗, 有高血压家族史。查体:P:100 次/分, BP230/150mmHg, 端坐位喘息貌, 双肺可闻及中小水泡音, 心率 100 次/分, 律齐, 各瓣膜区未闻及杂音, 双下肢不肿。心电图提示左室肥厚劳损。该患者目前的情况为

(137~138 题共用备选答案)

- A. 呋塞米
- B. 阿司匹林
- C. 华法林
- D. 地尔硫卓
- E. 地高辛

137. 女, 76 岁, 扩张型心肌病, 持续房颤, 慢性心力衰竭, 为增加营养一周前开始每天加饮用牛奶 500ml, 3 天前出现下肢水肿及气短, 除了限制入量, 能够短期控制症状的是

138. 女, 76 岁, 扩张型心肌病, 持续房颤, 给予 β 受体阻滞剂后血压偏低但心室率仍偏快, 应该加用控制心室率的药物是

(139~140 题共用备选答案)

- A. 颈静脉搏动
- B. 下肢水肿
- C. 多浆膜腔积液
- D. 双肺底对称性细湿罗音

2023 年临床执业历年真题

E. 肝颈静脉回流征阳性

139. 肺循环淤血的体征是

140. 右心衰的最可靠体征是

(141~142 题共用备选答案)

A. 髋关节后脱位

B. 膝关节后脱位

C. 肘关节后脱位

D. 桡骨小头半脱位

E. 肩关节前脱位

141. 适合 Allis 法治疗的是

142. 适合用 Hippocrates 手法复位的是

(143~144 题共用备选答案)

A. T1 期

B. T2 期

C. T3a 期

D. T3b 期

E. T4 期

143. 患者前列腺特异性抗原阴性, 经尿道前列腺切除术后病理活检发现前列腺癌病灶, 可能的分期是

144. 前列腺癌根治术后, 病理报告突破两侧包膜, 未侵犯精囊, 最可能的分期是

(145~146 题共用备选答案)

A. 降低心室前负荷

B. 降低心室后负荷

C. 降低心室前后负荷

D. 降低心肌收缩力

E. 增加心排血量

145. 呋塞米的作用是

146. 硝普钠的作用是

(147~148 题共用备选答案)

A. 肺泡耗氧量增加

B. 动静脉分流增加

C. 弥散功能障碍

D. 肺泡通气不足

E. 通气/血流比例失调

147. COPD 发生 II 型呼吸衰竭的主要机制是什么

148. 引起急性肺栓塞发生 I 型呼吸衰竭最重要的机制是

(149~150 题共用备选答案)

A. 肾活检

B. 肾动脉造影

C. 肾 B 超

D. 肾 CT

E. 肾盂造影

149. 确诊 IgA 肾病的检查方法

150. 鉴别急慢性肾衰竭, 首选的检查方法

第三单元

A1/A2 型选择题

1. 男性, 48 岁, 右上腹胀痛 4 月, 伴乏力, 无恶心、呕吐、发热, 自发病以来, 尿色稍黄, 既往饮白酒 10 年余, 约 150-200ml/d。查体: 精神差, 巩膜轻度黄染, 无肝掌、蜘蛛痣, 心肺无异常, 腹软, 无压痛, 肝脾未触及, 移动性浊音(-), 实验室检查: ALT35, AST25, HBsAg(-), 抗 HCV(-), B 超: 肝实质回声弥漫密集增强, 远场回声明显衰减, 最适宜的治疗是

A. 泼尼松治疗

B. 营养支持

C. 抗肝纤维化治疗

D. 戒酒

E. 保肝药物治疗

2023 年临床执业历年真题

2. 男, 33 岁, 右上腹胀痛伴寒战、高热 6 小时。查体: $T39.9^{\circ}\text{C}$, 皮肤黏膜无黄染, 右上腹压痛, 轻度及紧张, 无明显反跳痛。WBC $18 \times 10^9/\text{L}$, NO. 85, 腹部立位平片, 右侧膈肌抬高。B 超: 肝右后下方可见 8cm 液性暗区。以下最有价值的检查

- A. 肝核素扫描
- B. 腹部 CT
- C. 肝动静脉造影
- D. 超声下肝穿刺
- E. 血培养

3. 有助于确诊 PNH 的实验室检查是

- A. 流式细胞学技术
- B. 骨髓细胞学检查
- C. 粒细胞 *flaer* 测定
- D. 网织红细胞计数
- E. 外周血有核红细胞数

4. 女, 75 岁, 咯血 10 天, 每日咯血量约 20ml, 既往发作两次, 抗感染治疗后好转。患者肺 CT 如下所示(双肺支气管扩张), 目前首选的治疗是

- A. 手术治疗
- B. 止血药物
- C. 抗感染治疗
- D. 支气管动脉栓塞
- E. 垂体后叶素

5. 女, 55, 反复腹痛, 乏力, 既往有乙肝病史 30 年。查体: 神志清, 肝肋下 3cm, 腹部移动性阴性。实验室: 总胆红素 $30 \mu\text{mol}/\text{L}$, $\text{Alb}20\text{g}/\text{L}$, $\text{PT}19.1$, B 超: 肝右前叶见 $4\text{cm} \times 3\text{cm}$, 实性, 该如何治疗

- A. 化疗
- B. 动脉栓塞
- C. 靶向治疗
- D. 手术
- E. 无水乙醇注射

6. 丙型肝炎抗病毒治疗应选择

- A. 干扰素
- B. 更昔洛韦
- C. 核苷酸类似物
- D. 拉米呋定
- E. 抗生素

7. 消化性溃疡合并出血常见于

- A. 急性胃黏膜病变
- B. 胃溃疡
- C. 十二指肠球部溃疡
- D. 胃癌
- E. 慢性胃炎

8. 男, 65 岁。间歇性乏力、腹胀 3 年, 加重 2 个月。限盐利尿治疗后腹胀无明显缓解。查体: $T36.8^{\circ}\text{C}$, $\text{BP}120/80\text{mmHg}$ 。巩膜黄染, 可见肝掌、蜘蛛痣。腹膨隆, 无压痛, 肝脾肋下未及, 移动性浊音阳性。双下肢可见非凹陷性水肿。血清白蛋白 $19\text{g}/\text{L}$, 血钾 $3.7\text{mmol}/\text{L}$, 血钠 $136\text{mmol}/\text{L}$ 。接下来最为恰当的治疗措施是

- A. 腹腔置管持续引流腹腔积液
- B. 静脉输注白蛋白后利尿
- C. 继续利尿限盐
- D. 腹水培养, 用敏感抗生素
- E. 经颈静脉肝内门腔分流术

9. 男性 2 岁, 哭闹、腹痛 18 天, 果酱样大便 2 次, 查体: 右上腹触及“腊肠样”包块, 轻微压痛, 右下腹空虚, 肠鸣音亢进。腹部 B 超: 右上腹包块为“靶环征”。最佳诊断为

- A. 基因肠系膜淋巴结炎
- B. 急性阑尾炎
- C. 小肠扭转
- D. 肠套叠
- E. 肠蛔虫

2023 年临床执业历年真题

10. 功能性消化不良定义

- A. 症状 12 个月，连续 3 个月
- B. 症状 6 个月，连续 2 个月
- C. 症状 12 个月，连续 2 个月
- D. 症状 6 个月，连续 3 个月
- E. 症状 12 个月

11. 确诊流行性乙型脑炎常检查的抗体是

- A. IgM
- B. IgE
- C. IgG
- D. IgC
- E. IgB

12. 下列属于原发性腹膜炎的是

- A. 小肠穿孔
- B. 女性生殖道细菌上行感染
- C. 胆管吻合术漏
- D. 胃溃疡穿孔
- E. 结肠穿孔

13. 男，32 岁，低热、乏力伴腹胀 2 周，既往乙肝肝硬化病史 5 年，出现腹腔积液 1 年，无外伤史，无溃疡史，超声检查：腹腔大量腹水，肝脏淤血改变，胆囊、胰腺未见异常，脾脏肿大。腹腔积液检查：淡黄色，比重 1.017，蛋白 26g/L，白细胞 500x10⁶/L，中性粒细胞 0.80，最可能的诊断是肝硬化合并

- A. 胆汁性腹膜炎
- B. 自发性腹膜炎
- C. 结核性腹膜炎
- D. 外伤性胰腺炎
- E. 门静脉血栓形成

14. 女性，40 岁，既往体健。突发胸痛，肺压缩 30%，经胸腔穿刺后肺压缩仍为 30%。接下来应怎样治疗

- A. 胸腔穿刺

B. 胸膜固定术

C. 胸腔闭式引流

D. 手术

E. 心包穿刺

15. 男，40 岁。体重 60kg，右上肢肩关节以下右下肢膝关节以下烧伤，深度为浅 I 度至深 II 度，右足部烧伤深度为 II 度。该患者第一个 24 小时的补液量应为

- A. 2500ml
- B. 1800ml
- C. 2000ml
- D. 3700ml
- E. 4300ml

16. 男，42 岁，腹痛，腹胀伴肛门停止排气排便 2 天。禁食，补液治疗，今晨突发腹痛加剧。既往行阑尾切除术 10 年余。查体：全腹压痛，反跳痛，肌紧张，肠鸣音消失。最好的处理方法是

- A. 手术探查
- B. 持续性胃肠减压
- C. 解痉药物治疗
- D. 足量抗生素
- E. 空气灌肠

17. 男，64 岁，上腹痛 5 小时，既往胆囊多发结石，T:38.5°C，P: 100 次/分，血压：85/60mmHg 查体：上腹压痛，肌紧张，皮肤巩膜黄染。超声提示：胆总管上段扩张，下段显示不清，结石可能嵌顿的位置是

- A. 右肝管
- B. 左肝管
- C. 肝总管
- D. 胆总管
- E. 胆囊管

18. 育龄期女性，产后 4 周，一直母乳

2023 年临床执业历年真题

喂养，乳房出现红肿，表面皮温升高，无波动感，以下处理首选

- A. 切开引流
- B. 立即停止哺乳
- C. 立即使用抗生素
- D. 热敷，按摩乳房，促进乳汁排出
- E. 等待药敏结果出来后再行抗生素治疗

19. 患者女性，16 岁，甲状腺肿大，甲状腺摄碘率 2 小时 15%，24 小时 35%，可能的疾病是

- A. 甲状腺功能减退
- B. 甲状腺功能亢进
- C. 桥本甲状腺炎
- D. 生理性甲状腺肿
- E. 结节性甲状腺肿

20. 男，25 岁，因车祸伤致肝破裂，腹腔出血，失血性休克，经急诊手术后，腹腔出血得到控制，并给予充分补液。但患者中心静脉压 5cmH₂O，血压 90/60mmHg，并没有得到改善，接下来的处理是

- A. 继续补液
- B. 补液试验
- C. 给予强心剂
- D. 给予血管扩张剂
- E. 给予糖皮质激素

21. 女，50 岁，月经不规则 2 年余，阴道不规则流血 20 天，查体贫血貌，子宫稍大，无压痛，稍软，为明确诊断，应选择的检查是

- A. 尿 HCG 测定
- B. 盆腔 CT
- C. 分段诊刮
- D. 盆腔 B 超
- E. 阴道镜检查

22. 女，25 岁，发现右乳肿块两年。

无乳房红肿，疼痛，乳头溢液，无发热。查体：双乳外观无明显异常，右乳外上象限可触及大小 2.0cm×1.5cm 肿块，质地中等，光滑，活动，边界清楚。应如何治疗

- A. 局部理疗
- B. 密切观察
- C. 针灸治疗
- D. 手术切除
- E. 中药逍遥散

23. 男，34 岁，胃大部切除术后，出现镜面舌，查血常规：WBC $3.1 \times 10^9/L$ ，Hb68g/L，PLT $40 \times 10^9/L$ ，MCV>130fl，网织红细胞 0.5%，骨髓细胞学示：骨髓增生活跃，可见“核幼浆老”现象，未见病态造血。考虑的诊断是

- A. 巨幼细胞性贫血
- B. 缺铁性贫血
- C. 骨髓增生异常综合征
- D. 多发性骨髓瘤
- E. 白血病

24. 肝硬化贲门周围血管断流术不包括哪个血管

- A. 胃网膜左静脉
- B. 左膈下静脉
- C. 胃后静脉
- D. 冠状静脉
- E. 胃短静脉

25. 男，30 岁，某化工厂工人，在一次事故中出现恶心、呕吐、震颤等症状急诊入院，查体：皮肤黏膜呈樱桃花红色，呼出气中有苦杏仁味，疑为急性职业中毒，最可能是

- A. 氰化物
- B. 硫化氢
- C. 氧化碳
- D. 亚硝酸

2023 年临床执业历年真题

E. 砷化氢

26. 下列关于消化性溃疡出血，说法正确的是

- A. 生命体征平稳后行胃镜检查
- B. 口服 PPI
- C. 药物治疗无效行手术治疗
- D. 出血时一般无明显腹痛
- E. 胃溃疡一般比十二指肠溃疡容易发生

27. 女，54 岁，腹痛腹胀低热 2 月，查体：腹软，脐周压痛。B 超示中等量腹水，腹水 ADA65U/L。下列最有助于诊断的检查是

- A. 结肠镜
- B. γ -干扰素释放实验
- C. 腹部 CT
- D. 血沉
- E. 腹水

28. 男，65 岁，胃大切后 5 天，腹腔引流，为浑浊液，吻合口漏，予禁食，肠外营养 14 天，TBil1655 μ mol/L，ALT98 μ mol/L，AST120 μ mol/L，导致上述结果的主要原因是

- A. 肠外营养液未添加胰岛素
- B. 吻合口漏腹腔感染
- C. 肠外营养能量不足
- D. 长时间禁食导致胆汁淤积
- E. 肠道细菌移位

29. 男，40 岁，腹胀呕吐三天，呕吐物为宿食，既往十二指肠溃疡病史 10 年，为纠正患者可能存在的水电解质代谢紊乱和酸碱平衡失调。应适用的液体是

- A. 生理盐水
- B. 5%葡萄糖盐水
- C. 1.86%乳酸钠溶液+5%葡萄糖盐水
- D. 10%氯化钾+5%葡萄糖盐水

E. 5%碳酸氢钠

30. 女，28 岁，酱油色尿 3 天。查体：无双侧肾区扣痛，为明确诊断，接下来应做的检查是

- A. 尿隐血是试验
- B. 尿三杯试验
- C. 尿沉渣镜检
- D. 尿常规
- E. 尿胆原

31. 伤寒的临床表现不包括

- A. 出血性皮肤病
- B. 相对缓脉
- C. 脾大
- D. 表情淡漠
- E. 持续高热

32. 男，44，右下肢清创缝合术后 6 天，发热疼痛 2 天，见伤口处红肿，少量红色液，缝合处张力高，是何种感染

- A. 破伤风
- B. 厌氧菌
- C. 溶血性链球菌
- D. 金黄色葡萄球菌
- E. 肺炎链球菌

33. 男性，34 岁，肛门周围反复疼痛，红肿、流脓 5 个月，查体：肛缘 3cm 处有一直径 1cm 硬结，按压可有脓液流出，沿硬结往里可触及一条索物，延伸至肛管内 3cm，该病诊断为

- A. 外痔
- B. 皮脂腺囊肿
- C. 肛管癌
- D. 肛瘘
- E. 肛裂

34. 钩端螺旋体病临床类型不包括

- A. 黄疸出血型
- B. 胃肠型

2023 年临床执业历年真题

- C. 肾衰竭型
- D. 流感伤寒型
- E. 肺出血型

35. 最常见的传染病同源爆发的传播途径是

- A. 呼吸道传播
- B. 食物传播
- C. 垂直传播
- D. 日常生活接触传播
- E. 媒介蚊虫传播

36. 男性，43 岁，突发剑突下疼痛 5 小时，之后疼痛迅速波及右下腹，全腹压痛反跳痛肌紧张。既往上腹部隐痛史 5 年。诊断首先考虑

- A. 消化道穿孔
- B. 急性胰腺炎
- C. 急性阑尾炎
- D. 急性胆囊炎
- E. 肝破裂

37. 需要血浆置换的疾病是

- A. 急性肾炎
- B. 急性肾小管坏死
- C. 急性间质性肾炎
- D. 狼疮肾炎
- E. ANCA 相关性血管炎伴肺出血

38. 目前常用于诊断支气管扩张的检查

- A. 肺功能
- B. 支气管镜
- C. 高分辨 CT
- D. 胸部 X 线
- E. B 超

39. 男，50 岁。头晕、乏力伴腰痛 3 个月。血常规：Hb72g/L，WBC 6.4×10^9 /L，Plt 125×10^9 /L，ESR106mm/h，血清蛋白电泳见 M 蛋白带。尿蛋白(+)。骨髓细胞学检查：幼稚浆细胞占 0.42。

腰椎 X 线检查见第 2、3 椎体压缩性骨折。最可能的诊断是

- A. 反应性浆细胞增多症
- B. 多发性骨髓瘤
- C. 慢性肾小球肾炎
- D. 骨转移癌
- E. 霍奇金淋巴瘤

40. 引起尖锐湿疣的病原体是

- A. 人免疫缺陷病毒
- B. 人乳头瘤病毒
- C. EB 病毒
- D. 水痘病毒
- E. 巨细胞病毒

41. 肠易激综合征 (IBS) 的诊断标准时间的界定为

- A. 反复发作的腹痛或腹部不适，最近 10 个月内发作至少 6 个月
- B. 反复发作的腹痛或腹部不适，最近 12 个月内发作至少 6 个月
- C. 反复发作的腹痛或腹部不适，最近 3 个月内发作至少 1 个月
- D. 反复发作的腹痛或腹部不适，最近 6 个月内发作至少 2 个月
- E. 反复发作的腹痛或腹部不适，最近 6 个月内发作至少 3 个月

42. 下列哪项不是急性胰腺炎手术指征

- A. 合并大出血或假性囊肿
- B. 直接胆红素进行性升高伴寒战高热
- C. 急性腹膜炎不能排除其他急腹症
- D. 血清淀粉酶 >500 U/L
- E. 胰腺及胰周组织坏死继发感染

43. 急性上呼吸道感染患者拟行腹腔镜胆囊切除术，手术需延期至急性上呼吸道感染症状恢复后

- A. 14-21 天
- B. 7-14 天
- C. 5-7 天

2023 年临床执业历年真题

D. 3-5 天

E. 1-3 天

44. 关于判断胃食管反流病患者的症状与病理生理改变的相关检查是

A. 胃镜

B. 食管测压

C. 动态心电图

D. 24h 食管 pH 值检测

E. 上消化道 X 线钡剂检查

45. 采取非手术方法治疗急性消化性溃疡穿孔时, 错误的是

A. 静脉输液

B. 胃肠减压

C. 糖皮质激素

D. 质子泵抑制剂

E. 抗生素抗感染

46. 属于慢性肛裂特点的是

A. 有弹性

B. 肉芽灰白

C. 无疤痕形成

D. 底部浅

E. 边缘整齐

47. 门静脉高压形成后肝硬化患者的肝功能异常的原因

A. 对激素灭活增加

B. 营养不良

C. 侧支循环形成

D. 脾功能亢进

E. 腹压升高

48. 湿性坏疽常发生在

A. 脑、脾、肝

B. 脑、肠、子宫

C. 肺、肾、脑

D. 肺、肠、肝

E. 肺、肠、子宫

49. 男子肛周红肿热痛, 查体:T38℃, 肛周红肿, 触之有波动感, 选用以下那种治疗

A. 抽吸脓肿

B. 局部理疗缓解

C. 切开脓肿

D. 抗生素治疗

E. 温水坐浴

50. 重度溃疡性结肠炎首选治疗

A. 糖皮质激素

B. 英夫利昔单抗

C. 硫唑嘌呤

D. 环孢素

E. 大量抗生素

51. 男, 23 岁, 右下腹痛, 腹泻, 消瘦 5 年, 既往有肛瘘史, 肠镜回示: 回盲部充血、水肿, 呈鹅卵石样改变, 伴多发纵行溃疡, 最有可能的是

A. 肠结核

B. 阿米巴肠炎

C. 缺血性肠病

D. 克罗恩病

E. 溃疡性结肠炎

52. 患者, 女性, 28 岁, 关节疼痛 1 年, 易脱发半年就诊。ESR110mm/1h, 抗“O”正常, Hb86g/L, PLT70×⁹/L, ANA 呈颗粒型阳性, 尿蛋白(+++), 确诊为 SLE, 在估计其预后方面, 下列哪项说法不正确

A. 病情好转后可以妊娠

B. 肾脏病变是增殖型表现者, 预后不良

C. 非缓解期妊娠可加重病情, 应避孕

D. 反复发作关节炎引起关节畸形和关节周围肌肉萎缩

E. 反复癫痫发作及器质性脑病表现者预后不良

2023 年临床执业历年真题

53. 除病理变化外, 持续推进肝硬化患者肝功能减退的是

- A. 凝血因子减少
- B. 对激素灭活减弱
- C. 营养不良
- D. 脾功能亢进
- E. 门静脉高压

54. 男, 17 岁。瘦高体型。胸痛、气短 2 小时。2 小时前, 患者大笑后突发胸痛、气短, 有少量咳嗽, 无发热。查体: 左侧胸廓饱满, 左肺叩诊鼓音, 左肺呼吸音低, 无啰音。心率 101 次/分, 心电图示窦性心动过速。最可能的诊断是

- A. 自发性气胸
- B. 肺栓塞
- C. 支气管哮喘急性发作
- D. 肺气肿
- E. 急性心肌梗死

55. 急性白血病患者最不可能出现的临床表现是

- A. 匙状甲
- B. 脸色苍白
- C. 牙龈出血
- D. 脾脏肿大
- E. 间断性血尿

56. 关于电烧伤, 下列说法正确的是

- A. 损伤范围外小内大
- B. 伤后坏死范围一般不会再扩大
- C. 为局部损害
- D. 局部渗出较一般烧伤轻
- E. 有明显坏死层面

57. 结直肠中最常见的非肿瘤性息肉是

- A. 增生性息肉
- B. 错构瘤性息肉
- C. 化生性息肉
- D. 炎性息肉

E. 腺瘤性息肉

58. 疟疾患者的血常规典型表现为

- A. 淋巴细胞比例增高
- B. 红细胞和血红蛋白减少
- C. 白细胞计数增多
- D. 网织红细胞减少
- E. 血小板减少

59. 女, 27 岁, 确诊系统性红斑狼疮 2 年, 妊娠 28 周。一周前检查: Hb109g/L, PLT 209×10^6 /L。患者可以使用的药物是

- A. 甲氨蝶呤
- B. 环磷酰胺
- C. 羟氯喹
- D. 来氟米特
- E. 大剂量糖皮质激素

60. 女, 28 岁, 2 周前因接触冷空气出现干咳, 喘息, 无发热, 自服头孢类抗菌素无效。为明确诊断, 应进一步做的检查

- A. 支气管激发试验
- B. 特异性变应原检测
- C. 动脉血气分析
- D. 血嗜酸性粒细胞检测
- E. 呼出气 NO (FeNO) 检测

61. 老年男性, 消瘦乏力, 体重减轻, 指检距肛门 8cm 处有一直径 3cm 肿块, 结肠镜检查见距离肛门 8-10cm 处约 3cm 菜花样肿块, 首选治疗方法

- A. Hartmann 术
- B. Dixon
- C. miles
- D. Duhamel 术
- E. 结肠造瘘术

62. 哪个部位的溃疡应特别注意卓-艾综合征

2023 年临床执业历年真题

- A. 胃窦部
- B. 幽门部
- C. 十二指肠球部
- D. 十二指肠降部
- E. 回肠部

63. 男, 35 岁, 上腹部不适伴乏力、消瘦 3 年, 查 Hb80, 胃泌素 80pg/ml, 消化道造影示胃小弯侧 2.5cm 龛影, 胃活动差。考虑诊断是

- A. 复合型溃疡
- B. 胃癌
- C. 胃溃疡
- D. 慢性胃炎
- E. 胃息肉

64. 男, 42 岁, 腹痛腹胀肛门停止排气排便 2 天, 进行禁食补液治疗, 近几天腹痛加重入院, 既往有阑尾炎手术史, 查体:全腹压痛、反跳痛, 肌紧张, 未见胃肠型, 肠鸣音消失, 最佳的处理方式

- A. 空气通便
- B. 手术探查
- C. 持续性胃肠减压
- D. 补液
- E. 禁食

65. 女, 35 岁, 因发热, 呕吐头疼 3 天入院, 查体:面色潮红, 腋下有出血点, 尿常规有蛋白尿, 酱油色尿液, 血常规:WBC $23 \times 10^9/L$, 异形淋巴细胞 0.12, PLT $48 \times 10^9/L$, 该患者的诊断可能是

- A. 流行性脑脊髓膜炎
- B. 伤寒
- C. 流行性出血热
- D. 败血症
- E. 钩端螺旋体病

66. 男, 60 岁, 消化性溃疡行毕二式

手术后 10 天饭后呕吐, 内含胆汁, 最可能的原因是

- A. 输入袢梗阻
- B. 吻合口梗阻
- C. 输出袢梗阻
- D. 十二指肠残端破裂
- E. 吻合口破裂

67. 一外伤病人, 左大腿被柴刀砍伤, 8 小时后送医院急诊, 检查:左大腿外侧有 5cm 长, 深 1cm 的伤口, 边缘尚整齐, 伤口内沾有较多泥土。处理宜

- A. 酒精消毒后缝合
- B. 清创后延期缝合
- C. 清创后一期缝合
- D. 局部应用抗生素
- E. 肥皂水冲洗

68. 全身性感染的治疗原则是

- A. 应用广谱抗生素
- B. 病理生化确诊后, 再定项抗生素治疗
- C. 抗生素联合糖皮质激素治疗
- D. 积极寻找原发病灶, 尽早行对症治疗
- E. 早期大量联合用药

69. HIV 主要感染的主要细胞是

- A. T 细胞
- B. 树突状细胞
- C. CD4+T 细胞
- D. B 淋巴细胞
- E. CD8+T 细胞

70. 患者有脓血便病史, X 线钡剂造影显示结肠多发病变, 后症状加重, 腹胀、腹膜刺激征, 出现低血钾, 诊断考虑为

- A. 直肠癌
- B. 肠结核
- C. 溃疡性结肠炎合并中毒性巨结肠

2023 年临床执业历年真题

- D. 肠易激综合症
- E. 肠梗阻

71. 男性，39 岁，右上腹痛伴发热 1 天，查体：T39.8℃，P105 次/分，BP85/55mmHg，肝区叩诊(+)，B 超示胆囊多发结石，胆总管扩张 1.6cm，肝总管下段有强回声光团伴声影，以下最适宜的治疗是

- A. 积极抗休克治疗，禁食抗感染
- B. 急诊行胆总管切开，T 管引流术
- C. 急诊行开腹胆囊切除术
- D. 急诊行腹腔镜胆囊切除术
- E. 积极抗休克治疗，缓解后择期手术

72. 男，40 岁，头痛伴视物模糊 3 个月，在大便中发现虫卵，喜食生肉，此时眼底检查发现视乳头水肿，最可能的诊断是

- A. 结核性脑膜炎
- B. 脑囊虫蚴病
- C. 病毒性脑膜炎
- D. 脑肿瘤
- E. 疟疾

73. 为了诊断胃癌患者的临床分期，首选的检查手段是

- A. PET-CT
- B. 腹部增强 CT
- C. 腹腔镜探查
- D. 上消化道 X 线钡剂造影
- E. 内镜超声

74. 女，30 岁，阑尾切除术后 6 天，大量进食后面色苍白，烦躁气急，上腹饱胀，呕吐胃内容物，既往消化性溃疡病史 6 年，查体：上腹膨隆，轻压痛，无反跳痛，粪隐血(-)，最简单有效的处理措施是

- A. 针灸理疗
- B. 肌肉注射新斯的明

- C. 应用广谱抗生素
- D. 局部热敷
- E. 胃肠减压

75. 女性，32 岁，双下肢水肿，双手关节痛，口腔溃疡。血常规：Hb：100g/L，PLT：107×10⁹/L，尿红细胞(++)，尿蛋白(+++)，抗 dsDNA(+)，ANCA1:1000，与该患者最相关的免疫物是

- A. 免疫复合物
- B. IgM
- C. IgA
- D. 免疫分子
- E. IgG

76. 不属于乳腺癌高危因素的是

- A. 绝经年龄早
- B. 产后未哺乳
- C. 肥胖
- D. 一级亲属乳腺癌家族史
- E. BRCA 基因突变

77. 腹股沟斜疝与直疝最有意义的鉴别点是

- A. 发病年龄
- B. 突出途径
- C. 疝块外形
- D. 疝内容物是否进入阴囊
- E. 还纳疝内容物后，压迫深环内容物是否再突出

78. 男，28 岁，上腹胀痛不适，伴恶心呕吐 2 天，呕吐物为酸臭味的宿食，进食后缓解，常受凉后易发。该症状病因是

- A. 胃角溃疡
- B. 食管溃疡
- C. 十二指肠降部溃疡
- D. 胃体溃疡
- E. 十二指肠球部溃疡

2023 年临床执业历年真题

79. 男, 64 岁, 反复发热伴乏力 1 周, 加重 1 天, 查体: 体温 38.1°C , Hb69g/L, WBC 15×10^9 /L, 外周血原始细胞 7%, 骨原始细胞 22%, 可见 Auer 小体。诊断为 MDS, 其 FAB 分型最可能为

- A. RA
- B. RSA
- C. CMML
- D. RAEB
- E. RAEB-t

80. 患者因腹部手术行蛛网膜下腔麻醉后, 无不适, 意识清晰, 切口少许液体渗出, 采取什么体位

- A. 低半坐位
- B. 高半坐位
- C. $15-30^{\circ}$ 头高脚低位
- D. 下肢抬高 $15-20^{\circ}$, 头部和躯干抬高 $20-30^{\circ}$
- E. 平卧位

81. 长期内痔患者肛门有肿块脱出, 用手不能回纳, 为几期

- A. I 期
- B. II 期
- C. III 期
- D. IV 期
- E. V 期

82. 以下哪项是乙类传染病

- A. 鼠疫
- B. 霍乱
- C. 流行性腮腺炎
- D. 风疹
- E. 艾滋病

83. 男性, 65 岁, 进行性黄疸 2 月余, 上腹胀痛, 体重减轻 5kg, 检查, 巩膜及周身皮肤黄染, 可触及肿大胆囊,

P90 次/分, BP130/70mmHg, 血清总胆红素 $70\mu\text{mol/L}$, 该患者治疗为

- A. 胆管局部切除
- B. 胆总管空肠 Roux-Y 胆道重建术
- C. 胆囊空肠改良式 Roux-Y 吻合术
- D. 胰十二指肠切除术
- E. 胰体尾切除术

84. 对提示肝细胞癌有重要提示意义的肿瘤标志物是

- A. AFP
- B. CA199
- C. CA125
- D. PSA
- E. CEA

85. 胃十二直肠溃疡穿孔首选检查是

- A. 立位 X 线腹平片
- B. B 超
- C. 增强 CT
- D. 胃镜
- E. PETCT

86. 属于粪口传播的传染病是

- A. 乙肝
- B. 乙脑
- C. 流行性脑脊髓膜炎
- D. 戊肝
- E. 艾滋病

87. 女, 32 岁。急性阑尾炎阑尾切除术后 5 天, 体温升高至 39°C , 大便频繁伴里急后重, 黏液便, 量少。查体: 切口愈合可, 无红肿, 未触及明显压痛。可能的原因是

- A. 伪膜性肠炎
- B. 溃疡性结肠炎
- C. 阑尾残株炎
- D. 盆腔脓肿
- E. 肠瘘

2023 年临床执业历年真题

88. 患者胸痛、反酸 3 年，加重伴干咳 3 天，查体未见异常，心电图、胸部 CT 未见异常。患者应用什么药物

- A. 硝酸甘油
- B. 倍氯米松
- C. 泮托拉唑
- D. 硝苯地平
- E. 氢氯噻嗪

89. 男，70 岁，左腹股沟包块 1 年，包块圆形，大小 5×4cm，平躺消失，按住包块口深环，咳嗽后仍可突出，该包块可能为

- A. 脂肪瘤
- B. 腹股沟斜疝
- C. 腹股沟直疝
- D. 股疝
- E. 精索鞘膜积液

90. 与强直性脊柱炎密切相关的遗传基因是

- A. HLA-DR3
- B. HLA-B27
- C. HLA-DR2
- D. HLA-DR4
- E. HLA-DR5

A3/A4 型选择题

(91~92 题共用题干)

46 岁男性，多关节肿痛 6 月伴晨僵 6 小时。累及双腕关节，近端指间关节，掌指关节，双侧颞颌关节。ESR49，ASO89，RF(-)，抗 CCP(+)，ANA(-)，X 线见骨质疏松，双腕关节及近端指间关节间隙轻度狭窄。

91. 考虑诊断

- A. 系统性红斑狼疮
- B. 骨关节炎
- C. 痛风
- D. 类风湿性关节炎
- E. 银屑病关节炎

92. 首选治疗方式

- A. 青霉素
- B. IL-6 单抗
- C. 别嘌醇
- D. 甲氨蝶呤
- E. 布洛芬

(93~94 题共用题干)

女，34 岁，患者车祸后 4 小时，出现剧烈腹痛，查体：T36.8，P89 次/分，BP124/85mmHg，腹部有压痛、反跳痛。血淀粉酶 1200u/l。腹部立位平片未见明显异常。腹部 B 超示右侧腹部少量腹腔积液。

93. 最可能是哪个器官损伤

- A. 肝破裂
- B. 脾破裂
- C. 胰腺破裂
- D. 结肠破裂
- E. 小肠破裂

94. 接下来还要做什么检查?

- A. 诊断性腹腔穿刺
- B. 开腹探查
- C. 腹部 CT
- D. 腹腔镜探查
- E. 腹部 B 超

(95~97 题共用题干)

男，45 岁，反复上腹部疼痛十余年，多于秋冬季发生，夜间疼痛明显，向背部放射，近一周疼痛再发，一天前排柏油样便两次，量中等，无头晕、心悸。查体：P90 次/分，R18 次/分，BP110/75mmHg，腹软，脐上压痛。HB100g/L，粪隐血(+++)。

95. 为明确诊断，可行下列哪项检查

- A. 胃蛋白酶原 I / II
- B. 腹部增强 CT
- C. 13C 快速尿素酶

2023 年临床执业历年真题

- D. 24 小时胃酸反流监测
- E. 胃镜

96. 导致该患者粘膜损伤的直接因素是

- A. 胃粘膜血液供应异常
- B. 胃酸胃蛋白酶导致的自身消化
- C. 胃泌素分泌异常
- D. 胃肠粘膜粘液分泌减少
- E. 胃动力异常

97. 应首先采取的治疗是

- A. 紧急输血
- B. 质子泵抑制剂
- C. 血管加压素
- D. 6-氨基己酸
- E. h₂ 受体阻抗剂

(98~99 题共用题干)

女 32 岁，4 小时前进食较多油腻食物导致突发持续上腹痛，伴呕吐进食物。查体：痛苦面容，巩膜无黄染，心肺查体无异常，腹软，左上腹压痛，无反跳痛，心肺查体未见异常，murphy(-)，肠鸣音 2 次/min。

98. 可考虑诊断

- A. 急性胰腺炎
- B. 急性胆囊炎
- C. 急性阑尾炎
- D. 心肌梗死
- E. 胃溃疡

99. 为确诊可行下列哪项检查

- A. 心电图
- B. 腹部增强 CT
- C. 立位腹平片
- D. 胃镜
- E. 结肠镜

(100~101 题共用题干)

女，18 岁，持续高热 3 周后入院，查体 T39℃，心率 85 次/分，神志淡漠，

面色苍白，前胸部可见散在出血点和红斑，脾肋下可触及。

100. 首选考虑的诊断是

- A. 钩端螺旋体病
- B. 伤寒
- C. 疟疾
- D. 流行性出血热
- E. 败血症

101. 为确诊最有意义的检查是

- A. 出血热病毒抗体
- B. 外斐反应
- C. 肥达反应
- D. 血涂片查疟原虫
- E. 血细菌培养

(102~103 题共用题干)

男性，64 岁。右季肋部胀痛 1 月余，伴有食欲减退及乏力，体重减轻 4kg。查体：体温 38.2℃，呼吸 18 次/分，心率 84 次/分，血压 116/80mmHg。消瘦，慢性病容。皮肤、巩膜明显黄染，睑结膜苍白。肝右侧肋缘下 3cm，质硬，表面凹凸不平，肋下未触及，移动性浊音阴性，双下肢轻度水肿。AFP689ng/ml。CT 提示肝脏可见大小约 3×2cm 低密度影，动脉期出现环形强化影，而病变内部强化不显著

102. 考虑最可能的疾病

- A. 肝癌
- B. 肝血管瘤
- C. 肝脓肿
- D. 肝囊肿
- E. 肝硬化

103. 对该患者最有价值的检查是

- A. 肝穿刺
- B. 超声
- C. X 线
- D. MRCP
- E. 增强 CT

2023 年临床执业历年真题

(104~105 题共用题干)

男, 42 岁, 转移性右下腹痛 1 天, 腹痛, 腹胀, 未闻及肠鸣音, 下腹部叩诊鼓音。诊断为急性阑尾炎, 行手术治疗

104. 术后 5 天出现腹痛, 腹胀, 未闻及肠鸣音, 下腹部叩诊鼓音。其并发症首先考虑

- A. 粘连性肠梗阻
- B. 麻痹性肠梗阻
- C. 盆腔脓肿
- D. 切口感染
- E. 残端漏

105. 术后出院后 3 月余, 再次出现转移性右下腹痛诊断考虑

- A. 急性阑尾残株炎
- B. 粘连性肠梗阻
- C. 阑尾周围脓肿
- D. 假性囊肿
- E. 腹腔脓肿

(106~107 题共用题干)

女, 44 岁。因右乳腺癌行改良根治术。术后病理: 右乳浸润性癌, 非特殊型, 肿瘤大小 3cm×2cm, 组织学 III 级, ER80% 强阳, PR90% 强阳, HER2(+), ki-67. 50%。腋窝淋巴结 (4/16) 见癌转移, 活动尚可, 未见粘连。全身检查其他器官未见转移。雌激素、孕激素受体均(-)。

106. 按照 TNM 分期, 该患者分期

- A. T₁ N₂ M₀
- B. T₁ N₁ M₀
- C. T₂ N₁ M₀
- D. T₃ N₂ M₀
- E. T₂ N₂ M₀

107. 该患者术后应采取何种综合治疗方案

- A. 化疗+靶向治疗
- B. 化疗+内分泌治疗
- C. 化疗+靶向治疗+内分泌治疗+放疗
- D. 化疗+放疗+内分泌治疗
- E. 化疗+靶向治疗+内分泌治疗

(108~110 题共用题干)

男, 55 岁, 夜间阵发性疼痛, 进食后缓解, 近 3 个月来加重, 门诊收住入院, 胃镜检查提示: 十二指肠球部溃疡。行胃大切除毕 II 式吻合术

108. 手术后并发症属于远期并发症的是

- A. 输出袢梗阻
- B. 倾倒综合征
- C. 输入袢梗阻
- D. 胃排空障碍
- E. 十二指肠残端破裂

109. 手术后, 患者胆汁呕吐, 呕吐后腹痛不缓解, 属于

- A. 吻合口瘘
- B. 输出袢梗阻
- C. 碱性反流性胃炎
- D. 倾倒综合征
- E. 十二指肠残端破裂

110. 术后患者有低血糖综合症, 此时表现为

- A. 呕吐物为食物, 不含胆汁
- B. 呕吐物为胆汁, 不含食物
- C. 呕吐物既有胆汁也有食物
- D. 呕吐物是隔夜宿食
- E. 无呕吐

(111~112 题共用题干)

女, 75 岁, 因胃癌晚期合并幽门梗阻行胃肠减压, 近 5 天来引出胃液约 900ml/d, 每天予葡萄糖盐水 1500ml 静脉滴注, 查体: T: 37.3℃, P: 108 次/分, BP: 102/60mmHg 动脉血气分

2023 年临床执业历年真题

析 :PH:7.56 , HCO_3^- 46mmol/L ,
BE+7mmol/L。

111. 进一步治疗措施不正确的是

- A. 尿量超过 40ml/h 补充钾离子
- B. 中心静脉输注稀释盐酸溶液
- C. 择机行姑息性胃肠短路手术
- D. 每 4~6 小时监测血气分析和血电解质
- E. 静脉滴注碳酸氢钠溶液

112. 该患者最可能合并的酸碱平衡失调是

- A. 呼吸性酸中毒
- B. 呼吸性碱中毒
- C. 代谢性酸中毒
- D. 代谢性碱中毒
- E. 混合性酸中毒

(113~114 题共用题干)

男, 67 岁, 患再生障碍性贫血 5 年, 通过输血纠正了贫血症状, 近两次输血出现了发热反应, 但无腰痛, 血尿

113. 该患者出现的输血发热反应是

- A. 过敏反应
- B. 迟发性溶血性发热
- C. 急性溶血性发热
- D. 非溶血性发热
- E. 受到细菌污染

114. 该患者出现输血发热反应的原因是

- A. 与共者血型不合
- B. 受血者存在同种白细胞和血小板
- C. 存在致热原
- D. 血液运输, 保存受污染
- E. 受血者患有溶血性疾病

(115~116 题共用题干)

女, 50 岁, 被热水烫伤 3 小时, 查体: 体重 60kg 双小腿及足部布满大小不一的水疱, 创面湿润痛觉明显。

115. 按新九分法, 该患者的烧伤面积是

- A. 21%
- B. 13%
- C. 19%
- D. 22%
- E. 20%

116. 该患者第 1 个 24 小时的补液量是

- A. 3700ml
- B. 1700ml
- C. 5700ml
- D. 2700ml
- E. 4700ml

(117~119 题共用题干)

女, 46 岁, 上腹部不适 1 年, 加重伴头晕, 乏力 2 月, 多为进餐前疼痛, 既往患有桥本甲状腺炎病史 10 年, 胃镜见胃粘膜变薄, 黏膜色泽变淡, 可透见血管型。

117. 该患者最可能的胃病类型为

- A. A 型胃炎
- B. B 型胃炎
- C. 胃溃疡
- D. 慢性浅表性胃炎
- E. 胃癌

118. 为明确诊断应该首选检查

- A. 内因子抗体
- B. 13C 呼气实验
- C. 碘 131 检查
- D. 腹部 X 线片
- E. 上腹部彩超

119. 患者可能会出现

- A. 血中胃蛋白酶原增多
- B. 胃酸分泌增多
- C. 维生素 B12 缺乏
- D. 快速尿素酶试验
- E. 内因子增多

(120~122 题共用题干)

男, 58 岁, 发热 2 周, 查体, 体温 38° C, 手部皮肤针刺处可见瘀斑, 胸骨压痛 (+), 心肺未见异常, 脾肋下未及, 血常规: Hb86g/L, WBC12.4 × 10⁹/L, PLT34 × 10⁹/L, 骨髓细胞学检查: 增生极度活跃, 胞质内粗大颗粒的早幼粒细胞占 0.75。

120. 该患者骨髓检查最可能出现的结果是

- A. CD13 阴性
- B. MPO 阴性
- C. PAS 阳性
- D. CD33 阳性
- E. NSE 阴性

121. 首选的治疗是

- A. 全反式维甲酸
- B. HA 方案化疗
- C. 伊马替尼
- D. VLDP 方案化疗
- E. DA 方案化疗

122. 考虑最可能诊断为

- A. 早幼粒细胞白血病
- B. 急性单核细胞白血病
- C. 急性髓细胞白血病
- D. 急性巨核细胞白血病
- E. 中枢神经系统白血病

(123~124 题共用题干)

患者女, 32 岁, 游走性关节炎 10 余年, 反复口腔溃疡, 查体: 体温 36.5°, 呼吸 20 次/分, 心率 98 次/分, 颊部红斑, B 超提示心包积液

123. 最有可能的诊断

- A. 风湿热
- B. 系统性红斑狼疮
- C. 骨关节炎
- D. 类风湿关节炎

E. 心脏压塞

124. 下一步检查首选

- A. 心包抽液
- B. 抗核抗体谱
- C. 胸部 X 线
- D. 抗 O
- E. RF

(125~126 题共用题干)

女, 16 岁, 胸痛 3 个月, 血压 115/90mmHg, 呼吸 20 次/分, 查 X 线发现右侧胸部椭圆形肿物, 肺肋膈角尖锐。CT 显示前纵隔巨大肿物, 边缘清晰, 内有混杂高密度影。其余未见异常。

125. 最可能的诊断是

- A. 肺错构瘤
- B. 胸腺脓肿
- C. 胸腺淋巴瘤
- D. 肺癌
- E. 胸腺畸胎瘤

126. 进一步治疗

- A. 手术切除
- B. 化疗
- C. 观察
- D. 介入栓塞
- E. 密切观察

(127~128 题共用题干)

男性, 22 岁, 9 天前脚被铁钉刺伤。两天前出现乏力, 伴头痛, 咀嚼困难, 吞咽困难, 1 天前出现牙关紧闭, 肌肉痉挛, 全身抽搐。

127. 若疾病继续发展, 最威胁生命的是

- A. 持续呼吸肌痉挛
- B. 肌肉断裂
- C. 骨折
- D. 营养障碍

2023 年临床执业历年真题

E. 尿潴留

128. 首选治疗为

- A. 破伤风类毒素
- B. 破伤风抗毒素
- C. 青霉素
- D. 破伤风类毒素+青霉素
- E. 破伤风抗毒素+青霉素

(129~130 题共用题干)

男, 35 岁。头痛伴视物模糊 3 个月, 偶伴抽搐, 曾在大便中发现带状节片。

129. 最可能的诊断是

- A. 隐球菌性脑膜炎
- B. 结核性脑膜炎
- C. 病毒性脑膜炎
- D. 脑肿瘤
- E. 脑囊尾蚴病

130. 为明确诊断, 最重要的检查是

- A. 头颅 X 线片
- B. 腰穿脑脊液检查
- C. 脑室造影
- D. 脑电图检查
- E. 头颅 MRI

(131~132 题共用题干)

女, 30 岁。面部皮疹、发热 1 个月, 水肿 1 周。查体: $T37.8^{\circ}C$, $BP160/100mmHg$ 。颜面可见充血性皮疹, 腹部移动性浊音(+), 双下肢中度凹陷性水肿。血常规: $Hb 96g/L$, $WBC3.1 \times 10^9/L$, $Plt67 \times 10^9/L$ 。尿沉渣镜检 RBC 满视野, $WBC 8 \sim 10/HP$ 。尿蛋白定量 $4.2g/24h$ 。肾功能正常, 血 $C3$ 下降。

131. 首先考虑的诊断是

- A. 原发性小血管炎肾损害
- B. 乙型肝炎病毒相关性肾炎
- C. 狼疮肾炎
- D. 过敏性紫癜性肾炎

E. 急性肾小球肾炎

132. 为明确诊断, 最有价值的实验室检查是

- A. 血 IgA 及 IgEA
- B. 血抗中性粒细胞胞浆抗体
- C. 血抗链球菌溶血素“O”
- D. 乙肝病毒标志物
- E. 血抗核抗体及抗双链 DNA 抗体

B1 型选择题

(133~134 题共用备选答案)

- A. 哌喹
- B. 伯氨喹
- C. 青蒿素
- D. 奎宁
- E. 乙胺嘧啶

133. 控制普通型疟疾发作多选用的药物是

134. 预防疟疾复发选用的药物是

(135~136 题共用备选答案)

- A. 5ml
- B. 250ml
- C. 1000ml
- D. 400ml
- E. 600ml

135. 引起呕血的胃内出血量最少为

136. 粪隐血试验阳性的最少出血量

(137~138 题共用备选答案)

- A. 肝损伤
- B. 脾损伤
- C. 胰腺损伤
- D. 小肠损伤
- E. 结肠损伤

137. 下列哪个实质器官容易损伤

138. 腹部闭合性损伤中, 腹腔感染严

2023 年临床执业历年真题

重，但症状出现的比较晚，容易误诊的是

(139~140 题共用备选答案)

- A. 结肠脾曲
- B. 结肠肝曲
- C. 直肠和乙状结肠
- D. 回盲部
- E. 全结肠

139. 肠结核的好发部位是

140. 溃疡性结肠炎的好发部位是

(141~142 题共用备选答案)

- A. 上腹部压痛，板状腹，肝浊音界消失
- B. 脐周阵发性疼痛，伴恶心呕吐，肠鸣音亢进
- C. 上腹部胀痛，伴胃型及振水音
- D. 右上腹绞痛，伴黄疸，Murphy 征阳性
- E. 剑突下钝痛，腹部体征(-)

141. 急性机械性肠梗阻的典型临床表现为

142. 消化道溃疡穿孔的典型临床表现为

(143~144 题共用备选答案)

- A. 假性粒细胞减少
- B. Felty 综合征
- C. 低增生性白细胞
- D. 巨幼细胞贫血
- E. 骨髓增生异常综合征

143. 由免疫机制引起中性粒细胞减少的疾病

144. 由分布异常引起中性粒细胞减少的疾病是

(145~146 题共用备选答案)

- A. 溃疡呈环形与肠的长轴垂直
- B. 溃疡呈长椭圆形与肠的长轴平行
- C. 溃疡呈烧瓶形底大口小
- D. 溃疡边缘呈堤状隆起
- E. 溃疡表浅呈地图状

145. 细菌性痢疾的肠溃疡特征是

146. 肠伤寒的肠溃疡特征是

(147~148 题共用备选答案)

- A. 电解质及胃肠功能紊乱
- B. 自发性腹膜炎
- C. 消化道出血
- D. 穿孔性溃疡
- E. 继发性腹膜炎

147. 门静脉高压导致血管通透性增加，进而导致肠粘膜屏障功能减退所引发的疾病

148. 消化道溃疡穿透至周围实质脏器引发的疾病

(149~150 题共用备选答案)

- A. Halsted 术
- B. Bassini 术
- C. Lichtenstein 术
- D. McVay 术
- E. Ferguson 术

149. 常用于股疝修补的手术方法是

150. 无张力疝修补术是

第四单元

A1/A2 型选择题

1. 8 个月婴儿可出现的体征是

- A. 颈项强直
- B. 双侧巴氏征阳性
- C. 克氏征阳性
- D. 拥抱反射

2023 年临床执业历年真题

E. 吮吸反射

2. 颅底骨折通常的诊断依据是

- A. 脑脊液、耳漏
- B. 头痛伴呕吐
- C. 偏瘫
- D. 头皮血肿
- E. 昏迷

3. 下列描述女性生殖系统防御机制不正确是

- A. 阴道前后壁紧贴
- B. PH>6.5
- C. 阴道有自净功能
- D. 宫颈内口闭合
- E. 大小阴唇自然合拢

4. 小儿头围测量的方法是

- A. 沿乳头下缘水平绕胸 1 周
- B. 沿乳头上缘水平绕胸 1 周
- C. 眉弓到耳上到枕后结节绕头一周
- D. 眉间到枕后结节绕头 1 周
- E. 眉弓上方到枕后结节绕头 1 周

5. 鉴别三种非典型苯丙酮尿症的方法是

- A. 尿三氯化铁试验
- B. 尿蝶呤分析
- C. 血浆游离氨基酸分析
- D. Guthrie 细菌生长抑制试验
- E. DNA 分析

6. 脊髓半切综合征常见于

- A. 急性髓外硬膜内脓肿
- B. 急性脊髓炎
- C. 吉兰巴雷综合症
- D. 脊髓髓外肿瘤
- E. 脊髓空洞症

7. 婴儿，7 个月内，还没接种的疫苗为

- A. 麻腮风疫苗
- B. 脊髓灰质炎疫苗
- C. 乙肝疫苗
- D. 百白破疫苗
- E. 卡介苗

8. 儿童生长发育特点正确的是

- A. 各个系统生长发育速度一致
- B. 机体发育不存在个体差异
- C. 年纪越大，发育越慢
- D. 婴儿期是体格发育最快的时期
- E. 生长发育是自下而上

9. 脑栓塞最常见的病因是

- A. 心房颤动
- B. 动脉粥样硬化
- C. 高血压
- D. 糖尿病
- E. 高脂血症

10. 维持子宫前倾的韧带是

- A. 子宫圆韧带
- B. 子宫阔韧带
- C. 子宫主韧带
- D. 子宫骶韧带
- E. 卵巢固有韧带

11. 儿童阶段发病率及死亡率最高的时期是

- A. 新生儿期
- B. 婴儿期
- C. 幼儿期
- D. 学龄前期
- E. 学龄期

12. 可引起差异性青紫的是哪种先天性心脏病

- A. 动脉导管未闭
- B. 房间隔缺损
- C. 室间隔缺损
- D. 法洛四联症

2023 年临床执业历年真题

E. 完全性大动脉换位

13. 抑郁症的躯体症状群包括

- A. 情绪低落
- B. 睡眠障碍
- C. 思维迟缓
- D. 动作缓慢
- E. 自责自罪

14. 以下最能确诊早期妊娠的是

- A. 超声发现原始心管搏动
- B. 宫颈粘液涂片发现羊齿状树叶结晶
- C. 停经
- D. 双相体温高温相持续 18 天
- E. 阴道充血变软、呈紫蓝色

15. 子宫肌瘤最常见的变性是

- A. 囊性变
- B. 玻璃样变
- C. 红色样变
- D. 钙化
- E. 肉瘤样变

16. 下列不属于新生儿特殊生理性改变的是

- A. 乳房增大
- B. 马牙
- C. 假月经
- D. 生理性黄疸
- E. 红臀

17. 有关咳嗽变异型哮喘说法正确的是

- A. 常在午后发生或加重
- B. 抗哮喘治疗无效
- C. 以干咳为主
- D. 支气管激发实验阴性
- E. 常发生感染，抗生素治疗有效

18. 应行预防性宫颈环扎术的是

- A. 曾有 3 次以上药物流产史的孕妇
- B. 曾有 3 次以上人工流产史的孕妇

C. 曾有 3 次以上稽留流产史的孕妇

D. 曾有 3 次以上足月胎膜早破史的孕妇

E. 曾有 3 次以上妊娠中期自然流产史的孕妇

19. 单纯母乳喂养易导致婴儿产生的贫血是

- A. 缺铁性贫血
- B. 巨幼红细胞性贫血
- C. 失血性贫血
- D. 溶血性贫血
- E. 再生障碍性贫血

20. 闭合性颅盖骨骨折诊断的主要依据是

- A. 触诊局部有凹陷感
- B. 出现神经系统损伤体征
- C. 头皮肿胀有波动感
- D. X 线平片
- E. 有骨擦音

21. 一患者的位置觉受损，当该患者双脚并拢站立，在下列哪种情况患者容易跌倒

- A. 屈颈
- B. 双手平举向前
- C. 屈膝
- D. 转头
- E. 闭眼

22. 合并前列腺增生的帕金森患者不选用的药物是

- A. 溴隐亭
- B. 多巴丝肼
- C. 苯海拉明
- D. 苯海索
- E. 金刚烷胺

23. 卵巢上皮性肿瘤一线化疗方案为

- A. 博来霉素+长春新碱

2023 年临床执业历年真题

- B. 顺铂+长春新碱
 - C. 顺铂+长春新碱+异环磷酰胺
 - D. 顺铂+紫杉醇
 - E. 紫杉醇+卡铂
24. 个体对自己精神状态认识和判断的能力
- A. 自知力
 - B. 智力
 - C. 领悟力
 - D. 意识
 - E. 定向力
25. 命令性幻听最常见于
- A. 适应障碍
 - B. 躁狂症
 - C. 抑郁症
 - D. 精神分裂症
 - E. 惊恐障碍
26. 长期大量饮白酒后，突然停酒多长时间发生震颤谵妄
- A. 12h
 - B. 48h
 - C. 6h
 - D. 3h
 - E. 24h
27. 不全流产的特征是
- A. 易发生休克
 - B. 阴道流血
 - C. 腹痛
 - D. 妊娠物完全排出
 - E. 无妊娠物排出
28. 与过期妊娠无关的是
- A. 头盆不称
 - B. 宫内发育迟缓
 - C. 羊水过多
 - D. 胎盘功能不良
 - E. 胎儿过度成熟

29. 法洛四联症不会出现以下哪个体征
- A. 苍白
 - B. 蹲踞
 - C. 晕厥
 - D. 杵状指(趾)
 - E. 活动耐力下降
30. 新生儿坏死性小肠结肠炎最常见的病因是
- A. 寒冷
 - B. 溶血
 - C. 未及时添加辅食
 - D. 早产
 - E. 双胞胎
31. 新生儿胆红素生成过多的疾病是
- A. 新生儿败血症
 - B. 先天性甲减
 - C. 先天性胆道闭锁
 - D. 新生儿窒息
 - E. 胆汁黏膜综合征
32. 影响人性格形成的关键时期
- A. 青年期
 - B. 婴儿期
 - C. 学龄前期
 - D. 幼儿期
 - E. 中年期
33. 小脑损伤不可能发生的是
- A. 共济失调
 - B. 动作性震颤
 - C. 意向性震颤
 - D. 肌张力下降
 - E. 柔软性麻痹
34. 下不符合面神经炎的表现的是
- A. 患侧额纹消失
 - B. 患侧鼻唇沟变浅
 - C. 患侧不能闭眼

2023 年临床执业历年真题

- D. 患侧不能鼓腮
- E. 常伴有偏瘫

35. 女, 25 岁, 孕 20 周, 突发阴道流血, 少于月经量, 伴不规则腹痛, 检查发现胎心存在, 下列诊断正确的是

- A. 难免流产
- B. 稽留流产
- C. 先兆流产
- D. 不全流产
- E. 早产

36. 女, 28 岁。电镜下子宫内膜有高度分泌活动, 腺上皮细胞增大, 胞内有分泌颗粒, 间质疏松肿大, 提示此时子宫内膜处于的月经周期为

- A. 增生早期
- B. 增生晚期
- C. 分泌早期
- D. 分泌晚期
- E. 月经期

37. 男孩, 2 岁, 身高 87cm, 体重 12.5kg, 能双脚跳, 会说 2—3 个字的短语, 能准确评估该小儿发育情况的是

- A. 发育迟缓, 建议内分泌治疗
- B. 发育过度, 建议饮食指导
- C. 发育正常, 随访
- D. 消瘦, 建议加强营养
- E. 发育迟缓, 建议脑电图和智力测试

38. 患者女, G1P0, 28 岁, 7 月前行人工流产术后闭经, 肥胖多毛, 行雌孕激素序贯治疗后未发生撤退性出血, 诊断为

- A. Turner 综合征
- B. 闭经泌乳综合征
- C. 多囊卵巢综合征
- D. Asherman 综合征
- E. Sheehan 综合征

39. 女性分娩一子后。怕自己养不活, 继而紧张, 早醒, 体重下降 5kg, 该女子什么障碍

- A. 焦虑障碍
- B. 抑郁障碍
- C. 精神分裂障碍
- D. 人格障碍
- E. 心境转换障碍

40. 女, 6 岁, 高热伴恶心呕吐 6 天, 体温 38.5°C。入院 2 日后, 出现嗜睡, 昏迷, 几日后死亡。尸检发现脑白质和灰白质交界处多发呈白色半透明针尖大小空泡状液化性坏死, 脑脊膜血管充血、水肿。该疾病可能的诊断是

- A. 多发性脑血栓
- B. 多发性脑缺血
- C. 流行性乙型脑炎
- D. 流行性脑脊髓膜炎
- E. 脓毒血症

41. 男, 62 岁, 早晨起床发现右上肢无法抬举、无法独立行走 3 小时, 伴言语含糊。发病前晚八点时正常, 既往高血压、糖尿病。查体:P90 次/分、R19 次/分、BP160/90mmHg, 神清, 言语含糊, 右侧鼻唇沟浅, 舌头右偏, 右上肢肌力二级, 右下肢三级, 左侧五级, 右侧病理征阳性, 右侧偏身针刺下降, 血糖 11mmol/L, 其余正常, SpO₂ 99%, 头颅 CT 正常, 诊断考虑为

- A. TIA
- B. 脑血栓形成
- C. 脑栓塞
- D. 脊髓炎
- E. 脑出血

42. 女婴, 6 个月, 热退后皮疹半天。查体: 体温 36.9°C, 脉搏 120 次/分,

2023 年临床执业历年真题

呼吸 36 次/分，精神好，颈部，胸部，上肢可见红色斑丘疹，压之褪色，咽部充血。心、肺、腹及神经系统正常。诊断考虑为

- A. 幼儿急疹
- B. 风疹
- C. 水痘
- D. 麻疹
- E. 猩红热

43. 患儿，8 岁，患重症再生障碍性贫血 1 月，等待造血干细胞移植，需要纠正贫血时宜输注何种血液制品

- A. 辐照的去白的红细胞
- B. 去白红细胞
- C. 悬浮红细胞
- D. 浓缩红细胞
- E. 全血

44. 女，28 岁，产后 2 周仍有腹痛，发热，体温 38℃。2 天前阴道流血，约 250ml。查体：宫底耻骨联合上两横指，压痛，宫颈容两指，可见烂肉堵塞。哪项治疗不正确

- A. 产钳夹除
- B. 补液支持
- C. 抗感染治疗
- D. 给缩宫素
- E. 负压吸宫

45. 女性，35 岁，下腹痛伴恶心 4 小时，无阴道流血，呕吐和发热，平素月经周期正常，末次月经半月前，妇科查体右侧附件区一肿物，5cm，有张力，无触痛。血常规：HB110g/L，WBC $10 \times 10^9/L$ ，plt $20 \times 10^9/L$ ，血 HCG(-)，最可能的诊断是

- A. 急性阑尾炎
- B. 卵巢囊肿蒂扭转
- C. 黄体破裂
- D. 盆腔炎性疾病

E. 子宫内膜异位症

46. 女，30 岁，妊娠 25 周。OGTT：空腹血糖 5mmol/L，1 小时 11.2mmol/L，2 小时 8.2mmol/L。既往体健。该母儿可能情况

- A. 妊娠期高血糖
- B. 新生儿高血糖
- C. 滴虫阴道炎
- D. 羊水过少
- E. 前置胎盘

47. 男孩，6 岁。水肿，尿少 5 天。查体：T37℃，P82 次/分，R18 次/分，BP100/65mmHg。双下肢凹陷性水肿。实验室检查：血清白蛋白 24g/L，胆固醇 6.3mmol/L，尿 RBC1-2/HP，24 小时尿蛋白定量 1.5g。予泼尼松 2mg/(kg. d)口服 3 周，查 2 次尿蛋白阴性，接下来的治疗措施

- A. 继续泼尼松 2mg/(kg. d)，4 周后改为泼尼松 2mg/kg 隔日顿服
- B. 继续泼尼松 2mg/(kg. d)，5 周后改为泼尼松 2mg/kg 隔日顿服
- C. 改为泼尼松 2mg/kg 隔日顿服
- D. 继续泼尼松 2mg/(kg. d)，2 周后改为泼尼松 2mg/kg 隔日顿服
- E. 停用泼尼松

48. 女，39 岁，G3P2，子宫 II 度脱垂伴阴道前后壁轻度膨出。妇科检查宫颈长约 6 厘米，子宫后位正常大小，双附件区未触及肿物，要求手术治疗，首选的手术方式是

- A. 次全子宫切除术
- B. 骶韧带缩短术
- C. 阴道前后壁修补术
- D. 阴道封闭术
- E. 曼氏手术

49. 女性，33 岁，继发不孕 3 年，诊

2023 年临床执业历年真题

断双侧输卵管堵塞，2 天前行输卵管疏通术后，发热，宫颈举痛，附件压痛，右侧为重，白细胞升高，Hb95g/L，WBC:10×10⁹/L。可能并发什么疾病

- A. 盆腔炎
- B. 子宫剥脱
- C. 黄体破裂
- D. 子宫破裂
- E. 卵巢囊肿

50. 女，41，反复外阴阴道瘙痒 3 月，既往糖尿病病史 6 年，妇科查体：阴道红肿，分泌物增多，分泌物呈豆腐渣样。最有可能的诊断是

- A. 外阴阴道假丝酵母菌阴道炎
- B. 淋病
- C. 萎缩性阴道炎
- D. 细菌性阴道炎
- E. 前庭大腺炎

51. 男孩，两岁半，重度营养不良，近一周出现腹泻，约 3-8 次/日，稀薄，呈黄色，泡沫较多，带黏性，脓液，可见豆渣样细块，可能诊断的疾病是

- A. 白色念珠菌肠炎
- B. 致病大肠埃细菌肠炎
- C. 轮状病毒肠炎
- D. 金黄色葡萄球菌肠炎
- E. 耶尔森菌小肠结肠炎

52. 女性，24 岁，月经 21-23 天/4-5 天，自然流产 1 次，基础体温双相型，月经第 3 天激素测定未见明显异常，诊断为

- A. 多囊卵巢综合征
- B. 黄体功能不全
- C. 子宫异常内膜脱落
- D. 非排卵性异常子宫出血
- E. 闭经溢乳综合征

53. 男，60 岁。近 3 天夜间行为紊乱，

说房间地板上有老鼠、蛇，能看见死人，表情恐怖、紧张，不认识家人，白天较安静，喜卧床，不能回忆夜间行为，能认识家人，头部 CT 示：顶枕叶片状梗死灶，考虑患者处于

- A. 谵妄状态
- B. 幻觉妄想状态
- C. 抑郁状态
- D. 痴呆状态
- E. 木僵状态

54. 女，51 岁，6 周前亲眼目睹丈夫被汽车碾压至死，近 2 周出现恐惧失眠，反复回忆起丈夫去世的场景，不敢进卧室，最有可能的诊断是

- A. 躯体形式障碍
- B. 创伤后应激障碍
- C. 惊恐障碍
- D. 急性应激障碍
- E. 广泛性焦虑障碍

55. 男，25 岁，头痛四个月。加重 3 周，喷射状呕吐，P50 次，血压 160/95mmHg，清神志清楚，无双侧视神经乳头状水肿，应该如何处理

- A. 胸部 X 线+止痛剂
- B. 心电图+止痛剂
- C. 颅脑 B 超+甘露醇
- D. 颅脑 CT/MRI+甘露醇
- E. 腰椎穿刺+甘露醇

56. 男性，78 岁，因睡眠差、食欲极度减退、消瘦明显 2 个月入院，患者高血压病史 20 余年，2 年前发现血糖轻度升高，服用降压降糖药后，血糖血压控制良好，患者自主言语减少，担忧自己去世后老伴无人照顾，住院期间，经常夜间突然自主起床活动，无目的摸床，严重会大喊大叫，不认人，不知道自己身在何处，猜疑子女拿自己值钱的物品，时而发脾气，白

2023 年临床执业历年真题

天安静睡觉，记不得夜间发生的事，患者可能的诊断是

- A. 谵妄
- B. 阿尔兹海默症
- C. 血管性痴呆
- D. 突发性躁狂
- E. 精神分裂

57. 男 25 岁，尿道刺痛流脓 3 天，查体，尿道口红肿，有黄色脓性分泌物，涂片见多核细胞，可找到革兰氏阴性双球菌，不属于致病原是

- A. 内毒素
- B. 外毒素
- C. 外膜蛋白
- D. 菌毛
- E. 外膜脂多糖

58. 初产妇 28 岁，妊娠 40 周，估计胎儿 3000g，骨盆测量正常，第一产程顺利，宫口开 1 小时，S₊2，宫缩 4 次/10 分，羊水清，胎心变异好，偶有早期减速，应采取处置

- A. 密切观察胎头下降情况
- B. 会阴侧并加腹压
- C. 立即剖宫产
- D. 侧切下胎头吸引
- E. 产钳助产

59. 男，14 岁，感冒发热 10 天，体温高达 39.8℃，经医院治疗 3 天后体温恢复，出院后无明显诱因的讲话少，答少问少，在床上大便。查体：T37.9℃，P95 次/分，R20 次/分，Bp120/72mmHg。以下诊断最可能是

- A. 病毒脑炎
- B. 焦虑障碍
- C. 躯体感染性精神障碍
- D. 精神分裂
- E. 抑郁障碍

60. 女 38 岁，妊娠 18 周，既往生一智力低下儿，后因心脏病夭折，目前需要的检查是

- A. NT 检查
- B. 早期唐筛
- C. 羊水穿刺
- D. 染色体检查
- E. 无创 DNA

61. 男，20 岁，大学生，让其自我介绍时说“我今年 20 岁，今天太阳出来了，是个好日子，红桃 A 是病毒，我女朋友...”

- A. 思维奔逸
- B. 思维散漫
- C. 思维破裂
- D. 思维不连贯
- E. 思维迟缓

62. 男孩 2 岁，低热 2 天，轻咳，食欲欠佳，皮肤瘙痒。查体：胸腹部见红色斑丘疹及水疱，部分已结痂。考虑诊断为

- A. 猩红热
- B. 水痘
- C. 幼儿急疹
- D. 手足口病
- E. 麻疹

63. 女，G3P0，习惯性流产三次，预防流产应在妊娠多久时间开始预防宫颈管套扎

- A. 妊娠 24 周
- B. 妊娠 9 周
- C. 妊娠 32 周
- D. 妊娠 12 周
- E. 妊娠 34 周

64. 男性，48 岁，被木棍打击右颞枕部 12 小时，当时意识丧失，约 3 分钟后意识恢复，无恶心呕吐。查体：神志

2023 年临床执业历年真题

清，言语流利，双侧瞳孔等大等圆，对光反射灵敏，四肢肌力正常。(CT 图片:右侧枕颞部可见一双凸镜高密度影)，最可能的诊断是

- A. 硬膜下积液
- B. 硬膜外血肿
- C. 硬膜下血肿
- D. 硬膜外脓肿
- E. 硬膜外积液

65. 足月儿，曾宫内窘迫，羊水Ⅲ度污染，产钳助产，生后肌张力下降，无自主呼吸，最佳处理

- A. 气管插管机械通气
- B. 胸外按压
- C. 气管插管并吸除胎粪
- D. 清理呼吸道，吸净黏液，并保持气道通畅
- E. 保暖、摆好体位、清理呼吸道、诱发自主呼吸

66. 男婴，5 个月，咳嗽 3 天，喘憋 1 天，查体 37.8℃，P150 次每分，R66 次每分，精神可，鼻翼煽动，口唇轻度发绀，三凹征阳性，双肺呼吸相哮鸣音及少许湿啰音，实验室检查血 WBC $4.0 \times 10^9/L$ ，NO.35，LO.65。最可能的诊断是

- A. 呼吸道合胞病毒性肺炎
- B. 金黄色葡萄球菌肺炎
- C. 肺炎链球菌肺炎
- D. 支原体肺炎
- E. 腺病毒肺炎

67. 男，12 岁，颅 CT 示脑室高密度，脑血管造影示双侧颈内动脉闭塞，颅底异常脑血管网形成，诊断

- A. 脑动脉瘤
- B. 脑动静脉畸形
- C. 脑血管病
- D. 脑静脉瘤

E. 脑烟雾病

68. 患儿，2 岁，发热 1 天，发热 39.4 摄氏度，3 小时候前突发抽搐一次，面色发绀，意识丧失，持续时间 1 分钟自行停止，后精神良好。拟诊断为

- A. 病毒性脑炎
- B. 热性惊厥
- C. 化脓性脑炎
- D. 癫痫
- E. 结核性脑膜炎

69. 女，27 岁，孕 37 周，近 1 周反复阴道流血 3 次 1 小时前再次出现阴道多量流血，无腹痛，查体 P105 次/分，BP85/50mmHg，胎心 150 次/分，正确处理是

- A. 行 OCT 试验
- B. 继续观察
- C. 尽快剖宫产
- D. 积极引产
- E. 抑制宫缩期待治疗

70. 男性患者，近年来记忆力渐差，把虚构的事件填补记忆，不认识家人，不辨方向。有时在深夜看到屋里有人影晃动。饮酒 20 年，每天 250ml。最可能的诊断是

- A. 血管性痴呆
- B. 震颤谵妄
- C. 阿尔茨海默病
- D. 酒精性痴呆
- E. 科萨科夫综合征

71. 男孩，2 岁，纳差，消瘦 2 个月，伴发育倒退，查体:T36.5℃，P120 次/分，R26 次/分，贫血貌，颜面轻度水肿，表情呆滞，皮肤黏膜苍白，心肺未见异常，腹软，肝肋下 4cm，脾肋下 3cm，无颈抵抗，实验室检查，血 Hb88g/L，RBC $1.9 \times 10^{12}/L$ ，外周血涂

2023 年临床执业历年真题

片示 RBC 大小不等，以大细胞为多。
最可能的诊断是

- A. 再生障碍性贫血
- B. 维生素 B12 缺乏所致营养性巨幼细胞性贫血
- C. 缺铁性贫血
- D. 地中海贫血
- E. 叶酸缺乏所致营养性巨幼细胞性贫血

72. 女，26 岁，妊娠 32 周，1 小时前突发腹痛，阴道少量流血，面苍白，脉搏弱，P120 次/分，BP100/110mmHg，子宫大于妊娠周期，硬如板状，胎心不清。可诊断为

- A. 先兆早产
- B. 先兆子宫破裂
- C. 羊水栓塞
- D. 胎盘早剥
- E. 前置胎盘

73. 男，16 岁，反复左侧肢体抽搐 1 年，每次发作先由左手抽动，逐渐波及左上肢，并向左肩扩展，最后发展至左面部，每次发作持续 30 秒即可自行缓解。在发作时神志清醒，考虑为癫痫，则最大可能性为哪种发作类型

- A. 继发全面性强直阵挛发作
- B. 肌阵挛发作
- C. 单纯感觉发作
- D. 复杂部分发作
- E. Jackson 发作

74. 新生儿，20 天，胎龄 42 周，出生体重 4300g，出生后腹胀，便秘，喂养困难，查体：刺激后反应差，面部和巩膜黄染，心肺未见异常，腹部膨隆，脐疝，四肢肌张力低下，四肢末梢稍凉，血常规：Hb122g/L，白细胞 $7 \times 10^9/L$ ，NO.3，LO.6，TSH50mU/L，血培养阴性，最可能的诊断是

- A. 先天性甲状腺功能减退症
- B. 新生儿缺血缺氧性脑病
- C. 新生儿溶血病
- D. 先天性巨结肠
- E. 新生儿败血症

75. 初产妇，30 岁，孕前体检发现房间隔缺损，现妊娠 26 周，无心慌气短，超声心动图发现房间隔缺损 0.6cm^2 ，EF68%。为发现早期心力衰竭，每周孕检一次，开始的孕周应该是

- A. 28 周
- B. 30 周
- C. 32 周
- D. 34 周
- E. 36 周

76. 女性，27 岁，妊娠 20 周，外阴可见对称性密集分布呈鱼卵样小丘疹，表面光滑，触摸有颗粒感，酸白试验阴性，拟诊断为

- A. 尖锐湿疣
- B. 假性湿疣
- C. 皮脂腺异位
- D. 扁平湿疣
- E. 鲍温样丘疹病

77. 女，16 岁，进食困难 1 年。过分关注体重，认为自己胖，拼命节食，多吃就催吐，偶有贪食。过去的一年体重从 55Kg 下降至 35Kg，闭经，自觉精神良好。身高 165cm，无明显异常体征。甲状腺功能：FT3:4.16pg/mol，FT4:14.69pg/mol，TSH:14.63IU/ml。可能的诊断是

- A. 抑郁障碍
- B. 广泛性焦虑障碍
- C. 神经性厌食
- D. 强迫障碍
- E. 甲状腺功能减退症

2023 年临床执业历年真题

78. 患儿 1 岁，活动时喜下蹲及被大人抱，体检发现口唇发绀。下列哪项不正确

- A. 右心房扩大
- B. 右心室扩大
- C. 左心室扩大
- D. 房间隔缺损
- E. 支气管动脉和肺血管侧支循环建立

79. 男，3 岁，多汗乏力 1 年余，有 2 次肺炎病史，查体：胸骨左缘 2-3 肋间闻及 3/6 级收缩期杂音，肺动脉瓣区第二心音固定分裂，该患儿胸部 X 线心影形态最可能是

- A. 烧瓶状
- B. 靴形心
- C. 梨形心
- D. 球形心
- E. 卵圆形

80. 男婴，4 个月，冬季出生，足月顺产，母乳喂养，近 1 个月出现夜惊，烦躁，易激惹，请问可能出现下列哪项

- A. 手足镯
- B. 颅骨软化
- C. 方颅
- D. 鸡胸
- E. X、O 型腿

81. 男，35 岁，右侧耳后疼痛后，伴口角歪斜，查体：右侧鼻唇沟变浅，右侧额纹消失，Bell 征 (+)，下面可能的诊断是

- A. 脑血管病
- B. 蛛网膜下腔出血
- C. 面神经炎
- D. 吉兰-巴雷综合征
- E. 脑脊膜炎

82. 出生 4 周，妊娠 42 周男婴，出生

时烦躁声嘶，喂食情况不好，脐周膨隆，肌张力弱，可能的诊断是

- A. 缺血缺氧性脑病
- B. 先天性巨结肠
- C. 脑出血
- D. 脑梗死
- E. 脓毒血症

83. 新生儿，5 天，腹胀，未排胎便，查体：体重 3.2kg，精神欠佳，腹部见静脉，肠鸣音亢进。为明确诊断首选

- A. 直肠肛门镜
- B. 直肠指检
- C. 直肠肛门肌活检
- D. 钡剂灌肠
- E. 立位 X 线平片

84. 男，68 岁，吃饭时突感左侧肢体无力，伴视物重影，既往高血压病史。查体：神志清楚，右侧眼球外斜外展，右侧瞳孔散大，双侧额纹正常，左侧鼻唇沟浅，左侧肢体肌力 1 级，左侧巴彬斯基征阳性，该患者表现符合

- A. 基底动脉尖综合征
- B. 大脑脚综合征
- C. 闭锁综合征
- D. 霍纳征
- E. 延髓腹外侧综合征

85. 40 岁女性，G4P1，月经规律，经量正常，近 1 个月阴道分泌物增多，接触性出血，肝肾功能无异常，卵巢功能正常，诊断为

- A. 子宫内膜癌
- B. 子宫肌瘤
- C. 子宫颈炎
- D. 妊娠
- E. 葡萄胎

86. 女，31 岁，自然分娩后 1 天，诉下腹部阵发性疼痛。阴道少量流血，

2023 年临床执业历年真题

暗红色，阴道血性恶露。查体：T37.8℃，宫底平脐，质硬，无压痛，阴道少量流血，量少于月经量。该患者属于

- A. 软产道裂伤
- B. 正常产褥
- C. 异常产褥
- D. 子宫复旧不全
- E. 产道出血

87. 女，30 岁，结婚 3 年未避孕未孕，伴下腹坠胀。月经 8-9 天/26-28 天，妇科检查：子宫后位，活动度较差，形状不规则，双附件区未触及明显异常。以下检查对诊断价值最小的是

- A. 盆腔 B 超
- B. 基础体温测定
- C. 分段诊刮
- D. 腹部立位片
- E. 子宫输卵管碘油造影

88. 产妇，39 周，胎心正常，先露 S-2，宫高 35cm，腹围 115cm，出口后矢状径+坐骨结节间径 13cm，胎膜未破，下一步怎么处理

- A. 剖宫产
- B. 继续观察
- C. 缩宫素
- D. 人工破膜
- E. 引产

89. 肾病综合征患儿，口服泼尼松 2mg/kg/d，治疗 8 周后尿蛋白仍(++++)。疗效判断为

- A. 激素依赖型
- B. 激素敏感型
- C. 激素耐药型
- D. 复发
- E. 频复发

90. 女，孕 40 周，宫高 35 厘米，腹围

110 厘米，下腹不规律疼痛伴阴道流血 1 天，妇科检查：宫口开 1 指，胎膜已破，双足先露，接下来应该做什么

- A. 经 B 超外旋转
- B. 经阴道内旋转
- C. 自然分娩
- D. 静点缩宫素
- E. 剖宫产

91. 女，一年零 6 个月，发热两天，流涎，拒食，T38.6℃，P138 次/分，R38 次/分，颌下淋巴结肿大，咽充血，咽腭弓、腭垂、软腭有数个疱疹，舌面及齿龈有小疱疹，且部分小疱疹破溃变成溃疡，心肺腹无异常，最可能的病原体是

- A. EB 病毒
- B. 单纯疱疹病毒
- C. 白念珠菌
- D. 腺病毒
- E. 柯萨奇病毒

92. 女，16 岁，月经不规律，近半年月经量增多，无痛经，基础体温单相型，盆腔 B 超示子宫及双附件阴性。该患者月经增多的原因最可能是

- A. 子宫内膜炎
- B. 黄体功能不良
- C. 黄体萎缩不全
- D. 无排卵性子宫异常出血
- E. 子宫腺肌病

93. 男，70 岁，走路缓慢伴右上肢摆动消失 2 年，常跌倒，查体：面部呆板，颈肌张力高，右侧肢体肌张力高于左侧，静坐时，右手震颤，四肢肌力 5 级，腱反射减退，双侧 Babinski 征阴性，其余神经系统检查无异常，头颅 MRI：皮质内 2 个小的腔隙灶。最可能的诊断是

- A. 特发性震颤

2023 年临床执业历年真题

- B. 帕金森叠加综合征
- C. 血管性帕金森综合征
- D. 多系统萎缩
- E. 帕金森病

94. 女, 30 岁, 阴道不规则流血 20 天, 咳嗽 10 天, 自行服用抗生素治疗无明显好转。半年前行人工流产, 吸出物见到绒毛组织。妇科检查: 子宫如 40 天妊娠大小, 质软, 双侧附件区均可触及大小约 5cm 的囊性包块, 胸部 X 线片示双侧中下野多发棉球状阴影。首先考虑的诊断是

- A. 绒癌
- B. 葡萄胎
- C. 侵袭性葡萄胎
- D. 先兆流产
- E. 稽留流产

95. 经产妇, 32 岁, 孕 39 周, 估算胎儿体重 3800g, 骨盆外测量正常, 规律宫缩 15 小时, 间歇 8 分钟, 持续 30 秒, 宫口开 4cm, 胎膜已破, LOA, S=-1, 心电图 I 型。以下有可能的是

- A. 子宫协调性收缩乏力
- B. 子宫不协调性收缩乏力
- C. 子宫协调性收缩过强
- D. 子宫不协调性收缩过强
- E. 腹肌膈肌收缩减弱

96. 经产妇, 32 岁, 孕 39 周, 估算胎儿体重 3800g, 骨盆外测量正常, 规律宫缩 15 小时, 间歇 8 分钟, 持续 30 秒, 宫口开 4cm, 胎膜已破, LOA, S=-1, 胎心监护 I 型。最恰当的治疗措施是

- A. 人工破膜
- B. 静滴缩宫素
- C. 剖宫产
- D. 肌注哌替啶
- E. 肌注地西洋

97. 婴儿, 18 个月, 逗之不笑, 面色蜡黄, 有阵发性肢体不规则颤动, 经常咳嗽和腹泻, 查血象: Hb61g/L, MCV102f1, MCH 升高, MCHC 正常, 该患儿最可能缺乏以下哪种物质

- A. 维生素 B12
- B. 维生素 A
- C. 铁
- D. 维生素 C
- E. 维生素 B6

98. 男孩, 6 岁, 自幼发现心脏杂音, 查体胸骨左缘第 2 肋间连续机器响杂音。该患者的血流动力学特点是

- A. 主动脉收缩血流向肺动脉, 左向右分流
- B. 主动脉血舒张期流向肺动脉, 左向右分流
- C. 主动脉血全心周期流向肺动脉左向右分流
- D. 左心室血流向右心室, 左向右分流
- E. 右心房收缩期流向左心房, 右向左分流

99. 女, 63 岁, 因卵巢肿瘤行手术治疗, 术中见左卵巢囊实性肿物, 内壁有质脆乳头, 病理切片可见沙粒体。为进行病情监测和疗效评估, 最常用的肿瘤标志物是

- A. CA125
- B. CA199
- C. AFP
- D. HCG
- E. ER2

A3/A4 型选择题

(100~101 题共用题干)

男婴, 6 个月, 腹泻 6 个月, 4-7 次/天, 粘稠样便, 无呕吐, 无发热, 食欲尚可, 精神尚可, 出生体重 3.2kg,

2023 年临床执业历年真题

现体重 7.1kg，身高 63cm。单纯母乳喂养，查体：无乳牙，无脱水样貌，营养发育正常，心肺无异常，腹部肠蠕动，肠鸣音正常。

100. 考虑的诊断是

- A. 过敏性腹泻
- B. 感染性腹泻
- C. 生理性腹泻
- D. 消化功能紊乱
- E. 轮状病毒性肠炎

101. 可行处理方法

- A. 减少母乳喂养次数，使用蛋白水解配方奶
- B. 继续母乳喂养逐步由少到多添加米糊，米糊等辅食
- C. 使用止泻药
- D. 使用抗生素
- E. 停止母乳喂养

(102~103 题共用题干)

女，38 岁，接触性出血 1 周，月经规律，G3P1，妇科检查：宫颈上唇见 1.0cm×0.5cm，糜烂样改变，质脆，触血明显，子宫及双附件未触及异常，三合诊宫旁软。

102. 最有助于确诊的检查是

- A. 妇科超声检查
- B. 宫颈染色细胞学检查
- C. 宫颈活组织检查
- D. 人乳头状瘤病毒检查
- E. 阴道分泌物检查

103. 若该患者确诊为鳞状细胞癌，基底膜下浸润深度 2mm，则分期是

- A. I A1
- B. I A2
- C. II B1
- D. II B2
- E. II B3

(104~105 题共用题干)

女，62 岁，G6P4，绝经 6 年，阴道反复少量流血 4 个月，糖尿病病史 5 年。查体：BP160/105mmHg，身高 155cm，体重 80kg，妇科检查：阴道少量流血，宫颈光滑，子宫正常大小，双侧附件未见异常。经阴道超声检查：子宫内膜 1.1cm，不规则增厚，其内与相邻肌层内血流丰富。

104. 与该病无关的因素是

- A. 多产
- B. 肥胖
- C. 高血压
- D. 绝经延迟
- E. 糖尿病

105. 经阴道超声检查：子宫内膜 1.1cm，不规则增厚，其内与相邻肌层内血流丰富。以下适合的手术方法

- A. 广泛性子宫切除+双附件子宫切除+盆腔，腹部动脉淋巴结切除术
- B. 大剂量激素治疗
- C. 宫腔镜子宫内膜电极切除术
- D. 筋膜外全子宫切除术+双附件子宫切除术+盆腔，腹部动脉淋巴结切除术
- E. 子宫内膜消融术

(106~107 题共用题干)

女，50 岁，反复肢体抽搐 2 年，发作时四肢抽搐，伴意识丧失，数分钟后缓解。4 个月内类似症状出现 3 次。查体：T:36℃，血压:140/90mmHg，神志清楚，脑神经检查正常。四肢肌力 5 级，肌反射对称，病理反射阴性。MRI 提示顶叶巨大占位。

106. 考虑诊断为

- A. 脑出血
- B. 脑脓肿
- C. 颅内肿瘤
- D. 静止性震颤

2023 年临床执业历年真题

E. 癫痫

107. 下列哪项治疗有效

- A. 手术治疗
- B. 使用镇静剂治疗
- C. 使用激素治疗
- D. 使用扩血管药物治疗
- E. 抗癫痫治疗

(108~109 题共用题干)

初产妇，21 岁，妊娠 33 周，头晕头痛，视物模糊 3 天，加重 1 天。3 天前出现头晕，头痛，视物模糊，未诊治，1 天前明显加重，急诊测血压 160/110mmHg，尿蛋白(+++)，NST 无反应型，既往体健。

108. 最可能的诊断

- A. 重度子痫前期
- B. 慢性高血压合并子痫前期
- C. 妊娠期高血压
- D. 慢性高血压合并妊娠
- E. 子痫

109. 不适宜使用的药物

- A. 地西洋
- B. 拉贝洛尔
- C. 地塞米松
- D. 硫酸镁
- E. 硝普钠

(110~111 题共用题干)

初产妇，35 岁，身高 150cm，胎儿估重 3500g，妊娠 38+5 周，自然临产 20 小时，现宫缩间隔 1-2 分钟，持续 40~60s，患者烦躁，疼痛，平脐可见缩复环，子宫下段压痛，胎心监测反复早期减速，宫口近开全，S=+2。

110. 最可能的诊断是

- A. 子宫痉挛性缩复环
- B. 活跃期停滞
- C. 高张性子宫乏力

D. 胎盘早剥

E. 先兆子宫破裂

111. 最适宜的处理是

- A. 剖宫产
- B. 徒手旋转胎头
- C. 加强宫缩
- D. 胎吸引产
- E. 产钳引产

(112~113 题共用题干)

女，35 岁，G2P1，不规则阴道流血 1 月余。平素月经不规律，末次月经不详。查体：T36℃，P80 次/分，R18 次/分，BP100/70mmHg，面色苍白。妇科检查：外阴、阴道及宫颈未见异常，子宫如妊娠 4 个月大小，质软，双附件未触及异常。超声示子宫大小 18cm×10cm×6cm，宫腔内充满蜂窝状不均质回声。尿 hCG(+)，胸部 CT 未见异常。

112. 下一步首选的处理是

- A. 保胎治疗
- B. 药物流产
- C. 化疗
- D. 腹腔镜探查
- E. 清宫术

113. 患者术后 1 周复查血 hCG2030.0U/L，无阴道流血，无咳嗽咳痰。超声见宫腔少量积液。下一步最正确的处理是

- A. 1 周后复查 hCG
- B. 1 周后复查妇科超声
- C. 1 个月后复查 hCG
- D. 1 个月后复查妇科超声
- E. 2 个月后复查 hCG

(114~116 题共用题干)

女，48 岁，G2P1，继发性痛经 10 年，加重 4 年，近两年口服止痛药效果差，T36.2，P70 次/分，R22 次/分，心肺

2023 年临床执业历年真题

未见异常，腹部无压痛、反跳痛。查体：无宫颈举痛，双侧附件区无肿大，子宫后位球部增大，子宫大小如孕 3 个月，质硬、压痛，双附件、盆腔正常。

114. 其发病原因可能是

- A. 孕激素长期刺激
- B. 子宫内膜功能层缺陷
- C. 子宫内膜随经血逆流
- D. 雌激素刺激
- E. 子宫内膜基底层侵入基层

115. 除痛经外，还可能伴哪些症状

- A. 接触性出血
- B. 性交痛
- C. 月经量增多
- D. 尿频
- E. 便秘

116. 若 Hb85g/L，最适合的治疗方法是

- A. 放置左炔诺孕酮宫内缓释系统
- B. 大剂量孕激素
- C. 中药
- D. 手术治疗
- E. 口服避孕药

(117~119 题共用题干)

男，22 岁，3 年来无明显诱因出现孤僻，不愿外出与人交往，白天窗帘紧闭，生活懒散，夏天可长达半个月不洗澡，头发很长也不理，头颅 CT 未见明显异常，精神检查：表情淡漠，话少，否认幻觉，思维贫乏，情感淡漠，自知力差。

117. 诊断考虑

- A. 精神分裂症
- B. 广泛性社会焦虑
- C. 自闭症
- D. 抑郁症
- E. 社会回避人格障碍

118. 治疗为

- A. 抗抑郁药物
- B. 心境稳定剂
- C. 精神兴奋剂
- D. 抗精神病药物
- E. 抗焦虑药物

119. 该患者服用精神药物后，症状明显好转，但出现静不能坐，手抖等症状，下一步的治疗应该

- A. 加量使用该精神药物
- B. 该用其他不同机制作用的精神药物
- C. 减量使用该精神药物
- D. 停用该精神药物
- E. 加用苯海索治疗

(120~122 题共用题干)

女孩，4 岁，发热咳嗽流涕 4 天，发疹 1 天，体温 39.5° C，心率 130 次/分，呼吸 38 次/分，精神萎靡，头颈部出现红疹，疹间皮肤正常，眼结膜充血有分泌物，淋巴结未触及，口腔充血粗糙，心肺正常，肝触及边，脾未触及，血红蛋白 115g/L，白细胞 $6.5 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞 0.35，淋巴细胞 0.6，血小板 $261 \times 10^9/L$ 。

120. 最可能的诊断是

- A. 风疹
- B. 猩红热
- C. 麻疹
- D. 幼儿急疹
- E. 药物疹

121. 最可能的合并症是

- A. 肺炎
- B. 脓气胸
- C. 肺脓肿
- D. 心肌炎
- E. 麻疹脑炎

2023 年临床执业历年真题

122. 若退热后，头面及躯干皮疹，双肺呼吸音细湿罗音，最佳处理措施是

- A. 隔离治疗
- B. 抗过敏
- C. 丙种球蛋白
- D. 抗生素
- E. 阿司匹林

(123~124 题共用题干)

男孩，5 岁。持续高热 1 周。皮疹 2 天，查体： $T39^{\circ}\text{C}$ ， $P128$ 次/分， $R36$ 次/分。热病容，双眼结合膜充血，口唇干裂，可见草莓舌，皮肤可见弥漫性斑丘疹，颈部左侧可触及一直径 2cm 淋巴结。心音有力，手足指(趾)硬性水肿。

123. 最可能的诊断

- A. 川崎病
- B. 手足口病
- C. 败血症
- D. 风湿热
- E. 猩红热

124. 治疗首选

- A. 大剂量丙种球蛋白
- B. 小剂量阿司匹林
- C. 抗生素
- D. 糖皮质激素
- E. 双嘧达莫

(125~127 题共用题干)

儿童，7 岁左膝疼痛 3 天，寒战高热 1 天，查体： $T39.5^{\circ}\text{C}$ ，左侧股骨下段近关节处肿胀疼痛，查体明显压痛，浮髌试验阴性。实验室检查：血 $\text{WBC}22 \times 10^9/\text{L}$ ， $\text{N}0.86$

125. 最可能的诊断是

- A. 骨巨细胞瘤
- B. 化脓性关节炎
- C. 骨肉瘤
- D. 急性血源性骨髓炎

E. 膝关节结核

126. 早期诊断最有价值的检查方法是

- A. 局部脓肿分层穿刺
- B. 核素骨显像
- C. CT
- D. 超声
- E. 关节镜

127. 治疗首选的抗生素

- A. 三代头孢
- B. 氧氟沙星
- C. 青霉素
- D. 庆大霉素
- E. 克林霉素

(128~129 题共用题干)

女，32 岁，已婚，G1P0，经量增多 2 年，伴头晕乏力 1 个月，既往月经规律。妇科检查：子宫增大如妊娠 3 个月大小，子宫前壁触及直径约 8 厘米突起，质地较硬。

128. 最可能的诊断

- A. 子宫腺肌症
- B. 子宫肌瘤
- C. 异位妊娠
- D. 子宫内膜癌
- E. 子宫内膜异位症

129. 最佳处理方法是

- A. 子宫肌瘤切除术
- B. 子宫动脉栓塞术
- C. 次全子宫切除术
- D. 药物治疗
- E. 高能聚焦超声治疗

B1 型选择题

(130~131 题共用备选答案)

- A. 稽留流产
- B. 不全流产
- C. 先兆流产

2023 年临床执业历年真题

- D. 难免流产
- E. 完全流产

130. 最容易发生感染的流产类型

131. 阴道少量流血，B 超提示宫内胎儿存活的是

(132~133 题共用备选答案)

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 肺炎链球菌+脑膜炎双球菌
- C. 肺炎链球菌+大肠埃希菌
- D. 结合分枝杆菌
- E. 流感嗜血杆菌+肺炎链球菌

132. 3 个月以上的婴幼儿引起非传染性脑膜炎的病原体是

133. 12 岁以上的儿童引起化脓性脑膜炎最常见的病原体是

(134~135 题共用备选答案)

- A. 未结合胆红素升高，Coombs 直接实验阳性
- B. 未结合胆红素轻度升高，Coombs 直接实验和间接实验阴性
- C. 结合胆红素升高，肝功能异常
- D. 结合胆红素升高，游离抗体增高
- E. 结合胆红素增高，游离抗体降低

134. 新生儿溶血实验室检查结果为

135. TORCH 感染的实验室指标为

(136~137 题共用备选答案)

- A. Asherman 综合征
- B. 子宫穿孔
- C. 空气栓塞
- D. 人工流产综合征
- E. 吸宫不全

136. 女性患者行人工流产术中突发胸闷，冷汗，面色苍白，心动过缓，心律不齐，可能的原因

137. 人工流产术后阴道持续流血 2 周未净，可能的诊断是

(138~139 题共用备选答案)

- A. 青霉素
- B. 克林霉素
- C. 头孢曲松
- D. 氧氟沙星
- E. 阿奇霉素

138. 女，27 岁，孕 30 周，白带增多 6 天，妇科检查：外阴正常，阴道见浆液性脓性分泌物，宫颈红肿，轻度糜烂，Glemlsa 染色可见包涵体，该病原体治疗是

139. 女，32 岁，妊娠 12 周，阴道检查发现大阴唇红肿，可见圆形小溃疡，阴道分泌物检查可见活跃的苍白球螺旋体，首选治疗是

(140~141 题共用备选答案)

- A. 血 TSH 测定
- B. 染色体核型分析
- C. 尿三氯化铁实验
- D. 尿蝶呤分析
- E. 血浆氨基酸分析

140. 儿童苯丙酮尿症的确诊检查是

141. 儿童苯丙酮尿症的初筛选用的检查是

(142~143 题共用备选答案)

- A. 胎盘早剥
- B. 子宫收缩乏力
- C. 凝血功能障碍
- D. 胎盘剥离不全
- E. 软产道损伤

142. 某产妇，胎儿娩出后，立即出现阴道流血，数分钟内出鲜血 200ml 出血的原因是

2023 年临床执业历年真题

143. 双胞胎生产，第一胎顺产，第二胎人工破膜后随即出血，出血的原因是

(144~145 题共用备选答案)

- A. 情绪不稳
- B. 焦虑
- C. 易激惹
- D. 恐惧
- E. 情绪高涨

144. 患者常因极小的事情而产生较强烈的情绪反应，该症状为

145. 患者惶恐不安，坐立不安，十分紧张，为

(146~147 题共用备选答案)

- A. 分水岭脑梗死
- B. 短暂性脑缺血发作
- C. 脑栓塞
- D. 脑血栓形成
- E. 腔隙性脑梗死

146. 导致脑梗死最常见的病因是

147. 相邻两血管供血区分界处缺血所导致的卒中类型是

(148~149 题共用备选答案)

- A. 出生后 10~12 个月
- B. 出生后 2 个月
- C. 出生后 4~6 个月
- D. 出生后 7~9 个月
- E. 出生后 2 周

148. 足月儿开始添加肉末、菜末的时间是

149. 足月儿开始添加粥、软饭、碎肉等时间

答案

第一单元

1. 答案:C

解析:患者青年女性,典型三多一少症状(多饮,多尿,易饥,体重下降),空腹血糖 14.2mmol/L(大于 6.1),空腹血清胰岛素降低,为胰岛素绝对不足(胰岛素降低血糖的机制是使血糖的去路增强、来源减弱)。则该患者胰岛素降糖作用减弱,即组织用糖减少,葡萄糖分解减少,糖原合成较少、分解增加,三羧酸循环减弱,糖异生增加。

2. 答案:D

解析:抑郁自评量表(SDS)包含 20 个项目,采用四级评分方式,该量表使用方法简便,能相当直观地反映病人抑郁的主观感受及严重程度。使用者也不需经特殊训练。目前多用于门诊病人的粗筛、情绪状态评定以及调查、科研等。所以,对高校抑郁高危学生的抑郁程度定量评估最宜选择 SDS 自评量表。

3. 答案:B

解析:在活体的心脏和血管内血液发生凝固或血液中某些有形成分凝集形成固体质块的过程,称为血栓形成。

4. 答案:E

解析:发绀、以及发现血液中高铁血红蛋白增高(亚硝酸盐中毒),故选 E。

5. 答案:A

解析:聚合思维也称求同思维,就是把解决问题所能提供的各种信息聚合起来,得出一个正确的答案或一个最好的解决问题的方案。本例医生结合该患者的所有临床症状,最后得出患者肺癌的诊断,所以属于聚合思维。

2023 年临床执业历年真题

6. 答案:B

解析:患病率也称现患率,表示某一时间点某人群中患某病的频率,通常用表示病程较长的慢性病的发生或流行情况。属于现况调查可以调查的指标。

7. 答案:B

解析:处方医师签名式样和专用签章应与院内药学部门留样备查的式样相一致,不得任意改动,否则应当重新登记留样备案。

8. 答案:B

解析:痛风需要低嘌呤饮食,所以推断出痛风与嘌呤代谢有关。

9. 答案:E

解析:传导最慢的是房室交界区,传导最快的是浦肯野纤维。

10. 答案:B

解析:产生温室效应的是 CO₂,产生酸雨的是 SO₂,对臭氧层破坏的是氯氟烃(又名氟里昂)。

11. 答案:B

解析:本我是与生俱来的动物式的活动,相当于潜意识内容,它服务于快乐原则,它不看条件、不问时机、不计后果地寻求本能欲望的即时满足和紧张的立即释放。患者总是以自我快乐为中心,不顾现实情况,属于本我。

12. 答案:A

解析:储存并传递遗传信息的物质是 DNA。DNA 存在于细胞核和线粒体内,携带遗传信息,并通过复制的方式将遗传信息进行传代。

13. 答案:A

解析:因抢救生命垂危的患者等紧急情况,医师可以越级使用抗菌药物。越级使用抗菌药物应当详细记录用药指征,并应当于 24 小时内补办越级使用抗菌药物的必要手续。

14. 答案:E

解析:劣药是指药品成分的含量不符合国家药品标准的,为劣药。超过有效

期的药品也属于劣药。成分不符、变质、非药品冒充、超出治疗范围均属于假药范畴。

15. 答案:E

解析:当血压突然降低时:①颈动脉窦压力感受器传入冲动减少(D对),因此传入孤束核神经元冲动下降(B对)。②迷走紧张减弱(A对)。③交感紧张加强(C对),心率增快,心输出量增加,外周阻力增高,使降低的血压回升。

16. 答案:C

解析:患者暗适应时间延长,为缺乏维生素 A 的表现,胡萝卜中含有 β-胡萝卜素,被称为维生素 A 原,可在体内生成全反式视黄醇,改善对弱光的敏感性。

17. 答案:B

解析:尼古丁上瘾,焦油致癌,一氧化碳是烟雾的主要成分。

18. 答案:C

解析:中年女性,常于喝牛奶后出现腹痛,腹胀,腹泻症状,考虑为乳糖不耐受,原因为体内乳糖酶活性减低,可食用酸奶,因牛奶发酵成酸奶过程中乳糖部分变为乳酸,且乳酸菌也会产生乳糖酶,减轻乳糖不耐受症状。

19. 答案:E

解析:传染病暴发、流行时,国务院卫生行政部门负责向社会公布传染病疫情信息。并可以授权省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门向社会公布本行政区域的传染病疫情信息。

20. 答案:C

解析:略。

21. 答案:E

解析:略。

22. 答案:B

解析:患者暗适应时间延长,为缺乏维生素 A 的表现。

23. 答案:B

2023 年临床执业历年真题

解析:一般情况,处方当日有效。特殊情况需要延长有效时限的,最长不能超过 3 天。

24. 答案:C

解析:患者有腹痛,黄疸,发热等表现,彩超提示有胆总管扩张,下段显示不清,提示结石嵌顿在胆总管。考虑诊断为梗阻性胆管炎。

25. 答案:A

解析:略。

26. 答案:B

解析:患者在按医嘱服药后血糖得到有效控制得到了生理效益,从而更愿意遵从遗嘱服药,这属于强化因素。

27. 答案:E

解析:器官捐献互盲原则。

28. 答案:C

解析:第 3 级神经元的胞体在背侧丘脑的腹后外侧核,它们发出纤维称丘脑中央辐射,经内囊后肢投射到中央后回中、上部和中央旁小叶后部。

29. 答案:C

解析:艾滋病、非典型肺炎、病毒性肝炎属于乙类传染病。

30. 答案:B

解析:艾滋病特征为严重的免疫抑制早期淋巴滤泡明显增生,髓质内较多浆细胞;随着病变发展,滤泡外层淋巴细胞减少或消失,小血管增生,副皮质区 CD4⁺T 细胞进行性减少,浆细胞浸润,晚期淋巴结呈现一片荒芜,淋巴细胞几乎消失殆尽,仅残留少许巨噬细胞和浆细胞。

31. 答案:C

解析:发生脊髓休克时,由于脊髓失去高位中枢大脑皮层的控制,表现为尿潴留;当脊髓休克过去后,脊反射恢复,但仍不受高位中枢控制,表现为尿失禁。

32. 答案:E

解析:患者老年男性,慢性病程急性加

重,尿频、尿急、夜尿增多、排尿困难,应诊断为前列腺增生,该病好发于前列腺的移行带。

33. 答案:A

解析:AFP 对诊断原发性肝癌有重要作用。当 AFP>400ng/ml 时,超声、CT 或 MRI 发现肝实质性肿块,具有肝细胞癌典型影像学表现着可以确诊。(A 对)。CA199 主要反应消化道肿瘤,如胰腺,直肠等。(B 错)。CA125 主要对于卵巢较为敏感如果出现卵巢上皮癌时 CA125 会明显升高。(C 错)。PSA 指前列腺特异性抗原,主要反应前列腺肿瘤。(D 错)。CEA 主要反应结直肠癌,胰腺癌,肺癌等。(E 错)。

34. 答案:C

解析:甲状腺癌颈部手术,副神经支配胸锁乳突肌和斜方肌。斜方肌瘫痪时产生“塌肩”。

35. 答案:B

解析:鸟型分枝杆菌复合体可引起免疫低下人群的感染,是艾滋病病人常见的机会致病菌(B 对)。

36. 答案:B

解析:银环蛇、金环蛇为神经毒的毒蛇,通过抑制乙酰胆碱受体,导致肌肉瘫痪。而眼镜蛇的神经毒素影响乙酰胆碱释放。

37. 答案:C

解析:HIV 主要侵犯宿主 CD4⁺细胞以及表达 CD4 分子的单核/巨噬细胞、树突状细胞和神经胶质细胞等。

38. 答案:A

解析:药品导致的死亡病例须立即上报。

39. 答案:E

解析:苦杏仁味-氰化氢中毒。

40. 答案:D

解析:患者年轻男性,发热且全身多处出现淋巴结肿大。淋巴结活检提示淋巴结边缘融合破坏,免疫提示 CD20(+),组织病理类型应为弥漫性

大 B 细胞淋巴瘤。

41. 答案:D

解析:线图是通过线段的上升或下降来表示指标(变量)的连续变化过程,适用于描述一个变量随另一个变量变化的趋势和波动情况。本例想要了解 20 年来 2 型糖尿病患病率与时间的变化趋势,应采用线图。

42. 答案:E

解析:急性喉阻塞窒息时,进行环甲膜穿刺。因此选“环甲”。

43. 答案:C

解析:单盲:研究对象不知道自己被分在哪组和接受干预措施的具体内容称为单盲。本例试验属于随机单盲试验,所以接受治疗的患者不知道试验分组情况。

44. 答案:E

解析:患者诊断为:巨幼细胞性贫血,并伴有神经症状提示维生素 B12 缺乏。

45. 答案:E

解析:略。

46. 答案:C

解析:分层分析是把研究人群根据某特征或因素分为不同层,然后分别分析各层中暴露与疾病的关联。用以分层的因素是可能的混杂因素,通过分层分析,可以判断该因素是否起混杂作用,如果起混杂作用,通过分层分析可以加以控制,故分层分析的目的是控制混杂偏倚。

47. 答案:B

解析:略。

48. 答案:A

解析:鱼藤酮抑制复合体 I,从而阻断电子传递(A 对)。菱锈灵是复合体 II 的抑制剂,(B 错)。抗霉素 A、苯乙双胍等是复合体 III 的抑制剂(C 错)。CN⁻、N³⁻、CO 是复合体 IV 的抑制剂,(D 错)。无复合体 V(E 错)。

49. 答案:D

解析:B 超提示胎盘早剥,血小板和纤维蛋白原减少、D-二聚体升高提示 DIC。DIC 导致休克的机制:①大量微血栓形成,使回心血量明显减少,A 对。②广泛出血使血容量减少,E 对。③心肌损伤使心输出量减少。④激肽、补体的激活使微血管扩张,管壁通透性增强,外周阻力降低,回心血量减少,B、C 对。

50. 答案:B

解析:肺结核引起的免疫损伤为迟发型即 IV 型。过敏性休克为 I 型超敏反应,溶血为 II 型,III 型为免疫复合物型如肾小球肾炎、外源性哮喘,IV 型为 T 细胞介导的迟发型,如结核、梅毒。

51. 答案:A

解析:略。

52. 答案:B

解析:I 级:肌肉有轻微收缩,但不能移动关节(接近完全瘫痪)。II 级:肌肉收缩可带动关节水平方向运动,但不能对抗地心引力(重度瘫痪),III 级:能够对抗地心引力移动关节,但不能对抗阻力(轻度瘫痪)IV 级:能对抗地心力运动肢体且对抗一定强度的阻力(接近正常)。

53. 答案:C

解析:该患者大叶性肺炎。炎症导致肺泡表面活性物质减少,降低肺的顺应性,使肺泡扩张的弹性阻力增加。

54. 答案:B

解析:过敏反应为鱼类组胺中毒。

55. 答案:E

解析:边界不清是蜂窝织炎的特点。

56. 答案:A

解析:略。

57. 答案:D

解析:颞浅静脉不在三角区,在颞部。

58. 答案:A

解析:略。

59. 答案:A

解析：“柔软性麻痹”就是软瘫，周围瘫。小脑损伤不瘫。

60. 答案:D

解析:评选出优秀先进科室后,各医院科室看到了别人的成功和成就,又希望通过自身不断努力提高,在同样的评选中取得更好的成绩和荣誉。属于是“以典为先,以形感人”的方式促进。

61. 答案:A

解析:报经上一级人民政府决定采取的紧急措施有:限制集市、演出、聚集。停工停课停业。封闭水源食品物品。捕杀染疫动物。封闭可能扩散的场所。

62. 答案:B

解析:胰岛素主要促进肌肉、脂肪、蛋白质对葡萄糖的吸收,促进糖原的合成和贮存加速葡萄糖的氧化和酵解,并抑制糖原分解和异生,而降低血糖。

63. 答案:B

解析:表示连续性资料的频数分布用直方图(B对)。

64. 答案:D

解析:略。

65. 答案:B

解析:床位不满 100 张的医疗机构,其《医疗机构执业许可证》每年校验 1 次;床位在 100 张以上的医疗机构,其《医疗机构执业许可证》每 3 年校验 1 次。校验由原登记机关办理。ACDE 都是一级医院,只有 B 选项不同。(B 对)。

66. 答案:A

解析:因为是普查比较甲乙两地居民总的钩虫病患病率,故不需要进行假设检验,但已知男性钩虫病患病率高于女性,说明性别因素对钩虫病患病率有影响;而且两地性别构成不同,即甲地人口数男多于女,而乙地人口数女多于男,所以性别因素成为混杂因素。这样必须对性别标化后消除混

杂因素的影响后再进行两个标化率的比较。

67. 答案:C

解析:有利原则是指把有利于患者健康放在第一位,切实为患者谋利益,亦称行善原则。依法行使干涉权也是将患者健康放在第一位。

68. 答案:A

解析:患者诊断为伤寒,其致病菌为伤寒沙门菌。

69. 答案:C

解析:尸检发现脑白质和灰白质交界处多发呈白色半透明针尖大小空泡状液化性坏死,脑脊膜血管充血、水肿,考虑流行性乙型脑炎可能性大。乙脑病理检查肉眼可见软脑膜充血、水肿、出血,镜检可出现:神经细胞变性、坏死,软化灶形成,血管变化和炎症反应,胶质细胞增生,其中,灶性神经细胞的坏死、液化形成镂空筛网状软化灶,对本病的诊断具有一定的特征性,与本例尸检结果相符。

70. 答案:D

解析:患者现其妻子出轨,出现一系列躯体症状,但检查神经系统阴性。考虑其对心身症状的关注和敏感,考虑是癔症+疑病指标会升高。

71. 答案:A

解析:只有具备开立麻醉药品、一类精神药品处方资格的执业医师,才能开立麻醉药品、一类精神药品处方。

72. 答案:E

解析:“遏制疫情”是传染病的伦理要求。

73. 答案:E

解析:职业病的诊断要求:病史、体格检查、实验室检查。该地区的职业病发病率不是职业病的诊断要求。

74. 答案:B

解析:外源性感染是指来自宿主体外的病原菌所引起的感染。医院感染是指

2023 年临床执业历年真题

住院病人在医院内获得的感染，包括在住院期间发生的感染和在医院内获得出院后发生的感染，长期使用免疫抑制的患者出现在医院内发生感染，属于机体外源性病原菌所致。(B 对)。

75. 答案:C

解析:病理学胰体尾癌经门静脉肝内转移最常见。

76. 答案:B

解析:在男性，卵泡雌激素作用在睾丸的支持细胞以产生精子。对女性，FSH 作用于卵泡细胞产生卵子。

77. 答案:A

解析:略。

78. 答案:B

解析:血站在采血前应对其具有经血液传播疾病的检测，而甲型肝炎是经粪-口传播，不属于采血前的检测。

79. 答案:C

解析:偏态资料的均数用中位数。

80. 答案:D

解析:解剖分流为真性分流:支气管扩张症。

81. 答案:B

解析:白质变性后的特点:溶解度降低，易于沉淀，结晶能力消失，黏度增加，生物活性丧失，易被蛋白酶水解。

82. 答案:A

解析:前瞻性研究是以现在为起点追踪到将来的研究方法。

83. 答案:E

解析:腹股沟韧带下方的肿块为股疝，股疝的内侧壁为腔隙韧带。

84. 答案:C

解析:苯妥英钠的不良反应该包括局部刺激(恶心、呕吐、食欲缺乏)、牙龈增生、神经系统反应如眼球震颤、复视、眩晕、共济失调，巨幼细胞性贫血、低钙血症、过敏反应等，偶见男性乳房增大、女性多毛症、淋巴结肿大等，无肾损害。

85. 答案:B

解析:各种筛检、检查、三早属于二级预防。

86. 答案:C

解析:略。

87. 答案:A

解析:略。

88. 答案:C

解析:略。

89. 答案:E

解析:小肠的运动有紧张性收缩、分节运动、蠕动等。分节运动是一种以环行肌为主的节律性分段收缩和舒张运动。分节运动是小肠的特有运动。(E 对)。

90. 答案:C

解析:系统性红斑狼疮是一种免疫复合物病，自身抗体和相应抗原相结合形成免疫复合物，沉积在肾脏造成狼疮肾炎。

91. 答案:B

解析:当消化道大出血时，血液在消化系统被分解，形成大量氨，使脑内氨增高，与谷氨酸结合生成谷氨酰胺增多，而谷氨酰胺等抑制性递质活动增强，脑内神经递质平衡失调，导致中枢神经系统功能紊乱。

92. 答案:B

解析:略。

93. 答案:C

解析:侵袭性葡萄胎继发于葡萄胎 6 个月内。该患者无葡萄胎病史，所以不考虑侵袭性葡萄胎，因此选绒癌。

94. 答案:A

解析:题干“根据应激源的定义”。应激源的定义是:经个体认知评价后引起的心理或生理反应的刺激。因此选“认知评价”。

95. 答案:B

解析:患者胃溃疡病史，发病与精神紧张、压力大等因素有关，溃疡治疗应

配合心理治疗。

96. 答案:A

解析:阑尾、淋巴结、脾脏、扁桃体属于外周免疫器官不属于中枢免疫器官,中枢免疫器官包括骨髓和胸腺,(A对)。

97. 答案:C

解析:强制求医行为指得是公共卫生机构或病人的监护人为了维护人群或病人的健康和而给予强制性治疗的行为,主要是针对有严重危害的传染性疾病和精神病人。

98. 答案:A

解析:略

99. 答案:E

解析:豆渣样提示假丝酵母菌(白色念珠菌)。属于机会致病菌,单细胞,革兰染色阳性,可侵犯皮肤黏膜、内脏、中枢神经系统感染。在普通培养基、血培养基、沙氏培养基均生长良好。

100. 答案:C

解析:机体需要但不能合成,或合成量不能满足机体需要,必须由食物供给的氨基酸称为必需氨基酸。必需氨基酸一共有9种:赖氨酸、色氨酸、苯丙氨酸、蛋氨酸(甲硫氨酸)、苏氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、缬氨酸、组氨酸。对儿童而言,组氨酸也是一种必需氨基酸。酪氨酸和半胱氨酸必须以必需氨基酸为原料来合成,故被称为半必需氨基酸。(C对)。

101. 答案:C

解析:妊娠期糖尿病(GDM)无血糖不良的指征,营养治疗控制饮食。饮食控制不能达标的GDM,使用胰岛素皮下注射。

102. 答案:B

解析:脆弱拟杆菌是革兰氏阴性厌氧杆菌,感染多为化脓性感染,分泌物或脓液黏稠,呈乳白色、粉红色、血色或棕黑色,有恶臭,有时有气体。

103. 答案:C

解析:大叶性肺炎以纤维蛋白(纤维素)渗出为主。小叶性肺炎以中性粒细胞渗出为主。

104. 答案:D

解析:小儿,出生时左前额部有一扁平红色突起,不痛不痒,持续增大,最有可能得诊断是毛细血管瘤。

105. 答案:D

解析:救治脑死亡患者,除了仪器设备的监护外,还要在死者身体插上各种不同用途的管子,有失死者的形象和尊严,因而是人不道的。脑死亡标准的直接伦理目的就是维护死者的尊严。

106. 答案:B

解析:精神卫生法规定,精神障碍的住院治疗实行自愿原则。精神障碍患者已经有伤害自身的行为,经监护人同意,医疗机构可对患者实施住院治疗;监护人不同意的,不得强制将患者实施住院治疗。

107. 答案:B

解析:同源爆发指某易感人群中的成员同时暴露于某共同的病原体或污染源而引起的爆发。因呼吸道传播较其余四种传播途径更易导致易感人群的同时暴露,故呼吸道传播最常见。

108. 答案:A

解析:黄曲霉素,尤其是黄曲霉素B1(由霉变的谷物、花生、玉米中的黄曲霉菌产生)有极强的致癌性,可诱发肝细胞性肝癌。

109. 答案:D

解析:患者既往有胃溃疡病史,近2年腹痛加重,1周前有黑便,提示出现消化道出血。自觉乏力,查体球结膜苍白,提示贫血(血红蛋白 $<90\text{g/L}$)。

110. 答案:A

解析:人和动物共患的最常见病毒的形态是球形或近似球形,少数为杆状、丝状、弹状和砖块状。

111. 答案:D

解析:患者下楼时扭伤, X线片未见骨折, 首先考虑软组织损伤。踝部扭伤后出现疼痛, 肿胀, 皮下瘀斑, 活动踝关节疼痛加重。检查可以发现伤处有局限性压痛点, 踝关节距屈位加压, 使足内翻或外翻时疼加重, 应诊断为踝部韧带损伤。外侧副韧带, 起自外踝, 分三束分别止于距骨前外侧, 跟骨外侧和跟骨后方, 是踝部最薄弱的韧带。

112. 答案:C

解析:酮症酸中毒:多发生于糖尿病、严重饥饿和酒精中毒等情况。糖尿病时胰岛素不足, 葡萄糖利用减少, 脂肪分解加速, 形成过多的酮体(其中 β -羟丁酸和乙酰乙酸为酸性物质), 引发酮症酸中毒;(C对)。

113. 答案:B

解析:支气管相关的细胞因子为 IL-4、IL-5、IgE、IL-13。

114. 答案:D

解析:筛检试验的阳性检测率为真阳性率, 有病的人中筛查试验为阳性的比例。124/140。

115. 答案:C

解析:镇静催眠药过量时进入深麻醉期, 血压下降, 瞳孔散大, 对光反射消失, 出现意识障碍。

116. 答案:D

解析:对高危人群的监测为稍点监测, 属于主动监测。

117. 答案:C

解析:动脉血氧含量是指在 100ml 血液中, Hb 实际结合的 O₂ 量。该患者因子宫肌瘤月经量增大导致贫血, 血红蛋白下降(正常值为 120~180g/L), 所以在 100ml 血液中, Hb 实际结合的 O₂ 量必然下降, 即动脉血氧含量下降。

118. 答案:B

解析:结合患者病史及症状考虑低血容

量性休克。所以该患者造成血压改变的原因是有效循环血量减少。

119. 答案:B

解析:糖尿病适合有氧运动, 举重、拔河排除。游泳、跳绳、长跑三项为有氧运动, 考虑到糖尿病可能会有糖尿病足的并发症, 避免加重足部负荷, 首选游泳。

120. 答案:E

解析:出现医疗事故应立即向科室负责人报告, 科室负责人向本医疗机构负责医疗服务治疗监控部门报告, 该部门立即进行调查核实, 向医疗机构负责人报告并向患者通报、解释。

121. 答案:B

解析:HLA-I 为 CD8⁺ T 细胞提呈抗原, HLA-II 为 CD4⁺ T 细胞提呈抗原。

122. 答案:C

解析:IgG 可通过胎盘, 因此新生儿溶血的抗体是 IgG。

123. 答案:C

解析:库欣综合征, 血中皮质醇增多, 皮质醇(糖皮质激素)可导致钾离子内流引起低钾血症; 导致血脂升高(向心性肥胖)、血糖增高、刺激造血引起红细胞增多。

124. 答案:C

解析:直线回归方程 $Y=a+bx$ 回归系数 b 的意义是, 当 X 增加(或减少)1 个单位, Y 改变 b 个单位。在该方程中, $b=2$, 因此 X 增加 1 岁, 体重 Y 变化 2kg。

125. 答案:A

解析:患儿自幼发现心脏杂音, 考虑先天性心脏病, 查体胸骨左缘第 2 肋间连续机器响杂音应诊断为动脉导管未闭。因主动脉在收缩期和舒张期的压力均超过肺动脉, 故动脉导管未闭血流动力学特点为主动脉血全心周期流向肺动脉, 左向右分流。

126. 答案:E

解析:健康教育干预的是行为和生活方式。

127. 答案:B

解析:患儿面色苍白、心率加快、肝脾大、贫血,外周血涂片示红细胞大小不等,以小为主,中央淡染区扩大,应诊断为缺铁性贫血。合成血红素基本原料是甘氨酸、琥珀酰 COA 和 Fe^{2+} 等。

128. 答案:E

解析:心包横窦为心包腔在主动脉、肺动脉后方与上腔静脉、左心房前壁前方之间的间隙。当心直视手术需阻断主动脉和肺动脉血流时,可在横窦前后钳夹这两大血管。

129. 答案:A

解析:甲状腺髓样癌:癌细胞排列成巢状或条索状,间质有淀粉样物沉积。

130. 答案:A

解析:该例中患者已经死亡,家属情绪比较激动,医生要做的就是对患者家属进行安抚和解释,并向其说明上次病情稳定允许出院的合理依据。A 对,其余做法均不符合题意。

131. 答案:D

解析:略。

132. 答案:B、

解析:尸检在 48 小时内进行,有冰冻条件的延长至 7 天。

133. 答案:C

解析:趋避冲突是同一目标(即好又坏),即希望得到、又不得不回避。该孕妇怀孕很开心(即希望得到),但出于工作打算人工流产(又不得不回避),属于趋避冲突。

134. 答案:A

解析:病人有权知晓自己病情及可能的治疗方案,并对医生提出的治疗方案有选择取舍的决定权,这是病人的基本权力。故有权利决定做人工流产手术的人是孕妇本人。

135. 答案:E

解析:略。

136. 答案:E

解析:该市男性样本率和全省男性样本率分别对应样本率和总体率。样本率是指观测或调查的一部分个体占总体是研究对象的比率;总体率是指具有某一相同标志表现的全部总体单位数的比重。该市男性 HBsAg 携带率与全省男性 HBsAg 阳性携带率比较得 $P > 0.05$,说明该市与全省无差异,样本率不同是由抽样误差导致。

137. 答案:C

解析:两个样本率的比较,用样本推断总体, P 越小越认为两个总体率不同。

138. 答案:D

解析:略。

139. 答案:B

解析:略。

140. 答案:E

解析:婚前医学检查证明应当列明是否发现下列疾病:①在传染期内的制定传染病;②在发病期内的有关精神病;③不宜生育的严重遗传性疾病;④医学上认为不宜结婚的其他疾病。自限性传染病不属于婚前医学检查证明需要列明的疾病。选 E。

141. 答案:B

解析:中枢性免疫器官包括骨髓和胸腺。

142. 答案:E

解析:扁桃体是黏膜免疫系统的免疫器官。

143. 答案:E

解析:梗死的形状取决于发生梗死的器官血管分布方式。心冠状动脉分支不规则,故心肌梗死灶的形状也不规则,呈地图状,属于贫血性梗死。

144. 答案:B

解析:多数器官血管呈锥形分布如脾肾、肺等,梗死灶呈锥形,切面呈扇面形,或三角形,其尖端指向血管阻塞的部

位，常指向肺门、脾门、肾门，底部靠脏器表面。

145. 答案:B

解析:嗜酸性粒细胞主要见于寄生虫感染以及 IgE 介导的炎症反应。

146. 答案:C

解析:COPD 气道炎症最主要的效应细胞是中性粒细胞，通过释放中性粒细胞弹性蛋白酶等多种生物活性物质引起慢性黏液高分泌状态并破坏肺实质。

147. 答案:C

解析:支原体为无细胞壁的原核细胞型微生物，细胞膜含有胆固醇，可通过除菌滤器，分裂繁殖，是目前所知能在无生命培养基中生长繁殖的最小的原核细胞型微生物。

148. 答案:A

解析:真菌是一大类真核细胞型微生物。细胞核高度分化，有核膜核仁，胞浆内有完整的细胞器。

149. 答案:D

解析:维生素可分为脂溶性和水溶性两大类，脂溶性维生素包括维生素 A、维生素 D、维生素 E、维生素 K。

150. 答案:B

解析:维生素 B1 存在于豆类和种子外皮(如米糠)、胚芽、酵母和瘦肉中，而维生素 B1 缺乏多见于以精米为主食的地区，任何年龄均可发病，因此长期食精米易导致维生素 B1 缺乏。

第二单元

1. 答案:E

解析:患者糖尿病，服用降糖药物+胰岛素治疗，血糖控制良好，但射血分数 42%，提示心功能不全，不宜使用噻唑烷二酮类药物如罗格列酮，水肿、左室射血分数 <50%是噻唑烷二酮的禁忌症。因此停用罗格列酮。(E 对)。阿卡波糖有助于降低餐后血糖可继续服用。患者伴有心功能不全，应首选

胰岛素控制糖尿病，不宜停用胰岛素。瑞格列奈主要用于控制餐后高血糖，可继续服用。格列本脲为磺胺类降糖药，该患者未出现低血糖等不良反应，可继续服用。

2. 答案:C

解析:患者中年男，头痛胸闷，多次血压 170/110mmHg 左右(血压偏高)，心率 150 次/分(心率偏快)，经生活干预后血压仍不达标，应采取的治疗是口服比索洛尔。适用于心率较快的中、青年病人。

3. 答案:C

解析:患者老年女性，突发心悸，血压低(血流动力学障碍)，心率快，心率绝对不齐，第一心音强弱不等(房颤特征表现)，对于已呈现急性心力衰竭或血压下降明显，宜紧急施行电复律，故该患者最合适的治疗是同步电复律。(C 对)。临时心脏起搏用于房室传导阻滞患者，故不选。胺碘酮可以转复并维持窦性心律，但不适用于该患者。美托洛尔会导致血压进一步降低，不用低血压患者。电除颤用于心室颤动、心脏骤停在内等危及生命的恶性心律失常，故不选。

4. 答案:C

解析:略。

5. 答案:E

解析:患者年轻女性，酱油色 3 天，双肾无叩击痛，考虑肾脏疾病可能性小，考虑溶血性疾病导致的酱油色尿，应做尿胆原检查，若为阳性，则酱油色尿的病因为自身免疫性溶血性贫血。(E 对)。尿隐血是试验、尿三杯试验、尿沉渣镜检、尿常规均为常规泌尿系疾病诊断过程中的相关检查，患者无肾区叩击痛，所以因为肾脏疾病导致酱油色尿的可能性不大，故应鉴别其他原因，不选此选项。

6. 答案:C

2023 年临床执业历年真题

解析:疫水接触史,皮肤过敏反应,考虑血吸虫,首选吡喹酮治疗。

7. 答案:D

解析:功能性蛋白尿又称生理性蛋白尿,是在剧烈运动后出现的蛋白尿,呈一过性多见于青少年。

8. 答案:D

解析:吸入糖皮质激素由于其局部抗炎,作用强、全身不良反应少,已成为目前哮喘长期治疗的首选药物(D对)。

9. 答案:D

解析:患者老年男性,反复咳嗽咳痰痰中带血,考虑肺癌可能。后出现腰背部疼痛,直腿抬高试验及“4”字实验(一)(排除腰椎间盘突出症),考虑腰椎转移瘤。疼痛是转移瘤最常见的症状,疼痛常逐渐变为持续性加剧,夜间痛明显,制动多无效。(D对)。腰椎间盘突出症直腿抬高试验及“4”字实验(+),与该患者不符。

10. 答案:A

解析:踝关节扭伤早期按摩会加重局部出血及肿胀,故早期不能按摩。(A对)。休息,减少行走有利于减轻肿胀。弹力绷带适当固定有利于减轻水肿,促进韧带愈合。急性损伤应立即冷敷,以减少局部出血及肿胀。右下肢抬高有利于消肿。

11. 答案:D

解析:由于化学药品 A 适应症为原发性高血压,可作为标准制剂,与 B 药进行生物等效性研究,即用 B 药的 AUC 比 A 药的 AUC,可得到 B 药对 A 药的相对生物利用度为 86%(选 D,不选 E)。相对生物利用度是判断两种药物制剂是否具有生物等效性的依据,与题意不符(不选 A)。绝对生物利用度是以血管外给药的 AUC 和静脉注射的 AUC 进行比较得出的,与题意不符。(不选 BC)。

12. 答案:C

解析:患者青年男性,发热病史(前驱症状),心悸、乏力,频发室性期前收缩(急性病毒性心肌炎常以心律失常为首发症状),故根据病史以及临床表现最可能的诊断是急性病毒性心肌炎。

13. 答案:C

解析:咳嗽变异型哮喘以咳嗽为唯一或主要症状(C对)。咳嗽变异型哮喘常于夜间及凌晨发作,运动、冷空气等诱发加重(A错)。咳嗽变异型哮喘使用支气管解痉剂或吸入皮质激素治疗有效(B错)。咳嗽变异型哮喘支气管激发实验阳性(D错)。咳嗽变异型哮喘抗生素或镇咳,祛痰药治疗无效(E错)。

14. 答案:D

解析:降钙素的靶器官主要是肾脏和骨,通过影响肾小管对钙、磷的重吸收以及促进骨钙入血而调节血钙、血磷的稳态。综上所述降钙素可以抑制骨对钙的吸收。

15. 答案:E

解析:慢性失血导致贫血,血红蛋白减少,致血氧含量下降。

16. 答案:D

解析:肾小球滤过率最常用的是内生肌酐清除率(用于临床),最准确的是菊粉清除率(用于科研)。

17. 答案:A

解析:股骨头的营养动脉:小凹动脉、股骨干滋养动脉升支、旋股内外侧动脉(旋股内侧动脉损伤使导致股骨头坏死的主要原因,其发出的髂外侧动脉是股骨头最主要的供血来源)。

18. 答案:E

解析:硬性结节、弹响,是狭窄性腱鞘炎的体征。

19. 答案:D

解析:腹泻呕吐,水样便,无明显发热和腹痛,考虑霍乱,霍乱确诊需要病原菌检查,行粪动力实验及制动检查

2023 年临床执业历年真题

有助于出现霍乱弧菌。

20. 答案:C

解析:包扎时,露出指尖有利于减轻产生粘连及观察末梢血运。(C对)。患肢制动,弹力绷带固定非手外伤神经肌腱术后处理措施。局部冰可能导致血管收缩引起缺血坏死。石膏固定手指于伸直位应为一般需固定在功能位置。肌腱缝合后一般应固定3~4周期间可在医生指导下行主动伸指、被动屈指锻炼,待肌腱愈合后,拆除固定进行功能锻炼并辅以理疗。

21. 答案:C

解析:肾小球性蛋白尿可出现IgG、白蛋白,肾小管性蛋白尿以 $\alpha 1$ 微球蛋白和 $\beta 2$ 微球蛋白为主。C项错误,选C。

22. 答案:C

解析:略。

23. 答案:A

解析:患者老年男性,心率40次/分(心率低)可闻及大炮音(三度房室传导阻滞的临床表现),故诊断为三度房室传导阻滞。(A对)。二度窦房传导阻滞、一度窦房传导阻滞通常不明显发现,故不选。一度房室传导阻滞通常无症状故不选。二度房室传导阻滞可引起心搏脱漏,可有心悸症状,也可无症状,故不选。

24. 答案:B

解析:I期视网膜动脉变细,II期视网膜动脉狭窄,伴有动脉交叉和受压情况,III期眼底出血和棉絮状渗出,IV期视乳头水肿。

25. 答案:A

解析:患者中老年男性,心尖区收缩期中期喀喇音,闻及3/6级收缩中晚期吹风样杂音(尖瓣脱垂时收缩期杂音出现在喀喇音之后)故该患者诊断为二尖瓣脱垂。

26. 答案:C

解析:患者青少年女性,心烦易怒,怕热多汗,体重下降,查体心率增快,血压增高手有颤动,为代谢率增高、交感神经兴奋性增高表现,结合患者甲状腺有弥漫性肿大,应考虑为甲状腺功能亢进症Graves病。(C对)。

27. 答案:D

解析:IgA肾病属于病理分类。

28. 答案:E

解析:略。

29. 答案:A

解析:支气管哮喘早期发作为呼碱;晚期呼酸。

30. 答案:A

解析:患者长期口服华法林,培哚普利,硝酸脂类,地高辛等药物,出现腹泻、心悸,心电图示频繁室性期前收缩,短阵室性心动过速,由于地高辛治疗安全范围小,中毒最多见和最早见的是室性期前收缩,故首先应考虑地高辛中毒,因此行地高辛浓度测定(A对)。

31. 答案:C

解析:患者老年女性,活动后胸闷,夜间阵发性呼吸困难,查体:P2>A2,心尖部可闻及舒张晚期隆隆样杂音(二尖瓣狭窄的表现)根据病史以及临床表现可考虑诊断为二尖瓣狭窄,心房颤动为二尖瓣狭窄最常见的心律失常也是相对早期的常见并发症,可能为病人就诊的首发症状。

32. 答案:A

解析:患者老年女性,反复双膝关节疼痛10年(负重大的关节),表现为静息痛,活动时关节有弹响,骨摩擦音(+),综合病史、症状、体征考虑患者为骨关节炎。

33. 答案:B

解析:肱骨髁上骨折多发生于10岁以下儿童。

34. 答案:C

解析:腺苷起效迅速,是治疗室上性心动过速的首选药物。(C对)。胺碘酮主要用于房性心律失常故不选。美托洛尔也可治疗室上性心动过速,但不是首选。腺苷无效时可改用静注维拉帕米,故不选。利多卡因用于室性心律失常药物,但不作为首选。

35. 答案:C

解析:骨筋膜室综合征即由骨、骨间膜、肌间隔和深筋膜形成的骨筋膜室内肌肉和神经因急性缺血而产生的一系列早期综合征。缺血早期,及时处理恢复血液供应后,可不发生或仅发生极小量肌肉坏死,可不影响肢体功能。而较短时间或程度严重的不完全缺血,恢复血液供应后大部分肌肉坏死,形成挛缩畸形,严重影响病肢功能,为缺血性肌挛缩。是骨筋膜室综合征的晚期并发症。

36. 答案:B

解析:患者老年男性,急性心梗,反复发作室性心动过速和房颤。是由于交感神经过度兴奋时,未梢释放大量去甲肾上腺素,通过 β 等心血管受体,使心肌细胞膜离子通道功能严重失控形成。故该患者形成电风暴的原因是交感神经系统激活。(B对)。

37. 答案:B

解析:青年女性,急性尿路刺激征,伴肾区叩击痛,尿白细胞升高,最可能的诊断为急性肾盂肾炎。(B对)。急性肾小球肾炎以血尿、高血压为主要表现,该患者不符。急性膀胱炎表现为急性尿路刺激征,与肾盂肾炎的区别在于有无肾区叩击痛。急性间质性肾炎无特异临床表现,表现为药物相关的发热、关节酸痛、腰背痛等,血压正常,无水肿。急进性肾小球肾炎是在急性肾小球肾炎的基础上出现的肾功能的进展,肌酐升高的表现。

38. 答案:B

解析:患者老年男性,有脑梗病史,突发喘憋和咳粉红色泡沫痰,不能平卧(左心衰竭表现),在心尖部可闻及3/6收缩期杂音(多见于尖瓣关闭不全),双肺底可闻及大小不等的水泡音及哮鸣音(左心衰竭表现)。二尖瓣乳头肌因缺血、坏死等使收缩功能发生障碍,造成不同程度的二尖瓣脱垂并关闭不全心尖区出现收缩中晚期喀喇音和吹风样收缩期杂音,第一心音可不减弱,可引起心力衰竭,故该患者喘憋是由于乳头肌断裂。(B对)。

39. 答案:A

解析:慢性尿路刺激征抗生素无效考虑泌尿系结核,尿液检查多为酸性脓尿,有较多红细胞和白细胞,尿培养无普通细菌生长。

40. 答案:B

解析:患者老年男性,心脏超声示:左室扩大,左室前壁节段性运动减弱,左室射血分数降低(LVEF正常50~70%),阵发性房颤,IC类亦可致室性心律失常,严重器质性心脏病病人不宜应用,故使用的药物不包括普罗帕酮。(B对)。

41. 答案:B

解析:发热、一侧肾区叩痛、真性菌尿为急性肾盂肾炎,抗生素治疗2周

42. 答案:A

解析:缬沙坦属于血管紧张素2受体拮抗剂,可扩张肾小球的出球动脉,从而使肾脏的滤过率进一步下降,加重肾脏功能衰竭。故高血压伴双肾动脉狭窄禁用。

43. 答案:B

解析:心肺复苏首先胸外按压。

44. 答案:C

解析:患者老年男性,发作性胸痛,跌倒,呼唤无反应,考虑心脏骤停可能,应该首先确定心脏骤停,即触诊大动脉搏动情况。(C对)。

45. 答案:A

解析:无痛性肉眼血尿是泌尿系肿瘤的主要症状。

46. 答案:B

解析:患者青年男性,中性粒细胞绝对值 $<0.5 \times 10^9/\text{L}$,为粒细胞缺乏症,且伴有发热伴咽痛 3 天,颈部腹股沟淋巴结肿大考虑粒细胞缺乏感染风险增加所致。

47. 答案:A

解析:肺动脉高压是指在海平面静息状态下右心导管测量肺动脉平均压 $\text{mPAP} > 25\text{mmHg}$,根据静息 mPAP 将肺动脉高压分为轻、中、重三度:①轻度为 $26 \sim 35\text{mmHg}$;②中度为 $36 \sim 45\text{mmHg}$;③重度 $> 45\text{mmHg}$ 。肺动脉高压有不同的分类方法,以往习惯性分为原发性和继发性肺动脉高压。

48. 答案:E

解析:心房颤动为二尖瓣狭窄最常见的心律失常,也是相对早期的常见并发症,可能为病人就诊的首发症状,故风湿性心脏瓣膜病二尖瓣狭窄最常并发的心律失常心房纤颤。

49. 答案:E

解析:慢性失血患者,多丢失的为铁离子故多为缺铁性贫血。(选 E)。慢性胃炎患者可能因为慢性失血而导致缺铁性贫血,也可能是因为叶酸及 B12 吸收障碍而导致巨幼细胞性贫血。(不选 A)。慢性溶血的患者可以因为红细胞破坏位置的不同导致铁流失而导致缺铁从而导致缺铁性贫血,也可以因为铁并没有被排出体外而导致铁过载。(不选 B)。慢性感染的患者可以出现感染性休克,但不是缺铁性贫血。(不选 C)。慢性肝炎患者凝血功能出现问题,多会出现明显的大出血,故不会出现缺铁性贫血。(不选 D)。

50. 答案:E

解析:患者中年男性,急性广泛前壁心

肌梗死入院(病因),血压低而中心静脉压高(正常 $5 \sim 10\text{cmH}_2\text{O}$),提示心功能不全,结合双中下肺可闻及湿罗音,考虑诊断为心力衰竭,目前急性心肌梗第 3 天,治疗可选用洋地黄。(急性心肌梗死 24 小时内禁用洋地黄,因为洋地黄可增加心肌收缩力,会使心肌加重缺血,症状加重)。

51. 答案:C

解析:患者老年男性,反复胸痛多年多在凌晨发作(静息心绞痛),持续数分钟可自行缓解,发作时心电图:V1-V3 导联 ST 段抬高 0.3mv ,发作后复查心电图正常(一过性 ST 段动态改变),诊断为变异型心绞痛。变异型心绞痛特征为静息心绞痛,表现为一过性 ST 段动态改变,其发病机制为冠状动脉痉挛。(C 对)。

52. 答案:C

解析:环丙沙星是一种氟喹诺酮类药物,主要用于对其他抗菌药产生耐药的革兰阴性杆菌所致的呼吸道、泌尿生殖道、消化道、骨与关节和皮肤软组织感染。乙胺丁醇适用于与其他抗结核药联合治疗结核杆菌所致的肺结核。(A 错)。华法林是一种抗凝药,主要口服用于防治血栓栓塞性疾病,如心房纤颤和心脏瓣膜病所致的血栓栓塞,亦可降低静脉血栓形成发病率。(B 错)。普萘洛尔是一种 β 受体阻滞剂用于治疗心律失常、心绞痛、高血压和甲状腺功能亢进。(D 错)。阿托品是一种 M 受体阻滞剂,用于解除平滑肌痉挛,抑制腺体分泌,验光及眼底检查,虹膜睫状体炎,缓慢型心律失常,抗休克,解救有机磷酸酯类中毒。(E 错)。

53. 答案:A

解析:Addison 病即原发性慢性肾上腺皮质功能减退症,是由于双侧肾上腺的绝大部分被毁,糖皮质激素分泌减

少所致。故其最重要的治疗措施为糖皮质激素替代治疗。

54. 答案:D

解析:多巴胺小剂量增加肾血流量,大剂量减少肾血流量。

55. 答案:A

解析:患者老年男性,突发胸痛,呈持续性撕裂样疼痛,向肩背部和腰部放射,左右肢血压不同,均为主动脉夹层典型表现,根据病史以及临床表现可考虑诊断为主动脉夹层,故可进行主动脉CTA(计算机断层扫描血管造影),明确诊断。(A对)。胸部X线、心电图为一般项目检查,故不选。超声心动图用于心脏疾病检查对于主动脉价值不大,故不选。冠状动脉造影为诊断冠心病,故不选。

56. 答案:E

解析:满月脸、向心性肥胖、皮肤紫纹,符合库欣综合征典型表现。

57. 答案:E

解析:患者老年女性,血压偏高未规范治疗,突发胸闷,倒地不起,抢救无效死亡,考虑急性心肌梗死,因心包腔内有血液,约200ml.考虑并发心脏破裂。(E对)。冠脉闭塞后1~2小时心肌呈凝固性坏死,心肌间质充血、水肿,伴多量炎症细胞浸润。坏死的心肌纤维逐渐溶解,形成肌溶灶,随后渐有肉芽组织形成,该病变过程未达到,故不选。心肌纤维增粗肥大见于长期高血压患者,故不选。心肌坏死组织1~2周后开始吸收,并逐渐纤维化,该病变过程未达到,故不选。

58. 答案:A

解析:二尖瓣狭窄大咯血的出血部位是支气管静脉,支气管扩张大咯血的出血部位是支气管动脉。

59. 答案:A

解析:患者老年男性腰痛数年,直腿抬高试验(+),加强试验(-),考虑目

前诊断腰椎间盘突出症,左拇指背伸无力,考虑受累L5神经。(A对)。L4神经关键运动肌足背伸肌(腔前肌)。L3神经关键运动肌膝伸肌(股四头肌)。S2神经关键运动肌小腿三头肌。S1神经关键运动肌足屈级(小腿三头肌)。

60. 答案:E

解析:我国成人的正常血压值是低于120/80mmHg。收缩压120~139和或舒张压80~90属于正常高值血压。大于等于140/90mmHg属于高血压。

61. 答案:B

解析:使用胰岛素治疗的糖尿病病人早晨空腹血糖仍高可能的原因为夜间胰岛素用量不足、黎明现象及Somogyi效应,该患者于夜间感饥饿、头晕,考虑是由于夜间低血糖引起的反跳性高血糖,即Somogyi效应,故应减少晚餐前的胰岛素用量。

62. 答案:C

解析:患肢缩短外展外旋为股骨颈骨折(C对)。股骨转子间骨折患肢外旋90°(D错)。髋关节后脱位为患肢屈曲内旋。

63. 答案:A

解析:甲状腺癌时行VI区清扫既清扫了甲状腺癌最易转移的区域,又有助于临床分期、指导治疗、预测颈侧区淋巴结转移的可能性和减少再次手术的并发症。最小范围清扫即中央区颈淋巴结(VI)清扫已基本达到共识。

64. 答案:B

解析:患者甲状腺肿大,无结节,甲功正常,考虑为单纯性甲状腺肿。

65. 答案:B

解析:患者在按医嘱服药后血糖得到有效控制得到了生理效益,从而更愿意遵从遗嘱服药,这属于强化因素。(选B)。

66. 答案:B

解析:患者女性,出现急性膀胱刺激征,

2023 年临床执业历年真题

无腰疼及发热，考虑是急性膀胱炎，抗生素疗程为 3 天。

67. 答案:C

解析:略。

68. 答案:B

解析:患者甲亢 2 年控制不佳, 131I 治疗 2 天后突然出现大汗淋漓、过高热、恶心呕吐、P60 次/分(心动过速>140 次/分), 应考虑为甲状腺激素大量进入循环导致甲状腺危象。(B 对)。

69. 答案:A

解析:患者青年男性, 腹型肥胖型, 2 型糖尿病患者, 建议选择有氧运动作为其主要锻炼方式。有氧运动的特点是运动强度比较低, 运动持续时间比较长, 无氧运动的特点是爆发力强、速度快、持续时间比较短。游泳是常见的有氧运动。

70. 答案:A

解析:锁骨中段骨折:手法复位 8 字绷带固定。儿童青枝骨折及成人无移位骨折, 可不作特殊处理。而手术切开复位的指征:不能忍受 8 字绷带、复位后再移位、合并神经血管损伤、开放性骨折、陈旧骨折不愈合、锁骨外端骨折合并喙锁韧带断裂。

71. 答案:E

解析:房颤合并心衰(颈静脉怒张、双下肢水肿), 首选洋地黄类。

72. 答案:C

解析:糖尿病视网膜病变分期 I 期微血管瘤, II 期硬性渗出, III 期软性渗出, IV 期新生血管, V 期机化, VI 期失明。

73. 答案:E

解析:盖氏骨折:桡骨下 1/3 骨折合并尺骨小头脱位。孟氏骨折:尺骨下 1/3 骨折合并桡骨小头脱位。

74. 答案:C

解析:患者出现高血压、满月脸、向心

性肥胖、紫纹等临床表现, 应考虑诊断为库欣综合征。库欣综合征因肾上腺分泌过多糖皮质激素而致钠排钾, 故可能出现血钾水平降低。

75. 答案:D

解析:在碱性尿中易形成磷酸镁及磷酸盐沉淀。在酸性尿中易形成尿酸和胱氨酸结晶。

76. 答案:D

解析:呼吸运动是肺通气的原动力; 呼吸肌的收缩与舒张产生肺动力。

77. 答案:D

解析:患者老年男性, 劳累后心悸、气短, 双下肢水肿, 体力活动明显受限, 从事一般家务活动即感喘憋(心力衰竭的临床表现), NYHA 分级 III 级:心脏病病人体力活动明显受限, 低于平时一般活动即引起心衰症状。故该患者的心功能分级为 NYHA 分级 III 级。(D 对)。

78. 答案:B

解析:慢性阻塞性肺疾病(COPD)是一种具有持续气流受限为特征的肺部疾病, 呈进行性发展, 主要表现为肺功能下降。

79. 答案:B

解析:心音遥远、Ewart 征阳性提示心包积液, 首选心包穿刺抽液治疗。

80. 答案:A

解析:急性肾小管坏死常有明确的肾缺血(如休克、脱水)和中毒(如肾毒性抗生素)等诱因实验室检查以肾小管损害为主(尿钠增加、低比重尿及低渗透压尿)。患者既往肾毒性抗生素使用史, 现尿钠高、尿比重低, 最可能的为急性肾小管坏死。(A 对)。

81. 答案:A

解析:患者中年男性, 外伤致股骨干骨折, 入院短期内出现呼吸困难及休克, 考虑股骨干骨折可引起大量脂肪入血导致肺栓塞, 故最可能是骨折早期并

发病引起脂肪栓塞(A对)。

82. 答案:B

解析:肺结核的传播途径以空气传播为主,肺结核患者咳嗽、喷嚏排出的结核杆菌悬浮在飞沫中播散,健康人吸入可致感染;痰干燥结核杆菌随尘埃吸入也可感染,因此,痰涂片找到抗酸杆菌是判断肺结核具有传染性最主要的依据。

83. 答案:B

解析:急性肾小球肾炎主要为A组-β溶血性链球菌“致肾炎菌株”感染所致。

84. 答案:C

解析:99mTc-MIBI核素扫描敏感度高,阳性预测值高,是甲状旁腺功能亢进症定位诊断最有帮助的检查方式。(C对)。颈部及纵隔CT定位准确,但对甲旁亢敏感度较低。(排除A、B)。颈部超声操作简单、价格低廉,但其准确性受操作者水平影响较大。(排除D)。颈部MRI不常用于甲旁亢的诊断(排除E)。

85. 答案:B

解析:小细胞肺癌常表现副癌综合征如抗利尿激素异常分泌,表现为低钠血症和低渗透压血症,出现厌食、恶心、呕吐等水中毒症状还可伴有逐渐加重的嗜睡、易激动、定向障碍其他肺癌少癫痫样发作或昏迷等神经系统症状。

86. 答案:E

解析:骨折低热的常见原因为血肿吸收,开放性骨折高热时考虑感染。

87. 答案:B

解析:双侧肾动脉狭窄导致肾灌注减少,激活肾素-血管紧张素-醛固酮系统引起血压升高。

88. 答案:D

解析:患者高处坠落损伤腰背部,出现损伤平面以下感觉、运动障碍,1天后逐渐恢复考虑为脊髓震荡。脊髓震荡临床上表现为损伤平面以下感觉、

运动及反射完全消失或大部分消失。

一般经过数小时至数天,感觉和运动开始恢复,不留任何神经系统后遗症。

89. 答案:C

解析:老年女性患者腰痛伴发热,左肾区叩击痛,血、尿白细胞升高,CT示左输尿管上段积水,左输尿管结石,此时应绕过结石逆行置管,引流积水,缓解梗阻,减轻感染。(C对)。体外冲击波碎石在泌尿系统感染未控制之前是禁忌,该患者尿白细胞满视野,不可直接碎石。输尿管镜取石在泌尿系统感染也是禁忌。膀胱镜下无法取出输尿管上段的结石。经皮肾镜取石对于输尿管上段结石有一定的治疗效果,但与输尿管镜取石一致,不能在感染未控制时手术。

90. 答案:A

解析:患者老年男性,发作性胸痛,常于凌晨3时发作(静息心绞痛),Holter提示胸部导联ST段抬高,休息后缓解(一过性ST段动态改变),多次查cTn正常(排除心梗),根据病史以及临床表现可考虑诊断为变异型心绞痛,首选钙通道阻滞剂(尼可地尔)。(A对)。

91. 答案:C

解析:患者X线片示左肱骨外科颈骨质不连续,首先考虑为肱骨近端骨折。当肱骨近端4个解剖部位中(肱骨头、大结节、小结节和肱骨干),有2个部位骨折并且移位时,称为三部分骨折,它有2种形式,常见的是大结节、外科颈骨折,另一种是小结节、外科颈骨折。该患者左肱骨外科颈骨折伴大结节移位,为Neer三部分骨折。

92. 答案:E

解析:略。

93. 答案:D

解析:患者青年女性,因腹痛腹泻就诊,治疗后经烈日暴晒出现明显皮疹,应

考虑应用了喹诺酮类药物造成的光敏反应。在紫外线激发下，药物氧化生成活性氧，激活皮肤成纤维细胞中的蛋白激酶 C 和酪氨酸激酶，引起皮肤炎症。

94. 答案:B

解析:心脏压塞的临床特征为 Beck 三联征:低血压、心音低弱、颈静脉怒张,其中心音遥远最具有诊断意义。

95. 答案:B

解析:患者怕冷、嗜睡、脉搏 56 次/分(低于正常心率范围 60 次/分)、眼睑水肿、甲状腺弥漫性肿大,为代谢率减低及交感神经兴奋性下降表现,应考虑甲状腺功能减退症。甲状腺功能减退时,血清 TSH 增高,TT₄、FT₄ 均降低。晚期 TT₃ 可减低。(B 对)。TT₃ 正常,TT₄ 正常,TSH 减少提示亚临床甲亢,常无明显临床表现,与题干不符。TT₃ 增加,TT₄ 增加,TSH 减少提示甲状腺功能亢进,常表现为代谢率增高,如心率增快、多食多汗,兴奋性增高等,与题干临床表现不符。TT₃ 增加,TT₄ 增加提示甲状腺激素升高,可能存在甲状腺功能亢进,与题干不符。TT₃ 正常,TT₄ 正常,TSH 增加提示亚临床甲减,常无明显临床表现,与题干不符。

96. 答案:A

解析:胰腺导管细胞分泌 HCO₃,除此之外无其他物质,因为不分泌激素,所以无内分泌功能。(A 对)。肾上腺髓质细胞分泌肾上腺素和去甲肾上腺素,有内分泌功能。甲状腺细胞分泌甲状腺激素,有内分泌功能。甲状旁腺细胞分泌甲状旁腺激素,有内分泌功能。胃黏膜 G 细胞,胃内分泌细胞一种,进食时食物使胃机械扩张,壁内神经丛刺激 G 细胞分泌促胃液素,该激素可通过血液刺激胃底腺分泌,有内分泌功能。

97. 答案:B

解析:桡神经受损出现垂腕和虎口皮肤感觉障碍。C 和 D 为尺神经受损 D 和 E 为正中神经受损。垂腕是深支,虎口感觉异常是浅支。

98. 答案:B

解析:患者自服抗菌药物半小时后出现血压降低、神志不清、面色苍白、脉搏细速、四肢冰冷、发绀等周围循环衰竭症状,应首先考虑发生过敏性休克,抢救过敏性休克应首先立即皮下或肌内注射肾上腺素,必要时可加入糖皮质激素和抗组胺药(A 对,C 错)。多巴胺主要用于感染中毒性休克、心源性休克、出血性休克等,不用于抢救过敏性休克(B 错)、患者已发生休克,吸氧、观察等不能缓解患者症状。(DE 错)。

99. 答案:B

解析:反复发作的肾绞痛、肾积水考虑输尿管上段结石。肾盂内的结石无发作性腹痛。

100. 答案:A

解析:禁水试验尿量无变化,尿渗透压<血浆渗透压,垂体后叶素有效,为中枢性尿崩症。

101. 答案:D

解析:完全性中枢性尿崩症主要是由各种原因导致精氨酸加压素(AVP)合成、转运、储存及释放障碍,故最有效的方法是激素替代治疗,去氨加压素为人工合成的加压素类似物。其抗利尿作用强,而无加玉作用,不良反应少,为目前治疗中枢性尿崩症的首选药物。(D 对)。

102. 答案:B

解析:患者中年男性,突发胸痛 5 小时,既往高脂血症病史(高危因素),血 cTnT:0.83mg/l(肌钙蛋白升高,正常<0.1,提示心肌损伤),D-DIMER:0.3g/l,(D-二聚体,正常

〈0.5，排除肺栓塞），ST 段压低 0.2mv（急性非 ST 抬高性心肌梗死的心电图表现），根据病史以及体征考虑诊断为急性非 ST 抬高性心肌梗死。（B 对）。

103. 答案:B

解析:患者考虑诊断为急性非 ST 抬高性心肌梗死，故进一步明确诊断应进行冠状动脉造影，是诊断冠心病的“金标准”。

104. 答案:A

解析:慢性肾衰竭病人，肾脏排钾能力差，橘子中含钾较高，出现胸闷不适，四肢乏力伴口周发麻，心率减慢等高钾血症可表现，考虑高钾血症。（A 对）。

105. 答案:A

解析:患者拟诊高钾血症，最有效的降钾方法为透析疗法。

106. 答案:B

解析:大量蛋白尿(>3.5g/d)，低蛋白血症(白蛋白<30g/L)，水肿。高脂血症(血胆固醇>6.2mmol/L)为肾病综合征。

107. 答案:B

解析:肾病综合征因低蛋白血症导致血容量不足易诱发血栓及栓塞，而大量输白蛋白大量输注白蛋白后，会使血液黏稠度增加，更加重了血栓以及血管内凝血的危险。

108. 答案:D

解析:该患者 $1.8\text{mmol/L} \leq \text{LDL-C}$ （低密度脂蛋白）〈4.9mmol/L 且年龄 > 40 岁的糖尿病病人，为 ASCVD（动脉粥样硬化心血管疾病）高危人群。血清甘油三酯 TG 偏高但 〈5.7 mmol/L（正常 〈1.7），调脂首选他汀类药物，将 LDL-C 控制在 2.6 以下，能显著降低心血管事件风险。

109. 答案:C

解析:患者空腹血糖和餐后血糖偏高 BMI30(体型偏胖)，对于该患者首选二

甲双胍主要药理作用是通过抑制肝葡萄糖输出，改善外周组织对胰岛素的敏感性、增加对葡萄糖的摄取和利用而降低血糖。

110. 答案:C

解析:患者动脉血气分析 pH7.56（大于正常上限 7.45）， HCO_3^- 46mmol/L（大于正常上限 26mmol/L），BE+7mmol/L（大于正常+3mmol/L），提示患者代谢性碱中毒失代偿，故不宜静脉滴注 NaHCO₃ 溶液。（C 对）。

111. 答案:D

解析:患者动脉血气分析 pH7.56（大于正常上限 7.45）， HCO_3^- 46mmol/L（大于正常限 26mmol/L），BE+7mmol/L（大于正常+3mmol/L），提示患者合并酸碱平衡紊乱类型是代谢性碱中毒，失代偿期。（D 对）。

112. 答案:B

解析:T₃、T₄ 升高、TSH 降低为甲状腺性甲亢，最常见的病因是 Graves 病，病因为自身抗体 TRAb 阳性。TgAb 和 TPOAb 用于确诊慢性淋巴细胞性甲状腺炎，常见症状为甲减。FT₃ 用于确定甲状腺功能。Tg 为甘油三酯。

113. 答案:C

解析:患者心慌、多汗、体重下降、大便次数增多等高代谢症状；TT₃、TT₄ 增加，TSH 减低，结合甲状腺 I 度肿大，可诊断为 Graves 病，即弥漫性毒性甲状腺肿。（C 对）。

114. 答案:A

解析:患者水肿，少尿 2 周，高血压伴肌酐升高，蛋白尿，血尿，呈新月体征，考虑急性肾小球肾炎后出现的急进性肾小球肾炎，免疫荧光有线型分布，考虑型急进性肾小球肾炎(A 对)。

115. 答案:A

解析:急进性肾小球肾炎 I 型、III 型首选血浆置换，II 型激素冲击(甲泼尼龙)+细胞毒药物(环磷酰胺)。

116. 答案:D

解析:患儿急性起病,左膝疼痛伴寒战高热,血白细胞和中性粒细胞升高(感染性疾病),浮髌试验阴性(排除化脓性关节炎),可能的诊断是急性血源性骨髓炎。(D对)。

117. 答案:A

解析:患儿考虑急性血源性骨髓炎,局部脓肿分层穿刺抽出混浊液体或血性液可作涂片检查与细菌培养,涂片中发现多是脓细胞或细菌即可明确诊断。

118. 答案:A

解析:患儿考虑急性血源性骨炎。由于致病菌大都为溶血性金黄色葡萄球菌,要联合应用抗生素,一种针对革兰阳性球菌,而另一种则为广谱抗生素,待检出致病菌后再予以调整针对金黄色葡萄球菌的敏感抗生素,主要为头孢类抗菌素,如果出现耐药金葡菌感染就需要使用万古霉素进行抗感染治疗。故首选头孢类抗生素。(A对)。

119. 答案:B

解析:患者骑跨伤后出现会阴部肿胀瘀斑,考虑尿道球部损伤。(B对)。尿道膜部属于后尿道损伤,常继发于骨盆骨折等。尿道海绵体部、尿道前列腺部损伤较为少见。膀胱破裂一般发生于充盈的膀胱受到撞击后,出现腹痛、此时导出尿液可为血性。

120. 答案:D

解析:前尿道损伤,进行诊断性导尿。如能顺利插入导尿管,说明尿道连续而完整,应保留尿管引流尿液2周,拔管后适当做尿道扩张。如不能插入尿管,尿道球部断裂,应立即手术,术后留置尿管2周并适当尿道扩张。

121. 答案:A

解析:患者青年男性,慢性病程,低热、咳嗽、痰中带血,X线示左肺不规则阴影,左侧肋膈角变钝,血淋巴细胞升高,血沉增快,应怀疑结核的可能。

患者2年前曾患胸膜炎,应详细了解胸膜炎治疗情况判断本次肺结核、胸腔积液是否为结核复发。(A对)。

122. 答案:B

解析:患者考虑肺结核,应首选痰涂片抗酸染色,方法简单、快速、易行,发现抗酸染色阳性可诊断。

123. 答案:A

解析:患者突发呼吸困难,咳粉红色泡沫痰,体征:S3奔马律,两肺下叶湿性罗音。考虑:急性左心衰。肝颈静脉回流征阳性,表示存在右心衰。综合考虑诊断为全心衰。(A对)。

124. 答案:D

解析:患者考虑全心衰,既往冠心病史10年,首先考虑行超声心动图检查,评价各心腔大小变化及瓣膜结构和功能,方便快捷地评估心功能和判断病因。

125. 答案:D

解析:略。

126. 答案:E

解析:二尖瓣狭窄禁用洋地黄类药物。

127. 答案:D

解析:患者老年男性,长期大量吸烟史,长期反复咳嗽咳痰、劳力性气促,考虑慢性阻塞性肺疾病。现意识不清,血压降低,血氧饱和度降低,浅昏迷,球结膜水肿(提示CO₂潴留),应考虑慢阻肺急性加重,造成呼吸衰竭引起肺性脑病。(D对)。

128. 答案:C

解析:患者已出现肺性脑病,应立即行机械通气治疗。

129. 答案:A

解析:患者青年女性,X线发现右侧胸部圆形肿物,CT示左前纵隔巨大肿物,边缘清晰,光整,密度不均,伴有液性暗区及高密度钙化影,考虑前纵隔肿瘤,结合肿块内有液性暗区及高密度钙化影,应考虑为畸胎瘤。

130. 答案:A

解析:患者考虑诊断为前纵隔畸胎瘤首选手术治疗。恶性淋巴源性肿瘤适用放射治疗“恶性纵隔肿瘤若已侵入邻近器官无法切除或已有远处转移,则禁忌手术而可根据病理性质给予放射或化学药物治疗。

131. 答案:A

解析:老年男患,右侧阴囊肿大,右侧睾丸不能触及,透光试验阳性,考虑诊断为睾丸鞘膜积液。(A对)。精索鞘膜积液透光试验阳性,但可触及睾丸。睾丸肿瘤和斜疝透光试验阴性,与该患不符。交通性鞘膜积液透光试验阳性平躺积液改善。

132. 答案:B

解析:患者诊断睾丸鞘膜积液,治疗首选鞘膜翻转术或鞘膜切除术。(B对)。睾丸切除适用于睾丸肿瘤。斜疝修补适用于腹股沟斜疝的治疗。阴囊穿刺不能解决鞘膜积液的问题,仍会复发。患者此时积液量较大,有明显症状,应行手术治疗。

133. 答案:E

解析:哮喘的诊断需符合典型的症状和体征,同时具备气流受限客观检查中的一条,因此首选支气管激发试验。(E对)。

134. 答案:D

解析:患者中年男性,多于春季发病反复发作性干咳伴胸闷,抗生素治疗不佳,无其他感染、咳血、心力衰竭表现,应考虑诊断哮喘。胸腹矛盾运动是指呼吸时胸廓与腹部出现相反运动,即吸气时胸廓运动向外,腹壁运动向内,提示哮喘病情危重。(D对)。

135. 答案:C

解析:顽固性高血压为联合使用三种以上降压药包括利尿剂,血压仍未达到目标水平。恶性高血压指高血压病情进展急骤,舒张压持续 ≥ 130 ,并伴眼

底和肾损害。根据题干信息,非药物治疗+药物治疗都不能达到血压目标值,为顽固性高血压。

136. 答案:A

解析:短时间内高血压重度升高 $>200/130$ 并伴重要脏器功能障碍为高血压急症,高血压危象(高血压亚急症)不伴重要脏器功能障碍。该患者双肺水泡音为急性左心衰,因此为高血压急症。

137. 答案:A

解析:呋塞米为强效利尿药,作用强大而短暂,能有效改善胸闷、气短和水肿等症状故能够短期控制症状。(A对)。阿司匹林、华法林主要用于防止血栓形成,故不选。地尔硫卓有负性肌力作用,并可减慢窦房结和房室结的传导,故不选。洋地黄主要用于ACEI(ARB)、 β 受体拮抗剂、MRA(盐皮质激素受体拮抗剂)治疗后仍有症状,或者不能耐受 β 受体拮抗剂的患者,能有效改善症状,尤其用于减慢心力衰竭伴房颤病人的心室率。

138. 答案:E

解析:洋地黄主要用于 β 受体拮抗剂治疗后仍有症状的扩张型心肌病,能有效改善症状,尤其用于减慢心力衰竭伴房颤病人的心室率,故选地高辛。

139. 答案:D

解析:肺循环淤血导致肺毛细血管压增高,液体渗出到肺泡而出现湿性啰音。(D对)。

140. 答案:E

解析:肝颈静脉反流征阳性是右心衰的最具特征性的体征。(E对)。

141. 答案:A

解析:提拉法用于髋关节后脱位。

142. 答案:E

解析:足蹬法用于肩关节前脱位。

143. 答案:A

解析:术前无明确证据,术后病理前列

腺增生手术标本中发现的癌为 T1 期。

144. 答案:C

解析:突破包膜或侵犯精囊为 T3 期,突破包膜为 T3a,侵犯精囊为 T3b。

145. 答案:A

解析:呋塞米利尿,减少血容量,因此回心血量减少,降低心脏前负荷。

146. 答案:C

解析:硝普钠扩张小动脉和小静脉。扩张小动脉降低心脏后负荷,扩张小静脉降低心脏前负荷。

147. 答案:D

解析:慢性阻塞性肺疾病时由于持续气流受限,肺通气量不足导致 2 型呼衰。

148. 答案:E

解析:肺栓塞时,起栓塞部位血流减少,通气/血流比例增大,肺泡通气不能被充分利用,从而造成 I 型呼吸衰竭。

149. 答案:A

解析:IgA 肾病的确诊有赖于肾活检免疫病理检查。(A 对)。

150. 答案:C

解析:如果患者肾脏 B 超肾的形态、大小、血流正常、皮质正常,则急性肾功能衰竭可能性大。如果患者肾脏萎缩、皮质变薄、血流变少,则慢性肾衰竭可能性大。故首选 B 超进行鉴别。肾活检可以判断肾病的病理类型,对于针对性治疗有重要意义,但无法鉴别急慢性肾衰竭。动脉造影可观察肾动脉的分布走行等解剖结构,但对于鉴别急慢性肾衰竭,无意义。双肾 CT 也可以区分,但 B 超相对简便,便宜,故首选 B 超。静脉肾盂造影可发现肾盂形态(不结构的变化,但不能鉴别急、慢性肾衰竭)。

第三单元

1. 答案:D

解析:患者中年男性,长期大量饮酒 10 年余,右上腹胀痛,乏力 4 个月。

肝功能正常,肝炎阴性,彩超提示肝实质回声弥漫密集增强,远场回声明显衰减。提示酒精性脂肪肝可能。酒精性脂肪肝患者首先应对患者进行教育。戒酒是治疗最重要的措施。(D 对)。

2. 答案:D

解析:患者青年男性,右上腹痛伴有寒战高热,腹部立位片见膈肌抬高,白细胞升高以中性粒细胞为主,彩超肝区液性暗区,考虑肝脓肿。超声可明确脓肿的部位和大小,阳性率达 96%,超声引导下还可以行穿刺活检。为首选检查。

3. 答案:A

解析:流式细胞学检测到细胞膜表面 CD55 和 CD59 表达下降是诊断 PNH 的重要依据。粒细胞 flow 测定、骨髓细胞学检查、网织红细胞计数、外周血有核红细胞数等检查,可有异常改变,但均不能独立支持 PNH 的诊断。(BCDE 错误)。

4. 答案:C

解析:略。

5. 答案:D

解析:患者中老年女性,有乙肝病史 30 年,反复腹痛乏力。彩超检查发现肝实质性肿块。凝血功能检查提示 PT 延长(血浆凝血酶原时间正常 11~13s),考虑肝癌可能性大。部分肝切除为治疗肝癌首选和最有效的办法。(D 对)。用于治疗不可切除的肝癌患者或者用于手术后的辅助治疗。肝癌靶向治疗用于:1. 术后病理证实有淋巴转移的患者。2. 肝内血管被肿瘤侵犯的患者。3. 手术切除的边缘病理显示为阳性的患者。无水醇注射用于治疗不可切除的肝癌患者或用于肝癌手术后的辅助治疗。化疗用于不能手术的患者。

6. 答案:A

2023 年临床执业历年真题

解析:干扰素可用于丙型肝炎抗病毒治疗,它主要通过诱导宿主产生细胞因子起作用,在多个环节抑制病毒复制。只要血清 HCV RNA 阳性伴无论 ALT 升高与否均应给予 IFN- α 治疗,联合利巴韦林可提高疗效。

7. 答案:C

解析:消化性溃疡是上消化道出血中最常见的病因。在我国,约占非静脉曲张破裂出血病因的 50%~70%。十二指肠溃疡较胃溃疡多见。

8. 答案:B

解析:患者中老年男性、乏力、腹胀 3 年,有肝掌、蜘蛛痣,移动性浊音阳性,白蛋白 19g/L (<30g/L),考虑肝硬化、腹水、低蛋白血症。因患者肝硬化肝脏合成白蛋白不足导致低蛋白血症。血胶体渗透压降低形成腹水。故治疗应补充白蛋白提升胶体后利尿。(B 对)。

9. 答案:D

解析:患儿腹痛、果酱样便及右上腹触及“腊肠样”包块(符合肠套叠三大典型症状:腹痛、血便和腹部肿块),因此诊断为肠套叠。选 D。

10. 答案:D

解析:略。

11. 答案:A

解析:流行性乙型脑炎的特异性 IgM 抗体测定属于血清学检查,该抗体在病后 3-4 天即可出现,脑脊液中最早在病程第 2 天即可检测到,2 周时达高峰,可作为早期诊断指标。

12. 答案:B

解析:穿孔属于继发性腹膜炎。

13. 答案:B

解析:根据病史,患者肝硬化 5 年,近期有发热、腹痛,腹水介于漏出液和渗出液之间,考虑肝硬化合并自发性腹膜炎,肝硬化并发腹水机体抵抗力下降时,肠腔内细菌有可能通过肠壁

进入腹腔,发生细菌移位导致腹膜炎。

14. 答案:C

解析:患者中年女性,突发胸痛,肺压缩 30%,应诊断为自发性气胸,经胸腔穿刺后治疗效果不佳,此时应采取胸腔闭式引流。(C 对)。

15. 答案:D

解析:烧伤面积为 19%, $19 \times 60 \times 1.5 + 2000 = 3700$ 。

16. 答案:A

解析:粘连性肠梗阻出现腹膜刺激征考虑绞窄性肠梗阻,需手术探查。

17. 答案:D

解析:患者有腹痛,黄疸,发热等表现,彩超提示有胆总管扩张,下段显示不清,提示结石嵌顿在胆总管。考虑诊断为梗阻性胆管炎。

18. 答案:D

解析:急性乳腺炎脓肿未形成时首选物理治疗,排空乳汁,局部湿热敷。如治疗效果不佳使用抗生素。脓肿形成出现波动感行切开引流。

19. 答案:D

解析:患者 16 岁,甲状腺摄碘率 2 小时 <25%,无功能亢进、青春期,考虑生理性甲状腺肿。

20. 答案:B

解析:患者中心静脉压正常而血压低,给予补液实验。

21. 答案:C

解析:略。

22. 答案:D

解析:乳房纤维瘤,因妊娠可使肿块增大,因此首选切除。

23. 答案:A

解析:患者胃大切术后,可见镜面舌血常规示贫血且为大细胞型,骨髓可见“核幼浆老均提示为巨幼细胞性贫血。(A 对)。缺铁性贫血骨髓可见核老浆幼。骨髓增生异常综合征、白血病应可见病态造血。多发性骨髓瘤应可见

异常增殖的浆细胞。

24. 答案:A

解析:贲门周围血管分为①冠状静脉:包括胃支、食管支及高位食管支。②胃短静脉。③胃后静脉。④左隔下静脉。门静脉高压时上述静脉都显著扩张,彻底切断上述静脉及与静脉伴行的同名动脉才能彻底截断门奇静脉间的反常血流。不包括胃网膜左静脉(A对,BCDE 错误)。

25. 答案:A

解析:患者化工厂工人职业中毒,呼出气有苦杏仁味,皮肤黏膜呈樱桃红色,考虑氰化物中毒可能性大。

26. 答案:C

解析:质子泵抑制剂(PPI)——抑制胃酸药物;出血是消化性溃疡最常见的并发症,一般十二指肠溃疡较胃溃疡易发生。

27. 答案:E

解析:中年女性,腹痛腹胀低热,脐周压痛,腹水 ADA65U/L>45,考虑结核可能性可通过腹水大。故最有助于诊断的检查是腹水。实验室检查做出初步诊断。

28. 答案:D

解析:患者胃大切术后出现吻合口瘘长期禁食、肠外营养,出现总胆红素、转氨酶升高,肝功能受损,主要病理改变是胆汁淤积,与过高能量供给等有关。

29. 答案:D

解析:幽门梗阻导致低钾低氯性碱中毒,应补钾。患者既往十二指肠溃疡病史,腹胀、呕吐 3 天,呕吐物为宿食,应考虑幽门梗阻因大量呕吐,易造成低钾血症,且因无法进食,可能导致低血糖,可使用 10%氯化钾+5%葡萄糖盐水补钾同时补充葡萄糖。

30. 答案:E

解析:患者年轻女性,酱油色 3 天,肾

无叩击痛,考虑肾脏疾病可能性小,考虑溶血性疾病导致的酱油色尿,应做尿胆原检查,若为阳性,则酱油色尿的病因为自身免疫性溶血性贫血。

31. 答案:A

解析:伤寒的玫瑰疹为充血性皮疹。

32. 答案:C

解析:患者右下肢清创术后,出现发热疼痛,局部伤口张力高,考虑急性蜂窝织炎所致。伤口处红肿,少量渗液,且出现全身症状溶血性链球菌所致可能性大;而金黄色葡萄球菌所致者,病变较局限,可出现脓肿形成。

33. 答案:D

解析:肛瘘典型表现为外口持续或间断流出少量脓性、血性、黏液性分泌物。患者肛门周围反复疼痛、红肿、流脓,肛缘有一硬结,沿硬结往里可触及一条索物,考虑肛瘘的可能性大。(D对)。

34. 答案:B

解析:钩端螺旋体病中期,即器官损伤期,可分为五型:1. 流感伤寒型 2. 肺出血型 3. 黄疸出血型 4. 肾衰竭型 5. 脑膜脑炎型。

35. 答案:A

解析:同源爆发指某易感人群中的成员同时暴露于某共同的病原体或污染源而引起的爆发。故呼吸道传播较其余四种传播途径更易导致易感人群的同时暴露,故呼吸道传播最常见。

36. 答案:A

解析:患者既往上腹部隐痛病史,考虑有消化性溃疡病史,突发剑突下疼痛,迅速出现全腹压痛和肌紧张考虑弥漫性腹膜炎改变。因此考虑消化性溃疡穿孔。当溃疡穿透胃、十二指肠壁时,发生穿孔,表现为突发剧烈的腹痛,持续而加剧,先出现于上腹部,继之延及全腹,体征有腹壁板样僵直、压痛、反跳痛,肝浊音界消失,部分病

2023 年临床执业历年真题

人出现休克。(A 对)。

37. 答案:E

解析:ANCA 相关性血管炎伴肺出血是血浆置换的主要适应症。

38. 答案:C

解析:略。

39. 答案:B

解析:患者老年男性,乏力伴腰痛3个月。血清蛋白电泳见M蛋白带、尿蛋白(+)、骨髓细胞学检查见幼稚浆细胞、腰椎压缩性骨折均提示患者诊断为多发性骨髓瘤。(选B)。

40. 答案:B

解析:尖锐湿疣由人乳头瘤病毒所致常发生在外生殖器及肛门等部位,主要通过性行为传染。

41. 答案:E

解析:肠易激综合征指反复发作的腹痛,近3个月内发作至少每周1次,诊前症状出现至少6个月。(E对)。

42. 答案:D

解析:血清淀粉酶升高的程度不能反应急性胰腺炎的严重程度。

43. 答案:B

解析:急性上呼吸道感染,择期手术延期到感染完全控制后1-2周。

44. 答案:A

解析:略。

45. 答案:C

解析:长期服用NSAIDs、糖皮质激素等药物的患者可以发生溃疡。急性消化性溃疡穿孔使用糖皮质激素无明显效果。(C对)。

46. 答案:B

解析:慢性肛裂为慢性炎症,常有结缔组织增生、瘢痕形成、底深、边缘不齐、无弹性、肉芽灰白。急性肛裂可见裂口边缘整齐,底浅,呈红色并有弹性,无瘢痕形成。

47. 答案:C

解析:门静脉高压形成后,门静脉血液

分流到侧支循环,进入肝内的血流减少,进一步导致肝功能下降。

48. 答案:E

解析:湿性坏疽多发生于外界相通的内脏,如肺、肠、子宫、阑尾及胆囊等,也可发生于动脉阻塞及静脉回流受阻的肢体。

49. 答案:C

解析:患者发热,查体可见肛周红肿有波动感,最可能诊断为肛周脓肿,患者脓肿已形成,应手术治疗。脓肿切开引流是治疗直肠肛管周围脓肿的主要方法,一旦诊断明确,应立即切开引流。(C对)。

50. 答案:A

解析:对于氨基水杨酸制剂无效的中重度溃疡性结肠炎治疗应首选糖皮质激素。

51. 答案:D

解析:青年男性,右下腹痛伴腹泻,肛痿。肠镜检查提示:回盲部充血水肿,鹅卵石样改变。应考虑克罗恩病。

52. 答案:D

解析:系统性红斑狼疮的关节病变为非侵袭性,不会出现关节畸形。

53. 答案:E

解析:门静脉高压多属于肝内型,常导致食管胃底静脉曲张破裂出血,腹腔积液,脾大、脾功能亢进、肝肾综合征,肝肺综合征等是导致肝硬化患者除病因外推动肝功能减退的重要病理生理环节。(E对)。

54. 答案:A

解析:患者青年男性,瘦高体型,大笑后突发胸痛、气短,查体见左侧胸廓饱满,左肺叩诊鼓音,左肺呼吸音低,应考虑诊断自发性气胸。

55. 答案:A

解析:匙状甲是缺铁性贫血患者组织缺铁的表现。而急性白血病患者为正细胞正色素性贫血。

56. 答案:A

解析:烧伤常深达肌肉肌腿、骨骼,损伤范围常外小内大。(A对)。由于邻近血管的损害,经常出现进行性坏死,伤后坏死范围可扩大数倍。局部渗出较一般烧伤重,包括筋膜腔内水肿。没有明显的坏死层面。

57. 答案:A

解析:增生性息肉是结直肠中最常见的非肿瘤性息肉,常常多发,且直径多小于5mm,一般不需要特殊治疗。(A对)。

58. 答案:B

解析:疟疾是由人类疟原虫感染引起的寄生虫病,疟原虫先侵入肝细胞发育繁殖,再侵入红细胞繁殖,引起红细胞成批破裂而发病。因此,疟疾患者的血常规会呈现不同程度的贫血表现,红细胞和血红蛋白相应减少。

59. 答案:C

解析:患者属于妊娠晚期,大多数免疫抑制剂在妊娠前3个月至妊娠期应用均可能影响胎儿的生长发育,故必须停用半年以上方能妊娠但羟氯喹对妊娠影响相对较小,可以全程使用。

60. 答案:A

解析:略。

61. 答案:B

解析:患者老年男性,无明显诱因出现消瘦,结肠镜检查见距离肛门8~10cm处约3cm菜花样肿块,考虑直肠癌,指检距肛门8cm,因此采取低位前切除术(Dixon术)。(B对)。Miles术即经腹会阴联合直肠癌根治术,适用于腹膜反折以下的直肠癌,癌肿下缘距门7cm以内的肿瘤。Hartmann术即经腹直肠癌切除术、近端造口、远端封闭手术,适用于年老、体弱等原因不耐受手术、急性梗阻者。Duhamel术为巨结肠手术治疗方式。结肠造瘘术适用于直肠和远端结肠肿瘤性疾病治疗,

常用于低位直肠癌的治疗。

62. 答案:D

解析:促胃泌素瘤通常较小,约80%位于促胃泌素瘤三角区内,即胆囊与胆总管汇合点,十二指肠第二段(十二指肠降部)与第三段交界处。选项中选十二指肠降部最佳。(D对,ABCE错误)。

63. 答案:B

解析:中年男性,为胃癌好发年龄,有上腹部疼痛、乏力、消瘦,随之又出现贫血。临床症状高度怀疑胃恶性肿瘤。消化道造影示胃小弯侧2.5cm龛影,胃活动差。胃癌可能性大。胃泌素:80pg/ml在正常范围内,排除胃泌素瘤可能故考虑诊断为胃癌。(B对)。

64. 答案:B

解析:患者腹痛,腹胀伴肛门停止排气排便,为典型肠梗阻症状,考虑肠梗阻,经保守治疗无效,且症状加重,需立即手术治疗。(B对)。空气灌肠常用于肠套叠。持续胃肠减压常用于肠梗阻急性期。禁食、补液属于基础治疗,不是最佳处理方式。

65. 答案:C

解析:中年女性,发热,头痛(脑血管扩展充血)面色潮红(皮肤充血),腋下出血点(出血),尿常规有蛋白尿、酱油色血尿(肾损害),血白细胞升高,血小板减少,考虑流行性出血热可能性大。流行性出血热即肾综合征出血热,是由汉坦病毒引起,以鼠类为主要传染源。主要变化是全身小血管和毛细血管广泛性损害,临床上以发热、低血压休克、充血出血和肾损害为主要表现。实验室检查提示血白细胞在第3病日后逐渐升高,第4-5日后可出现异性淋巴细胞,血小板从第2病日起开始减少。(C对)。

66. 答案:C

解析:输出袢梗阻多见于术后肠粘连或结肠后方式系膜压迫肠管所致。病人

表现为上腹部饱胀不适，严重时有呕吐，呕吐物含有胆汁。符合该患者表现。(C 对)。

67. 答案:B

解析:患者柴刀砍伤左大腿后 8 小时伤口边缘整齐，内有泥土，需防止发生气性坏疽的可能，应彻底清创，伤口深 1cm 应充分敞开引流，避免死腔形成。(B 对，AC 错误)。对于气性坏疽感染，首选青霉素，需大剂量使用，每天 1000 万 U 以上。对疑有气性坏疽的伤口，可用 3% 过氧化氢或 1:1000 高锰酸钾等溶液冲洗、湿敷。蜂蜇伤后，拔除蜂刺后，可肥皂水冲洗。

68. 答案:D

解析:感染的原发灶应尽早明确，并及时采取相应措施控制感染源。

69. 答案:C

解析:HIV 侵入人体后，在直接细胞毒性作用和免疫病理作用下，以 CD4+ 淋巴细胞为主的多种细胞(CD8+T 细胞、单核-巨噬细胞、B 淋巴细胞、NK 细胞、小神经胶质细胞等)功能受损和大量破坏，导致机体细胞免疫缺陷，促使机体并发各种严重的机会性感染和肿瘤的发生，不包括肝内吞噬细胞。

70. 答案:C

解析:有脓血便史考虑溃疡性结肠炎，出现低钾考虑溃疡性结肠炎合并中毒性巨结肠。

71. 答案:B

解析:患者有腹痛，高热，伴有低血压。彩超提示胆囊多发结石，胆总管扩张 1.6cm。多考虑诊断急性化脓性梗阻性胆管炎，休克。只有立即解除胆道梗阻，阻止细菌进一步释放入血，才能阻断病情进一步恶化。主要方法包括是胆总管切开+T 管引流术。

72. 答案:B

解析:略。

73. 答案:B

解析:CT 提高了胃癌临床分期的精确度，有助于肿瘤转移的判断。其操作简单，为了解胃癌患者的临床分期首选的检查。胃镜检查结合黏膜活检是目前诊断胃癌最可靠的手段。胃癌病灶处的超声内镜检查可较准确地判断肿瘤侵犯深度，有助于区分早期和进展期胃癌，并了解有无局部淋巴结转移，但因超声内镜并不普及，操作难度大，不作为首选，可作为 CT 检查的重要补充。

74. 答案:E

解析:患者有消化性溃疡病史 6 年，大量进食后腹胀呕吐胃内容物，脸色苍白、气促上腹轻压痛，大便隐血阴性。考虑诊断幽门梗阻。幽门梗阻时应行胃肠减压。(E 对)。针灸用于阑尾炎术后肠梗阻。本例患者不考虑阑尾炎术后肠梗阻，故不选。肌注新斯的明可用于术后尿潴留，术后麻痹性肠梗阻。本例患者不适合。患者阑尾炎术后 6 天，无腹膜炎等感染表现，故不选。阑尾炎术后肠粘连可以选择热敷，热敷可以减轻肠道水肿。本例患者不考虑阑尾炎术后并发的粘连性肠梗阻。故不选。

75. 答案:A

解析:该患者出现多系统受累，抗 dsDNA (+)，ANCA1:1000，考虑诊断为 SLE。SLE 是一个免疫复合物病，自身抗体和相应自身抗原相结合形成免疫复合物，在组织沉积造成组织损伤。

76. 答案:E

解析:乳腺癌与遗传有关(BRCA 基因遗传，而非突变)乳腺在的高危因素有激素水平(雌激素、孕激素、生长激素)、月经状况(初潮早于 12 岁，绝经晚于 50 岁，经期长于 35 年)、婚育情况(第一胎足月产在 35 岁以上或 40 岁以上未孕、反复人流)、哺乳史(产后未

哺乳)、乳腺疾病史(乳腺不典型增生)、遗传和家族史、饮食(高脂肪、高蛋白、高热量)、环境因素(电离辐射、低剂量诊断用射线、主动和被动吸烟)、其他(精神刺激、忧郁、肥胖、糖尿病、病毒感染)。

77. 答案:E

解析:腹股沟斜疝常见于儿童或青年回纳后压住深环不再突出;直疝常见于老年男性,按压还纳后又突出。故直疝与斜疝最主要的鉴别点为回纳后压住深环后是否再突出。

78. 答案:E

解析:患者青年男性,腹胀呕吐,呕吐隔夜宿食,有酸臭味,考虑幽门梗阻。幽门梗阻常见于:胃幽门、幽门管、或十二指肠球部溃疡反复发作,形成瘢痕狭窄。(E对)。胃角溃疡一般由于胃黏膜的保护能力减弱,胃内的胃酸对黏膜腐蚀,破坏,导致溃烂形成。一般不出现幽门梗阻。食管溃疡与多种因素有关,包括:胃酸反流、放射性治疗、药物、不良饮食习惯、营养物质缺乏、慢性食管疾病等。通常不导致幽门梗阻。十二指肠降段溃疡指发生在十二指肠降段,多位于十二指肠降段的初始部及乳头附近。严重时可导致胆总管引流障碍,严重黄疸。通常不发生幽门梗阻。胃体溃疡不出现幽门梗阻。

79. 答案:E

解析:患者诊断为MDS(骨增生异常综合征),外周血原始细胞25%,骨髓原始细胞20~30%,见Auer小体,故FAB分型为RAEB-t。

80. 答案:E

解析:患者行蛛网膜下腔麻醉,应平卧或头低卧位12小时,以防止因脑脊液外渗致头痛。蛛网膜下腔阻滞12小时后,可根据手术需要选择体位。患者腹部手术,12小时后可采取低半坐位、

卧式或斜坡卧位,以减少腹壁张力。(E对,A错)。施行颈、胸手术后,多采用高半坐位卧式,以便于呼吸及有效引流。施行颅脑手术后,如无休克或昏迷,可取15-30°头高脚低斜坡卧位。休克病人,应取下肢抬15-20°,头部和躯干抬高20-30°的特殊体位。

81. 答案:D

解析:内痔主要表现为出血和脱出,无痛性间歇性便后鲜血是其常见症状,好发部位为截石位3、7、11点,分为I~IV度。I度:便时带血、滴血或喷射状出血,便后出血可自行停止,无痔脱出。II度:常有便血,排便时有痔脱出,便后可自行还纳。III度:偶有便血,排便或久站,咳嗽、劳累、负重时痔脱出,需用手还纳。IV度:偶有便血,痔脱出不能还纳或还纳后又脱出。

82. 答案:E

解析:艾滋病、非典型肺炎、病毒性肝炎等属于乙类传染病。鼠疫、霍乱属于甲类传染病。流行性腮腺炎、风疹属于丙类传染病。

83. 答案:D

解析:老年男性,进行性黄疸伴上腹痛,消瘦,胆囊肿大,胆红素升高。考虑胰头癌。胰头十二指肠切除术是治疗本病的外科手段。

84. 答案:A

解析:AFP对诊断原发性肝癌有重要作用。当AFP>400ng/ml时,超声、CT或MRI发现肝实质性肿块,具有肝细胞癌典型影像学表现着可以确诊。

85. 答案:A

解析:胃十二指肠溃疡穿孔时腹部立位片可见隔下游离气体。为首选可确诊的检查。

86. 答案:D

解析:戊型肝炎主要通过粪口传播,暴发流行均由粪便污染水源所致,散发

多由于不洁食物或饮品所引起。乙型肝炎具体传播途径主要包括母婴传播，血液、体液传播和性传播。乙脑主要通过蚊叮咬而传播。库蚊、伊蚊和按蚊的某些种都能传播本病，而三带喙库蚊是主要传播媒介。流行性脑脊髓膜炎的病原菌主要经咳嗽、打喷嚏借飞沫由呼吸道直接传播。HIV 的传播途径主要是性接触血液接触和母婴传播。

87. 答案:D

解析:盆腔脓肿多见于阑尾穿孔或结直肠手术后,出现体温升高、典型直肠或膀胱刺激症状,如里急后重、大便频而量少、有黏液便、尿频、排尿困难等。(D对)。溃疡性结肠炎以反复发作的腹泻、黏液脓血便及腹痛为主要症状。肛周脓肿也会出现直肠或膀胱刺激症状,但以局部疼痛症状为主,全身感染症状不明显,且与阑尾术后无关。阑尾残株炎指阑尾残端保留过长超过1cm时,或者肠石残留,术后残株可炎症复发,仍表现为阑尾炎的症状。阑尾周围脓肿如未及时引流,易形成各种内瘘、外瘘。

88. 答案:C

解析:患者诊断胃食管反流病。

89. 答案:C

解析:患者老年男性,腹股沟包块,平躺消失,按住包块口深环,咳嗽后仍可突出,应诊断为腹股沟直疝(C对)。脂肪瘤好发于肩、背、颈、乳房、腹部和四肢近端,质地柔软,边界清楚,推之活动度良好。腹股沟斜疝多发生于儿童及青壮年,疝块呈圆或梨形,回纳后压住深环不再突出。股疝多见于40岁以上女性,病块经股管突出,回纳后不能完全消失。精索鞘膜积液肿块较小,在腹股沟管内,牵拉同侧睾丸可见肿块移动。

90. 答案:B

解析:HLA-B27与强直性脊柱炎相关,HLA-DR3与重症肌无力、系统性红斑狼疮、胰岛素依赖糖尿病相关。

91. 答案:D

解析:中年男性患者,病程6月,双腕关节、近端指间关节、掌指关节、双侧颞颌关节的关节炎伴有晨僵,抗CCP(+),X线为典型的类风湿性关节炎(RA)影像学改变,故考虑诊断类风湿性关节炎。

92. 答案:D

解析:该患者考虑诊断类风湿性关节炎(RA),首选甲氨蝶呤,该药属于传统DMARDs,是联合用药的基础药物,确诊后尽早使用甲氨蝶呤可延缓和控制病情进展。(选D)。

93. 答案:C

解析:患者车祸伤后4小时出现剧烈腹痛,中上腹部压痛、反跳痛,血淀粉酶1200u/l(胰腺损伤,导致淀粉酶大量释放到血液中)。故考虑胰腺损伤可能性大。(C对)。肝脏损伤一般为右上腹痛,主要危害是失血性休克、胆汁性腹膜炎和继发性感染,淀粉酶正常。脾是腹腔脏器最容易受损的器官之一,主要危险为失血性休克,腹痛位于左上腹,淀粉酶正常。结肠损伤一般腹膜炎出现较晚但严重。小肠损伤可在早起出现明显腹膜炎,淀粉酶正常。

94. 答案:C

解析:患者考虑胰腺损伤,经腹部立位平片和腹部B超未明确诊断。对于诊断不明而病情稳定者可作CT或MRI检查,能显示胰腺轮廓是否完整及周围有无积血、积液。(C对)。患者目前生命体征平稳,暂无剖腹探查指征。诊断性腹腔穿刺术和腹腔灌洗术阳性率可达90%以上,对于判断腹腔内脏有无损伤和哪类脏器损伤有很大帮助,该患者血淀粉酶升高,考虑胰腺破裂,

行 CT 进一步确诊。腹腔镜检查可应用于一般状况良好而不能明确有无或何种腹内脏器伤的病人，但为有创检查，不首选。该患者已做 B 超，无需再次做。

95. 答案:E

解析:患者诊断为消化性溃疡，胃镜检查是消化性溃疡诊断的首选方法和金标准

96. 答案:B

解析:考虑消化性溃疡可能性大，胃酸胃蛋白酶导致的自身消化是导致消化性溃疡主要因素。(B 对)。胃粘膜血液供应异常，可以导致溃疡，但不是最直接的因素。胃泌素分泌异常可导致浅表性胃炎、萎缩性胃炎、胃泌素瘤、胃溃疡等疾病。胃肠粘膜粘液分泌减少与幽门螺杆菌感染、自身免疫等因素相关。胃动力异常一般导致消化不良不引起溃疡。

97. 答案:B

解析:患者诊断为消化性溃疡，PPI 是治疗消化性溃疡的首选药物。(B 对)。Hb 100g/L，未达到输血指征；Hb>100g/L 不需要输血；Hb <70g/L 可输入浓缩红细胞；Hb 为 70~100g/L 时，应根据病人的具体情况来决定是否输血)。血管加压素可用于食管、胃肠道等消化道疾病引起的急性大出血的辅助治疗。6-氨基己酸用于预防及治疗血纤维蛋白溶解亢进引起的各种出血。H₂受体拮抗剂:是治疗 PU 的主要药物之一，但不是首选药物。

98. 答案:A

解析:腹痛是急性胰腺炎的主要症状常于饱餐和饮酒后突然发作，腹痛剧烈，多位于左上腹，向左肩及左腰背部放射。患者进食油腻食物后突发持续上腹痛，查体:左上腹压痛，余无特殊。故考虑急性胰腺炎可能性大。(A 对)。急性胆囊炎进食油腻食物后发作右上

腹绞痛，向右肩和右腰背部放射。体检时右上腹有压痛、反跳痛、肌紧张，Murphy 征阳性。急性性阑尾炎典型表现是转移性右下腹痛和右下腹固定压痛。疼痛始于脐周或上腹部，待炎症波及阑尾浆膜(脏腹膜)，腹痛转移并固定于右下腹。急性心肌梗死是冠状动脉急性持续性缺血缺氧所引起的心肌坏死，临床上多有剧烈而持久的胸骨后疼痛。胃溃疡常见症状是胃部烧灼样疼痛，腹痛多发生于餐后半小时至一小时内。

99. 答案:B

解析:首选 B 超。确诊腹部增强 CT。

100. 答案:B

解析:患者女性，持续高热，神志淡漠，玫瑰疹，为伤寒典型症状。

101. 答案:E

解析:血和骨髓培养对伤寒有确诊意义。

102. 答案:A

解析:患者系老年男性，主要表现为右季肋部胀痛伴有食欲减退、乏力及黄疸，查体可见肝大、质硬、表面凹凸不平，AFP 明显升高，CT 提示肝脏可见大小约 3×2cm 低密度影，动脉期出现环形强化影，而病变内部强化不显著。首先考虑为肝癌。

103. 答案:A

解析:超声或 CT 引导下细针穿刺行组织学检查是确诊肝癌的可靠方法。

104. 答案:B

解析:术后 5 天属于阑尾术后早期的并发症。腹痛、腹胀，未闻及肠鸣音提示肠梗阻症状，粘连性肠梗阻不属于早期的并发症。多考虑肠道功能未恢复引起的麻痹性肠梗阻。手术后早期(5-7 天)发生梗阻的症状，应与手术后肠麻痹恢复期的肠蠕动功能失调相鉴别。

105. 答案:A

解析:阑尾残端保留超过 1cm 时，或肠

石残留，术后残株可炎症复发，表现为阑尾炎症状，即转移性右下腹痛症状，因此考虑急性阑尾残株炎诊断。

106. 答案:C

解析:患者行右侧乳腺癌改良根治术后病理回报:肿瘤大小为 3cmx2cm,属于 T2;同侧腋窝有肿大淋巴结,尚可推动,属于 N1;未见全身转移,属于 M0, TNM 分期为 T2N1M0。

107. 答案:E

解析:乳腺癌术后常规化疗, ER、PR 阳性需内分泌治疗, HER2(+)需靶向治疗。故该患者术后需化疗+靶向治疗+内分泌治疗。

108. 答案:B

解析:患者胃镜提示十二指肠溃疡,因近 3 月症状加重手术治疗,胃大部切除术后远期并发症包括:倾倒综合征、碱性反流性胃炎、溃疡复发、营养性并发症、残胃癌。(选 B)。早期并发症包括:出血、胃瘫、肠壁缺血坏死、吻合口破裂或漏、十二指肠残端破裂、术后肠梗阻。

109. 答案:B

解析:输出袢梗阻多见于术后肠粘连或结肠后方式系膜压迫肠管所致。病人表现为上腹部饱胀不适,严重时呕吐,呕吐物含胆汁。

110. 答案:E

解析:术后低血糖,为晚期倾倒综合征,不伴呕吐。

111. 答案:E

解析:动脉血气分析显示代谢性碱中毒。

112. 答案:D

解析:略。

113. 答案:D

解析:男性老年患者,因再障多次依靠输血纠正贫血,近 2 次输血发生了发热,原因应为患者多次受血后产生了白细胞及血小板的抗体而导致的非溶血性发热。(D 对)。

114. 答案:B

解析:男性老年患者,因再障多次依靠输血纠正贫血,近 2 次输血发生了发热,原因应为患者多次受血后产生了白细胞及血小板的抗体而导致的非溶血性发热。(B 对)。

115. 答案:C

解析:患者老年女性,烧伤双小腿(13%)及足部(成年女性 6%),故该患者的烧伤面积是 19%。

116. 答案:A

解析:患者老年女性,体重 60kg,烧伤双小腿及足部(烧伤面积 19%)布满大小不一的水疱,创面湿润,痛觉明显(浅二度烧伤),计算第 1 个 24 小时的补液量= $60 \times 19 \times 1.5 + 2000 = 3710$ 。

117. 答案:A

解析:患者上腹部不适,加重伴头晕乏力,胃镜见胃粘膜变薄,黏膜色泽变淡,可透见血管型。结合既往自身免疫性疾病,考虑慢性萎缩性胃炎 A 型, A 型胃炎时,可产生内因子抗体,内因子分泌减少,腺体萎缩,胃液分泌减少。

118. 答案:A

解析:桥本甲状腺炎为自身免疫性疾病,胃粘膜变薄为萎缩性胃炎,考虑因为自身抗体导致的胃粘膜萎缩,因此查和萎缩性胃炎相关的自身抗体。

119. 答案:C

解析:患者考虑自身免疫性胃炎(慢性萎缩性胃炎 A 型)。当体内出现针对壁细胞或内因子的自身抗体时,自身免疫性的炎症反应导致壁细胞总数减少、泌酸腺萎缩、胃酸分泌降低;内因子减少可导致维生素 B12 吸收不良,出现巨幼细胞贫血,称之为恶性贫血。

120. 答案:D

解析:患者为老年男性,有感染、出血表现。骨穿结果提示为早幼粒细胞白血病。CD33 阳性存在于粒细胞白血病,

故选该患者骨髓检查最可能出现 CD33 阳性。(选 D)。粒细胞白血病 MPO、CD13 应为阳性。粒细胞白血病 PAS 染色应为阴性。PAS 染色成块见于急淋。粒细胞白血病 NSE 染色应为阳性,若能被 NaF 抑制,则为急单。

121. 答案:A

解析:患者年轻男性,有贫血、感染出血等表现,骨穿示胞质内粗大颗粒的早幼粒细胞占 0.75。诊断应为急性早幼粒细胞白血病,首选治疗为全反式维甲酸诱导分化。(A 对)。DA 及 HA 化疗方案主要用于除外 APL 的 AML 患者治疗。伊马替尼为慢性粒细胞白血病的首选治疗药物。VLDP 方案化疗主要用于 ALL 的治疗。

122. 答案:A

解析:患者为老年男性,有感染、出血表现。骨穿结果提示为早幼粒细胞白血病,故不选急性髓系白血病。(A 对, B 错)。急性单核细胞白血病应在骨髓中发现幼稚的单核细胞。急性巨核细胞白血病应在骨髓中发现幼稚的巨核细胞。中枢神经系统白血病是指白血病细胞进入了中枢神经系统中。

123. 答案:B

解析:患者青年女性 SLE 好发人群,慢性病程,游走性关节炎、反复口腔溃疡,伴有颊部红斑、心包积液,患者多系统损害应怀疑系统性红斑狼疮(SLE)的可能。

124. 答案:B

解析:患者青年女性,系统性红斑狼疮(SLE)的可能,为明确诊断选抗核抗体谱检查,其中抗 dsDNA 抗体是诊断 SLE 的特异性抗体。(B 对)。

125. 答案:E

解析:略。

126. 答案:A

解析:略。

127. 答案:A

解析:患者考虑破伤风可能性大,累及膈肌和呼吸肌会导致呼吸骤停,危及生命。

128. 答案:E

解析:患者因被铁钉刺后出现破伤风前驱症状乏力伴头痛、咀嚼困难、吞咽困难,后出现肌肉痉挛,考虑破伤风感染,应控制痉挛下进行清创,充分引流,使用破伤风抗毒素中和游离毒素,使用青霉素抑制破伤风梭菌,并对症治疗。

129. 答案:E

解析:根据患者男,35 岁。头痛伴视物模糊 3 个月,偶伴抽搐,曾在大便中发现带状节片,患者考虑诊断为猪绦虫感染,最可能的诊断是脑囊尾蚴病。

130. 答案:E

解析:根据患者男,35 岁。头痛伴视物模糊 3 个月,偶伴抽搐,曾在大便中发现带状节片,患者考虑诊断为猪绦虫感染,最可能的诊断是脑囊尾蚴病。为明确诊断,最重要的检查是颅脑 MRI。(E 对)。

131. 答案:C

解析:根据题干病史、体征及辅材检查,该患者首先考虑 SLE,出现大量蛋白尿,诊断为狼疮肾炎。

132. 答案:E

解析:患者考虑 SLE、狼肾炎,血抗核抗体及抗双链 DNA 抗体对 SLE 的诊断有帮助。

133. 答案:C

解析:青蒿素为所有疟疾流行区药物联合治疗的基础用药。

134. 答案:B

解析:伯氨喹杀灭红细胞内疟原虫配子体和肝细胞内迟发型孢子,防止疟疾的传播和复发。

135. 答案:B

解析:胃内积血量>250ml 可引起呕血。

136. 答案:A

解析:每日消化道出血>5ml. 粪便潜血试验阳性。

137. 答案:B

解析:脾是腹腔脏器中最容易受损的器官之一。脾损伤的发生率在腹部创伤中可高达 40~50%。

138. 答案:E

解析:结肠损伤因结肠内容物液体成分少而细菌含量多, 故腹膜炎出现得较晚, 较严重。

139. 答案:D

解析:肠结核病原菌为抗酸菌, 很少受胃酸影响, 可顺利进入肠道, 多在回盲部引起病变。这是因为含结核分枝杆菌的肠内容物在回盲部停留较久, 增加了局部黏膜的感染机会, 该菌易侵犯淋巴组织, 而回盲部富有淋巴组织。(D 对)。

140. 答案:C

解析:溃疡性结肠炎病变主要限于大肠黏膜与黏膜下层, 呈连续性弥漫性分布。病变多自直肠开始, 逆行向近段发展, 可累及全结肠甚至未段回肠。(C 对)。

141. 答案:B

解析:机械性肠梗阻呈阵发性绞痛。在腹痛的同时伴有高亢的肠鸣音, 当肠腔有积气积液时, 肠鸣音呈气过水声或高调金属音。

142. 答案:A

解析:消化性溃疡穿孔主要临床表现:腹式呼吸减弱或消失, 全腹压痛, 但以穿孔处最重。腹肌紧张呈“板状腹”, 反跳痛明显。肠鸣音减弱或消失。叩诊肝浊音界缩小或消失, 可闻移动性浊音。

143. 答案:B

解析:机体免疫调节功能异常时, 脾内淋巴细胞、巨噬细胞增生引起脾大, 可见于类风湿关节炎、系统性红斑狼

疮、风湿热等。类风湿关节炎合并白细胞减少及脾大的特殊类型 (RA、脾大、粒缺三联征) 称为 Felty 综合征。(B 对)。

144. 答案:A

解析:血管中的中性粒细胞约一半随血液循环, 称为循环池, 通常白细胞计数反映这部分中性粒细胞的数量; 另一半则滚动在小血管的内皮细胞上, 称为边缘池。假性粒细胞减少, 主要表现为边缘池分布增多, 但血液检测时外周血代表的循环池粒细胞数量减少, 但实际总量是正常的, 可随着炎症、肾上腺素等刺激因素, 重新调用边缘池粒细胞进入血液循环, 故属于分布异常。(A 对)。

145. 答案:E

解析:细菌性痢疾的肠溃疡特征为溃疡表浅, 呈地图状。(E 对)。溃疡呈环形, 其长轴与肠的长轴垂直是肠结核的病变特征。溃疡呈长圆形, 其长轴与肠的长轴平行是肠伤寒的病变特征。溃疡呈烧瓶状口小底大是肠阿米巴病的病变特征。溃疡边缘呈堤状隆起是癌性溃疡的病变特征。

146. 答案:B

解析:肠伤寒溃疡期:坏死肠黏膜脱落后形成溃疡。溃疡边缘隆起, 底部不平。在集合淋巴小结发生的溃疡, 其长轴与肠的长轴平行孤立淋巴小结处的溃疡小而圆。

147. 答案:B

解析:门脉高压导致肠黏膜屏障功能减弱, 通透性增加, 肠腔内细菌经过淋巴或门静脉进入血液循环, 可引起自发性腹膜炎。

148. 答案:D

解析:消化道溃疡穿透于周围实质性脏器, 如肝、脾、胰等称为穿透性溃疡。故题干描述的是穿透性溃疡的定义。穿透性溃疡表现为慢性病史, 腹痛规

律改变，变为顽固或持续。

149. 答案:D

解析:McVay 法，是在精索后方把腹内斜肌下缘和联合腱缝至耻骨梳韧带上。适用于后壁薄弱严重病例，还可用于股疝修补。

150. 答案:C

解析:常用的无张力疝修补术有三种①平片无张力疝修补术(Lichtenstein 手术)②疝环充填式无张力疝修补术(Rutkow 手术)。③巨大补片加强内脏囊手术(GPRVS)，又称 Stoppa 手术，是在腹股沟处置人一块较大的补片以加强腹横筋膜，多于复杂症和复发症。Hastled 法用于腹股沟疝加强或修补腹股沟管后壁。Bassini 法是临床应用最广泛的加强或修补腹股沟管后壁的方法。Ferguson 法用于腹股沟疝加强或修补腹股沟管前壁。

第四单元

1. 答案:B

解析:拥抱反射、吸吮反射出生后三个月消失。颈强直、克氏征出生后 6 个月内阳性。巴宾斯基征 1 岁半内阳性。(B 对)。

2. 答案:答案 A

解析:颅底骨折主要表现为耳、鼻出血或脑脊液漏，脑神经损伤及皮下或黏膜下瘀血斑，因此诊断颅底骨折最重要的依据是脑脊液漏，而明确诊断需头颅 CT。

3. 答案:B

解析:糖原在乳杆菌的作用下转化为乳酸，维持阴道正常的酸性环境($\text{PH} \leq 4.5$ ，多在 $3.8 \sim 4.4$)。

4. 答案:E

解析:经眉弓上方、枕后结节绕头一周的长度为头围，反映脑和颅骨发育情况。(E 对)。

5. 答案:B

解析:尿蝶呤分析可以鉴别非典型 PKU。(选 B)。

6. 答案:D

解析:脊髓半切综合征见于髓外肿瘤压迫和脊髓半横贯损伤。(选 D)。

7. 答案:A

解析:麻腮风在 8 个月接种。(A 对)。

8. 答案:D

解析:略。

9. 答案:A

解析:脑栓塞是指各种栓子随血流进入脑动脉，使血管急性闭塞或严重狭窄，导致局部脑组织缺血、缺氧性坏死，而迅速出现相应神经功能缺损的一组临床综合征。脑栓塞在临床上主要指心源性脑栓塞。非瓣膜性心房颤动是心源性脑栓塞最常见的病因。

10. 答案:A

解析:子宫主要靠韧带、盆隔和尿生殖隔的托持以及周围结缔组织的牵拉等作用维持正常位置，其中子宫圆韧带主要功能是维持子宫前倾。(A 对)。子宫阔韧带可限制子宫向两侧移动。子宫主韧带是维持子宫颈正常位置，防止子宫脱垂的重要结构。子宫骶韧带向后上牵引子宫颈，协同子宫圆韧带维持子宫的前倾前屈位。卵巢固有韧带:固定卵巢。

11. 答案:A

解析:生后 1 周内新生儿的发病率和死亡率极高，婴儿死亡中约 2/3 是新生儿。(A 对)。婴儿期体格生长迅速，但消化功能尚未成熟，易发生消化紊乱和营养缺乏性疾病。幼儿期是社会心理发育最为迅速的时期。学龄前期是性格形成的关键时期。学龄期儿童求知欲强，是获取知识的最重要时期。

12. 答案:A

解析:动脉导管未闭:当肺动脉压超过主动脉压时，左向右分流明显减少或停止，产生肺动脉血流逆向分流入降

主动脉，患儿呈现差异性发绀，下半身青紫，左上肢可有轻度青紫，而右上肢正常。(A对)。房缺、室缺为左向右分流，一般不出现青紫。法洛四联症青紫为主要表现，多见于毛细血管丰富的浅表部位，可表现为持续性青紫。完全性大动脉换位青紫为全身性。

13. 答案:B

解析:抑郁症临床表现为抑郁发作，抑郁症的核心症状包括情绪低落、兴趣缺乏、快感缺失和易疲乏，可伴有多种躯体不适症状，食欲减退，睡眠障碍，自杀观念和行為等。(B对)。情绪低落是抑郁症的核心症状。思维迟缓、动作缓慢、自责自罪是抑郁症的心理症候。

14. 答案:A

解析:有性生活史的生育期妇女出现停经或月经异常，均应考虑妊娠的可能；血或尿 hCG 阳性提示妊娠，超声发现宫内孕囊或胚芽可以确诊为宫内妊娠，见原始心管搏动提示胚胎存活。(A对，不选 CD)。若将黏液作涂片检查，干燥后可见羊齿植物叶状结晶，这种结晶在月经周期第 6~7 日开始出现，到排卵期最为清晰而典型。妇科检查阴道黏膜和宫颈阴道部充血呈紫蓝色。妊娠 6-8 周时，双合诊检查子宫峡部极软，感觉宫颈与宫体之间似不相连，称为黑加征。

15. 答案:B

解析:玻璃样变又称透明变性，最常见。

16. 答案:E

解析:新生儿红臀即尿布疹，是由于长期包裹尿布导致的皮炎或皮疹，不属于新生儿的特殊生理状态，新生儿红斑则为新生儿的特殊生理状态。(E对)。新生儿常见的几种特殊生理状态:生理性体重下降;生理性黄疸;乳腺肿大;假月经;月牙。

17. 答案:C

解析:咳嗽变异型哮喘以咳嗽为唯一或主要症状。(C对)。咳嗽变异型哮喘常于夜间及凌晨发作，运动、冷空气等诱发加重。咳嗽变异型哮喘使用支气管解痉剂或吸入皮质激素治疗有效。咳嗽变异型哮喘支气管激发实验阳性。咳嗽变异型哮喘抗生素或镇咳祛痰药治疗无效。

18. 答案:E

解析:以病史为指征的宫颈环扎术，又称预防性宫颈环扎术。典型的病史为有 3 次及以上的妊娠中期自然流产史或早产史，一般建议于妊娠 12~14 周手术。

19. 答案:A

解析:婴儿，母乳喂养未添加辅食。最易导致缺铁性贫血。

20. 答案:D

解析:颅盖骨折按形态可分为线形骨折和凹陷骨折两种。线形骨折除可能伴有的头皮损伤，骨折本身仅靠触诊很难发现，常需依赖 X 线片或 CT 骨窗相。小的凹陷骨折易与边缘较硬的头皮下血肿混淆，需经 X 线平片或 CT 骨窗相方能鉴别。

21. 答案:E

解析:深感觉障碍时，患者靠视觉来以视觉代偿来调整平衡和姿势，如果闭目就会出现感觉性共济失调而跌倒。(E对)。

22. 答案:D

解析:苯海索是 M 受体阻断药，对帕金森患者抗震颤治疗效果好，但阻断了外周 M 胆碱受体，禁用于前列腺肥大患者。(D对)。

23. 答案:E

解析:紫杉醇+卡铂仍是上皮性卵巢癌一线化疗的标准方案和首选方案。在此方案中，加入第 3 种化疗药或其他三药联合的化疗方案，不仅不能提高

2023 年临床执业历年真题

疗效，还会增加毒性。

24. 答案:A

解析:自知力又称领悟力或内省力,是指患者对自己精神状态的认识和判断能力。

25. 答案:D

解析:幻听可见于多种精神障碍,其中评论性幻听、议论性幻听和命令性幻听是精神分裂症的典型症状。

26. 答案:B

解析:停酒后 48-96 小时。

27. 答案:A

解析:不全流产:难免流产继续发展部分妊娠物排出宫腔,还有部分残留于宫腔内或嵌顿于宫颈口处,或胎儿排出后胎盘滞留宫腔或嵌顿于宫颈口,影响子宫收缩,导致出血,甚至发生休克。(A 对,DE 错误)。流产的主要表现为停经后阴道流血和腹痛,无特征性。(BC 错误)。

28. 答案:C

解析:妊娠 42 周后羊水迅速减少,约 30%减少至 300ml;以下故与羊水过多无关。

29. 答案:A

解析:法洛四联症并无贫血,不会出现苍白。因其左向右分流的血流动力学特点,因血液中缺氧而产生青紫。(A 对)。蹲踞时下肢屈曲,使静脉回心血量减少,减轻了心脏负荷,同时下肢动脉受压,体循环阻力增加,使右向左分流减少,缺氧症状得以暂时缓解,故法洛四联症会有蹲踞症状。法洛四联症由于有阵发性缺氧严重时可突然昏厥甚至死亡。法洛四联症由于缺氧,长期发绀(超过 6 个月),指(趾)端毛细血管扩张增生,局部软组织及骨组织肥大,表现为杵状指(趾)。法洛四联症由于其严重缺氧,活动耐力下降。

30. 答案:D

解析:早产时肠道屏障功能不成熟,胃

酸分泌少,胃肠道动力差,消化酶活力低,容易导致黏膜损伤从而导致新生儿坏死性小肠结肠炎。(D 对)。

31. 答案:A

解析:新生儿败血症发生时,红细胞破坏增加从而导致胆红素生成过多出现黄疸。(A 对)。

32. 答案:C

解析:学龄前期儿童的智能发展快、独立活动范围大,是性格形成的关键时期。(C 对)。

33. 答案:E

解析:略。

34. 答案:E

解析:偏瘫是指由各种原因引起的中枢神经性损伤,导致一侧肢体(上、下肢)瘫痪,常伴有同侧脑神经损伤,多见于颅内病变或脑卒中。面神经炎不会引起偏瘫。

35. 答案:C

解析:先兆流产指妊娠 28 周前先出现少量阴道流血,常为暗红色或血性白带,无妊娠物排出,随后出现阵发性下腹痛或腰背痛。符合该孕妇表现。

36. 答案:D

解析:分泌晚期:该期子宫内膜呈海绵状厚达 10mm 内膜腺体开口面向宫腔,有糖原等分泌物溢出,间质更疏松、水肿。表面上皮细胞下的间质分化为肥大的蜕膜样细胞和小圆形的有分叶核及玫瑰红颗粒的内膜颗粒细胞。该患者子宫内膜符合分泌晚期表现。

37. 答案:C

解析:根据儿童体重、身高估算公式 2 岁儿童身高(cm),估算为年龄(岁)*7+75=89cm,体重(kg)估算为年龄(岁)*2+8=12kg。该儿童身高 87cm,体重 12.5kg,为正常 2 岁儿童的身高及体重;该儿童能双脚跳,会说 2~3 个字构成的句子,符合 2 岁儿童的神经精神发育进程。综上所述,该儿童

体格发育及神经精神发育均正常，故判断为发育正常，随访。(C 对)。

38. 答案:D

解析:患者序贯使用雌激素和孕激素未发生撤退性出血，提示为子宫性闭经，结合患者为人工流产后出现症状，提示患者可能因人工流产损伤子宫内膜，导致宫腔粘连而闭经。Asherman 综合征为子宫性闭经最常见原因，指因各种原因导致宫腔粘连或宫颈管粘连、狭窄所致的闭经。故考虑 Asherman 综合征。(D 对)。

39. 答案:B

解析:患者产褥期，担心自己养不活紧张，早醒，哭泣(心境低落)，体重下降，考虑为产后抑郁。早醒是抑郁障碍的特征性表现抑郁障碍患者也会出现体重下降。(B 对)。

40. 答案:C

解析:6 岁女性，高热伴恶心呕吐，入院后嗜睡，昏迷，最终死亡。尸检发现脑白质和灰白质交界处多发呈白色半透明针尖大小空泡状液化性坏死，脑脊膜血管充血、水肿，考虑流行性乙型脑炎可能性大。乙脑病理检查肉眼可见软脑膜充血、水肿、出血，镜检可出现神经细胞变性、坏死，软化灶形成，血管变化和炎症反应，胶质细胞增生，其中，灶性神经细胞的坏死、液化形成镂空筛网状软化灶，对本病的诊断具有一定的特征性，与本例尸检结果相符。(C 对)。

41. 答案:B

解析:患者既往高血压、糖尿病，突发运动及语言障碍，查体可见右侧肌力下降、病理征阳性，偏身针刺下降、鼻唇沟浅、舌头右偏，考虑为脑血栓形成。(B 对)。TIA 患者神经系统检查无异常不会出现肌力下降。脑栓塞通常由房颤引起，患者无房颤病史。急性脊髓炎以病损平面以下肢体瘫痪、

传导束性感觉障碍和尿便障碍为特征。脑出血患者头 CT 提示脑实质高密度，患者头颅 CT 未见异常。

42. 答案:A

解析:热退疹出为幼儿急疹。(A 对)。

43. 答案:A

解析:患者患重症再生障碍性贫血，等待造血干细胞移植，预期需要长期或者反复输血，在等待造血干细胞移植过程中机体处于免疫缺陷状态，外源淋巴细胞容易攻击相关组织器官导致免疫反应，辐照的去白红细胞使血液淋巴细胞灭活，可减轻移植物抗宿主反应，故应使用辐照的去白红细胞。(A 对)。去白红细胞可以减少过敏反应可用于纠正各种贫血。但辐照的去白红细胞更适合移植前的红细胞补充。浓缩红细胞主要用于增加红细胞，尤其适用于血容量正常但红细胞少的患者。输血一般不使用全血制品，首先考虑成分输血。

44. 答案:E

解析:胎盘胎膜残留，首选抗感染和夹除堵塞的组织。充分补液、备血、和准备手术的条件下刮宫。负压吸宫用于 10 周内的人工流产术。(E 对)。疑有胎盘、胎膜、蜕膜残留者，静脉输液、备血及准备手术的条件下清宫术，操作应轻柔，以防子宫穿孔。刮出物应送病理检查，以明确诊断。术后继续给予抗生素及子宫收缩剂。

45. 答案:B

解析:患者查体右侧附件区一肿物，有张力，无触痛，首先考虑右侧卵巢囊肿。结合下腹痛伴恶心 4 小时，无阴道流血，呕吐和发热的临床表现，及血常规结果，考虑无明显内出血及炎症反应。故首选卵巢囊肿蒂扭转。(B 对)。

46. 答案:A

解析:患者妊娠 28 周，OGTT 试验:空

腹 5.0mmol(正常低于 5.1), 餐后 1 小时 11.2mmol(正常低于 10.0), 餐后 2 小时 8.2mmol(正常低于 8.5), 患者餐后 1 小时血糖升高, 可诊断为妊娠期糖尿病。(A 对)。

47. 答案:D

解析:患儿水肿、少尿、蛋白尿, 应诊断为肾病综合征, 使用糖皮质激素治疗 3 周后蛋白尿转阴, 说明缓解, 根据糖皮质激素中、长程疗法, 若 4 周内尿蛋白转阴, 则自转阴后至少巩固 2 周方始减量, 故应继续巩固 2 周后减量。(D 对)。立即减量或停用易致复发或严重撤退反应。

48. 答案:E

解析:患者青年女性, G3P2, 为子宫 II 度脱垂。宫颈长, 且伴阴道前后壁轻度膨出, 故首选曼氏手术, 即阴道前后壁修补、主韧带缩短及宫颈部分切除术。(E 对)。阴道纵隔形成术:又称 LeFort 手术或阴道封闭术, 适用于年老体弱不能耐受较大手术、不需保留性交功能者。

49. 答案:A

解析:患者行输卵管疏通术后, 发热宫颈举痛, 附件压痛, 白细胞升高, 可诊断为急性盆腔炎。由于手术所致生殖道黏膜损伤、出血、坏死, 导致下生殖道内源性病原体上行感染。(A 对)。

50. 答案:A

解析:外阴阴道假丝酵母菌病主要表现为外阴阴道瘙痒、阴道分泌物增多, 阴道分泌物的特征为白色稠厚, 呈凝乳状或豆腐渣样。患者有典型反复外阴阴道瘙痒, 白色豆腐渣样分泌物, 故诊断为外阴阴道假丝酵母菌病。(A 对)。

51. 答案:A

解析:患儿重度营养不良, 提示可能存在免疫力低下, 有真菌感染可能, 近

1 周出现腹泻, 泡沫较多, 见豆腐渣样细块, 考虑为排出的白念珠菌菌落, 故最可能的致病菌为白色念珠菌。

52. 答案:B

解析:黄体功能不全常表现为月经周期缩短。有时月经周期虽在正常范围内, 但卵泡期延长、黄体期缩短, 以致患者不易受孕或在妊娠早期流产。该患者月经周期缩短(正常 28+7 日), 自然流产, 考虑黄体功能不全。(B 对)。

53. 答案:A

解析:患者夜间行为紊乱, 表情恐怖紧张, 白天较安静, 不能回忆夜间行为, 能认识家人, 为谵妄状态。谵妄状态指患者在意识清晰度降低的同时出现大量的幻觉、错觉, 这些幻觉和错觉以形象鲜明的恐怖性幻视和错视为主, 如猛兽、毒蛇等。在恐怖性幻视及错视的影响下患者往往产生紧张和恐惧的情绪反应, 出现喊叫、逃跑、双手在空间不停抓摸等不协调性精神运动性兴奋。谵妄状态往往夜间加重, 具有昼轻夜重的规律。

54. 答案:B

解析:略。

55. 答案:D

解析:患者头痛 4 个月。加重 3 周, 喷射状呕吐, 为颅内压升高表现, 应行颅脑 CT/MRI 排查颅内病变, 甘露醇降颅压治疗。

56. 答案:A

解析:略。

57. 答案:B

解析:革兰氏阴性菌的致病原常常为内毒素(除了霍乱弧菌的肠毒素)。

58. 答案:A

解析:估计胎儿 3000g, 骨盆测量正常无产道异常指征; 第一产顺利, 宫口开 1 小时, S+2, 宫缩 4 次/10 分, 无产力异常指征; 羊水清胎心变异好, 偶有早期减速, 无明显胎儿窘迫指征。

目前患者产程进展顺利，可密切观察胎头下降情况，若后续有产程异常指征，行助产术。(A 对，B 错)。第二产程异常时，若胎头下降至 $\geq+3$ 水平，可行产钳或胎头吸引器助产术；处理后胎头下降无进展，胎头位置在 $<+2$ 水平以上，应及时行剖宫产术。

59. 答案:C

解析:患者感冒后出现讲话少、答少问少及行为异常，考虑为躯体感染所致神经认知障碍。躯体感染所致神经认知障碍是指由病毒、细菌、螺旋体、真菌、原虫及其他感染病原体引起的躯体感染所致的认知功能障碍。感染的急性期患者还可以出现行为紊乱、情绪高涨、情绪低落等。

60. 答案:D

解析:智力低下+先心病，考虑为 21-三体综合征。因此下一胎重点检查染色体。(D 对)。

61. 答案:C

解析:句与句不相连为思维破裂。思维散漫为句与句相连而主题不明确。

62. 答案:B

解析:患儿有低热，皮肤癌痒表现，查体:胸腹部见红色斑丘疹及水疱，部分结痂，为水痘的典型表现。(B 对)。猩红热表现为发热、咽峡炎、全身弥漫性红色针尖样皮疹、皮疹退后皮肤脱屑.与题意不符。幼儿急疹主要表现为热退疹出皮疹表现为红色细小密集斑丘疹，头面部及躯干部多见，与题意不符。手足口病表现为发热，手、足口、臀等部位出现散在的皮疹或疱疹，与题干不符。麻疹表现为发热，发热 3-4 天后出疹，出疹期为发热的高峰期，皮疹为红色斑丘疹，自头面部开始，逐渐蔓延至颈部、躯干、四肢，退疹后有色素沉着及细小脱屑。

63. 答案:D

解析:宫颈功能不全导致习惯性流产，

在孕 12-14 周行预防性宫颈环扎术，37 周或有宫缩时拆除缝线。

64. 答案:B

解析:略。

65. 答案:D

解析:新生儿窒息首要措施是保持呼吸道通畅和建立呼吸。

66. 答案:A。

解析:中性粒细胞比例下降，淋巴细胞比例升高提示病毒感染。三凹征、哮鸣音为呼吸道合胞病毒肺炎。

67. 答案:E

解析:烟雾病是一种病因不明的、以双侧颈内动脉末端及大脑前动脉、大脑中动脉起始部慢性进行性狭窄或闭塞为特征，并继发颅底异常血管网形成的一种脑血管疾病。由于这种颅底异常血管网在脑血管造影图像上形似“烟雾”，故称为“烟雾病”。(E 对)。

脑动脉瘤 CT 平扫呈类圆形高密度灶，与患者临床表现不符。CT 增强扫描动静脉畸形表现为混杂密度区，大脑半球中线结构无移位。脑血管病 CT 表现为脑实质的低密度或高密度。脑静脉瘤 CT 平扫一般无明显异常，与患者临床表现不符。

68. 答案:B

解析:患儿 2 岁，为热性惊厥高发年龄，高热后突发惊厥，意识丧失，但 1 分钟即自行恢复(很快自行停止)，完全清醒，且精神状态好，应考虑为热性惊厥。(B 对)。病毒性脑炎所致惊厥常呈全身性，可为惊厥持续状态，常惊厥反复发作，伴有不同程度的意识改变，该患儿惊厥后完全清醒不符合病毒性脑炎临床表现。化脓性脑炎可致反复惊厥发作除此之外，还会伴有感染中毒及急性脑功能障碍症状与脑膜刺激征。癫痫为无热惊厥。结核性脑膜炎会伴有结核菌感染相关症状，如全身结核中毒表现。

69. 答案:C

解析:结合患者妊娠晚期多次无痛性反复阴道流血病史,初步判断为前置胎盘。现再次阴道多量流血, P105 次/分, BP85/50mmHg, 目前已有休克体征, 为挽救孕妇生命, 故应立即剖宫产终止妊娠。

70. 答案:E

解析:患者多年饮酒史, 最近记忆力渐差(近事记忆障碍), 把虚构的事件填补记忆(虚构), 不认识家人, 不辨方向(定向障碍)深夜看到屋里有人影晃动(幻觉), 为科萨科夫综合征。酒精依赖者神经系统的特有症状之一是记忆障碍, 称之为科萨科夫综合征, 主要表现为近事记忆障碍、虚构、定向障碍三大特征, 患者还可能有幻觉、夜间谵妄等表现。(E 对)。

71. 答案:B

解析:患儿纳差, 消瘦, 伴发育倒退, 表情呆滞, 皮肤黏膜苍白, 血红蛋白降低, 血涂片以大细胞为多, 提示大细胞性贫血, 符合巨幼贫的临床表现及血象。患儿有发育倒退, 表情呆滞神经系统表现, 考虑为维生素 B12 缺乏所致营养性巨幼细胞性贫血。(B 对)。

72. 答案:D

解析:胎盘早剥典型临床表现是阴道流血、腹痛, 早期表现通常以胎心率异常为首发变化, 宫缩间歇期子宫呈高张状态, 胎位触诊不清。该孕妇妊娠 32 周突发腹痛、阴道少量流血子宫硬如板状, 胎心不清, 符合胎盘早剥表现。(D 对)。先兆早产指有规则或不规则宫缩, 伴有宫颈管进行性缩短。先兆子宫破裂:常见于产程长有梗阻性难产因素的产妇。典型羊水栓塞:以骤然出现的低氧血症、低血压(血压与失血量不符合)和凝血功能障碍为特征, 也称羊水栓塞三联征。前置胎盘典型

症状为妊娠晚期或临产后发生无诱因、无痛性反复阴道流血。

73. 答案:E

解析:患者反复左侧肢体抽搐, 由左手, 逐渐波及左上肢, 向左肩扩展, 最后发展至左面部, 每次发作持续 30 秒即可自行缓解, 考虑为 Jackson 发作。

74. 答案:A

解析:患儿胎龄 42 周, 出生体重 4300g, 提示过期产, 超重儿。出生后背腹胀, 便秘, 喂养困难, 提示吮吸反应差, 查体刺激后反应差(对外界反应差), 脐疝, 四肢肌张力低下, 四肢未稍稍凉, 实验室检查 TSH50mU/L(>20mU/L), 白细胞及白细胞分类正常, 血培养阴性, 可排除感染性疾病所致的临床表现, 符合先天性甲状腺功能减退症的临床表现及实验室检查。

75. 答案:C

解析:不宜妊娠的心脏病孕妇, 应在妊娠 12 周前行人工流产。妊娠超过 12 周时, 应密切监护, 积极防治心力衰竭, 度过妊娠与分娩。在妊娠 20 周前, 应每 2 周行产前检查 1 次。在妊娠 20 周后产前检查应每周 1 次, 尤其是妊娠 32 周以后, 发生心力衰竭的几率增加, 应住院防治。(C 对)。

76. 答案:B

解析:孕期女性, 外阴可见对称性密集分布呈鱼卵样小丘疹, 表面光滑, 触摸有颗粒感, 醋酸白试验阴性(排除尖锐湿疣), 符合假性湿疣诊断。(B 对)。

77. 答案:C

解析:患者认为自己过胖, 每日专注于自己的体重、体型, 严格限制每日饮食, 过去的年体重下降 20Kg, 为神经性厌食。神经性厌食是指有意节制饮食, 导致体重明显低于正常标准的一种进食障碍。其核心的心理特征是特有的关于体型和体重的超价观念。患

者对自己的体像有歪曲的认识，即使体重过低，仍认为自己过胖并常采取过度运动、引吐导泻等方法来减轻体重。(C对)。

78. 答案:C

解析:喜蹲踞、自幼青紫为法洛三联症的特点。无左室增大。(C对)。

79. 答案:C

解析:患儿房间隔缺损，右心血液增多，肺动脉扩张，心腰膨出呈梨形。(C对)。

80. 答案:B

解析:患儿男性，4个月，冬季出生提示可能因缺乏紫外线照射而致维生素D缺乏，近1月出现夜惊、烦躁、易激惹，应考虑诊断为营养性维生素D缺乏性佝偻病，根据该病的骨骼畸形与好发年龄特点，颅骨软化好发年龄为3~6个月，故4个月大患儿最可能出现的是颅骨软化。(B对)。

81. 答案:C

解析:一侧周围型面瘫为面神经炎。吉兰-巴雷为双侧对称性周围性面瘫。

82. 答案:A

解析:出生时烦躁、肌张力弱为神经系统症状。

83. 答案:E

解析:患儿新生儿，出生5天未排胎便，伴有腹胀、呕吐等症状，应考虑先天性巨结肠。首选X线检查:可见在病变肠段以上肠管扩张，内含有气体和液性粪便—气液平面，而在病变肠段中不含气体，呈现一个典型的低位肠梗阻征象。

84. 答案:B

解析:大脑脚综合征表现为患侧除外直肌和上斜肌外的所有眼肌麻痹，瞳孔散大，对侧中枢性面舌瘫和上下肢瘫痪。患者老年男性，查体提示右侧眼球外斜外展，右侧瞳孔散大，左侧鼻唇沟浅，左侧肢体肌力下降，左侧巴

彬斯基征阳性，考虑为大脑脚综合征。

85. 答案:C

解析:患者近1个月阴道分泌物增多，接触性出血，首先考虑子宫颈炎。(C对)。子宫内膜癌:约90%患者出现阴道流血或阴道排液症状。阴道流血，尚未绝经者可表现为经量增多、经期延长或月经紊乱。经量增多及经期延长是子宫肌瘤最常见的症状。有性生活史的生育期妇女出现停经或月经异常，均应考虑妊娠的可能。凡有停经后不规则阴道流血要考虑葡萄胎可能。

86. 答案:B

解析:患者现为产褥早期，下腹部阵发性疼痛为产后宫缩痛，体温略升高可能与产程延长致过度疲劳有关，子宫复旧及阴道血性恶露正常，阴道流血少于月经量，故属于正常产褥。(B对)。产后出血指胎儿娩出后24小时内，阴道分娩者出血量500ml剖宫产者1000ml。软产道裂伤为产后出血常见原因，胎儿娩出后立即发生阴道流血，色鲜红，应考虑软产道裂伤(不选AE)。发热、疼痛、异常恶露，为产褥感染三大主要症状。子宫复旧不全或宫腔内残留部分胎盘、胎膜或合并感染时，恶露增多，血性恶露持续时间延长并有臭味。

87. 答案:D

解析:患者结婚3年未避孕未孕，可诊断不孕。月经8-9天/26-28天，妇科检查:子宫后位，活动度较差，形状不规则，考虑主要可能为盆腔因素。腹部立位平片是是对消化系统检查的常用手段，对于盆腔检查价值较小。(D对)。

88. 答案:A

解析:患者出口后矢状径+坐骨结节间径13cm，属于骨盆出口平面II级狭窄，考虑患者初产妇，足月胎儿不易

经阴道分娩，应行剖宫产术结束分娩。(A 对)。若两者之和 $>15\text{cm}$ ，多数可经阴道分娩，有时需行产钳助产或胎头吸引术助产。

89. 答案:C

解析:治疗 ≤ 8 周尿蛋白转阴为激素敏感。连续两次减量或停药 2 周内复发为激素依赖。以泼尼松治疗满 8 周，尿蛋白仍是 $\geq (+++)$ 者为激素耐药型。经糖皮质激素正规治疗后，尿蛋白由阴转为阳性，且持续 3 日以上为复发。半年内复发 ≥ 2 次，或 1 年内复发 ≥ 3 次为频发。

90. 答案:E

解析:该产妇现胎膜已破，双足先露可诊断臀先露。考虑患者下腹不规律疼痛 1 天，尚无规律宫缩，且现宫口开 1 指，处于潜伏期，考虑臀先露分娩过程风险较大，且短时间内无法完成经阴道分娩，建议行剖宫产手术。(E 对)。

91. 答案:E

解析:患儿急起高热、流涎、厌食，咽部充血，咽腭弓、悬雍垂、软腭等处可见疱疹，应考虑为疱疹性咽峡炎，病原体为柯萨奇病毒 A 组。(E 对)。

92. 答案:D

解析:患者 16 岁为青春期(无排卵性子宫异常出血好发人群)，月经不规律，月经量增多(多数不排卵性子宫异常出血表现为月经紊乱)，基础体温单相型(基础体温测定是诊断无排卵性子宫异常出血最常用的手段，且呈单相型)，因此考虑为无排卵性子宫异常出血可能性大。(D 对)。子宫内膜炎表现为下腹痛、发热、异常阴道分泌物或月经异常。黄体功能不良见于排卵性异常子宫出血，多发生于生育期女性。黄体萎缩不全主要临床表现为月经周期正常，但经期延长。子宫腺肌病常表现为痛经。

93. 答案:E

解析:特发性震颤发病年龄轻，家族史阳性，为动作性、位置性震颤，无明显动作迟缓，肌张力不增高(A 错误)。帕金森叠加综合征为多系统萎缩，除帕金森症状外伴自主神经症状如尿频尿急尿失禁排尿困难，长时间站立头晕(B 和 D 错误)。血管性帕金森综合征多由脑卒中病史，症状阶梯状加重，病理征阳性(C 错误)。

94. 答案:A

解析:妊娠滋养细胞肿瘤包括侵袭性葡萄胎和绒癌。无转移性以侵袭性葡萄胎多见，常继发于葡萄胎后。转移性以绒癌多见。题中未有葡萄胎病史，且转移到肺，首选考虑绒癌。(A 对)。

95. 答案:A

解析:宫口 4cm，进入第一产程活跃期，正常宫缩应为间歇 2-3 分钟，持续 50-60 秒。该孕妇协调性宫缩乏力。(A 对)。

96. 答案:B

解析:宫口 4cm，进入第一产程活跃期，正常宫缩应为间歇 2-3 分钟，持续 50-60 秒。该孕妇协调性宫缩乏力，胎膜已破，骨盆外测量正常，胎心正常，适合缩宫素加强宫缩。(B 对)。

97. 答案:A

解析:患儿 18 个月，逗之不笑，面色蜡黄，有阵发性肢体不规则颤动，符合巨幼贫的临床表现，血象显示 Hb61g/L，提示中度贫血，MCV102fl，提示为大细胞性贫血，符合巨幼贫血象表现，应考虑诊断为巨幼贫。巨幼贫伴有神经精神症状者提示维生素 B12 缺乏，应使用维生素 B12 治疗。(A 对)。缺乏维生素 A 可导致干眼症，不会导致贫血。缺乏铁可导致缺铁性贫血，缺铁贫表现为小细胞性贫血，与该患儿血象结果不符。维生素 C 缺乏导致骨质疏松或坏血症。维生素 B6

缺乏导致皮炎、口腔炎、舌炎等。

98. 答案:C

解析:患儿自幼发现心脏杂音,考虑先天性心脏病,查体胸骨左缘第2肋间连续机器响杂音应诊断为动脉导管未闭。因主动脉在收缩期和舒张期的压力均超过肺动脉,故动脉导管未闭血流动力学特点为主动脉血全心周期流向肺动脉,左向右分流。(C对)。

99. 答案:A

解析:本题患者因卵巢肿瘤行手术治疗,卵巢癌80%的患者血清CA125水平升高,但近半数的早期病例并不升高,不单独用于早期诊断,更多用于病情监测和疗效评估。(A对)。CA199可作为胰腺癌、结直肠癌等疾病的肿瘤标志物。血清AFP对卵巢卵黄囊瘤有特异性诊断价值。卵巢未成熟畸胎瘤、混合性无性细胞瘤中含卵黄囊成分者,AFP也可升高,但不用于病情监测和疗效评估。HCG对妊娠性绒癌有特异性可排除。ER2主要用于乳腺癌的诊断有特异性,可排除。

100. 答案:C

解析:患儿出生始即腹泻,除腹泻外无不适,体重7.1kg,身高63cm,符合6个月婴儿的生长规律,营养发育正常,考虑为生理性腹泻。(C对)。

101. 答案:B

解析:6个月患儿,考虑生理性腹泻是由于母乳里的抑制乳糖酶活性的物质造成乳糖不耐受,从而引起腹泻。患儿除大便次数增加外,无其他症状,生长发育不受影响,一般添加辅食后,大便可逐渐转为正常。故应继续母乳喂养逐步由少到多添加米糊等辅食。(B对)。

102. 答案:C

解析:患者接触性阴道流血,宫颈质脆、触之出血,最可能为宫颈癌。早期病例的诊断应采用子宫颈细胞学检查和

(或)HPV检测阴道镜检查、子宫颈活组织检查的“三阶梯”程序,确诊依据为组织学诊断。(C对)。

103. 答案:A

解析:IA1的浸润深度为 $<3\text{mm}$ 。(A对)。IA2浸润深度 $>3\text{mm}$ 且 $<5\text{mm}$ 。(不选B)。II期癌灶超越子宫,但未达阴道下1/3或未达骨盆壁IIB有宫旁浸润,未达盆壁。III期癌灶累及阴道下1/3和(或)扩展到骨盆壁和(或)引起肾盂积水或肾无功能和(或)累及盆腔和(或)主动脉旁淋巴结。IIIB癌灶扩展到骨盆壁和(或)引起肾盂积水或肾无功能。

104. 答案:A

解析:患者糖尿病病史,绝经后阴道反复少量流血,经阴道超声检查提示子宫内膜不规则增厚,其内与相邻肌层内血流丰富,首先考虑子宫内膜癌,且为I型子宫内膜癌。I型子宫内膜癌均为子宫内膜样癌,患者较年轻,常伴有肥胖、高血压、糖尿病、不孕或不育及绝经延迟,或伴有无排卵性疾病、功能性卵巢肿瘤、长期服用单雌激素或他莫昔芬等病史。

105. 答案:D

解析:患者目前诊断为子宫内膜癌,本术式是筋膜外全子宫切除及双侧附件切除术。结合经阴道超声检查:子宫内膜不规则增厚,其内与相邻肌层内血流丰富,考虑可能具有高危因素,故同时行盆腔和腹主动脉旁淋巴结切除。(D对)。

106. 答案:C

解析:患者肢体抽搐2年,发作时四肢抽搐,意识丧失,数分钟后缓解,查体未见明显异常,MRI提示顶叶巨大占位,考虑为颅内肿瘤脑肿瘤病人的癫痫(瘤性癫痫)发病率高达30%。(C对)。

107. 答案:A

解析:患者颅内肿瘤导致癫痫反复发作首

2023 年临床执业历年真题

选手术治疗切除肿瘤。(A 对)。

108. 答案:A

解析:患者既往体健,现妊娠 33 周血压 160/110mmHg, (收缩压 \geq 160mmHg, 或舒张压 \geq 110mmHg), 尿蛋白+++ , 且出现头晕头痛, 视物模糊, 可诊断重度子痫前期。

109. 答案:E

解析:硝普钠是强效血管扩张剂, 扩张周围血管使血压下降。由于药物能迅速通过胎盘进入胎儿体内, 并保持较高浓度, 其代谢产物(氰化物)对胎儿有毒性作用, 不宜在妊娠期使用。分娩期或产后血压过高, 应用其他降压药效果不佳时, 考虑使用。

110. 答案:E

解析:下腹压痛、病理性缩复环为先兆子宫破裂的主要表现。

111. 答案:A

解析:先兆子宫破裂:抑制宫缩+立即剖宫产。

112. 答案:E

解析:葡萄胎诊断一经成立, 应及时清宫。停经大于 16 周的葡萄胎清宫术应在超声引导下进行。一般选用吸刮术, 其具有手术时间短、出血少、不易发生子宫穿孔等优点。(E 对)。

113. 答案:A

解析:葡萄胎清宫术后每周 1 次 hCG 定量测定, 直至连续 3 次阴性。以后每月 1 次共 6 个月, 然后再每 2 个月 1 次共 6 个月, 自第一次阴性后共计 1 年。(A 对)。

114. 答案:E

解析:依据典型的进行性痛经史、妇科检查子宫均匀增大、质硬且有压痛, 可作出初步诊断为子宫腺肌病。子宫腺肌病患者部分子宫肌层中的内膜病灶与宫腔内膜直接相连, 故认为是由基底层子宫内膜侵入肌层生长所致, 多次妊娠及分娩、人工流产、慢性子

宫内膜炎等造成子宫内膜基底层损伤, 与腺肌病发病密切相关。

115. 答案:C

解析:子宫腺肌病主要症状是经量过多、经期延长和逐渐加重的进行性痛经, 疼痛位于下腹正中, 常于经前 1 周开始, 直至月经结束。

116. 答案:D

解析:患者诊断为子宫腺肌病, 考虑年龄大无生育要求(48 岁, G2P1), 症状严重(严重痛经, 止痛效果差, 中度贫血), 应行全子宫切除术。

117. 答案:A

解析:患者 3 年来无明显诱因出现孤僻, 不喜与他人交流, 话少, 思维贫乏, 无自知力, 考虑为精神分裂症。

118. 答案:D

解析:患者考虑精神分裂症, 不论是首次发作还是复发的精神分裂症患者, 抗精神病药物治疗应作为首选的治疗措施。

119. 答案:E

解析:抗精神病药物出现椎体外系副作用如类帕金森症、静坐不能、急性肌张力障碍可用苯海索、地西泮、普萘洛尔对症治疗。如出现恶性综合征需立即停药。

120. 答案:C

解析:患儿发热 4 天, 发疹 1 天, 说明发热后 3 天出疹, 出疹从头颈部始, 眼结膜充血有分泌物, 口腔充血粗糙, 提示伴有结膜炎及 Koplik 斑, 符合麻疹出疹特点及临床表现。(C 对)。

121. 答案:A

解析:肺炎是麻疹最常见的并发症。(选 A)。

122. 答案:A

解析:考虑诊断为麻疹。患儿退热后, 双肺呼吸音细湿罗音考虑并发肺炎, 麻疹出疹后 5 天均有传染性, 故患儿需隔离治疗。(A 对)。患儿无过敏反

应表现，无需抗过敏治疗。麻疹并发肺炎主要是由于免疫抑制所致，可补充丙种球蛋白增强免疫力。但不是主要的治疗措施。如为细菌感染所致肺炎，可使用抗生素治疗，但不是最佳处理措施。患儿已退热，无需使用阿司匹林治疗。

123. 答案:A

解析:患儿高热 1 周，皮疹 2 天，眼结合膜充血，口唇干裂，草莓舌，手足硬性水肿，符合川崎病典型临床表现。(A 对)。

124. 答案:A

解析:略。

125. 答案:D

解析:患儿急性起病，左膝疼痛伴寒战高热，血白细胞和中性粒细胞升高(感染性疾病)，浮试验阴性(排除化脓性关节炎)，可能的诊断是急性血源性骨髓炎。

126. 答案:A

解析:患儿考虑急性血源性骨髓炎，局部脓肿分层穿刺抽出混浊液体或血性液体可作涂片检查与细菌培养，涂片中发现多是脓细胞或细菌即可明确诊断。(选 A)。

127. 答案:A

解析:患儿考虑急性血源性骨髓炎。由于致病菌大都为溶血性金黄色葡萄球菌，要联合应用抗生素，一种针对革兰阳性球菌，而另一种则为广谱抗生素，待检出致病菌后再予以调整针对金黄色葡萄球菌的敏感抗生素，主要为头孢类抗菌素，如果出现耐药金葡萄球菌感染就需要使用万古霉素进行抗感染治疗。故首选头孢类抗生素。

128. 答案:B

解析:根据患者经量增多 2 年病史，及妇科检查提示子宫增大，子宫前壁触及直径约 8 厘米突起，质地较硬，考虑诊断为子宫肌瘤，由于大的肌壁间

肌瘤使宫腔增大，子宫内膜面积增加并影响子宫收缩，引起经量增多。(B 对)。

129. 答案:A

解析:患者经量增多 2 年，伴头晕乏力 1 个月，考虑由于经量增多导致贫血，需进行治疗。患者 32 岁，G1P0，需要希望保留生育功能故最佳处理方法是子宫肌瘤切除术。

130. 答案:B

解析:流产过程中，若阴道流血时间长，有组织残留于宫腔内或非法堕胎，有可能引起宫腔感染。不全流产表现为部分妊娠物排出宫腔，还有部分残留于宫腔内或嵌顿于宫颈口处，或胎儿排出后胎盘滞留宫腔或嵌顿于宫颈口，影响子宫收缩，导致出血，甚至发生休克。故不全流产容易感染。(选 B)。

131. 答案:C

解析:先兆流产指妊娠 28 周前先出现少量阴道流血，常为暗红色或血性白带，无妊娠物排出，随后出现阵发性下腹痛或腰背痛。妇科检查宫颈口未开，胎膜未破，子宫大小与停经周数相符。(选 C)。

132. 答案:E

解析:3 个月~3 岁婴幼儿非传染性脑膜炎的致病菌以流感嗜血杆菌、肺炎链球菌和脑膜炎双球菌多见。(选 E)。

133. 答案:B

解析:我国 12 岁以上年长儿童引起化脓性脑膜炎的致病菌是肺炎链球菌与脑膜炎双球菌。(选 B，不选 ACDE)。

134. 答案:A

解析:新生儿溶血性黄疸以非结合胆红素升高为主，Coombs 直接实验、释放试验阳性。

135. 答案:C

解析:新生儿病理性黄疸，以结合胆红素增高为主的包括新生儿肝炎(乙肝、巨细胞病毒肝炎、弓形虫病)、胆汁淤

积综合征、胆道疾病。TORCH 指的是一组在孕期感染会导致胎儿畸形和功能障碍的病原微生物。“T”指的是弓形虫，“O”指的是其他病原微生物 (Others)，“R”指风疹病毒，“C”指的是巨细胞病毒，“H”指的是单纯疱疹病毒。因此 TORCH 感染可导致结合胆红素升高的新生儿病理性黄疸。C 正确。

136. 答案:D

解析:人工流产综合反应指手术时疼痛或局部刺激,使受术者在术中或术毕出现恶心呕吐、心动过缓、心律不齐、面色苍白,头昏、胸闷、大汗淋漓,严重者甚至出现血压下降、昏厥、抽搐等迷走神经兴奋症状。

137. 答案:E

解析:吸宫不全指人工流产后部分妊娠组织物的残留。与操作者技术不熟练或子宫位置异常有关,是人工流产术常见的并发症。手术后阴道流血时间长,血量多或流血停止后再现多量流血,应考虑为吸宫不全。

138. 答案:E

解析:孕 30 周,阴道见浆液性脓性分泌物,Glenssa 染色可见包涵体,考虑孕期生殖道衣原体感染。衣原体治疗推荐方案为阿奇霉素或多西环素,替代方案包括米诺环素、四环素、罗红霉素、克拉霉素、左氧氟沙星、司帕沙星。该孕期妊娠期仅可用阿奇霉素或红霉素治疗,不宜用四环素类药物。

139. 答案:A

解析:患者现为妊娠早期,大阴唇可见圆形小溃疡,阴道分泌物检查可见活跃的苍白球螺旋体,可诊断为一期梅毒,首选青霉素治疗。

140. 答案:E

解析:血浆氨基酸分析为苯丙酮尿症确诊实验。(E 对)。血 TSH 测定:甲状腺功能异常。染色体核型分析:染色体异

常疾病例如 21 三体综合征。尿三氯化铁实验:筛查苯丙酮尿症。尿蝶岭分析:主要用于 BH4 鉴别。

141. 答案:C

解析:尿三氯化铁实验:筛查苯丙酮尿。

142. 答案:E

解析:胎儿娩出后立即发生阴道流血色鲜红,应考虑软产道裂伤。失血导致的临床症状明显,伴阴道疼痛且阴道流血不多,应考虑隐匿性软产道损伤,本题中患者胎儿娩出后立即出现阴道出血,故应考虑软产道损伤。(E 对)。

143. 答案:A

解析:双胎妊娠时,第一胎娩出后宫腔压力骤减子宫骤然收缩,胎盘与子宫壁发生错位而剥离,导致胎盘早剥也可出现阴道流血。

144. 答案:C

解析:易激惹的定义:指情绪不稳定变化快,容易因小事产生强烈反应,若不避免激惹,患者可能会疲劳。患者因一件小事引起极大的情感波动,符合此诊断。

145. 答案:B

解析:焦虑主要临床表现:精神障碍患者常常有不明原因的提心吊胆、紧张不安,显著的自主神经功能紊乱症状、肌肉紧张及运动性不安。患者往往能够认识到这些担忧是过度和不恰当的,但不能控制,因难以忍受而感到痛苦。该患者无客观原因的出现惶恐不安,心慌,坐立不安,均是焦虑的表现。

146. 答案:D

解析:脑血栓形成是脑梗死常的类型,通常是由于脑血管自身的狭窄或闭塞,导致脑组织缺血坏死而产生肢体偏瘫、失语、感觉障碍等一系列中枢神经症状。

147. 答案:A

解析:分水岭区脑梗死或称为脑分水岭梗死,是指发生在脑的两条主要动脉

2023 年临床执业历年真题

分布区的交界处的脑梗死，多发生于脑的较大动脉供血交界区。

148. 答案:D

解析:足月儿开始添加肉末、菜末的时间是出生后 7~9 个月。

149. 答案:A

解析:足月儿开始添加粥、软饭、碎肉等时间是出生后 10~12 个月。