

第一单元

A1 型题

答题说明

以下每一道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- 阴盛格阳属于
 - 阳偏衰
 - 阴偏衰
 - 阳损及阴
 - 真热假寒
 - 真寒假热
- 心为五脏六腑之大主的理论依据是
 - 心主血脉
 - 心总统意志
 - 心总统魂魄
 - 心主情志
 - 心主神志
- 元气运行的道路是
 - 脉外
 - 部位三焦
 - 心脉
 - 胸腔
 - 全身
- “阴阳离决，精气乃绝”阐述的阴阳关系是
 - 阴阳消长
 - 阴阳交感
 - 阴阳转化
 - 阴阳对立
 - 阴阳互根
- 从任脉开始，由内向外的经脉排列是
 - 胃经、脾经、肾经
 - 肾经、脾经、胃经
 - 肾经、胃经、脾经
 - 脾经、肾经、胃经
- 暑邪伤人，常见胸闷，四肢困倦等症，是由于
 - 暑为阳邪，其性炎热
 - 暑伤脾胃，纳食减少
 - 暑多挟湿，阻遏气机
 - 暑性升散，伤津耗气
 - 暑性开泄，易袭阳位
- 气出入受阻，突然昏厥的病理变化为
 - 气虚
 - 气滞
 - 气逆
 - 气闭
 - 气脱
- 五行中某一行过于强盛，使原来克制它的一行不仅无法克制它，反而受其反向克制，说明五行之间的关系是
 - 五行制化
 - 五行相生
 - 五行相克
 - 五行相乘
 - 五行相侮
- 具有推动和调控各脏腑、经络、形体和官窍生理活动功能的气是

- B. 元气
- C. 营气
- D. 卫气
- E. 脏腑之气

10. 下列哪项属于精的功能

- A. 载气
- B. 化气
- C. 温煦
- D. 中介
- E. 滋润

11. 厌食油腻，脘闷呕恶，便溏不爽多见于

- A. 湿热蕴脾
- B. 食滞胃脘
- C. 肝胆湿热
- D. 妊娠反应
- E. 阴虚火旺

12. 渴喜热饮而量不多，或水入即吐多为

- A. 湿热内蕴
- B. 痰饮内停
- C. 营分热盛
- D. 阴虚津亏
- E. 瘀血内阻

13. 久病面色苍白，却时而泛红如妆，游移不定者，其证候是

- A. 阴虚证
- B. 实热证
- C. 气虚证
- D. 戴阳证
- E. 失血证

14. 脏腑中具有“主津”作用的是

- A. 胃
- B. 脾
- C. 三焦
- D. 小肠

15. 一气一病，症状相似体现的是

- A. 痰饮
- B. 戾气
- C. 湿气
- D. 六淫
- E. 七情

16. 诊断疾病时以气息分阴阳，属阳者为

- A. 语声低微
- B. 语声无力
- C. 少言沉静
- D. 语声高亢
- E. 低声懒言

17. 干呕呃逆，胃脘嘈杂，口干咽燥，舌红少苔。其证候是

- A. 食滞胃脘
- B. 胃阴虚
- C. 肝脾不调
- D. 肝胃不和
- E. 胃阳虚

18. 可见眩晕，肢体震颤，面白无华症状的是

- A. 肝阳化风证
- B. 阴虚动风证
- C. 血虚生风证
- D. 热极生风证
- E. 肝阳上亢证

19. 何脏在病理状态下会出现“清气在下，则生飧泄”

- A. 肝
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

20. 肺之“门户”是

- A. 鼻

- C. 喉
- D. 皮毛
- E. 玄府

21. 外邪侵袭是否发病在于

- A. 正气的强弱
- B. 邪气的盛衰
- C. 阴阳之气的盛衰
- D. 气血的盛衰
- E. 脏腑功能的盛衰

22. 临床常见的心火引动肝火之心肝火旺证, 属于

- A. 相乘传变
- B. 母病及子
- C. 相侮传变
- D. 子病犯母
- E. 子盗母气

23. 与女子胞关系最紧密的是

- A. 冲脉
- B. 肝经
- C. 脾经
- D. 肾经
- E. 阴跷脉

24. 感邪后缓慢发病是

- A. 徐发
- B. 合病
- C. 复发
- D. 感邪即发
- E. 伏而后发

25. 下列各项, 适用于真寒假热证的治法是

- A. 以热治寒
- B. 以热治热
- C. 以寒治寒
- D. 用寒远寒
- E. 通因通用

26. 虚人感受外邪, 应采用的是

- A. 治标
- B. 治本
- C. 标本兼治
- D. 先治本后治标
- E. 反治

27. 中焦有火的临床表现是

- A. 形瘦食少
- B. 肥而食少
- C. 形瘦食多
- D. 胖而能食
- E. 肉削著骨

28. 补阳时适当配伍补阴药的方法称为

- A. 阴中求阳
- B. 阳中求阴
- C. 阴病治阳
- D. 阳病治阴
- E. 阴阳同治

29. 元气耗损和功能减退, 脏腑功能低下, 抗病能力下降的病机是

- A. 气虚
- B. 气脱
- C. 血虚
- D. 津亏
- E. 气陷

30. 痰热内闭的目态是

- A. 戴眼反折
- B. 目睛微定
- C. 昏睡露睛
- D. 双睑下垂
- E. 横目斜视

31. 主收引疼痛的是

- A. 寒
- B. 湿

- D. 暑
- E. 风

32. 膀胱湿热所致的尿急尿频尿痛的治法

- A. 通因通用
- B. 塞因塞用
- C. 热因热用
- D. 寒因寒用
- E. 寒则热之

33. 舌苔由薄白转为白厚，提示

- A. 病邪入里
- B. 寒邪化热
- C. 邪退正复
- D. 热退津复
- E. 湿热留恋

34. 濡脉与弱脉的主要不同点，在于

- A. 脉位的浮沉
- B. 脉力的大小
- C. 脉形的长短
- D. 脉率的快慢
- E. 脉律的齐否

35. 齿燥如枯骨者，属

- A. 热盛伤津
- B. 阳明热盛
- C. 肾阴枯涸
- D. 胃阴不足
- E. 肾气虚乏

36. 按肌肤尚温，汗出如油，脉躁疾无力者是

- A. 实热证
- B. 亡阳证
- C. 亡阴证
- D. 阴虚证
- E. 气虚证

37. 面色黑而干焦，多见于

- B. 肾阴亏虚
- C. 瘀血内阻
- D. 水饮内停
- E. 心阳虚衰

38. 小腿部位皮肤突然鲜红成片，色如涂丹，边缘清楚，灼热肿胀者，称为

- A. 抱头火丹
- B. 麻疹
- C. 流火
- D. 瘾疹
- E. 赤游丹

39. 下列哪项不是鉴别寒证与热证的要点

- A. 身热与身冷
- B. 面赤与面白
- C. 口渴与不渴
- D. 舌苔黄与白
- E. 头痛与不痛

40. 痰多量大，易咳的临床意义

- A. 寒痰
- B. 风痰
- C. 湿痰
- D. 热痰
- E. 燥痰

41. 胸胁饱满，咳唾引痛，喘促不能平卧，有肺癆病史为

- A. 支饮
- B. 悬饮
- C. 痰饮
- D. 溢饮
- E. 痰湿

42. 后头部痛属于

- A. 阳明经
- B. 太阳经
- C. 少阳经

- D. 厥阴经
- E. 太阴经

43. 小儿脾虚泄泻，腹胀，苔腻的临床意义

- A. 真实假虚
- B. 真寒假热
- C. 真热假寒
- D. 真虚假实
- E. 阴盛格阳

44. 循衣摸床，撮空理线的病理意义

- A. 神乱
- B. 少神
- C. 得神
- D. 失神
- E. 假神

45. 病邪未经传变，同时侵入两经为

- A. 发病
- B. 传经
- C. 直中
- D. 合病
- E. 并病

46. 短缩舌和痿软舌的共同意义是

- A. 气虚两虚
- B. 阴虚火旺
- C. 痰浊内蕴
- D. 寒凝筋脉
- E. 瘀血内阻

47. 下列各项不属于细辛功效的是

- A. 宣通鼻窍
- B. 温肺化饮
- C. 祛风止痛
- D. 解表散寒
- E. 燥湿止带

48. 归经的理论基础是

- B. 五行学说
- C. 运气学说
- D. 整体观念
- E. 脏腑经络理论

49. 干姜配伍附子，可降低附子的毒性，属于

- A. 相须
- B. 相使
- C. 相畏
- D. 相杀
- E. 相反

50. 下列各项，不属薄荷功效的是

- A. 疏散风热
- B. 疏肝行气
- C. 清热凉血
- D. 透疹利咽
- E. 清利头目

51. 沉香治疗痰饮喘咳，上盛下虚之证，其作用在于

- A. 温肺化饮
- B. 燥湿化痰
- C. 温肾纳气
- D. 益气健脾
- E. 补益肺肾

52. 下列哪项不是大黄与虎杖的共同功效

- A. 泻下攻积
- B. 清热泻火
- C. 凉血解毒
- D. 逐瘀通经
- E. 宣肺止咳

53. 关于栀子的应用，下列不正确的是

- A. 热病心烦
- B. 目赤肿痛
- C. 骨蒸潮热
- D. 淋证涩痛

54. 具有行气安胎的药物是

- A. 砂仁
- B. 厚朴
- C. 佩兰
- D. 苍术
- E. 白豆蔻

55. 下列不属于硫黄主治病证的是

- A. 阳痿
- B. 湿疹
- C. 遗精滑精
- D. 虚喘冷哮
- E. 虚寒便秘

56. 既善于治疗吐衄便血，又善于治疗肺热咳嗽有痰的药物是

- A. 苈麻根
- B. 地榆
- C. 侧柏叶
- D. 三七
- E. 槐花

57. 具有镇静安神，平肝潜阳，收敛固涩功效的药物是

- A. 菊花
- B. 夏枯草
- C. 龙骨
- D. 朱砂
- E. 石决明

58. 发汗解表，温通经脉的是

- A. 辛夷
- B. 防风
- C. 荆芥
- D. 香薷
- E. 桂枝

59. 热闭、寒闭神昏，均常选用的药物是

- A. 石菖蒲

C. 牛黄

- D. 羚羊角
- E. 苏合香

60. 善消肉食的药物是

- A. 山楂
- B. 神曲
- C. 麦芽
- D. 莱菔子
- E. 鸡内金

61. 病人肝肾结石，用海金沙治疗，但药房缺药可用那个代替

- A. 虎杖
- B. 金钱草
- C. 茵陈
- D. 柴胡
- E. 山豆根

62. 磁石的功效是

- A. 养心安神，平安潜阳
- B. 开窍醒神，清热化浊
- C. 开窍醒神，清热止痛
- D. 镇静安神，收敛固涩
- E. 聪耳明目，纳气平喘

63. 黄芩具有而黄柏不具有的功效是

- A. 燥湿
- B. 泻火
- C. 解毒
- D. 清肺热
- E. 退虚热

64. 小柴胡汤中和解少阳的药物配伍是

- A. 柴胡、半夏
- B. 柴胡、人参
- C. 柴胡、黄芩
- D. 半夏、生姜
- E. 人参、大枣

65. 麻子仁丸的主治证候中有

- A. 大便稀溏
- B. 腰膝酸软
- C. 小便频数
- D. 久痢赤白
- E. 手足厥逆

66. 补阳还五汤为活血化瘀之剂，其君药为

- A. 黄芪
- B. 当归尾
- C. 红花
- D. 桃红
- E. 川芎

67. 银翘散中辛而微温，协君药开皮毛以助祛邪的药物是

- A. 薄荷、桔梗
- B. 芦根、竹叶
- C. 薄荷、牛蒡子
- D. 荆芥穗、淡豆豉
- E. 金银花、连翘

68. 桂枝汤中具有调和营卫作用的配伍是

- A. 桂枝与生姜
- B. 桂枝与芍药
- C. 大枣与甘草
- D. 生姜与甘草
- E. 芍药与大枣

69. 心悸失眠，夜多异梦，平素胆怯易惊，苔白腻，脉弦滑者，治宜选用

- A. 二陈汤
- B. 温胆汤
- C. 导痰汤
- D. 酸枣仁汤
- E. 半夏白术天麻汤

70. 保和丸中配伍莱菔子的主要用意是

- A. 消食止泻

C. 下气消食

- D. 化滞解酒
- E. 消积和胃

71. 六一散的功用是

- A. 清暑利湿
- B. 清暑生津
- C. 清暑除烦
- D. 清暑化湿
- E. 祛暑清热

72. 主治壮热面赤，汗出恶热的首选方剂是

- A. 竹叶石膏汤
- B. 犀角地黄汤
- C. 黄连解毒汤
- D. 白虎汤
- E. 清营汤

73. 不属于济川煎组成药物的是

- A. 芍药
- B. 牛膝
- C. 泽泻
- D. 升麻
- E. 枳壳

74. 天王补心丹主治的失眠类型是

- A. 痰热失眠
- B. 血虚失眠
- C. 瘀血失眠
- D. 阳虚失眠
- E. 阴虚失眠

75. 八正散和小蓟饮子共同的组成是

- A. 滑石、灯心
- B. 篇蓄、车前子
- C. 木通、滑石
- D. 瞿麦、当归
- E. 木通、藕节

76. 泻痢，赤白相间，苔黄腻，选用方剂为

- A. 葛根芩连汤
- B. 芍药汤
- C. 白头翁汤
- D. 泻白散
- E. 藿香正气散

77. 白头翁汤功效为

- A. 清营解毒，透热养阴
- B. 清热生津，透热养阴
- C. 清热生津，益气养胃
- D. 清热解毒，凉血止痢
- E. 清热生津，止血凉血

78. 厥逆，营血亏虚，寒凝四肢治疗首选

- A. 四逆汤
- B. 四逆散
- C. 当归四逆汤
- D. 吴茱萸汤
- E. 大建中汤

79. 既能和胃，又能清胆利湿的方剂

- A. 小柴胡汤
- B. 凉膈散
- C. 蒿芩清胆汤
- D. 泻白散
- E. 导赤散

80. 制定卫生行政法规的部门是

- A. 人民代表大会
- B. 常务委员会
- C. 卫健委
- D. 人民政府
- E. 国务院

81. 发生传染病菌种、毒种丢失的，设区的市级人民政府向省、自治区、直辖市人民政府报

告时间是

- A. 1 小时
- B. 2 小时
- C. 6 小时
- D. 12 小时
- E. 24 小时

82. 不属于卫生法的基本原则是

- A. 保护社会健康原则
- B. 患者自主原则
- C. 公平原则
- D. 尊重原则
- E. 卫生保护

83. 对已经发生甲类传染病病例的场所，所在地的县级以上地方人民政府可以

- A. 采取强制隔离措施
- B. 实施隔离措施
- C. 采取必要的预防措施
- D. 予以隔离治疗
- E. 在指定场所进行医学观察

84. 民事责任的构成是

- A. 损伤的事实存在
- B. 财产的责任
- C. 一方当事人对另一方的责任
- D. 补偿当事人的损伤
- E. 民事责任可以由当事人协商解决

85. 下列各项，不属卫生行政处罚的是

- A. 警告
- B. 停止损害
- C. 罚款
- D. 没收违法所得
- E. 责令停产停业

A2 型题

答题说明

每一道试题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

86. 患者，女，36岁。面色萎黄，神疲乏力，气短懒言，食少便溏，月经淋漓不断，经血色淡，舌淡无苔，脉沉细无力。其证候是

- A. 脾不统血证
- B. 脾肾阳虚证
- C. 气血两虚证
- D. 脾肺气虚证
- E. 肝血不足证

87. 患者，男，25岁。胃肠热盛，大便秘结，腹满硬痛而拒按，潮热，神昏谵语，但又兼见面色苍白，四肢厥冷，精神萎顿。其证候是

- A. 虚中夹实证
- B. 真实假虚证
- C. 由实转虚证
- D. 真虚假实证
- E. 实中夹虚证

88. 患者，男，58岁。胃大部切除术后已近半年，头晕心悸，气短乏力，面唇淡白，舌淡嫩，脉弱。临床诊断最可能是

- A. 气虚证
- B. 血虚证
- C. 气血两虚证
- D. 脾气虚证
- E. 心肝血虚证

89. 患者，女，3岁。患“乙脑”第8天，低热不退，颧红盗汗，失语，手足蠕动，舌红绛无苔，脉细数，临床诊断最可能是

- A. 肝阴虚证
- B. 肾阴虚证
- C. 肝肾阴虚证

E. 血虚动风证

90. 患者，男，55岁。胃脘肋胀满疼痛，呃逆暖气，吞酸嘈杂，苔薄黄，辨证属于

- A. 肝脾不调证
- B. 肝胃不和证
- C. 肝胆湿热证
- D. 肝郁气滞证
- E. 胃热炽盛证

91. 患者癆嗽，干咳无痰，颧红，盗汗，午后及夜间低热，治疗方中不应出现的药物是

- A. 知母
- B. 麦冬
- C. 鳖甲
- D. 地骨皮
- E. 石膏

92. 患者出现突然昏倒，口吐白沫，目睛上视，四肢抽搐，醒后如常者，属于

- A. 脏躁
- B. 狂病
- C. 癫病
- D. 痴呆
- E. 痫病

93. 患者，女，30岁。带下量多，色黄而稠，少腹隐痛，阴部瘙痒，舌苔黄腻，脉滑数。不应选用的药物是

- A. 黄柏
- B. 龙胆草
- C. 车前子
- D. 薏苡仁

94. 患者，女，30岁。外感发热10天，现气逆不降，咳嗽气喘，皮肤蒸热，舌红少苔，脉细数。用药应首选的药物是

- A. 地骨皮
- B. 赤芍
- C. 大腹皮
- D. 黄柏
- E. 生地黄

95. 患者，脘腹疼痛，喜温喜按，呕吐便溏，脘痞食少，畏寒肢冷，口淡不渴，舌淡苔白润，脉沉细，治宜选

- A. 理中丸
- B. 小建中汤
- C. 吴茱萸汤
- D. 大建中汤
- E. 桂枝人参汤

96. 患者，温病后期出现夜热早凉，热退无汗，舌红苔少，脉细数。治疗宜选

- A. 清胃散
- B. 犀角地黄汤
- C. 白虎汤
- D. 青蒿鳖甲汤
- E. 白头翁汤

97. 患者，男，右少腹疼痛拒按，按之其痛如淋，局部痞痞，小便自调，自汗恶寒，舌苔薄腻而黄，脉滑数。治疗宜选

- A. 大黄牡丹汤
- B. 仙方活命饮
- C. 透脓散
- D. 大柴胡汤
- E. 少腹逐瘀汤

98. 患者症见汗出恶风，面色㿔白，舌淡，苔薄白，脉虚浮者，宜选用

- A. 玉屏风散

- B. 桂枝汤
- C. 四君子汤
- D. 当归补血汤
- E. 八珍汤

99. 患者，男，33岁，出现泻利无度，滑脱不禁，脐腹疼痛，喜温喜按，倦怠食少，舌淡苔白，脉沉迟细，宜用

- A. 逍遥散
- B. 真人养脏汤
- C. 易黄汤
- D. 桑螵蛸散
- E. 参苓白术散

100. 患者突然昏倒，牙关紧闭，不省人事，苔白，脉迟，宜选用的方子是

- A. 苏合香丸
- B. 至宝丹
- C. 紫雪丹
- D. 牛黄丸
- E. 柴胡汤

101. 患者，男，眩晕头痛，胸膈痞闷，恶心呕吐，舌苔白腻，脉弦滑，治宜选用

- A. 温胆汤
- B. 镇肝熄风汤
- C. 羚角钩藤汤
- D. 天麻钩藤饮
- E. 半夏白术天麻汤

102. 患者，男，尿频尿急，淋漓不畅，尿色混赤，小腹急满，口燥咽干，舌苔黄腻，脉滑数，治宜首选

- A. 平胃散
- B. 完带汤
- C. 八正散
- D. 茵陈蒿汤
- E. 藿香正气散

B1 型题

答题说明

以下提供若干组考题，每组考题共同使用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(103~104 题共用备选答案)

- A. 心脾
- B. 肝肺
- C. 脾肾
- D. 心肾
- E. 肝肾

103. “乙癸同源”的“乙癸”所指的脏是

104. “水火既济”的“水火”所指的脏是

(105~106 题共用备选答案)

- A. 泻南补北
- B. 扶土抑木
- C. 滋水涵木
- D. 培土生金
- E. 佐金平木

105. 心肾不交的治法是

106. 肝阳上亢的治法是

(107~108 题共用备选答案)

- A. 营养作用
- B. 温煦作用
- C. 推动作用
- D. 气化作用
- E. 固摄作用

107. 机体维持相应的体温有赖于气的

108. 体内物质的新陈代谢和能量的转换有赖于气的

(109~110 题共用备选答案)

- A. 约束纵行诸经

D. 加强了十二经脉中相为表里的两经在体内的联系

C. 加强了十二经脉中相为表里的两经在体内的联系

D. 调节十二经脉的气血

E. 分主一身左右之阴阳

109. 别络的生理功能为

110. 经别的生理功能为

(111~112 题共用备选答案)

A. 足厥阴肝经

B. 足阳明胃经

C. 足太阳膀胱经

D. 手太阴肺经

E. 足少阳胆经

111. 按照十二经脉气血流注次序，小肠经下交的经脉是

112. 按照十二经脉气血流注次序，大肠经下交的经脉是

(113~114 题共用备选答案)

A. 阴跷脉、阳跷脉

B. 阴维脉、阳维脉

C. 督脉、任脉

D. 冲脉、任脉

E. 阴跷脉、阴维

113. 患者，女。因流产而失血过多导致月经不调，久不怀孕，其病在哪经

114. 患者久病，眼睑开合失司，下肢运动不利其病在哪经

(115~116 题共用备选答案)

A. 血轮

- C. 肉轮
- D. 气轮
- E. 水轮

115. 目的脏腑分属中, 白睛属肺, 称为
116. 目的脏腑分属中, 眼胞属脾, 称为

(117~118 题共用备选答案)

- A. 脾胃虚弱
 - B. 亡血失精
 - C. 阴盛气结
 - D. 寒证痛证
 - E. 脏气衰微
117. 缓脉多见于
118. 代脉多见于

(119~120 题共用备选答案)

- A. 脾不统血证
 - B. 脾虚气陷证
 - C. 寒湿困脾证
 - D. 脾阳虚证
 - E. 脾气虚证
119. 以神疲乏力, 气短懒言, 脘腹坠胀, 小便浑浊如米泔为特征的证候是
120. 以脘腹胀闷, 泛恶欲呕, 腹痛便溏身重为特征的证候是

(121~122 题共用备选答案)

- A. 燥邪犯肺
 - B. 痰湿阻肺
 - C. 热邪犯肺
 - D. 肺气虚损
 - E. 肺阴不足
121. 咳嗽, 咳声不扬, 痰少而黏, 不易咯出, 其临床意义是
122. 咳嗽, 咳有痰声, 痰多色白易咯, 其临床意义是

(123~124 题共用备选答案)

- A. 气虚阳虚

- C. 邪正俱盛
- D. 邪去正复
- E. 邪盛正衰

123. 战汗后身热不退, 烦躁不安, 脉来急疾的临床意义是
124. 战汗后汗出热退, 脉静身凉的临床意义是

(125~126 题共用备选答案)

- A. 肝阳化风证
 - B. 阴虚动风证
 - C. 血虚生风证
 - D. 热极生风证
 - E. 肝阳上亢证
125. 可见步履不稳, 眩晕欲仆症状的是
126. 可见高热不退、痉厥、抽搐、鼻翼扇动、目睛上吊、神昏谵语症状的是

(127~128 题共用备选答案)

- A. 表寒证
 - B. 真寒假热证
 - C. 虚寒证
 - D. 实寒证
 - E. 亡阳证
127. 脘腹冷痛拒按, 大便秘结, 多见于
128. 脘腹冷痛喜按, 大便溏软, 多见于

(129~130 题共用备选答案)

- A. 泽泻
 - B. 滑石
 - C. 茵陈
 - D. 萆薢
 - E. 地肤子
129. 具有利湿去浊, 祛风除痹功效的药物是
130. 具有利湿退黄, 解毒疗疮功效的药物是

(131~132 题共用备选答案)

- A. 独活
- B. 秦艽
- C. 防己

E. 川乌

131. 既能祛风湿，又能温经止痛的药物是

132. 既能祛风湿，又能退虚热的药物是

(133~134 题共用备选答案)

A. 川芎、延胡索

B. 桃仁、红花

C. 益母草、牛膝

D. 莪术、三棱

E. 乳香、没药

133. 既能活血止痛，又能消肿生肌的药组是

134. 具有破血行气、消积止痛的药组是

(135~136 题共用备选答案)

A. 石膏

B. 知母

C. 栀子

D. 天花粉

E. 夏枯草

135. 治疗肝火上炎，目珠疼痛，应选用

136. 治疗痰火郁结，瘰疬痰核，应选用

(137~138 题共用备选答案)

A. 补阳

B. 通阳

C. 升阳

D. 潜阳

E. 固阳

137. 石决明具有的功效是

138. 桂枝具有的功效是

(139~140 题共用备选答案)

A. 炙甘草汤

B. 生脉散

C. 补中益气汤

D. 左归丸

E. 六味地黄丸

139. 配伍中体现“甘温除热”的代表方是

140. 配伍中体现“三补三泻”的代表方剂是

(141~142 题共用备选答案)

A. 青蒿配黄芩

B. 地骨皮配桑白皮

C. 青蒿配鳖甲

D. 地骨皮配黄连

E. 黄连配银柴胡

141. 配伍可增强清热燥湿截疟之力，适用于湿热郁遏少阳，寒热如疟的药对是

142. 配伍可增强清泄肺热、止咳平喘之力，适用于肺热咳喘、痰多黏稠的药对是

(143~144 题共用备选答案)

A. 大承气汤

B. 温脾汤

C. 葛根芩连汤

D. 大陷胸汤

E. 小陷胸汤

143. 煎药时先煎大黄，治宜峻，中病即止的方剂是

144. 煎药时先煎葛根，后纳诸药，则“解肌之力优而清中之气锐”的方剂是

(145~146 题共用备选答案)

A. 二妙散

B. 易黄汤

C. 完带汤

D. 参苓白术散

E. 龙胆泻肝汤

145. 主治肾虚湿热带下的首选方剂是

146. 主治脾虚肝郁，湿浊带下的首选方剂是

(147~148 题共用备选答案)

A. 解决医疗纠纷的合法途径

B. 增强社区卫生服务站和村卫生室提供中医药服务的能力

C. 从事医疗卫生、健康促进及其监督管理活动

D. 利用职务之便索要、非法收受财物或者牟取其他不正当利益

147. 上列关于举办医疗机构的条件说法正确的是

148. 上列医患医疗纠纷中患者的权利正确的是

(149~150 题共用备选答案)

A. 在必要时可以采取停工、停业、停课等措施

B. 承担本单位及负责地段的传染病预防、控制和疫情管理工作

C. 对甲类传染病疫区实施封锁管理

D. 承担责任范围内的传染病监测管理工作

E. 对违反《中华人民共和国传染病防治法》的行为给予行政处罚

149. 各级各类卫生防疫机构按照专业分工应

150. 各级各类医疗保健机构设立的预防保健组织或人员应



第二单元

A1 型题

答题说明

以下每一道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. “正在心下，按之则痛”是下列何证的主证

- A. 茯苓桂枝白术甘草汤证
- B. 桂枝人参汤证
- C. 大陷胸汤证
- D. 小陷胸汤证
- E. 大陷胸丸证

2. 《素问·阴阳应象大论》说：“壮火之气衰，少火之气壮”，其中“壮火”、“少火”的本义是

- A. 药食气味纯阳与温和之别
- B. 人体阳气亢盛与平和之别
- C. 病理之火与生理之火的区别
- D. 邪火与正气之别
- B. 相火与君火之别

3. 太阳病，关节疼痛而烦，脉沉而细，此为

- A. 风痹
- B. 湿痹
- C. 血痹
- D. 历节
- E. 肾痹

4. “伤寒表不解，心下有水气”，针对这种病机，选方应用

- A. 大青龙汤
- B. 麻黄汤
- C. 桂枝汤
- D. 葛根汤
- E. 小青龙汤

5. 麻黄汤证“无汗而喘”的机理是

- A. 风寒束表，腠理闭塞，肺气不宜
- B. 外寒内饮，塞塞于肺，肺失清肃
- C. 风寒束表，卫强营弱，肺气上逆
- D. 素有喘疾，外感风寒，引动宿疾
- E. 风寒束表，久郁化热，肺气上逆。

6. 《温热论》所云“在阳旺之躯，胃湿恒多”，其病机为

- A. 热重于湿
- B. 湿重于热
- C. 湿热并重
- D. 湿阻脾胃
- E. 湿阻困脾

7. 《经脉别论》所述“毛脉合精”是指

- A. 细小络脉相合
- B. 毛脉均受谷气
- C. 毛脉相会合
- D. 气血相合
- E. 经脉、经别相合

8. “逆传心包”是指

- A. 由肺传入心包
- B. 由肺传入营分
- C. 由肺卫传入心包
- D. 由肺卫传入营分
- E. 由气分传入营分

9. 中风一型在舌络的症状表现是

- B. 即重不胜
- C. 即不识人
- D. 但臂不遂
- E. 舌即难言，口吐涎

10. 心下有痰饮，胸胁支满，目眩者，宜用

- A. 肾气丸
- B. 苓桂术甘汤
- C. 小半夏加茯苓汤
- D. 小青龙汤
- E. 泽泻汤

11. “见肝之病，知肝传脾，当先实脾”这是以下哪个层次的医生的认识

- A. 圣人
- B. 上工
- C. 下工
- D. 中工
- E. 庸工

12. 据《素问·阴阳应象大论》，病邪急猛的治法是

- A. 散而泻之
- B. 引而竭之
- C. 因而越之
- D. 按而收之
- E. 汗而发之

13. 《素问·经脉别论》指出：“食气入胃，浊气归心”，其中“浊气”是指

- A. 邪气
- B. 食物残渣
- C. 水谷之悍气
- D. 宗气
- E. 谷食精微中的稠厚部分

14. 证见其脉自沉，腹满不喘，应诊断为

- A. 皮水
- B. 正水

- D. 石水
- E. 黄汗

15. 服桂枝汤的调护方法不正确的是

- A. 药后啜粥，一剂药一次煎好，分三次温
- B. 温覆取汗，使全身汗出，越多越好
- C. 中病即止
- D. 服后不出汗可服第二剂
- B. 服药禁忌生冷

16. “风水恶风，一身悉肿，脉浮不渴，续自汗出，无大热”，治用

- A. 防己黄芪汤
- B. 越婢加术汤
- C. 越婢汤
- D. 蒲灰散
- E. 麻黄加术汤

17. 小青龙汤证中“服汤已渴者”的机理是

- A. 水饮未化不能上润
- B. 津液大伤难以润
- C. 水饮初化，邪气欲解之兆
- D. 余邪化热，灼伤津液
- E. 温解过度，津液受损

18. 胸骨左缘第 3~4 肋间听到舒张期高调、递减型叹气样杂音的疾病是

- A. 主动脉瓣关闭不全
- B. 肺动脉瓣狭窄
- C. 二尖瓣狭窄
- D. 二尖瓣关闭不全
- E. 主动脉瓣狭窄

19. 晚期肝硬化最严重也是最常见的死亡原因是

- A. 上消化道出血
- B. 原发性肝癌
- C. 感染
- D. 肝肾综合征

20. 支气管肺癌由原发癌肿引起的症状是

- A. 霍纳综合征
- B. 咳嗽、咯血、胸闷、气急
- C. 吞咽困难
- D. 头痛、呕吐、共济失调
- E. 厌食、肝区疼痛、黄疸

21. 有助于鉴别 1 型与 2 型糖尿病的检查是

- A. 空腹血糖+胰岛素
- B. 餐后血糖+胰岛素
- C. 尿糖
- D. 糖化血红蛋白
- E. 血浆胰岛素和 C 肽+自身免疫性抗体

22. 急性型特发性血小板减少性紫癜的特点是

- A. 多见于女性
- B. 无感染病史
- C. 多数病程迁延
- D. 骨髓幼稚型巨核细胞增多
- E. 多见于成人

23. 类风湿关节炎最早出现的关节表现是

- A. 畸形
- B. 晨僵
- C. 疼痛
- D. 肿胀
- E. 活动障碍

24. 大叶性肺炎的炎症性质是

- A. 急性纤维素性炎
- B. 纤维素性化脓性炎
- C. 化脓性炎
- D. 浆液性炎
- E. 蜂窝织炎

25. 对肺炎链球菌肺炎诊断价值大的是

- A. 起病急，有寒战、高热、胸痛、咳嗽
- B. 血白细胞总数升高
- C. 痰涂片或培养有肺炎球菌

E. X 线检查呈肺叶分布的密度均匀影

26. 急性白血病发生感染，最常见的是

- A. 咽峡炎、口腔炎
- B. 泌尿道感染
- C. 皮肤感染
- D. 肺部感染
- E. 肛周炎

27. 甲亢患者因甲状腺素分泌过多可引起

- A. 畏寒
- B. 眼裂增宽，凝视
- C. 突眼
- D. 甲状腺肿大
- E. 怕热，多汗，多食而消瘦

28. 胃癌淋巴转移最常见的部位是

- A. 左腋窝下淋巴结
- B. 左锁骨上淋巴结
- C. 脐周淋巴结
- D. 胃周淋巴结
- E. 直肠淋巴结

29. 肺心病肺动脉高压形成的主要原因是

- A. 肺细小动脉痉挛
- B. 肺血管玻璃样改变
- C. 血容量增加
- D. 右心室肥大
- E. 左心衰竭

30. 诊断类风湿关节炎，X 线检查最有价值的部位是

- A. 双手指及腕关节
- B. 双侧踝关节
- C. 双侧膝关节
- D. 双侧肘关节
- E. 双侧肩关节

31. 急性水肿型胰腺炎的腹部体征有

B. 腹膜刺激征明显

C. 脐周或两侧腹出现青紫

D. 肠鸣音消失

E. 肝浊音界消失

32. 体温在 39°C 以上，一日内波动范围超过 2°C 者，多见于

A. 风湿热

B. 伤寒

C. 疟疾

D. 大叶性肺炎

E. 中暑

33. 对脾脏肿大与腹腔肿块的鉴别，最有意义的是

A. 质地

B. 活动度

C. 有无压痛

D. 有无切迹

E. 叩诊音的差异

34. 下列检查结果中，最能反映慢性肾炎患者肾实质严重损害的是

A. 尿蛋白明显增多

B. 尿中白细胞明显增多

C. 尿中红细胞明显增多

D. 尿中出现管型

E. 尿比重固定于 1.010 左右

35. 对诊断系统性红斑狼疮最有意义的检查是

A. 免疫球蛋白测定

B. 抗双链 DNA 抗体

C. 总补体溶血活力测定

D. 玫瑰花试验

E. 淋巴细胞转化试验

36. 下列不出现尿酮体阳性表现的是

A. 暴饮暴食

B. 妊娠剧烈呕吐

D. 糖尿病酮症酸中毒

E. 厌食症

37. 下列可出现脊柱后凸的是

A. 椎间盘突出症

B. 强直性脊柱炎

C. 胸膜肥厚

D. 一侧腰肌瘫痪

E. 儿童发育期坐或立姿势不良

38. 两侧瞳孔大小不等，多见于

A. 有机磷农药中毒

B. 阿托品类药物影响

C. 吗啡药物影响

D. 濒死状态

E. 脑肿瘤

39. 肺气肿患者心浊音界改变的特点是

A. 向左下扩大

B. 向右扩大

C. 向左右两侧扩大

D. 缩小

E. 不变

40. 下列除哪项外，均可引起中性粒细胞生理性增多

A. 新生儿

B. 妊娠后期

C. 剧烈运动

D. 分娩

E. 严重缺氧

41. 病理性蛋白尿，可见于

A. 剧烈活动后

B. 严重受寒

C. 直立性蛋白尿

D. 妊娠中毒

E. 发热

42. 下列关于急性胰腺炎酶学检查的叙述, 正确的是

- A. 血清淀粉酶多在发病 1~2 小时开始增高
- B. 尿淀粉酶多在发病 3~4 小时开始增高
- C. 胰腺广泛坏死时, 尿淀粉酶可增高不明显
- D. 尿淀粉酶的增高多早于血清淀粉酶
- E. 尿、血淀粉酶常同时开始增高

43. 甲状腺功能亢进引起发热的主要原因是

- A. 坏死物质吸收
- B. 内分泌与代谢障碍
- C. 产热过多
- D. 散热过少
- E. 抗原-抗体反应

44. 气胸出现的呼吸困难为

- A. 呼气性呼吸困难
- B. 吸气性呼吸困难
- C. 混合性呼吸困难
- D. 神经精神性呼吸困难
- E. 夜间阵发性呼吸困难

45. 主诉应包括的内容

- A. 此次发病的全过程
- B. 就诊过程
- C. 治疗过程
- D. 发病时间
- E. 对治疗的反应

46. 血白细胞总数增多, 可见于

- A. 伤寒杆菌感染
- B. 再生障碍性贫血
- C. 急性失血
- D. 使用氯霉素的影响
- E. 脾功能亢进

47. 下列疾病, 除哪项外均可以出现凝血时间延长

- A. 先天性凝血酶原缺乏症

C. 血友病

D. 血小板减少性紫癜

E. 严重肝病

48. 腹痛伴里急后重者可见于

- A. 直肠炎
- B. 伤寒
- C. 副伤寒
- D. 肠结核
- E. Crohn病

49. 流行性脑脊髓膜炎的主要传染源是

- A. 患者和带菌者
- B. 苍蝇
- C. 鼠类
- D. 污染水源
- E. 病毒

50. 只是局部皮肤发红, 一般不高出皮肤的是

- A. 斑疹伤寒
- B. 玫瑰疹
- C. 丘疹
- D. 斑丘疹
- E. 荨麻疹

51. 抽搐病因中, 属于非感染性颅脑疾病的是

- A. 脑炎
- B. 脑膜炎
- C. 脑肿瘤
- D. 脑脓肿
- E. 脑寄生虫病

52. 血清总胆红素、结合胆红素、非结合胆红素均中度增加, 可见于

- A. 蚕豆病
- B. 胆石症
- C. 珠蛋白生成障碍性贫血
- D. 急性黄疸性肝炎
- E. 胰头癌

53. 下列疾病，多表现为下垂性水肿的是

- A. 肾小球肾炎
- B. 肝硬化
- C. 血管神经性水肿
- D. 右心衰竭
- E. 甲状腺功能减退症

54. 可引起全身性水肿的疾病是

- A. 淋巴管炎
- B. 肿瘤压迫
- C. 甲状腺功能减退症
- D. 静脉炎
- E. 丝虫病

55. 下列除哪项外，均可引起阻塞性黄疸

- A. 疟疾
- B. 胆管癌
- C. 肝癌
- D. 胆道蛔虫症
- E. 胆总管结石

56. 我国最常见的咯血原因是

- A. 支气管扩张
- B. 肺结核
- C. 二尖瓣狭窄
- D. 肺脓肿
- E. 支气管肺癌

57. 引起吸气性呼吸困难的疾病是

- A. 气管肿瘤
- B. 慢性阻塞性肺气肿
- C. 支气管哮喘
- D. 气胸
- E. 大块肺不张

58. 意识障碍伴瞳孔缩小，可见于

- A. 阿托品中毒
- B. 酒精中毒
- C. 有机磷农药中毒

D. 癫痫

E. 尿毒症

59. 暗红色果酱样便可见于

- A. 细菌性痢疾
- B. 直肠癌
- C. 阿米巴痢疾
- D. 上消化道出血
- E. 霍乱

60. 下列哪项属于非感染性发热的疾病

- A. 肺结核
- B. 肺炎
- C. 急性肾盂肾炎
- D. 伤寒
- E. 血清病

61. 浅昏迷的主要临床特点是

- A. 角膜、对光反射消失
- B. 吞咽反射消失
- C. 对声、光刺激仍有反应
- D. 对强烈疼痛刺激无反应
- E. 意识大部分丧失

62. 慢性咳嗽、大量脓痰、反复咯血最多见于

- A. 慢性支气管炎
- B. 支气管肺癌
- C. 支气管扩张
- D. 肺结核
- E. 肺炎

63. 下列哪种病变引起的胸痛常沿一侧肋间神经分布

- A. 胸肌劳损
- B. 流行性胸痛
- C. 颈椎病
- D. 带状疱疹
- E. 皮下蜂窝组织炎

64. 支气管扩张，常表现为

- A. 指关节梭状畸形
- B. 杵状指
- C. 匙状甲
- D. 浮髌现象
- E. 肢端肥大

65. 在传染病的流行期间，为保护易感人群，下列哪项预防注射不合适

- A. 高效价免疫球蛋白
- B. 丙种球蛋白
- C. 抗毒素
- D. 青霉素
- E. 类毒素

66. 有关标准预防下列哪项是错误的

- A. 要防止血源性疾病的传播也要防止非血源性疾病的传播
- B. 强调双向防护
- C. 所有的患者均被视为具有潜在感染者
- D. 要根据疾病的主要传播途径，采取相应的隔离措施
- E. 操作完毕后脱去手套即可

67. 流行性出血热低血压休克期的主要特点是

- A. 热退后病情反而加重
- B. 体温逐渐上升
- C. 血小板增多
- D. 中性粒细胞增多
- E. 出现三红征

68. 流行性脑脊髓膜炎的主要致病因子是

- A. 肠毒素
- B. 内毒素
- C. 类毒素
- D. 细胞毒素
- E. 神经毒素

69. 有关流行性出血热的描述正确的是

B. 热退后症状减轻

- C. 血小板常减少
- D. 外周血白细胞常减少
- E. 临床上都有五期经过

70. 对于肠道传染病起主导作用的预防措施是

- A. 隔离患者
- B. 治疗带菌者
- C. 预防性服药
- D. 预防接种
- E. 切断传播途径

71. 导致霍乱特征性剧烈水样腹泻的是

- A. 肠毒素
- B. 细胞毒素
- C. 神经毒素
- D. 内毒素
- E. 类毒素

72. 医学科研道德的基本要求不包括

- A. 实事求是
- B. 真诚协作
- C. 治学严肃
- D. 作风严格
- E. 客观公正

73. 在选择诊断方法、治疗药物时，应考虑患者的经济负担和社会医疗资源，这反映的是

- A. 知情同意原则
- B. 保护隐私原则
- C. 医疗公正原则
- D. 医疗最优化原则
- E. 效益最大化原则

74. 患者的基本权利不包括

- A. 基本医疗权
- B. 疾病认知权
- C. 知情同意权
- D. 自主决定权

75. 不属于临床诊疗道德原则的是

- A. 最优化原则
- B. 知情同意原则
- C. 保密原则
- D. 生命价值原则
- E. 病人第一原则

76. 除下列哪项外均是医学道德范畴的内容

- A. 权利与义务
- B. 责任与信念
- C. 情感与良心
- D. 审慎与保密
- E. 荣誉与幸福

A2 型题

答题说明

每一道试题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

77. 患者身热不显，心下硬满，按之疼痛，舌苔黄滑腻，脉浮滑。选方最宜

- A. 大陷胸汤
- B. 半夏厚朴汤
- C. 小陷胸汤
- D. 十枣汤
- E. 小柴胡汤

78. 男，5岁，身热不恶寒，利下黄色稀水势急臭秽，灼肛，心烦，口渴，喘而汗出，尿赤，苔黄，脉滑数。应首选

- A. 黄连汤
- B. 葛根芩连汤
- C. 葛根汤
- D. 白头翁汤
- E. 桂枝汤

79. 患者，20岁，发热恶寒，无汗，干呕、咳嗽，痰白清稀量多，口渴、小便不利、少腹满，脉浮弦，苔白滑。选方为

- A. 苓桂术甘汤
- B. 小青龙汤
- C. 大青龙汤
- D. 桂枝汤
- E. 五苓散

80. 患者，男，50岁。身黄，黄色鲜明如橘子色，伴见汗出不彻，发热，口渴，心烦，大便秘结，小便黄赤不利，舌红苔黄。选方最宜

- A. 小柴胡汤
- B. 茵陈蒿汤
- C. 梔子柏皮汤
- D. 吴茱萸汤
- E. 麻黄连翘赤小豆汤

81. 患者见腹满硬痛，不大便，潮热，不恶寒，反恶热；面目俱赤，烦躁谵语；手足濇然汗出；苔黄燥，脉沉滑实有力。选方最宜

- A. 大承气汤
- B. 小承气汤
- C. 调胃承气汤
- D. 麻仁滋脾丸
- E. 麻子仁丸

82. 患者温病后期症见身热面赤，口干舌燥，齿黑唇裂，脉沉实，脉虚大，手足心热甚于手足背，选方最宜

- A. 猪苓汤
- B. 加减复脉汤
- C. 麦门冬汤
- D. 生脉散

83. 患者症见头痛恶寒,身重疼痛,舌白不渴,脉弦细而濡,面色淡黄,胸闷不饥,午后身热,选方最宜

- A. 藿香正气散
- B. 清暑益气汤
- C. 三仁汤
- D. 雷氏清凉涤暑法
- E. 雷氏宣透膜原法

84. “少阴温病,真阴欲竭,壮火复炽,心中烦,不得卧者”选方最宜

- A. 猪苓汤
- B. 加减复脉汤
- C. 麦门冬汤
- D. 生脉散
- E. 黄连阿胶汤

85. 女性,70岁,COPD病史20年,肺心病10余年。该患者胸部X线典型的心脏形态特征为

- A. 心尖上翘
- B. 心腰部凹陷
- C. 心脏普大
- D. 心脏向左下扩大
- E. 心脏向右扩大

86. 男性,37岁,支气管哮喘病史,突发极度呼吸困难就诊,拟诊为危重哮喘发作,查体示肺部哮鸣音减弱或消失,该病情变化提示发生的临床情况是

- A. 支气管高度狭窄或痰栓堵塞
- B. 支气管痉挛缓解
- C. 合并肺部感染
- D. 合并气胸
- E. 病情趋于缓解

87. 患者,男,50岁。每日吸烟20支已多年。近来经常咳嗽,痰中有血丝,1周前突感呼吸困难。X线透视见右侧胸腔大片致密阴影,胸

- A. 结核性胸膜炎
- B. 大叶性肺炎并发胸膜腔积液
- C. 肺癌转移至胸膜
- D. 肺癌并发肺脓肿
- E. 肺门淋巴结转移癌压迫胸导管

88. 患者,男,70岁。发热,咳嗽1周。查体:体温38°C,血压80/50mmHg(10.6/6.7kPa),左肺下可闻及湿啰音。下列哪项处理是错误的

- A. 吸氧
- B. 药物降温
- C. 补充血容量
- D. 纠正酸中毒
- E. 使用血管活性药物

89. 患者咳嗽。查体:右侧呼吸动度减弱,右下肺叩诊出现浊音,并可闻及支气管呼吸音。应首先考虑的是

- A. 右下肺不张
- B. 右下肺实变
- C. 右侧胸腔积液
- D. 右侧气胸
- E. 肺气肿

90. 患者,男,20岁。突发胸闷,气急,咳嗽。听诊:两肺满布哮鸣音。应首先考虑的是

- A. 急性支气管炎
- B. 慢性支气管炎喘息型
- C. 心源性哮喘
- D. 支气管哮喘
- E. 支气管肺癌

91. 患者,女,30岁,6年前开始间断性上腹痛,以夜间明显,伴反酸,1天前因进食不当感口干,心悸,头晕,肠鸣,便溏且色黑。最有可能诊断为

- A. 上消化道出血
- B. 幽门梗阻

- D. 胆汁返流
- E. 胃癌

92. 张某, 60岁, 干咳、胸痛、发热、消瘦1个月, 经检查诊断为小细胞肺癌, 其治疗首选

- A. 化疗
- B. 手术治疗
- C. 放射治疗
- D. 干扰素
- E. 集落刺激因子

93. 患者, 男, 50岁。慢性支气管炎病史5年, 近2~3个月咳嗽加重, 痰中持续带血, 伴胸闷, 气急, 胸痛。X线检查见肺门阴影增大。应首先考虑的是

- A. 慢性支气管炎
- B. 原发性支气管肺癌
- C. 肺炎
- D. 肺结核
- E. 肺脓肿

94. 患者, 男, 25岁。发热, 咳嗽3天。检查: 气管位置居中, 右胸呼吸动度减弱, 右中肺语颤增强, 叩诊呈浊音, 听诊可闻及湿性啰音及支气管肺泡呼吸音。应首先考虑的是

- A. 胸膜炎
- B. 肺炎
- C. 气胸
- D. 肺不张
- E. 肺结核

95. 患者, 女, 30岁。心悸气促2个月, 咯粉红色泡沫痰。查体: 面颊暗红, 口唇紫绀, 双肺底闻及湿啰音, 尖区可闻及舒张期隆隆样杂音, 下肢浮肿。其诊断是

- A. 肺源性心脏病
- B. 冠心病
- C. 二尖瓣狭窄, 心功能不全
- D. 高血压心脏病

96. 女性患者, 40岁, 1周前出现咽喉痛伴发热, 随后出现心悸、气短、易激动等症, 入院查体: 甲状腺左叶肿大、触痛、质硬。血 T_3 及 T_4 升高, 红细胞沉降率80mm/h, 吸碘率下降, 应首先考虑的诊断是

- A. 甲状腺左叶出血
- B. 桥本甲状腺炎
- C. Graves病
- D. 亚急性甲状腺炎
- E. 自主性功能亢进性甲状腺腺瘤

97. 患者女性, 因月经量多2年, 出现贫血表现, 经检查诊断为缺铁性贫血, 其首选的治疗方法是

- A. 口服铁剂
- B. 注射铁剂
- C. 口服叶酸
- D. 增加营养
- E. 输血

98. 女性, 20岁, 有明显糖尿病症状, 每日胰岛素用量36U, 夜里出现多汗, 心悸, 手抖, 晨起查血糖10.3mmol/L (86mg/dl), 应给予

- A. 增加晚餐用量
- B. 调换胰岛素类型
- C. 加大胰岛素用量
- D. 减少早饭前胰岛素剂量
- E. 减少晚餐前胰岛素用量

99. 患者, 男, 50岁。有长期肝病病史, 近年来乏力, 腹胀明显, 反复齿龈出血, 近1个月下肢水肿, 今呕血后神志不清。应首先考虑的是

- A. 脑血栓形成
- B. 糖尿病高渗昏迷
- C. 内囊出血
- D. 尿毒症昏迷
- E. 肝性昏迷

100. 患者, 男, 65岁。高血压病10年, 近半

160/95mmHg, 两肺底闻及湿啰音, 心电图及 X 线显示左心室增大。应首先考虑的是

- A. 高血压病一期
- B. 高血压病二期
- C. 高血压病三期
- D. 冠心病
- E. 心肌梗死

101. 患者, 女, 40 岁。风心病 5 年, 近半月

来胃纳差, 恶心, 呕吐, 肝区疼痛, 尿少。查体: 颈静脉怒张, 心尖区可闻及舒张期杂音, 三尖瓣区可闻及收缩期杂音, 肝肋下 2cm。应首先考虑的是

- A. 肝炎
- B. 右心衰竭
- C. 左心衰竭
- D. 肝硬化
- E. 全心衰竭

A3/A4 型题

答题说明

以下提供若干个案例, 每个案例有若干个考题。请根据提供的信息, 在每题的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(102~104 题共用题干)

男, 28 岁。心悸、无力、手颤抖 3 个月, 大便每日 2~3 次, 不成形, 体重下降 5kg。1 周前诊断为甲状腺功能亢进症, 尚未治疗。昨晚饮白酒半斤, 呕吐一次, 晨起醒来发现双下肢不能活动。

102. 为明确下肢不能活动的原因首先应测定

- A. 血钠
- B. 血镁
- C. 血糖
- D. 血钾
- E. 血钙

103. 下肢不能活动的紧急处理是

- A. 口服大剂量 β 受体阻滞药
- B. 静脉补钾
- C. 口服丙硫氧嘧啶
- D. 注射 B 族维生素
- E. 静脉滴注氯化钾的松

104. 为避免再次出现下肢不能活动, 甲亢治疗应采用

- B. 放射性碘
- C. 肾上腺皮质激素
- D. 立即行甲状腺手术
- E. 复方碘溶液

(105~107 题共用题干)

男性, 68 岁, 吸烟 40 余年, 咳嗽、咳痰 20 余年, 气急、呼吸困难 3 年余, 2 天前劳累后病情加重。查体: 桶状胸, $T37.0^{\circ}\text{C}$, P40 次/min, 双肺叩诊过清音, 双肺下叶湿性啰音。化验: 血 WBC $7.5 \times 10^9/\text{L}$, N60%。

105. 该患者的诊断为

- A. 肺炎+哮喘
- B. COPD+慢支
- C. ARDS+哮喘
- D. COPD+哮喘
- E. 肺炎+慢支

106. 该患者最需要做的检查为

- A. 肺功能检查
- B. X 线检查
- C. CT 检查

E. PET 检查

107. 该患者的治疗中错误的是

- A. 高流量吸氧
- B. 祛痰药
- C. β_2 肾上腺素受体激动剂
- D. 抗胆碱能药
- E. 茶碱类

(108~110 题共用题干)

男性, 20 岁。反复发作呼吸困难、胸闷、咳嗽 5 年, 每年春季发作, 可自行缓解, 此次发作 1 天症状仍继续加重而来就诊。查体: 双肺满布哮鸣音, 心率 82 次/min, 律齐, 无杂音。

108. 该患者应首先考虑的诊断为

- A. 慢性支气管炎
- B. 阻塞性肺气肿
- C. 心源性哮喘
- D. 支气管哮喘
- E. 慢性支气管炎并气肿

109. 对该患者的治疗应选用下列哪种药物

- A. β_2 肾上腺素受体激动剂
- B. β_2 受体拮抗剂
- C. 抗生素类药物
- D. α 受体拮抗剂
- E. β_1 肾上腺素受体激动剂

110. 入院后给予足量沙丁胺醇和异丙托溴铵治疗 1 天多病情仍无好转, 呼吸困难严重, 口唇发绀。此时应采取下列哪种措施

- A. 大剂量二丙酸倍氯米松气雾吸入
- B. 静脉滴注第三代头孢菌素
- C. 原有药物加大剂量再用 24 小时
- D. 应用琥珀酸氢化可的松静脉滴注
- E. 静脉滴注 5% 碳酸氢钠

(111~113 题共用题干)

130/80mmHg, 脉搏 110 次/分, 板样腹。肠鸣音消失。HB120g/L, WBC 8.0×10^9 /L。

111. 首先应采取的检查为

- A. 腹部立位 X 线平片
- B. 腹部 B 超
- C. 腹腔穿刺
- D. 腹部 MRI
- E. 腹部 CT

112. 以下提示病情危险的是

- A. 恶心、呕吐频繁
- B. 体温持续升高, 寒战
- C. 脉搏加快, 体温上升
- D. 腹痛加重, 大汗淋漓
- E. 脉搏加快, 体温下降

113. 若腹穿抽出较多液体, 应尽早采取的治疗措施是

- A. 胃肠减压、输液
- B. 镇痛镇静治疗
- C. 全量应用抗生素
- D. 输液、纠正水、电解质酸碱失衡
- E. 手术探查

(114~116 题共用题干)

男, 40 岁。中上腹饥饿性隐痛反复发作 10 年, 伴反酸、嗝气, 进食和服用抑酸剂可缓解。

114. 该患者最可能的疾病是

- A. 胃癌
- B. 胰腺癌
- C. 消化性溃疡
- D. 慢性胆囊炎
- E. 慢性胰腺炎

115. 患者 4 小时前突然出现中上腹剧痛且腹痛持续存在, 该患者可能发生的并发症是

- A. 急性胰腺炎并发出血坏死

- C. 胃癌并发幽门梗阻
- D. 消化性溃疡并发急性穿孔
- E. 急性胆囊炎并发胆汁性腹膜炎

116. 如进行腹部检查, 最具诊断价值的体征是

- A. 腹肌紧张
- B. 腹壁柔韧感
- C. 肠鸣音亢进
- D. 肝浊音界消失或缩小
- E. 墨菲征阳性

(117~119 题共用题干)

患者女性, 50 岁。近几年来逐渐出现心悸、乏力、活动后气急。体检发现: 心脏向左下扩大。主动脉听诊区闻及舒张期泼水样杂音。

117. 首先考虑的诊断是

- A. 二尖瓣狭窄
- B. 二尖瓣关闭不全
- C. 主动脉瓣关闭不全
- D. 主动脉瓣狭窄
- E. 肥厚型梗阻性心肌病

118. 对诊断最有价值的检查方法是

- A. 胸部 X 线摄片
- B. 超声心动图
- C. 冠状动脉造影
- D. 心电图
- E. 心脏核素检查

119. 应选用的药物是

- A. 地高辛
- B. 硝酸甘油

- C. 普萘洛尔
- D. 卡托普利
- E. 硝普钠

(120~122 题共用题干)

女性, 18 岁, 发热、鼻出血、皮肤紫癜 2 周, 舌尖可见血疱, 双下肢可见瘀斑, 浅表淋巴结及肝脾未触及, 胸骨压痛阴性, 血红蛋白 52g/L, 白细胞 $2.0 \times 10^9/L$, 分类中性 0.24, 淋巴 0.75。嗜碱粒 0.01, 血小板 $22 \times 10^9/L$, 网织红细胞 0.001, 胸部 X 线片示右下肺炎。

120. 本例最可能的诊断是

- A. 脾功能亢进
- B. 再生障碍性贫血
- C. 淋巴瘤
- D. 慢性髓系白血病
- E. 多发性骨髓瘤

121. 明确诊断应先做哪一项检查

- A. B 超
- B. 硫酸亚铁或右旋糖酐铁
- C. 骨髓检查
- D. MRI
- E. 同位素骨扫描

122. 治疗应积极考虑使用

- A. 叶酸、维生素 B₁₂
- B. 硫酸亚铁或右旋糖酐铁
- C. 维生素 C、雄激素
- D. 同种异基因造血干细胞移植
- E. 促红细胞生成素

B1 型题

答题说明

以下提供若干组考题，每组考题共同使用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(123~124 题共用备选答案)

- A. 进行性贫血
 - B. 皮肤、鼻腔等处发生坏死性溃疡
 - C. 皮肤、黏膜出血
 - D. 频繁性呕吐
 - E. 胸骨压痛
123. 血小板减少性紫癜可出现的临床表现是
124. 粒细胞缺乏症可出现的临床表现是

(125~126 题共用备选答案)

- A. 全血细胞减少
 - B. 嗜碱粒细胞增多
 - C. 骨髓中原始细胞明显增多
 - D. 酸化溶血试验阳性
 - E. 网织红细胞增多
125. 慢性粒细胞白血病的特点是
126. 急性白血病的特征是

(127~128 题共用备选答案)

- A. 胃小弯
 - B. 胃窦部
 - C. 胃大弯
 - D. 球部
 - E. 十二指肠壶腹后部
127. 十二指肠溃疡绝大部分发生在
128. 胃溃疡上消化道钡剂造影检查的直接征象多见于

(129~130 题共用备选答案)

- A. 单纯性甲状腺肿
- B. 甲状腺机能亢进症

- D. 甲状腺癌
 - E. 慢性淋巴细胞性甲状腺炎
129. 可出现甲状腺肿大伴震颤及血管杂音的是
130. 可出现甲状腺肿大伴声音嘶哑的是

(131~132 题共用备选答案)

- A. 呼吸困难
 - B. 咳嗽
 - C. 咯血
 - D. 下垂性凹陷性水肿
 - E. 紫绀
131. 左心衰竭时最早出现和最重要的症状是
132. 右心衰竭时典型的体征是

(133~134 题共用备选答案)

- A. 急性发热
 - B. 黄疸
 - C. 呕吐
 - D. 腹泻
 - E. 血便
133. 肠梗阻可见腹痛，并伴有
134. 肠套叠可见腹痛，并伴有

(135~136 题共用备选答案)

- A. 口中有烂苹果味
 - B. 口中有尿味
 - C. 口中有肝臭味
 - D. 口中有大蒜味
 - E. 呕吐物粪臭味
135. 肠梗阻患者口中

(137~138 题共用备选答案)

- A. 2000ml
 - B. 1000~2000ml
 - C. 1500ml
 - D. 100ml
 - E. 2500ml
137. 多尿是指 24 小时尿量大于
138. 无尿是指 24 小时尿量少于

(139~140题共用备选答案)

- A. 淀粉酶
 - B. 血清转氨酶
 - C. γ -谷氨酰基转肽酶
 - D. 血清碱性磷酸酶
 - E. 肌酸磷酸激酶
139. 对诊断骨质疏松最有意义的是
140. 对诊断心肌梗死最有意义的是

(141~142题共用备选答案)

- A. 咯铁锈色痰
 - B. 咯粉红色泡沫痰
 - C. 咯吐大量鲜血
 - D. 咯大量脓痰
 - E. 干咳无痰
141. 急性左心功能不全, 常伴有
142. 肺炎球菌肺炎, 常伴有

(143~144题共用备选答案)

- A. 稽留热
 - B. 弛张热
 - C. 间歇热
 - D. 回归热
 - E. 波状热
143. 疟疾病的热型是

144. 布氏杆菌病的热型是

(145~146 题共用备选答案)

- A. 黏液便
 - B. 水样便
 - C. 果酱样大便
 - D. 黑便
 - E. 陶土色便
145. 霍乱患者的大便性状为
146. 菌痢患者的大便性状为

(147~148 题共用备选答案)

- A. 照护为主, 缓解患者的疼痛
 - B. 知情同意原则、尊重原则、效用原则、禁止商业化原则、保密原则、伦理审查原则
 - C. 尊重原则、知情同意原则、安全和有效原则、防止商品化原则
 - D. 尊重与平等原则、知情同意原则、保护隐私原则、以治疗为目的原则
 - E. 有利于患者的原则
147. 上列属于人体器官移植的伦理原则的是
148. 上列属于基因诊断和基因治疗的伦理原则的是

(149~150 题共用备选答案)

- A. 内心信念
 - B. 社会舆论
 - C. 传统习俗
 - D. 真诚信仰
 - E. 科学标准
149. 医德品质构成的基本要素是
150. 医德评价中最普遍、最具有影响力的方式是

第三单元

A1 型题

答题说明

以下每一道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 下列哪项不是时行感冒的特征

- A. 传染性强
- B. 证候相似
- C. 集中发病
- D. 老幼易感
- E. 流行性强

2. 便秘冷秘的临床特征是

- A. 大便不干，腰膝酸软
- B. 大便干结，欲便不得
- C. 大便不干，努挣乏力
- D. 大便艰涩，手足不温
- E. 大便干结，口干口臭

3. 痴呆与健忘的鉴别关键是痴呆有

- A. 善忘前事
- B. 善忘后事
- C. 表情呆滞
- D. 记忆下降
- E. 沉默寡言

4. 不寐的病位主要在

- A. 心
- B. 脑
- C. 肝
- D. 脾
- E. 肾

B. 活血化瘀

- C. 补气温阳
- D. 滋阴益肾
- E. 补益心气

6. 肺胀发病的主要病理因素是

- A. 气滞、血瘀、水饮
- B. 气滞、水饮、痰浊
- C. 痰浊、水饮、血瘀
- D. 痰浊、寒邪、血瘀
- E. 风邪、痰浊、水饮

7. 治疗咳嗽，应以治肺为主，还应注意治

- A. 肝、脾、肾
- B. 心、肝、肾
- C. 心、脾、肾
- D. 心、肝、脾
- E. 肝、胃、肾

8. 痛痹的临床特征是

- A. 关节酸痛，游走不定
- B. 关节疼痛，红肿灼热
- C. 疼痛剧烈，痛有定处
- D. 酸痛重着，肌肤不仁
- E. 屈伸不利，心悸气短

9. 治疗虚体感冒之气虚感冒证，首选的方剂是

- A. 葱豉桔梗汤
- B. 加减葶藶汤

5. 针对胸痹标实的治法是

C. 荆防达表汤

- D. 新加香薷饮
- E. 参苏饮

10. 心悸心虚胆怯证的特点是

- A. 心悸烦躁，善惊痰多
- B. 心悸善惊，坐卧不安
- C. 惊悸眩晕，胸闷喘憋
- D. 心悸怵惕，心痛胸闷
- E. 虚烦而悸，耳鸣腰酸

11. 下列哪项不是内伤头痛的特征

- A. 起病缓慢
- B. 疼痛较轻
- C. 痛无休止
- D. 痛势悠悠
- E. 遇劳加重

12. 胃痛的病机是

- A. 胃失和降，逆气动膈
- B. 胃失和降，胃气上逆
- C. 胃气阻滞，胃失和降
- D. 脾胃虚寒，胃中无火
- E. 痰瘀互结，食道狭窄

13. 黄疸最主要的辨证要点是

- A. 急黄之病因
- B. 黄疸病势轻重
- C. 辨阳黄、阴黄
- D. 阳黄湿热之轻重
- E. 阴黄之病因

14. 尿血与血淋的鉴别，主要在于

- A. 尿色的深浅
- B. 尿量的多少
- C. 尿味的情况
- D. 有无尿痛
- E. 有没有泡沫

15. 脏躁的代表方是

- B. 滋水清肝饮
- C. 丹栀逍遥散
- D. 甘麦大枣汤
- E. 半夏厚朴汤

16. 下列各项，属着痹特点的是

- A. 疼痛游走不定
- B. 痛势较剧，痛有定处
- C. 关节酸痛、重着、漫肿
- D. 关节肿胀局限，见皮下结节
- E. 关节肿胀僵硬，疼痛不移

17. 腰痛发病的关键是

- A. 寒湿
- B. 湿热
- C. 肾虚
- D. 气滞
- E. 血瘀

18. 消渴的病机主要是

- A. 气阴两虚
- B. 阴虚燥热
- C. 阴阳两虚
- D. 血脉瘀滞
- E. 燥热内结

19. 可治疗小儿惊风的腧穴是

- A. 悬钟
- B. 风府
- C. 阳陵泉
- D. 环跳
- E. 足临泣

20. 章门穴位于

- A. 腹侧，腋中线第8肋骨端稍下处
- B. 腹侧，腋中线第9肋骨端稍下处
- C. 腹侧，腋中线第10肋骨端稍下处
- D. 腹侧，腋中线第11肋骨端稍下处
- E. 腹侧，腋中线第12肋骨端稍下处

21. 位于腕背横纹桡侧，当拇短伸肌腱与拇长伸肌腱之间的凹陷中的穴位是

- A. 太渊
- B. 神门
- C. 阳池
- D. 阳溪
- E. 养老

22. 归来穴归属的经脉是

- A. 手太阴肺经
- B. 手阳明大肠经
- C. 足阳明胃经
- D. 足太阴脾经
- E. 手少阴心经

23. 位于面部，颧弓下缘中央与下颌切迹之间凹陷中的腧穴是

- A. 耳门
- B. 听宫
- C. 下关
- D. 四白
- E. 颊车

24. 经足背到第 2 足趾的经脉是

- A. 足太阴脾经
- B. 足厥阴肝经
- C. 足阳明胃经
- D. 足少阳胆经
- E. 足太阳膀胱经

25. 足大趾内侧趾甲根角旁约 0.1 寸的穴位是

- A. 隐白
- B. 大敦
- C. 厉兑
- D. 至阴
- E. 足临泣

26. 以下哪项不是神门穴的主治病证

- A. 心痛、惊悸
- B. 健忘、失眠
- C. 高血压
- D. 胸胁痛
- E. 呕血、衄血

27. 常用于治疗瘾疹、瘰疬的是

- A. 商阳
- B. 合谷
- C. 阳溪
- D. 偏历
- E. 曲池

28. 绝经前后诸证肾阳虚者，宜配伍

- A. 照海、阴谷
- B. 中脘、丰隆
- C. 关元、命门
- D. 心俞、神门
- E. 中脘、阴陵泉

29. 足阳明胃经的原穴是

- A. 内庭
- B. 陷谷
- C. 冲阳
- D. 解溪
- E. 丰隆

30. 用俞募配穴法治疗胃病，应选下列哪组穴位

- A. 脾俞、胃俞
- B. 胃俞、太白
- C. 胃俞、足三里
- D. 脾俞、中脘
- E. 胃俞、中脘

A2 型题

答题说明

每一道试题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

31. 李某，男，患肺癆1年，见干咳少痰，痰中带血，胸痛，潮热颧红，咽干口燥，舌红，苔薄黄少津，脉细数，应选方

- A. 清燥救肺汤
- B. 沙参麦冬汤
- C. 百合固金汤
- D. 月华丸
- E. 保真汤

32. 患者腹痛，里急后重，下痢赤白相杂，肛门灼热，小便短赤，舌苔微黄，脉滑数。其治法是

- A. 清肠化湿，调气行血
- B. 清热化湿，理气止痛
- C. 清热凉血，和胃利湿
- D. 清肠和胃，利湿解毒
- E. 清胃利湿，和胃通降

33. 患者，女，35岁，胁痛反复发作5年，加重3天。现症见：胁肋胀痛，走窜不定，胸闷腹胀，舌苔薄白，脉弦，其证是

- A. 肝郁脾虚证
- B. 肝胃不和证
- C. 肝郁气滞证
- D. 肝胆湿热证
- E. 肝络失养证

34. 患者，女，60岁，有反复尿路感染病史5年，3天前因劳累而复发。发症：小便淋漓不已，时作时止，伴腰膝酸软，神疲乏力，舌淡，脉细弱。其辩证是

- A. 热淋

D. 血淋

- D. 膏淋
- E. 劳淋

35. 患者以胃脘痞塞，满闷不舒为主，按之柔软，压之不痛，望无胀形。发病缓慢，时轻时重，反复发作，病程漫长。多因饮食、情志、起居、寒温等因素诱发。其诊断是

- A. 胃痛
- B. 鼓胀
- C. 胃痞
- D. 胸痹
- E. 结胸

36. 吴某，男，36岁。黄疸迁延日久，久治不效，症见身目俱黄，黄色晦暗，食少纳呆，脘闷腹胀，大便不实，神疲畏寒，口淡不渴，舌质淡，苔白腻，脉濡缓。治法宜用

- A. 清热利湿，佐以通便
- B. 利湿化浊，佐以清热
- C. 温中化湿，健脾和胃
- D. 调理脾胃，益气补血
- E. 清热解毒，调气活血

37. 患者呃声洪亮，冲逆而出，口臭烦渴喜冷饮，小便短赤，大便秘结，舌苔黄，脉滑数。其治法是

- A. 清胃化痰止呃
- B. 清热化湿降逆
- C. 清热化瘀止呃
- D. 清胃平肝降逆
- E. 清降泻热止呃

38. 患者大便不干硬，晨有便意，临厕努挣无

淡嫩苔薄，脉虚。其治法是

- A. 补脾和胃
- B. 温阳通便
- C. 益气补肺
- D. 温中健脾
- E. 益气润肠

39. 患者吐血缠绵不止，时轻时重，血色暗淡，神疲乏力，心悸气短，面色苍白，舌质淡，脉细弱。其治法是

- A. 健脾和胃，宁络止血
- B. 和中宁络，凉血止血
- C. 益气养阴，宁络止血
- D. 健脾益气，摄血止血
- E. 健脾升阳，化瘀止血

40. 患者面浮肢肿，腹部胀满，咳嗽喘息，咳痰清稀，心悸，怕冷，纳差，尿少，便溏，舌胖苔白滑，脉沉细。其治法是

- A. 温肾健脾，化饮利水
- B. 温肾补肺，化痰利水
- C. 温脾补肺，化瘀利水
- D. 温肺补肾，化瘀利水
- E. 补肺纳气，化痰平喘

41. 患者痢下赤白，白多赤少，腹痛，里急后重，饮食乏味，胃脘饱胀，舌淡苔白腻，脉濡缓。其证候是

- A. 疫毒痢
- B. 湿热痢
- C. 阴虚痢
- D. 休息痢
- E. 寒湿痢

42. 患者大便并不干硬，虽有便意，但排便困难，用力努挣则汗出短气，便后乏力，面白神疲，肢倦懒言，舌淡苔白，脉弱，其治法是

- A. 养血滋阴，润燥通便
- B. 补脾益肺，润肠通便

D. 补肾温阳，润肠通便

E. 顺气导滞，润肠通便

43. 患者，男，70岁。小便点滴不通，短赤灼热，尿细如线，小腹胀满，口苦口黏，舌质红，苔黄腻，脉数。治疗应首选

- A. 八正散
- B. 沉香散
- C. 小蓟饮子
- D. 清肺饮
- E. 石韦散

44. 患者眼睑浮肿，继则四肢及全身皆肿，多有恶寒，发热，肢节酸楚，小便不利，咳喘。若经治疗后表证渐解，但仍见身重而水肿不退，则其治法为

- A. 疏风清热，宣肺利水
- B. 运脾化湿，通阳利水
- C. 宣肺解毒，利湿消肿
- D. 健脾温阳利水
- E. 温肾助阳，行气利水

45. 患者，男，26岁。精神抑郁，表情淡漠，神志痴呆，语无伦次，不思饮食，舌苔腻，脉弦滑。其证候是

- A. 痰气郁结
- B. 阳明热盛
- C. 火盛伤阴
- D. 瘀血内阻
- E. 脾气虚衰

46. 患者，男，25岁。身热，微恶风，汗少，肢体酸重，头昏重胀痛，咳嗽痰黏，鼻流浊涕，心烦，口渴，舌苔薄黄而腻，脉濡数。治疗应首选

- A. 银翘散
- B. 桑菊饮
- C. 新加香薷饮
- D. 桑白皮汤

47. 患者，男，60岁。心悸怔忡，健忘失眠，多梦，面色不华，舌质淡，脉细。其治法是

- A. 滋阴养心
- B. 滋补肝肾
- C. 益气养阴
- D. 养血安神
- E. 清胃泻火

48. 患者，女，69岁，左胸部闷痛4年，近来胸闷频发，痰多气短，肢体沉重，形体肥胖，偶有心悸眩晕，纳呆便溏，咯吐痰涎，舌体胖大边有齿痕，苔白腻，脉滑，其辨证是

- A. 气滞心胸证
- B. 寒凝心脉证
- C. 痰浊闭阻证
- D. 心肾阳虚证
- E. 心血瘀阻证

49. 患者不寐，性情急躁易怒，不思饮食，口渴喜饮，目赤口苦，小便黄赤，大便秘结，舌红苔黄，脉弦而数。其治法是

- A. 清肝泻火，宁心安神
- B. 清肝泻火，镇惊安神
- C. 疏肝泻热，佐以安神
- D. 清肝利胆，安神定志
- E. 清心凉肝，镇惊宁神

50. 患者突然昏仆，不省人事，牙关紧闭，两手握固，大小便闭，肢体强痉，伴有静卧不烦，四肢不温，痰涎壅盛，舌苔白腻，脉沉滑缓。其诊断是

- A. 中风阳闭证
- B. 中风阴闭证
- C. 中风脱证
- D. 中风中经络
- E. 中风后遗症

51. 症见呃声沉缓有力，膈间及胃脘不舒，得热则减，遇寒则甚，口中和，食纳少，舌苔白，

- A. 胃火上逆
- B. 胃阴不足
- C. 气机郁滞
- D. 胃中寒冷
- E. 脾胃阳虚

52. 患者咳唾时胸胁引痛，咳逆喘息不能平卧，右侧肋间饱满，舌苔白腻，脉沉弦。其诊断

- A. 痰饮，脾阳虚弱
- B. 悬饮，邪犯胸肺
- C. 支饮，寒饮伏肺
- D. 溢饮，水饮泛滥
- E. 悬饮，饮停胸胁

53. 某男，48岁，四肢关节酸楚，两膝关节灼热红肿，疼痛而强硬，屈伸不利，汗出口渴，苔黄燥，脉滑数，证属

- A. 行痹
- B. 着痹
- C. 风湿热痹
- D. 痛痹
- E. 痰瘀痹阻

54. 患者，男，68岁。家属代诉患者于今日下午外出散步，突然昏仆，不省人事，半身不遂，目合口张，鼻鼾息微，遗尿，汗出，四肢厥冷，脉细弱。治疗应首选

- A. 督脉经穴，灸法
- B. 任脉经穴，灸法
- C. 背俞穴，灸法
- D. 足阳明经穴，灸法
- E. 足厥阴经穴，针刺用泻法

55. 患者，女，55岁。头痛病史5年，发作时头重如裹，视物旋转。舌淡，苔白腻。针刺治疗除取主穴外，还应配

- A. 百会、风池、太冲、内关
- B. 风府、天柱、颈夹脊
- C. 曲池、足三里

E. 行间、侠溪、太溪

56. 治疗胃脘疼痛隐隐，喜按喜暖，空腹痛甚，纳后痛减，兼见泛吐清水，便溏，手足不温，舌淡苔薄，脉虚弱，在足三里、内关、中脘基础上，应加取

- A. 胃俞、梁门
- B. 下脘、梁门
- C. 太冲、肝俞
- D. 肾俞、太溪
- E. 关元、脾俞、胃俞

57. 某男，30岁，体质素弱，近半年来，呕吐时作时止，食欲不佳，倦怠乏力，舌苔薄白，脉弱。治疗应选用

- A. 内关、足三里、中脘、丰隆、阴陵泉
- B. 内关、足三里、中脘、合谷、内庭
- C. 内关、足三里、中脘、梁门、天枢
- D. 内关、足三里、中脘、太冲、阳陵泉
- E. 内关、足三里、中脘、脾俞、胃俞

58. 患者，男，23岁。1周前外出淋雨受寒，3天前出现腰痛，并放射至小腿后侧。治疗的主穴是

- A. 腰夹脊、秩边、委中、承山、昆仑、阿是穴
- B. 腰夹脊、环跳、阳陵泉、悬钟、丘墟
- C. 腰夹脊、肾俞、大肠俞、环跳、秩边、委中、阳陵泉
- D. 阿是穴、肾俞、大肠俞、秩边、昆仑
- E. 大肠俞、阿是穴、委中

59. 某女，53岁。2小时前突然发现右半身麻木，口角喎斜，言语不利。现神志清，头晕目眩，苔白腻，脉弦滑。其诊断是

- A. 中经络，风痰阻络证
- B. 中经络，肝阳暴亢证
- C. 中经络，阴虚风动证
- D. 中脏腑，气虚血瘀证

60. 某男，30岁，右下齿痛，疼痛剧烈，齿龈红肿，无龋齿，身热，舌红，苔薄黄，脉浮数。针灸治疗本病的取穴是

- A. 合谷、颊车、下关、外关、风池
- B. 合谷、颊车、下关、内庭、二间
- C. 合谷、颊车、下关、太溪、行间
- D. 合谷、颊车、下关、风池、侠溪
- E. 合谷、颊车、下关、风池、太冲

61. 患者，男，36岁。咳嗽2周，现症见咽痛，咽干微肿，手足心热，舌红，少苔，脉细数。针刺治疗的主穴为

- A. 尺泽、合谷、少商、照海
- B. 关冲、合谷、少商、行间
- C. 关冲、厉兑、鱼际、侠溪
- D. 少商、合谷、尺泽、关冲
- E. 太溪、照海、列缺、鱼际

62. 某女，30岁，3个月前突发高热，热退后出现周身乏力，并见下肢痿软无力，食少纳呆，腹胀便溏，神疲乏力。治疗本病应选用哪组经脉为主

- A. 手足少阳经穴、夹脊穴
- B. 手足阳明经穴、夹脊穴
- C. 手足太阳经穴、夹脊穴
- D. 手足太阴经穴、夹脊穴
- E. 手足厥阴经穴、夹脊穴

63. 某女，17岁，痫病发作后来诊，发病前有眩晕，胸闷，现痰多，舌红，苔白腻，脉滑。针灸治疗除印堂、鸠尾、间使、太冲、丰隆外，应加用

- A. 曲池、神门、内庭
- B. 合谷、阴陵泉、风池
- C. 心俞、脾俞、足三里
- D. 肝俞、肾俞、太溪
- E. 丰隆、膈俞、内关

64. 患者，男，76岁。神情淡漠，寡言少语，

舌质红，苔薄白，脉沉细，针刺应配

- A. 太冲、内庭
- B. 十宣、涌泉
- C. 肝俞、肾俞
- D. 丰隆、中脘
- E. 膈俞、内关

65. 某男，37岁，最近工作压力较大，出现心慌心跳，头晕目眩，少寐，腰酸，盗汗，舌红，脉细数。治疗除主穴外，宜加取

- A. 肾俞、太溪
- B. 肾俞、中渚
- C. 肾俞、大陵
- D. 膻中、气海
- E. 膻中、大陵

66. 患者，女，33岁。精神抑郁，易怒易哭半年，兼胸胁胀痛，舌苔薄白，脉弦。针刺治疗的配穴为

- A. 通里、心俞、三阴交
- B. 肝俞、肾俞、太溪、三阴交
- C. 天突、照海
- D. 膻中、期门
- E. 行间、侠溪

67. 患者，男，60岁。咳嗽1个月，劳累后加重，咳吐黏稠痰，胸脘痞闷，胃纳减少，舌苔白腻，脉濡滑。治疗除取肺俞、太渊穴外，还应取

- A. 风门、大椎、合谷
- B. 章门、太白、丰隆
- C. 脾俞、胃俞、列缺
- D. 尺泽、列缺、外关
- E. 脾俞、太冲、阴陵泉

68. 某女，20岁，食海鲜后皮肤出现大小不等，形状不一的风团，高起皮肤，边界清楚，色红，瘙痒，伴恶心，肠鸣泄泻，舌红，苔黄腻，脉滑数。除曲池、合谷、血海、膈俞、三阴交外，

- A. 外关、风池
- B. 足三里、天枢
- C. 三阴交、天枢
- D. 足三里、大横
- E. 三阴交、风池

69. 患者，男，50岁。右颊面部束带状刺痛5天，局部皮肤潮红，皮疹呈簇状水疱，排列如带状，兼口苦烦躁易怒，苔黄，脉弦滑数。治疗除取局部阿是穴、相应夹脊穴外，还应加

- A. 阴陵泉、内庭
- B. 血海、三阴交
- C. 天枢、合谷
- D. 神门、支沟
- E. 行间、侠溪

70. 患者，女，因流产失血过多，导致月经不调，久不怀孕。其病在哪经

- A. 阴跷脉、阳跷脉
- B. 阴维脉、阳维脉
- C. 督脉、任脉
- D. 冲脉、任脉
- E. 阴跷脉、阴维脉

71. 患者因肺肾阴虚，虚火妄动，脉络受伤而致咳血。治疗应首选

- A. 孔最
- B. 梁丘
- C. 隐白
- D. 曲泽
- E. 定喘

72. 患者，男。不寐多梦，甚则彻夜不眠，急躁易怒，伴头晕头胀，目赤耳鸣，口干而苦，不思饮食，便秘溲赤，舌红苔黄，脉弦而数。治疗除主穴还应加用

- A. 心俞、脾俞
- B. 心俞、胆俞
- C. 风池、悬钟

E. 行间、侠溪

73. 患者，男，39岁。大便时溏时泄，迁延反复，稍进油腻食物则便次增多，面黄神疲，舌淡苔白，脉细弱者，针刺应配

- A. 脾俞、太白
- B. 神阙
- C. 内庭
- D. 中脘
- E. 足三里

74. 患者，男，55岁。1年来每日黎明之前腹微痛，痛即泄泻，腹部和下肢畏寒，舌淡苍白，脉沉细。治疗除取主穴外，还应加

- A. 胃俞、合谷
- B. 肝俞、内关
- C. 三焦俞、公孙
- D. 命门、关元
- E. 关元俞、三阴交

75. 某女，24岁。经血不止15天，下血量多，色红，气味臭秽，口干喜饮，舌红苔黄，脉滑数。治疗取穴是

- A. 关元、公孙、三阴交、行间、阴陵泉
- B. 关元、公孙、足三里、隐白、太冲
- C. 关元、公孙、三阴交、隐白、血海
- D. 关元、公孙、足三里、隐白、内庭
- E. 气海、三阴交、足三里、然谷、太溪

76. 患者，女，30岁。乳房肿块和疼痛在月经前加重，兼腰酸乏力，月经失调，色淡量少，舌淡，脉沉细，针刺应选取的配穴为

- A. 阳陵泉、光明
- B. 天枢、气穴
- C. 肝俞、太冲
- D. 脾俞、胃俞
- E. 关元、肝俞

A3/A4 型题

答题说明

以下提供若干个案例，每个案例有若干个考题。请根据提供的信息，在每题的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(77~80 题共用题干)

患者，女，35岁。心悸气短，头晕目眩，失眠健忘，面色无华，倦怠乏力，纳呆食少，舌淡红，脉细弱。

77. 其证候是

- A. 水饮凌心证
- B. 心虚胆怯证
- C. 心阳不振证
- D. 心血不足证
- E. 阴虚火旺证

B. 温补心阳，安神定悸

- C. 镇惊定志，养心安神
- D. 活血化瘀，理气通络
- E. 补血养心，益气安神

79. 治疗应首选

- A. 安神定志丸加减
- B. 归脾汤加减
- C. 桂枝甘草龙骨牡蛎汤合参附汤加减
- D. 苓桂术甘汤加减
- E. 桃仁红花煎合桂枝甘草龙骨牡蛎汤

78. 其治法是

80. 若见心悸怔忡，白汗盗汗，胸膈闷结，治宜

- B. 生脉散加减
- C. 炙甘草汤加减
- D. 黄连温胆汤加减
- E. 苓桂术甘汤加减

(81~82 题共用题干)

男性,43岁。长夏时节,起居不慎而外感,临床表现为:身热,微恶风,汗少,肢体酸重,头昏胀痛,心烦口渴,胸闷恶心,小便短赤,舌苔薄黄腻,脉濡数。

81. 如此,下列哪种方剂最适合上述中医辨证及治疗原则

- A. 藿香正气散
- B. 银翘散
- C. 新加香薷饮
- D. 清暑益气汤
- E. 竹叶石膏汤

82. 如未及时治疗,临床表现为心烦躁扰,口渴,小便短赤,舌苔黄厚,舌尖红,可酌加

- A. 黄连、青蒿
- B. 藿香、苍术
- C. 白豆蔻
- D. 佩兰
- E. 黄豆卷

(83~86 题共用题干)

患者,男,47岁。胁肋灼热疼痛,痛有定处,口苦口黏,胸闷纳呆,恶心呕吐,小便黄赤,大便黏腻,舌红苔黄腻,脉弦滑数。

83. 该患者所患疾病证属

- A. 阴虚气滞证
- B. 肝郁气滞证
- C. 肝胆湿热证
- D. 肝络失养证
- E. 瘀血阻络证

- A. 清热利湿
- B. 养阴柔肝
- C. 祛瘀通络
- D. 补血疏肝
- E. 疏肝理气

85. 治疗此证应首选的方剂是

- A. 柴胡疏肝散加减
- B. 龙胆泻肝汤加减
- C. 血府逐瘀汤或复元活血汤加减
- D. 一贯煎加减
- E. 加味逍遥丸加减

86. 若兼见发热,黄疸,可加

- A. 知母、天花粉
- B. 牡丹皮、赤芍
- C. 白茅根、芦根
- D. 茵陈、黄柏
- E. 黄连、吴茱萸

(87~90 题共用题干)

患者,男,22岁。2日前因饮食不洁,出现痢下鲜紫脓血,腹痛剧烈,壮热口渴,头痛烦躁,舌质红绛,苔黄燥,脉滑数。

87. 该患者所患疾病证属

- A. 虚寒痢
- B. 寒湿痢
- C. 休息痢
- D. 疫毒痢
- E. 湿热痢

88. 此证的治法是

- A. 清肠化湿,调气和血
- B. 清热解毒,凉血除积
- C. 温中燥湿,调气和血
- D. 温补脾肾,收涩固脱
- E. 温中清肠,调气化滞

- A. 桃花汤合真人养脏汤
- B. 驻车丸加减
- C. 白头翁汤加减
- D. 不换金正气散加减
- E. 连理汤加减

90. 若该患者伴见神昏高热谵语，则可合

- A. 犀角地黄汤
- B. 清营汤
- C. 安宫牛黄丸
- D. 竹叶石膏汤
- E. 白虎加人参汤

(91~94 题共用题干)

患者，女，28岁。平素头痛，目眩，耳烦躁易怒。现鼻衄，两目红赤，口苦，舌红，脉数

91. 该患者所患疾病属于何种证型

- A. 肝火上炎证
- B. 胃热炽盛证
- C. 热邪犯肺证
- D. 气血亏虚证
- E. 心肝火炽证

92. 此证的治法是

- A. 清泄肺热，凉血止血
- B. 清肝泻火，凉血止血
- C. 清胃泻火，凉血止血
- D. 泻火解毒，清热凉血
- E. 补气摄血

93. 治疗此证应首选的方剂是

- A. 玉女煎加减
- B. 桑菊饮加减
- C. 龙胆泻肝汤加减
- D. 银翘散加减
- E. 归脾汤加减

- A. 玄参、麦冬、女贞子、墨旱莲
- B. 玄参、龟板、地骨皮、知母
- C. 白茅根、仙鹤草、藕节
- D. 黄芩、牡丹皮、栀子
- E. 银花、连翘、牛蒡子

(95~98 题共用题干)

患者，女，28岁。小便黄赤频数，灼热刺痛，少腹拘急胀痛，口苦，呕恶，腰痛拒按，苔黄腻，脉滑数。

95. 该患者所患疾病属于何种证型

- A. 石淋
- B. 热淋
- C. 气淋
- D. 血淋
- E. 膏淋

96. 此证的治法是

- A. 清热通淋，凉血止血
- B. 清热利湿，排石通淋
- C. 理气疏导，通淋利尿
- D. 清热利湿通淋
- E. 清热利湿，分清泄浊

97. 治疗此证应首选的方剂是

- A. 石韦散加减
- B. 小蓟饮子加减
- C. 八正散加减
- D. 沉香散加减
- E. 程氏萆薢分清饮加减

98. 患者若伴寒热、口苦、呕恶，可加

- A. 清半夏、生姜
- B. 丁香、柿蒂
- C. 大黄、枳实
- D. 吴茱萸、黄连
- E. 柴胡、黄芩

患者，男，36岁。遍体浮肿，皮肤绷急光亮，胸脘痞闷，烦热口渴，小便短赤，大便干结，舌红苔黄腻，脉沉数。

99. 该患者所患疾病属于何种证型

- A. 脾阳虚衰证
- B. 风水相搏证
- C. 湿毒浸淫证
- D. 湿热壅盛证
- E. 水湿浸渍证

100. 此证的治法是

- A. 健脾温阳利水
- B. 宣肺解毒，利湿消肿
- C. 分利湿热
- D. 疏风清热，宣肺行水
- E. 运脾化湿，通阳利水

101. 治疗此证应首选的方剂是

- A. 疏凿饮子加减
- B. 麻黄连翘赤小豆汤合五味消毒饮加减
- C. 五皮饮合胃苓汤加减
- D. 越婢加术汤加减
- E. 实脾饮加减

102. 若患者腹满不减，大便不通，可合

- A. 大陷胸丸
- B. 己椒藜黄丸
- C. 防己地黄汤
- D. 防己黄芪汤
- E. 葶藶大枣泻肺汤

(103~105 题共用题干)

患者，女，65岁。咳嗽5天。咳嗽声重，气急，咽痒，咳痰稀薄色白，鼻塞，流清涕，头痛，肢体酸楚，舌苔薄白，脉浮。

103. 其证候是

- A. 风燥伤肺证

C. 肝火犯肺证

D. 风寒袭肺证

E. 风热犯肺证

104. 其治法是

- A. 疏风清肺，润燥止咳
- B. 疏风散寒，宣肺止咳
- C. 疏风清热，宣肺止咳
- D. 清肺泻肝，顺气降火
- E. 清热肃肺，豁痰止咳

105. 治疗应首选

- A. 三拗汤合止嗽散加减
- B. 黛蛤散合黄芩泻白散加减
- C. 桑杏汤加减
- D. 清金化痰汤加减
- E. 桑菊饮加减

(106~108 题共用题干)

患者，女，60岁，腰部隐隐作痛1年。伴腰酸乏力，脉沉细。

106. 其辨证为

- A. 寒湿腰痛
- B. 肾虚腰痛
- C. 瘀血腰痛
- D. 气滞腰痛
- E. 气虚腰痛

107. 针灸治疗时，应以哪组经穴为主

- A. 督脉、足少阴肾经
- B. 阿是穴、足少阴肾经
- C. 阿是穴、足少阳胆经
- D. 阿是穴、足太阳膀胱经
- E. 督脉、足太阳膀胱经

108. 治疗除大肠俞、委中外，还应选取的腧穴是

- A. 肾俞、太溪

- C. 申脉、太溪
- D. 命门、后溪
- E. 膈俞、次髎

(109~111 题共用题干)

患者,男,50岁。间断性颈项部疼痛5年,伴双上肢麻木疼痛1周。

109. 除取局部腧穴外,还应选取

- A. 手阳明、手厥阴经穴
- B. 足阳明、足厥阴经穴
- C. 督脉、手少阳、足少阳经穴
- D. 督脉、手足三阴经穴
- E. 局部腧穴、督脉、手足三阳经穴

110. 治疗的主穴首选

- A. 外劳宫、天柱、阿是穴、后溪、悬钟
- B. 外劳宫、大椎、阿是穴、风池、风门
- C. 颈夹脊、外劳宫、曲池、风门、外关
- D. 颈夹脊、天柱、风池、曲池、悬钟、阿是穴
- E. 颈夹脊、大椎、风池、曲池、后溪、阿是穴

111. 除主穴外,应选取

- A. 合谷、后溪
- B. 合谷、手三里
- C. 后溪、肝俞、肾俞
- D. 外关、膈俞、合谷
- E. 申脉、合谷、列缺

(112~114 题共用题干)

某女,50岁。头部空痛10年,头痛隐隐,遇劳发作,兼头晕,神疲乏力,面色不华,舌淡,脉细弱。

112. 其辨证为

- A. 肾虚头痛
- B. 血虚头痛
- C. 痰浊头痛

E. 肝阳上亢头痛

113. 治疗应首选的主穴是

- A. 百会、风池、太冲、内关
- B. 攒竹、阳白、风池、合谷
- C. 百会、风池、阿是穴、合谷
- D. 百会、风池、颊车、内关、阿是穴、合谷
- E. 大椎、风池、合谷、列缺

114. 应选取的配穴为

- A. 脾俞、足三里
- B. 太溪、肾俞
- C. 太冲、太溪
- D. 血海、膈俞
- E. 三阴交、肝俞

(115~117 题共用题干)

某男,52岁,突然昏仆,不省人事,两目上视,牙关紧闭,四肢抽搐,口吐白沫,二便自遗,醒后如常。

115. 其诊断是

- A. 中经络,痰蒙神窍证
- B. 中脏腑,闭证
- C. 中脏腑,脱证
- D. 痫病,大发作
- E. 痫病,小发作

116. 针灸治疗应取用哪组经脉为主

- A. 手厥阴经穴、督脉
- B. 手厥阴经穴、任脉
- C. 足厥阴经穴、督脉
- D. 足厥阴经穴、任脉
- E. 手足厥阴经穴、任脉

117. 治疗应首选的主穴是

- A. 印堂、神门、少府、太冲、阳陵泉
- B. 内关、水沟、百会、后溪、涌泉
- C. 风池、百会、太冲、行间、劳宫

E. 关元、水沟、大陵、神门、中冲

(118~120 题共用题干)

某女, 33 岁。经常寐而易醒, 醒后不寐, 多梦, 易惊易恐, 舌淡, 苔薄, 脉弦细。

118. 治疗应首选

- A. 督脉、手少阴经穴
- B. 手、足少阳经穴
- C. 手少阴、手少阳经穴
- D. 手、足阳明经穴
- E. 手少阴、手太阳经穴

119. 除神门、三阴交、照海外, 还应选取

- A. 太溪、肾俞
- B. 心俞、胆俞
- C. 行间、侠溪
- D. 心俞、脾俞
- E. 足三里、内关

120. 针灸治疗中, 照海穴宜用

- A. 针刺补法
- B. 针刺泻法
- C. 平补平泻
- D. 温和灸
- E. 点刺出血

B1 型题

答题说明

以下提供若干组考题, 每组考题共同使用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(121~122 题共用备选答案)

- A. 射干麻黄汤
 - B. 三子养亲汤
 - C. 定喘汤
 - D. 厚朴麻黄汤
 - E. 麻杏石甘汤
121. 治疗哮喘寒包热哮证, 应首选
122. 治疗哮喘风痰哮证, 应首选

(123~124 题共用备选答案)

- A. 上消肺热津伤证
 - B. 中消胃热炽盛证
 - C. 中消气阴两虚证
 - D. 下消肾阴两虚证
 - E. 下消阴阳两虚证
123. 消渴病, 口渴多饮, 口舌干燥, 尿频量多, 舌边尖红, 苔薄黄, 脉数, 辨证应属

124. 消渴病, 多食易饥, 口渴, 尿多, 形体消瘦, 苔黄, 脉滑实有力。辨证应属

(125~126 题共用备选答案)

- A. 肉桂、细辛、高良姜
 - B. 乳香、没药、郁金
 - C. 沉香、檀香、荜茇
 - D. 人参、黄芪
 - E. 薤白、苏木
125. 胸痹血瘀气滞并重, 胸闷痛甚者, 可加
126. 胸痹瘀血痹阻重证, 胸痛剧烈, 可加

(127~128 题共用备选答案)

- A. 圣愈汤
- B. 荆防败毒散
- C. 川芎茶调散
- D. 葛根汤

127. 患者头痛起病较急,其痛如破,痛连项背,恶风畏寒,口不渴,苔薄白,脉多浮紧。治疗应首选

128. 患者恶寒重,发热轻,无汗,头痛,肢节酸疼,鼻塞声重,时流清涕,喉痒,咳嗽,痰稀薄色白,舌苔薄白,脉浮。治疗应首选

(129~130 题共用备选答案)

- A. 透脓散
 - B. 仙方活命饮
 - C. 黄连解毒汤
 - D. 青蒿鳖甲汤合三妙丸
 - E. 萆薢渗湿汤
129. 治疗肛痈火毒炽盛证,应首选
130. 治疗肛痈阴虚毒恋证,应首选

(131~132 题共用备选答案)

- A. 疏邪解表,化浊和中
 - B. 温中化饮,和胃降逆
 - C. 疏肝理气,和胃降逆
 - D. 健脾益气,和胃降逆
 - E. 温中健脾,和胃降逆
131. 呕吐痰饮中阻证的治法是
132. 呕吐脾胃气虚证的治法是

(133~134 题共用备选答案)

- A. 左归丸
 - B. 右归丸
 - C. 寿胎丸
 - D. 补肾固冲丸
 - E. 肾气丸
133. 温补肾阳的代表方是
134. 滋肾益阴的代表方是

(135~136 题共用备选答案)

- A. 荆防败毒散
- B. 银翘散
- C. 新加香薷饮
- D. 参苏饮

135. 感冒风热犯表证宜首选

136. 感冒风寒束表证宜首选

(137~138 题共用备选答案)

- A. 茵陈五苓散合甘露消毒丹
 - B. 茵陈蒿汤
 - C. 茵陈术附汤
 - D. 犀角散
 - E. 大柴胡汤
137. 患者身目俱黄,黄色不甚鲜明,胸脘痞满,头重身困,食欲减退,恶心呕吐,腹胀,大便溏,舌苔厚腻微黄,脉濡数。治疗应首选
138. 患者身目俱黄,黄色鲜明,发热口渴,脘腹胀闷,口干而苦,恶心呕吐,小便短少黄赤,大便秘结,舌苔黄腻,脉象弦数。治疗应首选

(139~140 题共用备选答案)

- A. 水肿
 - B. 癫痫
 - C. 耳聋
 - D. 便秘
 - E. 舌强
139. 外关可用于治疗
140. 阳池可用于治疗

(141~142 题共用备选答案)

- A. 灯草灸
 - B. 隔姜灸
 - C. 隔蒜灸
 - D. 隔盐灸
 - E. 隔泥灸
141. 治疗阳气暴脱,可于神阙穴施
142. 治疗风寒痹痛常用

(143~144 题共用备选答案)

- A. 远近配穴法
- B. 前后配穴法
- C. 上下配穴法
- D. 同名经配穴法

143. 治疗痔疾取长强与承山的配穴方法是

144. 治疗失眠取神门与太溪的配穴方法是

(145~146 题共用备选答案)

A. 大杼

B. 绝骨

C. 太渊

D. 膈俞

E. 膻中

145. 骨会是

146. 脉会是

(147~148 题共用备选答案)

A. 手太阴肺经

B. 手阳明大肠经

C. 足阳明胃经

D. 手少阴心经

E. 手太阳小肠经

147. 曲池穴归属于

148. 极泉穴归属于

(149~150 题共用备选答案)

A. 郄门

B. 神门

C. 曲泽

D. 通里

E. 阴郄

149. 位于腕横纹尺侧端, 尺侧腕屈肌腱的桡侧凹陷处的腧穴是

150. 位于腕横纹上 5 寸, 掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间的腧穴是

第四单元

A1 型题

答题说明

以下每一道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- 好发于儿童的癣是
 - 白癣、手癣
 - 黄癣、白癣
 - 体癣、花斑癣
 - 脚癣、花斑癣
 - 黄癣、体癣
- 下列关于乳痈的主要病因病机，错误的是
 - 乳汁淤积，阻塞乳络
 - 肝郁痰凝，积聚乳络
 - 肝郁胃热，闭阻乳络
 - 感受外邪，郁滞乳络
 - 热毒入侵，瘀滞乳络
- “痛无定处，忽彼忽此，走注甚速”，其疼痛的原因是
 - 风痛
 - 湿痛
 - 痰痛
 - 热痛
 - 化脓痛
- 乳痈初起的治疗方法
 - 清热消肿
 - 疏肝解郁
 - 疏肝清胃
 - 凉血消肿
 - 疏肝健脾
- 龙胆泻肝汤
 - 马齿苋合剂
 - 萹薹渗湿汤
 - 五味消毒饮
- 下列各项，常发于多汗体质青年，并可在家庭中相互传染的是
 - 白秃疮
 - 肥疮
 - 鹅掌风
 - 圆癣
 - 花斑癣
- 脓疮湿热下注的治法是
 - 清热解毒，养阴活血
 - 清热利湿，活血通络
 - 益气活血，清热解毒
 - 清热利湿，和营解毒
 - 活血化瘀，和营消肿
- 脱疽的主要病因病理是
 - 脾气不健，肝肾不足，寒湿侵袭，凝滞脉络
 - 湿热蕴结，寒湿外侵，气血瘀滞，脉络闭塞
 - 湿热下注，气血壅滞，经络阻隔，脉络瘀滞
 - 肝肾不足，气血两亏，络脉闭阻，筋骨失养

5. 寻常疣湿热血瘀证的治法宜

5. 祛毒和结 气滞血瘀 脉络闭阻 筋脉失养

9. 以下哪项不是白癣的特点

- A. 多见于学龄儿童
- B. 毛发干枯无光泽
- C. 可形成永久性脱发
- D. 易在距头皮 0.3~0.8cm 处折断
- E. 病发根部有白色菌鞘包绕

10. 下列各项, 不属于癭瘤特征的是

- A. 颈中两侧结块
- B. 皮色不变
- C. 微有灼热
- D. 疼痛牵引至耳后枕部
- E. 容易化脓

11. 水痘的临床特点是

- A. 发热 3~4 天出疹, 出疹时热度增高
- B. 发热 3~4 天出疹, 出疹时热退
- C. 发热 2~3 天出疹
- D. 发热或无热, 1~2 天出疹 (根盘红晕不明显)
- E. 发热数小时~1 天出疹

12. 下列各项, 不属于五软的是

- A. 头项软
- B. 口软
- C. 手软
- D. 腿软
- E. 足软

13. 以下关于手足口病的叙述, 正确的是

- A. 皮疹呈向心性分布
- B. 疹退后在皮疹部位有色素沉着
- C. 疱疹质地坚硬, 疱浆清亮
- D. 疹退后局部留有瘢痕
- E. 皮疹以口腔、四肢为主, 口腔疱疹破溃后形成溃疡

14. 下列哪项属新生儿的正常舌象

- A. 舌红无苔

C. 舌质绛红

- D. 舌生红刺
- E. 舌质淡白

15. 按公式计算, 1 岁小儿正常身高是

- A. 75cm
- B. 90cm
- C. 95cm
- D. 100cm
- E. 105cm

16. 奶麻的临床特点是

- A. 发热 3~4 天出疹, 出疹时热度增高
- B. 发热 3~4 天出疹, 出疹时热退
- C. 发热 2~3 天出疹
- D. 发热或无热, 1~2 天出疹 (根盘红晕不明显)
- E. 发热数小时~1 天出疹

17. 治疗顿咳恢复期, 应首选

- A. 人参五味子汤
- B. 华盖散
- C. 参附龙牡救逆汤
- D. 桑白皮汤
- E. 桑菊饮

18. 水痘的主要病位是

- A. 肺肾
- B. 肺脾
- C. 脾肾
- D. 脾胃
- E. 肺胃

19. 与五软关系密切的脏腑是

- A. 心、肝、肾
- B. 肝、脾、肾
- C. 心、脾、肾
- D. 肝、脾
- E. 心、肝、脾

20. 菟丝子散治疗小儿遗尿的证是

- A. 肺脾气虚证
- B. 肾气不足证
- C. 肝经湿热证
- D. 心肾不交证
- E. 痰瘀阻滞证

21. 解颅、五迟五软、遗尿的共同治法是

- A. 益气养血法
- B. 温补肾阳法
- C. 培元补肾法
- D. 益气养阴法
- E. 滋补肾阴法

22. 小儿五脏娇嫩，其中最突出的是

- A. 肝、脾、肾
- B. 肺、脾、肾
- C. 心、肝、肾
- D. 脾、心、肝
- E. 心、肝、肺

23. 下列关于针刺四缝操作程序的叙述，错误的是

- A. 握持患儿手指
- B. 皮肤局部消毒
- C. 用粗毫针刺刺
- D. 刺入人指关节腔
- E. 出针挤出黏液

24. 婴儿（1岁）服用的中药煎出量是

- A. 10~20ml
- B. 21~30ml
- C. 31~40ml
- D. 41~50ml
- E. 60~100ml

25. 《小儿药证直诀》把小儿生理病理特点概括为

- A. 脏腑柔弱，易虚易实，易寒易热

C. 生机蓬勃，发育迅速

- D. 发病容易，传变迅速
- E. 脏气清灵，易趋康复

26. 以下除哪项外，均为儿科推拿疗法的作用

- A. 神气安定
- B. 经络畅通
- C. 气血循行
- D. 凉血止血
- E. 脏腑调和

27. 引起佝偻病的原因是

- A. 甲状旁腺功能亢进
- B. 维生素D缺乏
- C. 骨质软化
- D. 阻塞性黄疸
- E. 恶性肿瘤

28. 小儿癫痫痰痫证的治法是

- A. 祛风涤痰
- B. 息风开窍
- C. 健脾化痰
- D. 通窍定痫
- E. 豁痰开窍

29. 紫癜阴虚火旺证的治法是

- A. 疏风散邪，清热凉血
- B. 滋阴降火，凉血止血
- C. 理气化痰，活血止痛
- D. 健脾养心，益气摄血
- E. 清热解毒，凉血止血

30. 小儿夏季热的临床特征除长期发热外，可见

- A. 口渴多饮、多尿、汗闭
- B. 口渴多饮、多尿、多汗
- C. 口渴多饮、少尿、多汗
- D. 口不渴、多尿、多汗
- E. 口不渴、少尿、汗闭

A2 型题

答题说明

每一道试题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

31. 患者，男，65岁。肛门局部红肿灼热，坠胀不适，伴有不同程度的全身症状，易肿、易脓、易溃，但不易敛，溃后易形成肛瘘，应考虑

- A. 血栓性外痔
- B. 肛裂
- C. 肛隐窝炎
- D. 肛周脓肿
- E. 肛周感染

32. 患者，女，25岁。发现颈部肿块2天。查体：气管右侧可扪及一结节，质硬，表面不光滑，可随吞咽上下移动，同侧胸锁乳突肌前缘可扪及2个肿大淋巴结。应首先考虑的诊断是

- A. 单纯性甲状腺肿
- B. 甲状腺腺瘤
- C. 慢性淋巴性甲状腺炎
- D. 甲状腺癌
- E. 甲状旁腺腺瘤

33. 一病人于3小时前从2米高处跃下，左腰部撞击伤，无昏迷，血压正常，左腰部疼痛伴轻压痛，无包块，尿常规服5~10个/HP，最可能的诊断为

- A. 肾损伤
- B. 肾部分裂伤
- C. 肾全层裂伤
- D. 肾蒂断裂
- E. 输尿管损伤

34. 患者，女性，24岁。患腿痛1周，溃腐3天，脓腐稠厚且多，不易脱落。外用掺药应首

- B. 八二丹
- C. 红灵丹
- D. 八宝丹
- E. 三石散

35. 患者，女，44岁。右足第3及第4趾缝间潮湿，糜烂，覆以白皮，渗液较多，伴有剧烈瘙痒。诊断为糜烂型脚湿气，外治应首选

- A. 一号癣药水
- B. 复方土槿皮酊
- C. 青黛膏
- D. 雄黄膏
- E. 红油膏

36. 患者，男，48岁。肩背皮肤浅层肿块，与皮肤粘连，瘤体表面中心有黑色粗大毛孔，挤压时有臭味脂浆溢出。其诊断是

- A. 脂瘤
- B. 肉瘤
- C. 流痰
- D. 血管瘤
- E. 筋瘤

37. 患者，女，58岁。左侧腰周出现绿豆大水疱，簇集成群，累累如串珠，排列成带状，疼痛较重，舌苔薄黄，脉弦数。其诊断是

- A. 接触性皮炎
- B. 药物性皮炎
- C. 蛇串疮
- D. 热疮
- E. 湿疹

38. 患者，男，38岁。两手出现皮下小水疱

疹。诊断为鹅掌风，外治应首选

- A. 雄黄膏
- B. 皮脂膏
- C. 疯油膏
- D. 青黛膏
- E. 复方土槿皮酊

39. 患者因牙痛服用去痛片，7天后四肢出现豌豆至蚕豆大圆形红斑，有些部位中央有水疱，大便燥结，小便黄赤，有轻微发热；舌红，苔薄黄，脉滑。其药毒的证型是

- A. 湿毒蕴肤证
- B. 热毒入营证
- C. 气阴两虚证
- D. 邪犯肺卫证
- E. 风热蕴肤证

40. 患者1周前因外伤出现右手食指红肿热痛。肿胀呈圆柱状。皮色光亮，关节轻度屈曲，不能伸展，现局部跳痛明显，拟切开排脓。应选择的切口部位是

- A. 指掌侧面
- B. 指掌正中
- C. 手指侧面
- D. 手指正中
- E. 食指关节处

41. 患者，女，27岁。左乳胀痛3天，乳汁郁积结块，皮色微红微热，伴恶寒发热，脉滑数。其外治法是

- A. 切开引流，金黄散外敷
- B. 药线引流，金黄散外敷
- C. 湿热疗法，金黄散外敷
- D. 乳房按摩，金黄散外敷
- E. 火针刺脓，金黄散外敷

42. 患者，女，29岁，便血伴肛痛五月余，病起于产后，因大便干结所致，每次便后肛门疼痛，持续数小时方缓，大便带血，量少色红，

舌红，苔少，脉细数，截石位12点，肛管裂溃疡面约0.2cm×0.8cm，伴见赘皮外痔。其诊断是

- A. 结缔组织性外痔
- B. 内痔
- C. 早期肛裂
- D. 陈旧性肛裂
- E. 肛窦炎

43. 患者，女性，26岁，临床表现为右下肢暗红微肿，灼热疼痛，溃烂腐臭，发热，口渴，舌红脉数者。治宜选用

- A. 透脓散
- B. 普济消毒饮
- C. 大黄牡丹汤
- D. 四妙勇安汤
- E. 仙方活命饮

44. 患者男性，突然腰腹胀痛，疼痛向外阴部放射，尿频，尿急，尿黄赤，舌暗红，有瘀斑，脉弦，诊断为尿石症，宜选用

- A. 三金排石汤
- B. 金铃子散加石韦散加减
- C. 小蓟饮子
- D. 八正散
- E. 济生肾气丸

45. 某男半小时前被热气灼伤两前臂，现局部疼痛剧烈，有散在水疱，个别破溃，基底部分呈均匀红色、潮湿。其诊断是

- A. 面积约为6%的浅Ⅱ度烧伤
- B. 面积经为4.5%的Ⅱ度烧伤
- C. 面积约为9%的Ⅲ度烧伤
- D. 面积约为9%的Ⅰ度烧伤
- E. 面积约为9%的深Ⅱ度烧伤

46. 患者，女，38岁。产后关节刺痛，按之痛甚，恶露量少色暗，小腹疼痛拒按，选用的治法是

- B. 疏肝解郁，通络下乳
- C. 养血益气，温经通络
- D. 养血活络，行瘀止痛
- E. 养血祛风，散寒除湿

47. 患者，女，33岁，已婚，停经48天，伴下腹部剧烈疼痛1天，偶有阴道少量出血，查尿hCG(+)，B超：宫内未见胎囊。首先考虑的诊断是

- A. 妊娠腹痛
- B. 不全流产
- C. 胎动不安
- D. 异位妊娠
- E. 痛经

48. 患者，女，35岁。经期腹痛，喜温喜按，月经色淡质稀，神疲乏力，下腹积块，腹腔镜检查诊断为子宫内膜异位症，首选方剂为

- A. 少腹逐瘀汤
- B. 膈下逐瘀汤
- C. 血府逐瘀汤
- D. 桃红四物汤
- E. 理冲汤

49. 患者，女，34岁，已婚。经行先后不定，经量多、色红、质稠，少腹胀痛，乳房胀痛，舌暗红苔薄黄，脉弦。治疗应首选

- A. 逍遥散
- B. 小柴胡汤
- C. 加味逍遥散
- D. 血府逐瘀汤
- E. 当归芍药散

50. 患者，女，27岁，已婚。近几个月来带下量多、黏稠、色黄，胸闷心烦，纳少便溏，舌淡红苔黄略腻，脉细滑。其治法是

- A. 清热利湿止带
- B. 健脾利湿止带
- C. 健脾益气止带

- D. 清热解毒止带
- E. 补肾健脾止带

51. 患者，女，32岁。新产后，突然阴道大量下血，色暗红，夹有血块，小腹疼痛拒按，血块下后腹痛减轻；舌紫暗，脉沉涩。治疗首选

- A. 保阴煎
- B. 化瘀止崩汤
- C. 补中益气汤
- D. 升举大补汤
- E. 生化汤合失笑散

52. 患者，女，36岁。带下量增多一个月，色黄，呈脓样，阴痒，心烦口苦，小便黄赤，大便干结，舌质红，苔黄腻，脉弦数。治疗应首选的方剂是

- A. 内补丸
- B. 完带汤
- C. 龙胆泻肝汤
- D. 萆薢渗湿汤
- E. 仙方活命饮

53. 患者，女，28岁。经期小腹绵绵作痛，经色淡，量少，腰膝酸软，头晕耳鸣；舌质淡，脉沉细弱。最佳诊断为

- A. 痛经，气滞血瘀证
- B. 痛经，寒湿凝滞证
- C. 痛经，湿热瘀阻证
- D. 痛经，气血虚弱证
- E. 痛经，肝肾亏虚证

54. 患者，女，21岁。月经停闭，小腹冷痛拒按，得热痛减，形寒肢冷，面色青白；舌紫暗，苔白，脉沉紧。选用的治法是

- A. 益气健脾，养血调经
- B. 养阴清热，养血调经
- C. 燥湿化痰，活血通经
- D. 行气活血，祛瘀通经
- E. 温经散寒，活血通经

55. 郑某, 36岁, 脾虚气弱, 津微不布, 水湿内生, 溢于肌肤或下注损伤任带, 治当

- A. 健脾养血法
- B. 健脾益气, 利水渗湿
- C. 健脾升阳法
- D. 健脾摄血法
- E. 健脾益胃法

56. 患者, 女, 18岁, 经常经期提前一周, 量多, 经色紫红, 质稠有块, 经前乳房、胸胁、少腹胀痛, 烦躁易怒, 舌红, 苔黄, 脉弦数。其证候是

- A. 肝郁血热证
- B. 阳盛血热证
- C. 阴虚血热证
- D. 肾气虚证
- E. 脾气虚证

57. 患者, 女, 26岁, 已婚。停经2个月, 尿妊娠试验阳性, 恶心呕吐10天, 加重4天, 不能进食, 呕吐血水, 精神萎靡, 头晕体倦, 舌红, 苔薄黄而干, 脉细滑无力。其证候是

- A. 肝胃不和
- B. 气阴两虚
- C. 脾胃虚弱
- D. 痰湿内阻
- E. 肝脾不和

58. 患者, 女, 25岁, 已婚。有盆腔炎病史, 下腹部疼痛结块, 缠绵日久, 痛连腰骶, 经行加重, 经血量多有块, 带下量多, 精神不振, 纳少乏力, 舌质紫暗有瘀点, 苔白, 脉弦涩无力。治疗应首选

- A. 理冲汤
- B. 膈下逐瘀汤
- C. 少腹逐瘀汤
- D. 血府逐瘀汤
- E. 银甲丸

59. 患者, 女, 28岁, 已婚。产后恶露量多, 过期不止, 色深红, 质稠粘而臭秽, 口干咽燥, 面色潮红。其证候是

- A. 气虚
- B. 血虚
- C. 血热
- D. 湿热
- E. 血瘀

60. 患者, 女, 19岁, 未婚。月经提前, 量少, 色红、质黏稠, 伴手足心热, 两颧潮红, 舌红少苔, 脉细数。治疗应首选

- A. 大补元煎
- B. 丹栀逍遥散
- C. 清经散
- D. 保阴煎
- E. 两地汤

61. 患儿, 男, 1岁半。大便稀溏, 色淡不臭, 多于食后作泻, 面色萎黄, 形体消瘦, 神疲倦怠, 舌淡苔白, 脉缓弱, 指纹淡。其诊断是

- A. 风寒泄泻
- B. 伤食泄泻
- C. 湿热泄泻
- D. 脾虚泄泻
- E. 脾肾阳虚泄泻

62. 患儿, 女, 10岁。西医确诊为急性肾小球肾炎, 治疗已3个月, 面睑不肿, 血尿消失, 面色少华, 倦怠乏力, 易感多汗, 舌质偏淡, 苔白, 脉缓弱。其中医治法是

- A. 温阳扶正
- B. 健脾益气
- C. 平肝潜阳
- D. 疏风利水
- E. 清热解毒

63. 患儿, 男, 9岁, 诊断为病毒性脑炎。症见高热不退, 头痛, 恶心呕吐, 神识不清, 喉

苔黄腻，脉滑数。其中医证型是

- A. 热毒内闭证
- B. 阴竭阳脱证
- C. 痰热壅盛证
- D. 心阳虚衰证
- E. 肝肾阴虚证

64. 患儿，女，6岁。症见：乳核增大、触之疼痛、阴道分泌物增多；伴胸闷不舒、心烦易怒、痤疮、便秘、舌红，苔黄，脉弦数。其治疗首选方剂是

- A. 知柏地黄丸
- B. 丹栀逍遥散
- C. 黄连解毒汤
- D. 黄连温胆汤
- E. 柴胡疏肝散

65. 患儿，男，3岁。久咳，与冷空气加重，干咳为主，痰少，鼻塞，流涕，舌淡红，苔薄白，脉浮数。宜选方

- A. 桑菊饮
- B. 六君子汤
- C. 藿香正气散
- D. 清金化痰汤
- E. 三拗汤合苍耳子散

66. 患儿，女，1岁。口腔满布白屑，面赤唇红，烦躁不宁，吮乳哭啼，大便干结，小便短黄，舌红，苔薄黄，指纹紫滞。治疗应首选

- A. 知柏地黄丸
- B. 清热泻脾散
- C. 黄连解毒汤
- D. 五味消毒饮
- E. 大黄黄连泻心汤

67. 患儿经常遗尿，可达1夜数次，小便清长，面色苍白，肢凉怕冷，腰腿酸软，舌质淡。治疗应首选

- A. 大补元煎

- C. 补中益气汤
- D. 十全大补汤
- E. 金匮肾气丸

68. 小儿，男，3岁，站位测身高91cm，体重14kg。评价其生长发育状况最恰当的是

- A. 正常范围
- B. 身高体重低于正常
- C. 身高正常，体重低于标准
- D. 体重正常，身高低于标准
- E. 身高体重超过正常

69. 患儿，5岁。臀部及下肢紫癜1天，呈对称性，色鲜红，瘙痒，发热，舌红，苔薄黄，脉浮数。治疗应首选

- A. 犀角地黄汤
- B. 银翘散
- C. 归脾汤
- D. 化斑汤
- E. 大补阴丸

70. 患儿，男，4岁。入夏后体温渐高，发热持续，气温越高，体温越高，皮肤灼热，汗少，口渴欲饮，小便频数，烦躁，口唇干燥，舌质稍红，苔薄黄，脉数。治疗应首选

- A. 王氏清暑益气汤
- B. 温下清上汤
- C. 白虎汤
- D. 竹叶石膏汤
- E. 香薷饮

71. 患儿，12岁。皮肤出现瘀点瘀斑，其色鲜红、微痒、触之碍手，伴鼻衄，便秘，舌红，苔黄燥，脉数有力。治疗应首选

- A. 清营汤
- B. 黄连解毒汤
- C. 透疹凉解汤
- D. 犀角地黄汤
- E. 清热泻脾散

72. 患儿, 7 岁。突然胃脘部绞痛, 弯腰曲背, 肢冷汗出, 呕吐蛔虫 1 条。治疗应首选

- A. 使君子散
- B. 加味温胆汤
- C. 丁萸理中汤
- D. 乌梅丸
- E. 定吐丸

73. 患儿, 4 岁。不能独立行走, 全身无力, 面色无华, 舌淡苔薄白。其治法是

- A. 补肺健脾
- B. 补中益气
- C. 补肾养肝
- D. 益气养血
- E. 温补肾阳

74. 患儿, 9 岁。全身浮肿, 尿少, 头晕, 头

痛, 恶心呕吐, 舌淡嫩苔白腻, 脉弦。其证候是

- A. 肺脾气虚
- B. 脾肾两虚
- C. 风水相搏
- D. 水毒内闭
- E. 水气上凌心肺

75. 患儿, 女, 7 岁。发热两天, 癫痫发作时突然仆倒, 神志不清, 颈项强直, 四肢抽搐, 两目上视, 牙关紧闭, 口吐白沫, 口唇及面部色青, 舌苔白, 脉弦滑。治疗应首选

- A. 镇惊丸
- B. 涤痰汤
- C. 定痫丸
- D. 通窍活血汤
- E. 六君子汤

A3/A4 型题

答题说明

以下提供若干个案例, 每个案例有若干个考题。请根据提供的信息, 在每题的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(76~78 题共用题干)

患者, 女性, 39 岁, 甲状腺肿大 20 年, 呈漫肿, 无痛, 随喜怒而消长, 舌质淡红, 苔薄, 脉沉弦。

76. 属中医的

- A. 石瘿
- B. 肉瘿
- C. 瘰疬
- D. 气瘿
- E. 失荣

77. 辨证为

- A. 肝郁气滞证
- B. 肝肾不足证

D. 气滞痰凝证

E. 冲任失调证

78. 治疗应选代表方剂为

- A. 逍遥散
- B. 逍遥蒺贝散
- C. 海藻玉壶汤
- D. 开郁散
- E. 四海舒郁丸

(79~81 题共用题干)

老年消渴患者, 病史近 20 年, 10 年前出现足部麻木、发凉不适, 近 5 年症状加重, 下肢乏力, 伴有足趾疼痛, 三周前洗脚后出现左足破溃, 近一周足部溃疡发展迅速, 伴脓性分

查舌红、苔黄腻、脉弦数。

79. 诊断为

- A. 脱疽
- B. 疔疮
- C. 筋瘤
- D. 股肿
- E. 中风

80. 辨证为

- A. 寒湿阻络证
- B. 气阴两虚证
- C. 热毒伤阴证
- D. 湿热毒盛证
- E. 血脉瘀阻证

81. 治疗应选代表方剂为

- A. 黄芪鳖甲汤
- B. 顾步汤
- C. 桃红四物汤
- D. 四妙勇安汤
- E. 阳和汤

(82~84 题共用题干)

患者，男，38岁。患急性子痛2天，恶寒发热，左侧睾丸肿大疼痛，疼痛引及子系（精索），舌红苔黄腻，脉滑数。

82. 其辨证属于

- A. 湿热下注
- B. 气滞痰凝
- C. 阴虚火旺
- D. 肝郁气滞
- E. 浊痰凝结

83. 治疗应首选

- A. 透脓散
- B. 滋阴除湿汤
- C. 萆薢化毒汤

E. 枸橘汤加减

84. 相当于西医的什么病

- A. 前列腺炎
- B. 前列腺增生
- C. 急性肾盂肾炎
- D. 附睾结核
- E. 睾丸炎

(85~87 题共用题干)

患者，男，25岁，左侧小腿内侧出现一条细红丝，迅速向躯干方向走窜，红肿疼痛，苔薄黄，脉濡数；检查：腹股沟淋巴结肿大。

85. 首先考虑的诊断是

- A. 蛇头疔
- B. 蛇肚疔
- C. 蛇眼疔
- D. 红丝疔
- E. 托盘疔

86. 治疗首选

- A. 仙方活命饮
- B. 五味消毒饮
- C. 犀角地黄汤
- D. 黄连解毒汤
- E. 牛蒡解肌汤

87. 挑刺疗法的操作要点为

- A. 沿红线两头针刺出血
- B. 梅花针沿红线打刺，微微出血
- C. 用三棱针从中挑断红线，微微出血
- D. 梅花针沿红线打刺，微微出血，并加神灯照法
- E. 用三棱针沿红线寸寸挑断，并令微微出血

(88~90 题共用题干)

患者，男，55岁。双小腿青筋怒张，右小腿下1/3钱币大小溃疡，创面腐暗，滋水淋漓，

便黄赤，舌质红，苔黄腻，脉滑数

88. 最可能的诊断是

- A. 疔疮
- B. 筋瘤
- C. 脱疽
- D. 股肿
- E. 血栓性浅静脉炎

89. 其治法是

- A. 养阴清热，祛湿解毒
- B. 清热解毒，化浊利湿
- C. 清热利湿，解毒通络
- D. 清热利湿，解毒化浊
- E. 清热利湿，和营解毒

90. 治疗应首选的方剂

- A. 补阳还五汤合四妙汤
- B. 二妙丸合五神汤
- C. 活血散瘀汤合二妙丸
- D. 活血通脉汤合四妙汤
- E. 萆薢渗湿汤合活血通脉汤

(91~92 题共用题干)

患者，女性，29岁，婚久不孕，月经不调，经量少，色暗；头晕耳鸣，腰膝酸软，精神疲倦，小便清长；舌淡，苔薄，脉沉细，两尺尤甚。

91. 辨证为

- A. 肾阳虚
- B. 肾阴虚
- C. 肾气虚
- D. 脾气虚
- E. 脾阳虚

92. 首选代表方剂为

- A. 温胞饮
- B. 右归丸

D. 毓麟珠

E. 理冲汤

(93~96 题共用题干)

患者，女，28岁，已婚。月经提前，量多，色深红或紫红，质黏稠，心烦，口干，小便短黄，大便秘结，舌质红，苔黄，脉滑数。

93. 其诊断是

- A. 月经先期
- B. 月经过多
- C. 经行发热
- D. 经行感冒
- E. 经间期出血

94. 其证型是

- A. 阴虚血热证
- B. 阳盛血热证
- C. 肝郁血热证
- D. 肾气虚证
- E. 脾气虚证

95. 其治法是

- A. 养阴清热调经
- B. 疏肝清热，凉血调经
- C. 清热凉血调经
- D. 补益肾气，固冲调经
- E. 补益脾气，摄血调经

96. 治疗应首选

- A. 两地汤
- B. 丹栀逍遥散
- C. 清经散
- D. 固阴煎
- E. 补中益气汤

(97~99 题共用题干)

患者，女，29岁，已婚，一天前产下一子，今日开始发热，高热寒战，热势不退，小腹痛

心烦口渴，尿少色黄，大便燥结，舌红苔黄，脉数有力。

97. 其辨证为

- A. 产后发热，外感证
- B. 产后发热，感染邪毒证
- C. 产后发热，血瘀证
- D. 产后发热，血虚证
- E. 产后发热，肾虚证

98. 治法为

- A. 养血祛风，疏解表邪
- B. 活血化瘀，和营退热
- C. 补血益气，和营退热
- D. 清热解毒，凉血化瘀
- E. 养血祛风，散寒除湿

99. 治疗首选代表方为

- A. 五味消毒饮合失笑散
- B. 荆穗四物汤
- C. 生化汤加味
- D. 八珍汤加减
- E. 黄芪桂枝五物汤

(100~102 题共用题干)

患者，女，31岁，已婚，既往孕2产0。2018年5月10日因阴道少量出血2天、腹痛半天就诊，血色淡暗，腰酸腹坠，夜尿多，舌淡，苔白，脉沉细滑，平素月经规律量少，末次月经3月20日。尿妊娠试验阳性。

100. 其最可能的诊断是

- A. 胞漏
- B. 胞阻
- C. 恶阻
- D. 数堕胎
- E. 胎动不安

101. 此时的治疗原则是

- B. 清热凉血，养血安胎
- C. 活血化瘀，补肾安胎
- D. 从速下胎益母
- E. 破血逐瘀下胎

102. 治疗应首选的方剂是

- A. 寿胎丸加党参、白术
- B. 圣愈汤
- C. 胎元饮
- D. 桂枝茯苓丸
- E. 保阴煎

(103~105 题共用题干)

某女性患者，28岁。月经延后10天，量少、色淡、质稀，小腹绵绵作痛，头昏眼花，面色苍白，舌质淡红，脉细弱。

103. 可诊断为

- A. 月经先期
- B. 月经后期
- C. 月经先后不定期
- D. 崩漏
- E. 绝经期诸证

104. 治法宜选用

- A. 扶阳祛寒调经
- B. 温经散寒调经
- C. 补血益气调经
- D. 补肾养血调经
- E. 滋补肝肾调经

105. 方药宜选用

- A. 温经汤
- B. 生化汤
- C. 大补元煎
- D. 八珍汤
- E. 固阴煎

(106~108 题共用题干)

白清稀，鼻塞流涕，恶寒无汗，发热头痛，或全身酸痛，舌苔薄白，指纹浮红。

106. 其证型是

- A. 气虚证
- B. 风热证
- C. 痰热证
- D. 痰湿证
- E. 风寒证

107. 其治法是

- A. 燥湿化痰，宣肺止咳
- B. 滋阴润燥，养阴清肺
- C. 疏风散寒，宣肺止咳
- D. 疏风解热，宣肺止咳
- E. 疏风清肺，润燥止咳

108. 治疗应首选

- A. 银翘散
- B. 桑菊饮
- C. 沙参麦冬汤
- D. 杏苏散
- E. 清金化痰汤

(109~111 题共用题干)

患儿，男，5岁，发热2天后出疹，查体：

T: 38.5℃，精神尚可，咽充血，耳后及枕部淋巴结肿大，颜面、躯干散在淡红色丘疹。现发热恶风，流涕喷嚏，胃纳欠佳，舌质偏红，苔薄白，脉浮数。

109. 其病证诊断应考虑为

- A. 风疹，邪郁肺卫证
- B. 麻疹，初热期
- C. 麻疹，见形期
- D. 风疹，邪热炽盛证
- E. 幼儿急疹，肺胃蕴热证

- A. 发热后1~2天
- B. 发热后1~3天
- C. 发热后2~3天
- D. 发热后2~4天
- E. 发热后3~5天

111. 首先出现的部位是

- A. 耳部
- B. 面部
- C. 颈部
- D. 小腿部
- E. 胸背部

(112~114 题共用题干)

患儿，男，3岁。诊断为营养性缺铁性贫血，症见面色萎黄，唇甲淡白，发黄枯燥，容易脱落，心悸气短，头晕目眩，夜寐欠安，语声低微，精神萎靡，食欲不振，舌淡红，苔薄白，脉细弱，指纹淡红。

112. 其辨证为

- A. 心脾两虚证
- B. 肝肾阴虚证
- C. 脾肾阳虚证
- D. 脾胃虚弱证
- E. 湿热蕴结证

113. 治法宜选用

- A. 温补脾肾，益精养血
- B. 健运脾胃，益气养血
- C. 补脾养心，益气生血
- D. 滋养肝肾，益精生血
- E. 滋水涵木，益气生血

114. 其首选方剂是

- A. 归脾汤
- B. 左归丸
- C. 右归丸
- D. 异功散

(115~117 题共用题干)

患儿，男，4岁。大便秘结，脘腹胀满，不思饮食，恶心呕吐，口臭，手足心热，小便少，舌质红，苔黄厚，脉沉有力。

115. 其诊断是

- A. 食积便秘
- B. 燥热便秘
- C. 气滞便秘
- D. 气虚便秘
- E. 血虚便秘

116. 其治法是

- A. 消积导滞通便
- B. 清热润肠通便
- C. 理气导滞通便
- D. 益气润肠通便
- E. 养血润肠通便

117. 治疗应首选

- A. 黄芪汤
- B. 麻子仁丸
- C. 六磨汤
- D. 枳实导滞丸
- E. 润肠丸

(118~120 题共用题干)

患儿，女，5岁。因右侧腮部肿痛5天就诊。现证见腮部漫肿，灼热疼痛，咀嚼时尤甚，精神倦怠，高热头痛，咽喉红肿，大便干结，小便短赤，舌质红，苔黄腻，脉滑数。

118. 根据患者症状此病辨证为

- A. 邪犯少阳证
- B. 热毒壅盛证
- C. 邪陷心肝证
- D. 肝胆火盛证
- E. 肝经湿热证

119. 治疗宜采用的治法为

- A. 清热解毒，息风开窍
- B. 疏风清热，散结消肿
- C. 清热解毒，软坚散结
- D. 清肝泻火，活血止痛
- E. 清肝泻火，散结消肿

120. 治疗采用的代表方为

- A. 仙方活命饮
- B. 荆防败毒散
- C. 黄连解毒汤
- D. 三仁汤
- E. 普济消毒饮

B1 型题

答题说明

以下提供若干组考题，每组考题共同使用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(121~122 题共用备选答案)

- A. 溃疡
- B. 疮疡
- C. 肿疔

E. 痈疽

- 121. 一切体表浅显的外科疾患称
- 122. 一切体表未溃破的肿块称

- A. 挂线法
- B. 内治法
- C. 手术切除
- D. 砭镰法
- E. 挑治法

123. 肉瘰早期的治法是

124. 石瘰早期的治法是

(125~126 题共用备选答案)

- A. 气瘤
- B. 血瘤
- C. 筋瘤
- D. 肉瘤
- E. 骨瘤

125. 体表血络扩张, 纵横交集的肿瘤, 属于

126. 发于皮里膜外, 由脂肪组织过度增生而形成的肿瘤, 属于

(127~128 题共用备选答案)

- A. 硫黄软膏
- B. 青黛膏
- C. 黄连膏
- D. 黄柏霜
- E. 硼酸水

127. 儿童干性湿疹的外治, 应选用

128. 成人慢性湿疹的外治, 应选用

(129~130 题共用备选答案)

- A. 红丝疔
- B. 蛇头疔
- C. 蛇眼疔
- D. 蛀节疔
- E. 蛇肚疔

129. 生于手指骨节间的疔疮称为

130. 生于指腹部的疔疮称为

(131~132题共用备选答案)

- A. 丹栀逍遥散
- B. 乌药汤

- D. 天仙藤散
- E. 龙胆泻肝汤

131. 治疗子肿脾肾两虚证, 应首选

132. 治疗子肿气滞湿阻证, 应首选

(133~134 题共用备选答案)

- A. 血虚证
- B. 痰湿证
- C. 血瘀证
- D. 肾虚证
- E. 气滞证

133. 不属于月经后期常见证候的是

134. 不属于月经过少常见证候的是

(135~136 题共用备选答案)

- A. 癥瘕
- B. 不孕症
- C. 痛经
- D. 带下病
- E. 外阴炎

135. 可用坐浴法治疗的疾病是

136. 可用阴道纳药法治疗的疾病是

(137~138 题共用备选答案)

- A. 脾胃虚弱
- B. 脾虚痰湿
- C. 肝胃不和
- D. 肝经湿热
- E. 肝郁脾虚

137. 恶阻, 口淡, 呕吐清涎者, 多为

138. 恶阻, 口苦, 呕吐酸水或苦水者, 多为

(139~140 题共用备选答案)

- A. 逍遥散
- B. 香砂六君子汤
- C. 四君子汤
- D. 八珍汤
- E. 四物汤

139. 子晕气血虚弱证, 治疗应首选的方剂是

140. 妊娠恶阻脾胃虚弱证, 治疗应首选的方剂是

(141~142 题共用备选答案)

- A. 风
- B. 动
- C. 抽
- D. 搐
- E. 火

141. 属急惊风四证的是

142. 属惊风八候的是

(143~144 题共用备选答案)

- A. 心悸不宁, 胸闷憋气, 心前区痛如针刺, 舌质紫暗, 脉结代
- B. 心悸不宁, 憋气乏力, 少气懒言, 烦热口渴, 舌红少苔, 脉细数
- C. 心悸怔忡, 神疲乏力, 畏寒肢冷, 舌质淡胖, 脉缓无力
- D. 寒热起伏, 心悸胸闷, 肌肉酸痛, 腹痛泄泻, 舌质红, 苔黄腻, 脉濡数
- E. 心悸气短, 胸闷胸痛, 发热咳嗽, 咽红肿痛, 舌红脉数

143. 病毒性心肌炎湿热侵心证的证候有

144. 病毒性心肌炎痰瘀阻络证的证候有

(145~146题共用备选答案)

- A. 外邪引动伏痰, 痰阻气道
- B. 感受外邪, 肺气郁闭
- C. 感受外邪, 肺气失宣
- D. 肺脾肾不足, 痰饮内伏
- E. 脾肾阳虚, 肾不纳气

145. 哮喘发作期的主要病机是

146. 哮喘缓解期的主要病机是

(147~148 题共用备选答案)

- A. 大定风珠
- B. 十全大补汤
- C. 缓肝理脾汤
- D. 人参五味子汤
- E. 银翘散

147. 治疗小儿慢惊风脾虚肝亢证, 应首选

148. 治疗小儿肺炎喘嗽肺脾气虚证, 应首选

(149~150 题共用备选答案)

- A. 面色少华, 精神尚好
- B. 脘腹胀满, 舌苔厚腻
- C. 形体消瘦, 精神萎靡
- D. 腹痛拒按, 暖气泛酸
- E. 神疲肢倦, 大便不调

149. 积滞的主要症状有不思乳食, 伴见

150. 疳证的主要症状有不思乳食, 伴见